Unterschiede betreffen die Genitalmorphologie. Folgende Grössen der einzelnen Genitalpartien wurden bei den tschechischen Faltern festgestellt:

L. reali: Männchen (25 Ex.): Aedeagus 1,8 - 2,1 mm, Saccus 0,7 - 1,0 mm; Weibchen (11 Ex.): Ductus bursae 0,8 - 1,0 mm.

Leptidea sinapis: Männchen (64 Ex.): Aedeagus 1,4 - 1,7 mm, Saccus 0,5 - 0,7 mm; Weibchen (29 Ex.): Ductus bursae 0,5 - 0,7 mm.

Die Arten weisen das syntopische Vorkommen auf. Hinter den Fundortsnamen im "Material" werden die Nummern der faunistischen Quadrate angegeben.

Klapalekiana, **31**: 39, 1995
ISSN 1210-6100

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC - 21

Coleoptera: Chrysomelidae

Chaetocnema (Tlanoma) major (Jacquelin du Val, 1852). Bohemia or., Žamberk (5964), 6.vii.1992, 1 ♂, P. Čížek leg., det. et coll. On the vegetation of the dry pond. Distribution: Spain, southern France, Corsica, Romania, Bulgaria, Hungary, Moldavia, south of european Russia, Turkey, Morocco (Gruev & Tomov 1986: 290-292). In central Europe known from southern and eastern Slovakia (Král 1954; Čížek, Hejkal & Stanovský 1995). New species for the Czech Republic.

ČÍŽEK P., HEJKAL J. & STANOVSKÝ J. 1995: *Klapalekiana,* 31: 1-10. - GRUEV B. & TOMOV V. 1986: *Chrysomelidae II. Fauna na Balgaria 16.* IBAN, Sofia, 388 pp. - KRÁL J. 1954: *Ročen. Čs. Společ. Entomol.,* 51: 177-180.

Petr ČÍŽEK, Nádražní 55,
CZ-564 01 Žamberk, Czech Republic