Slovakia: Ulič, 1965, lgt. M.Sláma.

Pristaulacus schlettereri Kiefer ex Xylotrechus arvicola Olivier, Bohemia: Nižbor, 7.1964, lgt. M.Sláma.

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE HOSTS OF ICHNEUMON FLIES II

The present paper is a continuation of a previous contribution published in Vol.I. No 4 of this periodical. Both contributions report on hosts of ichneumon flies, obtained from the breedings by the members of the Czechoslovak Entomological Society as well as scientists of various institutes. Species marked with /+/ are considered by the author to be new observations on host species. Hosts given under the remaining species of Ichneumonidae have already been stated in literature.

Apart from the data on the family Ichneumonidae, the present paper includes several observations on rare members of the families Aulacidae and Stephanidae. The author will continue publishing the data of the hosts of ichneumon flies in subsequent papers.

AMPHIMALLON (ERIOTROGUS) ERIVANICUS REITTER (COLEOPTERA - SCARABAEOIDEA, MELOLONTHIDAE) - NOVÝ DRUH PRO ČESKOSLOVENSKO

Petr R y b á ř

Některé entomologické nálezy se po spolehlivé determinaci mohou ukázat velmi důležité, leckdy i značně překvapující a neočekávané. Bylo tomu tak i v případě nálezu Amphimallon (Eriotrogus) erivanicus Reitt. z čeledi Melolonthidae, který s velkou ochotou určil dr.V.Balthasar.

Jedná se o jedinou samičku, kterou jsem chytil v poledních hodinách dne 5.června 1966 na lokalitě mezi zříceninou Dívčích hradů a nejvyšším bodem Pavlovských vrchů na jižní Moravě. Získaný exemplář (17 mm) plně vyhovuje originálnímu Reitterovu popisu. Příslušnost k rodu Amphimallon určuje devět článků tykadel. Někdy bývá tento rod spojován s rodem Rhizotrogus, ten má však tykadla desetičlánková. Pro podrod Eriotrogus, který má pouze jediný druh, je mj. charakteristická neobroubena ba-

ze štítu.

Tento nález nového druhu pro ČSSR, ale očividně i pro Evropu, je zajímavý zejména po zoogeografické stránce. Amphimallon erivanicus byl dosud vzácně sbírán pouze v Zakavkazí (Armenie, vých.Gruzie, Azerbajdžan, Nachičevanská ASSR). Protože nejsou známy nálezy z jiných oblastí, lze usuzovat pouze na jeho expanzi k nám. Naskýtají se zhruba dvě možnosti; první spojnice vede přes Ukrajinu, Rumunsko a Maďarsko, druhá naopak přes Malou Asii, Bulharsko, Jugoslávii a opět Maďarsko. V obou případech lze tedy uvažovat o možnosti výskytu i na jižním Slovensku, případně i v Rakousku. Potvrzení těchto úvah však mohou přinést pouze další nálezy z území předpokládané expanze.

Fakt, že tento poměrně velký druh dosud unikal pozornosti, lze přičíst nejen jeho zjevně řídkému výskytu, ale také nedostatečnému faunistickému výzkumu jihovýchodní Evropy a možno říci i našeho území.

AMPHIMALLON (ERIOTROGUS) ERIVANICUS REITTER (COLEOPTERA - SCARABAEOIDEA, MELOLONTHIDAE) - EINE NEUE ART FÜR DIE TSCHECHOSLOWAKEI

Die genannte Amphimallon-Art (sg. Eriotrogus) wurde bisher nur von Transkaukasien bekannt, wo sie übrigens nur selten vorkommt. Die Entdeckung dieser Art in Süd-Mähren (Palauer Berge, 5.6.1966) wirkt daher in höchstem Masse überraschend und ist vom zoogeographischen Standpunkt aus sehr interessant, desto mehr, da die Art von keiner Lokalität bekannt ist, die uns den Weg der Verbreitung bis nach Süd-Mähren verraten könnte. Jedenfalls muss man annehmen, dass die Art entweder in Klein-Asien oder in der Süd-Ukraine und in Rumänien oder auf der Balkanhalbinsel, und wohl auch in Ungarn und in der Süd-Slowakei vorkommt. Erst die zukünftige faunistische Forschung in den genannten Gebieten kann uns eine verlässlichere Antwort geben. Die Determination des gefundenen Beleges übernahm gefälligst Dr.Vladimír Balthasar, wofür ich ihm an dieser Stelle danke.

LITERATUR

M e d v e d e v S.I., 1955: Fauna SSSR, Scarabaeidae I: 488. R e i t t e r E., 1902/1903: Bestimmungstabelle der

Melolotnidae III: 253. Z a i c e v F.A., 1927: Izv. Tiflisk. Gos. politechn. Inst., 3: 373-395.

Z P R Á V Y O R G A N I Z A Č N Í

Vede dr.L.Heyrovský

6. pracovní schůze členů se konala v posluchárně Přírodovědecké fakulty Karlovy university dne 19. listopadu 1966 s úvodním referátem dr. Zd. Boučka, CSc. " O mezinárodních nomenklatorních předpisech v entomologii". Následovala čilá diskuse, která nemohla být pro krátkost času ukončena a proto usneseno, pokračovat o tomto tématu v další pracovní schůzi. Účast 40 členů.

7. pracovní schůze konána byla v obvyklých místnostech dne 17. prosince 1966 o stejném tématu a setkala se rovněž s živým zájmem účastníků. Účast 30 členů.

8. pracovní schůze konána dne 4. února 1967 s úvodním referátem dr. Vl.Landy, CSc., na téma "Využití výsledků srovnávací anatomie pro taxonomii a fylogenesi". Následovala diskuse. Účast 25 členů.

9. pracovní schůze konala se dne 1.dubna 1967 v obvyklých místnostech s referátem doc.dr.J.Mařana, "Vznik geografických plemen u brouků a rovnokřídlých". Po debatě byla prováděna determinace některých čeledí Coleopter. Účast 25 členů.

Podle usnesení ústředního výboru byl uspořádán ve dnech 4.-5.března 1967 jarní sraz entomologů, spojený s výstavkou a výměnou hmyzu. Dne 4.března se konal přátelský večírek účastníků v Černém pivovaru. V neděli, dne 5.března následovala výměna hmyzu od 7-12 hodin v sálech domu Energetiky v Praze 7-Holešovicích, Bubenská 1 za velké přítomnosti přes 200, převážně mimopražských účastníků. Výstavku Lepidopter a jejich vývojových stadií uspořádal s. J. Háša. V přednáškové části promluvil předseda dr.L. Heyrovský o účelu a vývoji výměnných entomologických dnů u nás i v cizině a dr.J.Strejček o organizovaném faunistickém výzkumu hmyzu v ČSSR. Tímto zdařilým podnikem v důstojném prostředí byly dřívější výměnné dny pořádané mimo rámec společnosti uvedeny na žádoucí úroveň. Podnik se těšil velké pozornosti a byl přijat s velkým ohlasem účastníků.