REFERENCES

ANDERSON R. S. & PECK S. B. 1986: Geographic patterns of colour variation in American Nicrophorus burying beetles (Col.: Silphidae). *J. Natur. Hist.*, 20: 283-297.

BICKHARDT H. 1909: Die Varietäten unserer schwarzen Totengräberarten. *Entomol. Blätter*, 4: 73-76.

FISCHER VON WALDHEIM G. 1842: Catalogus coleopterorum in Sibiria Orientali a Cel. Gregorio Silide Karelin collectorum. Moscow, 28 pp.

HATCH M. H. 1928: Silphidae II. Pp. 63-244. In: SCHENKLING S. (ed.): *Coleopterorum Catalogus, Pars 95*. W. Junk, Berlin, 244 pp.

HLISNIKOVSKÝ J. 1964: 3. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Necrophorus F. (Col.: Silphidae). *Reichenbachia*, 3: 223-225.

PECK S. B. & ANDERSON R. S. 1985: Taxonomy, phylogeny and biogeography of the carrion beetles of Latin America (Col.: Silphidae). *Quest. Entomol.*, 21: 247-317.

PORTEVIN G. 1926: Les grandes Necrophages du Globe. *Encyclopedie Entomol.*, 6: 1-270.

PUKOWSKI E. 1933: Oekologische Untersuchungen an Necrophorus F. *Z. Oekol. Morphol. Tiere*, 27: 518-586.

SEMENOV-TIAN-SHANSKIY A. P. 1933: De tribu Necrophorini (Col.: Silphidae) classificanda et de ejna distributione geographica. *Trav. Inst. Zool. Acad. Sci. URSS*, 1 (1932): 149-160.

SHCHEGOLEVA-BAROVSKAYA T. 1933: Les Necrophorini (Col.: Silphidae) de la faune de l'URSS. *Ibid.*, 1: 161-191.

SIKES D. S. 1993: The black burying beetle Nicrophorus nigrita (Col.: Silphidae), displays red maculation. *Coleopt. Bull.*, 47: 231.

SOUHRN

Druh *Nicrophorus lunatus* je jedním z nejrozšířenějších druhů rodu *Nicrophorus* na území střední Asie. Byl sbírán v horských oblastech okolo vodních zdrojů na území dnešního Kazachstánu, Kyrgyzstánu a zasahuje i na území Číny (obr. 6). V materiálu, který jsem měl k dispozici, jsem objevil větší počet jedinců, majících odlišné zbarvení než exemplář popsaný Fischerem von Waldheimem. Rozdíly se projevují postupnou redukcí červené pásky na krovkách (obr. 1-5). Nové poznatky o velikosti a zbarvení druhu *Nicrophorus lunatus* jsou důležité při determinaci a z hlediska jeho systematického zařazení.

Klapalekiana, **32**: 170, 1996
ISSN 1210-6100

FAUNISTIC RECORD FROM THE CZECH REPUBLIC - 45

Coleoptera: Dermestidae

Dermestes erichsoni Ganglbauer, 1904. Bohemia centr., Kladno - Max mine (5850), 13.vi.1954, 1 ♀, O. Voříšek lgt., J. Háva det. et coll. Species distributed throughout Europe and western Asia, from the Czech Republic reported only from Moravia (Kalík 1993). New species for Bohemia.

KALÍK V. 1993: Dermestidae, pp. 84-85. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Fol. Heyrovskyana, Suppl.* 1: 3-172 (in English and Czech).

Jiří HÁVA, Šluknovská 319,
CZ-190 00 Praha 9, Czech Republic