Olexa lgt. festgestellt. 3. Crypt. pygmaeus Fabricius 1752. Fast alle bisher so determinierten Exemplare aus der Tschechoslowakei erwiesen sich als Cr. vittula. Crypt. pygmaeus wurde nur zweimal im Gebirge České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge) gesammelt: Boh. Radejčín, A.Láska lgt., Boh. Hliňany, A.Láska lgt. Herr A.Láska hat zugleich als erster die Frage pygmaeus - vittula gelöst. Die Determination wurde durch Vergleich mit Exemplaren aus Deutschland, die Herr Dr.A.Lohse bereitwillig geliehen hat, und mit der Untersuchung des Aedoeagus, die Herr Voříšek jun. durchgeführt hat, gesichert. Die beiden Arten wurden von verschiedenen Pflanzen angegeben. Ich konnte Crypt.vittula an einer trockenen Lokalität an Mentha sp. (positive Frassprobe!) in Böhmen bei Štěchovice 7.1959 feststellen. Meiner Meinung nach beziehen sich die Angaben von Labiaceen (Mentha , Origanum, Thymus) wahrscheinlich auf Crypt. vittula, die Angaben von Asteraceen (Achillea, Solidago) auf Crypt. pygmaeus.

LITERATURA

A p f e l b e c k V., 1916: Wiss.Mitt.Bosn.Herzeg., 13. B u r l i n i M., 1955: Revisione dei Cryptocephalus Italiani etc. in Mem. della Soc.Ent.Ital., 34: 5-287. H o r i o n A., 1935: Nachtrag zu Fauna Germanica. Krefeld. K a s z a b Z., 1962a: Beiträge zur Kenntnis der Chrysomeliden-Fauna des Karpathenbeckens etc. in Folia Ent.Hung. 15(n.s.): 25-93. K a s z a b Z., 1962b: Chrysomelidae in Fauna Hungariae. Budapest. M o h r K.H., 1966: in Freude, Harde, Lohse: Käfer Mitteleuropas, 9: 95-299. M ü l l e r G., 1948: Atti Mus.Civ.Stor.Nat.Trieste, 17. M ü l l e r G., 1951: Col.Ven.Giul. 2. N e r e s h e i m e r et W a g n e r , 1930: Col. Zentralblatt 5:224. R e i t t e r E., 1912: Fauna Germanica IV. Stuttgart. W e i s e J., 1882: Naturg.Ins.Deutsch.Col.VI. Berlin 1881-1893.

ENTHERPIA NOBILIARIA (HERRICH-SCHÄFFER) NOVÁ PRO NAŠE ÚZEMÍ (GEOMETRIDAE, LARENTIINAE)

Jaroslav W i c h r a

Ve dnech 29.června až 5.července 1961 jsem podnikl denní

exkurzi do Belanských Tater. Kromě mnoha horských píďalek jsem chytil 5 exemplářů, které jsem považoval za Entherpia cyanata (Hbn.). Dva jedinci byly nápadně mastného lesku a určeny jako Entherpia nobiliaria (H.-S.). Rozdíly těchto druhů jsou výstižně uvedeny v klíči Błeszyńskéhe, 1965. Z polských Tater uvádí druh E. nobiliaria (H.-S.) Niesiołovski (1932), kde byl chycen 21.8. jeden exemplář. V Prodromu Lepidopter Slovenska vyslovuje prof.K.Hrubý (1964) domněnku o možném výskytu druhu i na naší straně Tater, která byla mým nálezem potvrzena. Při uvedené exkurzi do Belanských Tater jsem zjistil z příbuzných druhů několik Calostigia aptata (Hbn.), 2 Calost. turbata (Hbn.), 5 Calost. salicata (Hbn.), 3 Venusia cambrica (Curtis), 4 Coenotephria nebulata (Treitschke), 2 Enthepria flavicinctata (Hbn.) a 3 zmíněné Enth. cyanata (Hbn.).

ENTHERPIA NOBILIARIA (HERRICH-SCHÄFFER) NEU FÜR DIE TSCHECHOSLOWAKEI (GEOMETRIDAE, LARENTIINAE)

Entherpia nobiliaria (Herrich-Schäffer) wurde auch in der Slowakei in der Belaner Tatra (29.Juni bis 5.Juli 1961, Wichra lgt. et det.) festgestellt. Diese Art war bereits von polnischer Tatra bekannt.

LITERATURA

B ł e s z y ń s k i S., 1965: Hydriomeninae-Geometridae, t. 46b, Klucze do oznaczania owadów Polski, Warszawa. H o l d h a u s K., 1912: Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen (Glazialrelikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge. Annalen des Hofmuseums, 26: 399-440, Wien. H r u b ý K., 1964: Prodromus Lepidopter Slovenska, Bratislava. N i e s i o ł o w s k i W., 1932: Przyczynek do fauny motyli wiekszych (Macrolepidoptera) Tatr polskich. Sprawozd.kom.fizjogr.Pol.Ak. Um., 66: 101-113, Kraków.