

VZÁCNÝ NÁLEZ MOTÝLA PRODOTIS STOLIDA (F.) V ČECHÁCH
(LEP. NOCTUIDAE)

Josef L e v ý

Za teplého večera dne 20.9.1963 přilétla mi v údolí řeky Otavy na okraji Písku ke světlu čistá neolétaná samička motýla Prodotis stolida (F.). Domnívám se, že se vylíhla v blízkosti místa, na kterém jsem chytal. I její způsob letu tomu nasvědčoval. Kromě ní jsem z migrujících motýlů na témže místě dne 11.8.1953 ulovil Chloridea scutosa (Den. et Schiff.) a dne 31.7.1958 Chl. peltigera (Den. et Schiff.). Na Slunečném pobřeží v Bulharsku se tyto tři druhy vyskytují ve větším množství společně. V Československu chytil Prodotis stolida (F.) K.Hrubý 25.8.1954 v Mlýňanském arboretu a J.Patočka v Bánské Štiavnici. Hrubý (1952) předpokládá její výskyt i v Čechách. Podle sdělení p.Dr.F.Kasya jsou známy dva nálezy z Rakouska: Vídeň, 19.okres a Pfaffenburg u Deutschaltenburgu v blízkosti československo-maďarských hranic. Dále byla ulovena v Míšni v Sasku, r.1933 v Anglii a údaj o nálezu severně od Berlína je v práci Haegerové. Zajímavé je, že byla několikrát zjištěna v oblasti Baltického moře (Estonsko, Dánsko, Farelofinská SSR, Finsko), jak uvádí Kaisila 1962. V jižním Finsku byla zjištěna dvakrát, a to r.1955 a 1957. Wolfsberger 1965 píše o výskytu tohoto druhu v oblasti Gardského jezera. Jinak je Prodotis stolida (F.) známa z Francie (Nice, Digne), ze severní Itálie, Maďarska (Budapešť), Rumunska, Bulharska a Ukrajiny.

Motýl nalezený u Písku je v mé sbírce. Za poskytnutí informací děkuji p.Dr.F.Kasyovi a p.Ing.K.Spitzerovi.

EIN SELTENER FUND DES FALTERS PRODOTIS STOLIDA (F.) IN BÖHMEN
(LEP. NOCTUIDAE)

Die Art wurde den 20.9.1963 im Tale der Otava bei Písek in Südböhmen in einem frischen weiblichen Stück aufs Licht gefangen. Ferner wurden Fundorte in und ausserhalb der Tschechoslowakei aufgezählt.

LITERATURA

H r u b ý K., 1956: Motýlí fauna Mlyňanského arboreta. Biol.práce SAV, 3: 74. Bratislava. H r u b ý K., 1964: Pro-dromus Lepidopter Slovenska. Praha. G a b r i e l l i G., 1901: Leucanitis stolidus F. Budapesti faunában. Rovart. Lapok, 8: 189. Budapest. T h u r n e r, 1964: Die Lepidopterenfauna jugoslawisch Mazedoniens. I. Rhopalocera, Grypocera und Noctui-dae. Prirod.Muz. Skopje, Posebno Izdanie, 1: 158. K a i s i l a J., 1962: Immigration und Expansion der Lepidopteren in Finnland in den Jahren 1869-1960. Acta ent.fenn., 18: 1-452. H a e g e r E., 1955: Irrgäste aus dem Süden. Mitt.Deutsch.Ent.Ges., 15: 56-57. K l j u č k o Z.F., 1963: Sovki zapadných oblastěj Ukrainy. Izd. Kijev Universiteta. B u r e š I., T u l e š k o v K., 1932-1943: Peperudnata fauna na Bulgaria. Bul.Inst.Hist. Nat.Sofia. W o l f s b e r g e r J., 1965: Die Macrolepido-pteren-Fauna des Gardaseegebietes. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale, Vol. 13: 245, 39 figg., 16 tav. H e i - n i c k e W., 1965: Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. Beiträge zur Entomo-logie 15, NR: 5/6. S o u t h R., 1933: The Moths of the Bri-tish Isles 2. London.

POZORUHODNÉ NÁLEZY MOTÝLŮ NA SEVERNÍ MORAVĚ

Miloslav K u d l a

Pro území Moravy mohou zaznamenati tři pozoruhodné nálezy motýlů, a to:

1. Hippotion celerio (L.). Mnoho desítiletí nebyl tento vzácný jižní lišaj na území naší republiky pozorován. Většina publikovaných nálezů pochází z minulého století. V Litovli při-létl dne 25.8.1966 za světlem do bytu v přízemním domku poblíž jižního okraje města l samec. Motýl je naprosto bezvadný a lze soudit, že se v blízkosti vylíhl.

2. Apamea (Parastichtis) illyria (Fr.). V Karlově Studánce (Hrubý Jeseník) byli dne 17.-18.6.1957 uloveni na světlo dva