LITERATURA

H r u b ý K., 1956: Motýlí fauna Mlyňanského arboreta. Biol.práce SAV, 3: 74. Bratislava. H r u b ý K., 1964: Prodromus Lepidopter Slovenska. Praha. G a b r i e l l i G., 1901: Leucanitis stolida F. Budapesti faunában. Rovart. Lapok, 8: 189. Budapest. T h u r n e r , 1964: Die Lepidopterenfauna jugoslawisch Mazedoniens. I. Rhopalocera, Grypocera und Noctuidae. Prirod.Muz. Skopje, Posebno Izdanie, 1: 158. K a i s i l a J., 1962: Immigration und Expansion der Lepidopteren in Finnland in den Jahren 1869-1960. Acta ent.fenn., 18: 1-452. H a e g e r E., 1955: Irrgäste aus dem Süden. Mitt.Deutsch.Ent.Ges., 15: 56-57. K l j u č k o Z.F., 1963: Sovki zapadných oblastěj Ukrainy. Izd. Kijev Universiteta. B u r e š I., T u l e š k o v K., 1932-1943: Peperudnata fauna na Bulgaria. Bul.Inst.Hist. Nat.Sofia. W o l f s b e r g e r J., 1965: Die Macrolepidopteren-Fauna des Gardaseegebietes. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale, Vol. 13: 245, 39 figg., 16 tav. H e i n i c k e W., 1965: Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. Beiträge zur Entomologie 15,NR: 5/6. S o u t h R., 1933: The Moths of the British Isles 2. London.

POZORUHODNÉ NÁLEZY MOTÝLŮ NA SEVERNÍ MORAVĚ

Miloslav K u d l a

Pro území Moravy mohu zaznamenati tři pozoruhodné nálezy motýlů, a to:

1. Hippotion celerio (L.). Mnoho desítiletí nebyl tento vzácný jižní lišaj na území naší republiky pozorován. Většina publikovaných nálezů pochází z minulého století. V Litovli přilétl dne 25.8.1966 za světlem do bytu v přízemním domku poblíž jižního okraje města 1 samec. Motýl je naprosto bezvadný a lze soudit, že se v blízkosti vylíhl.

2. Apamea (Parastichtis) illyria (Fr.). V Karlově Studánce (Hrubý Jeseník) byli dne 17.-18.6.1957 uloveni na světlo dva

samci, Kudla lgt. Na území naší republiky byl tento druh znám dosud z Čech (Slabý). Nový pro Moravu.

3. Callogonia virgo (Tr.) je známa od nás z pozdější doby ze Slovenska. V Doloplazech u Olomouce přiletěl ke světlu dne 17.6.1966 1 samec, Bleša lgt. Nový pro Moravu.

BEMERKENSWERTE LEPIDOPTERENFUNDE IN NORDMÄHREN

Es werden drei interessante Lepidopterenfunde aus Nordmähren gemeldet, davon sind die zwei letztgenannten neu für Mähren. Hippotion celerio (L.) wurde in Mähren seit mehreren Jahrzehnten nicht beobachtet.

LITERATURA

S l a b ý O., 1954: Parastichtis illyria Frr. v západních Čechách a problém jejího výskytu a původu. Acta Soc.Ent.Čechoslov., 51: 193-196.

K VÝSKYTU ECTOBIUS SYLVESTER (PODA 1761), ECTOBIUS LAPPONICUS (LINN. 1745) A PHYLLODROMICA MACULATA (SCHREBER 1781) V LESNÍCH A REKREAČNÍCH CHATÁCH

Jaroslav A š m e r a

Krajská hygienická stanice Ostrava

V Severomoravském kraji jsme se několikrát setkali s výskytem rusce lesního Ectobius sylvester (Poda 1761) v lesních a rekreačních chatách, a to tak, že nám byl uvedený druh donesen k určení.

V odborné literatuře je citován Linnaeus 1761, který první uvedl, že ve volné přírodě se vyskytující rusec laponský - Ectobius lapponicus napadá v Laponsku a jiných severských státech tamním obyvatelům zásoby sušených ryb připravených pro zimní období v domech a způsobuje tak někdy citelné škody. Tento údaj převzaly všechny entomologické publikace, např. Wattenwyl 1882, Lucas 1920, Obenberger 1926, 1955, Tümpel 1922, Bar-