



KLAPALEKIANA

VOL. 33, SUPPLEMENTUM

ISSN 1210-6100

1997



Pokračování titulu *Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV* (ISSN 0862-478X). Vydává Česká společnost entomologická.

A continuation of *Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV* (ISSN 0862-478X). Published by the Czech Entomological Society.

Redakční rada/Editorial Board:

David S. Boukal, Zdeněk Černý, Jan Horák, Karel Hůrka, David Král,
Ivo Novák (předseda/Chairman), Jan Růžička, Jaromír Střejček,
Jan Vitner (výkonný redaktor/Executive Editor), Vladimír Vrabec.

Rozšiřuje vydavatel. Objednávky a rukopisy zasílejte na adresu:
Česká společnost entomologická, Viničná 7, 128 00 Praha 2.

Distributed by the Publisher. Orders and the manuscripts of the articles should be sent to the
Czech Entomological Society, Viničná 7, CZ-128 00 Praha 2, Czech Republic.

Sazba/Typeset by: Bi-MAC Graphics Inc.
Vytiskla/Printed by: Tiskárna Flora s.r.o., Praha.

Toto číslo vyšlo za podpory MŠMT ČR a firem Bi-MAC Graphics Inc.
(zastoupené p. Jakubem Rolčíkem) a Price Print Service (zastoupené p. Martinem
Linhartem).

This issue was supported by the Ministry of Education of the Czech Republic,
Bi-MAC Graphics Inc. (represented by Mr. Jakub Rolčík) and Price Print Service (repre-
sented by Martin Linhart).

ISSN 1210-6100

Klapalekiana Vol. 33, Supplementum

1997 Dec. 15

© Česká společnost entomologická, Praha, 1997

Excerptováno/Covered by: Entomology Abstracts, Zoological Record.

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha čj. NP 511/1994 ze dne 15.3.1994.

Katalog motýlů (Lepidoptera) Čech Katalog der Falter (Lepidoptera) Böhmens Catalogue of the Bohemian Lepidoptera

Ivo NOVÁK¹⁾ & Jan LIŠKA²⁾

a spolupracovníci - unter Mitarbeit von - in cooperation with

Gustav ELSNER³⁾, Josef JAROŠ⁴⁾, Miloslav PETRŮ⁵⁾, Jan SKYVA⁶⁾,
Karel SPITZER⁴⁾, Karel ŠPATENKA⁷⁾, Jiří VÁVRA⁸⁾
& Zdeněk WEIDENHOFFER⁹⁾

¹⁾Masarykova 882, CZ-252 63 Roztoky u Prahy

²⁾Strnady 136, CZ 156 04 Praha 5 - Zbraslav

³⁾Hůlkova 304, CZ-197 00 Praha 9 - Kbely

⁴⁾Institute of Entomology, Czech Academy of Sciences,
Branišovská 31, CZ-370 05 České Budějovice

⁵⁾Revoluční 25, CZ-110 00 Praha 1

⁶⁾Buzulucká 3, CZ-160 00 Praha 6 - Dejvice


⁷⁾Výletní 362, CZ-144 00 Praha 4

⁸⁾Nečova 18, CZ-143 00 Praha 4 - Modřany

⁹⁾Vyžlovská 2243, CZ-100 00 Praha 10

Faunistics, Lepidoptera, list of species, Bohemia, Czech Republic

Abstract. A systematic list of the Lepidoptera recorded in the territory of Bohemia (the historical part of the Czech Republic, Central Europe) is given, linking up with analogous check-lists of Moravia-Silesia and Slovakia (former Czechoslovakia) which appeared several years ago. Reference to the first record is made for each species including exact data about unpublished or recently confirmed species. Problematic species or those interesting from various points of view are annotated. The possibly complete list of faunistic papers on the Bohemian lepidopterous fauna, published since 1929 is added. The Catalogue includes 2936 species, 97 are new for the Bohemian fauna or the whole Czech Republic. The catalogue is written in Czech and German with English Introduction and headings.



Obr. 1. Česká republika s historickým územím Čech (šedá plocha) a vyznačenými čtverci pro faunistické síťové mapování.

Abb. 1. Die Tschechische Republik mit dem historischen Gebiet Böhmens (graue Fläche) und bezeichneten Feldern für die faunistische Rasterkartierung.

Fig. 1. The Czech Republic with the historical territory of Bohemia (grey area) and marked faunistic grid mapping fields.

OBSAH - INHALT - CONTENTS

Úvod Einleitung Introduction	4
Přehled systému s počty druhů System mit Artenzahlen System with numbers of species	16
Seznam motýlů Čech Verzeichnis der Falter Böhmens List of the Bohemian Lepidoptera	19
Komentáře Kommentare Comments	69
Nové, z Čech dosud neuváděné druhy Neue, für Böhmen bisher nicht angegebene Arten New species for the Bohemian fauna	84
Nově potvrzené a ověřené nálezy druhů Neu bestätigte und überprüfte Artenangaben Recently confirmed and verified records	93
Neakceptované údaje o výskytu druhů Nicht akzeptierte faunistische Angaben Non accepted faunistic data	96
Soupis prací o fauně motýlů Čech Literaturquellen über die böhmische Schmetterlingsfauna Literature resources dealing with the Bohemian fauna of Lepidoptera	99
Sbírkové prameny Sammlungsquellen Collections	128
Literatura Literatur References	129
Seznam použitých zkratk jmen autorů taxonů Übersicht der benutzten Abkürzungen der Autorennamen Review of the used abbreviations of the authors names	131
Rejstřík rodů a vyšších systematických jednotek Index der Gattungen und höheren systematischen Einheiten Index of genera and higher systematic categories	133
Rejstřík druhových jmen Index der Artennamen Index of species names	140

ÚVOD

V posledních desetiletích dosáhl faunistický výzkum řádu Lepidoptera v Čechách značného pokroku, přesto však stále chyběla publikace, která by shrnovala nahromaděné výsledky a ukázala, jaký je současný stav znalostí fauny motýlů Čech. Posledním souborným dílem je Sterneckův „Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens“ z roku 1929, zahrnující v tehdejší době poměrně dobře prozkoumanou skupinu tzv. makrolepidopter. Druhá část, na které se podílel jako druhý autor F. Zimmermann, vyšla v r. 1933 a shrnuje tehdejší znalosti o čeledích ze skupiny tzv. mikrolepidopter, které jsou ovšem značně mezerovitě, neboť drobnými motýly se v Čechách na počátku století zabývalo jen nemnoho zájemců. Od té doby uplynulo více než 60 let, během kterých se sice objevilo několik obsažnějších faunistických studií (Hrubý 1959, Voldřich 1963, Novák & Spitzer 1972, Krampl 1973, Soldát & Starý 1978, Jaroš 1984 aj.), avšak většina výsledků je rozptýlena do menších příspěvků, které vycházely v nejrůznějších známých i méně známých, neztřídkách již zaniklých časopisech, a v jednorázových, často jen těžko dostupných sbornících a jiných příležitostných publikacích.

Chvályhodný záměr připravit seznamy hmyzu Československa začalo realizovat postupně entomologické oddělení Národního muzea v Praze ve spolupráci se specialisty na jednotlivé skupiny hmyzu, členy tehdejší Československé společnosti entomologické. První svazek celé série se objevil v roce 1977 a postupně byla zpracována většina hmyzích řádů. Je poněkud paradoxní, že nezpracována zůstala právě jedna z nejatraktivnějších skupin, totiž Lepidoptera. Opoždování přípravy seznamu československých motýlů vedlo mezi československými lepidopterology k jisté netrpělivosti, jejímž důsledkem bylo, že v r. 1989 vyšel samostatně seznam motýlů Slovenska a v r. 1993 obdobný seznam Moravy a české části Slezska. Za této situace zbývalo dokončení seznamu motýlů na území Čech, které se jevílo jako mimořádně naléhavé. Této práci se ujal skupina lepidopterologů z České společnosti entomologické a výsledkem je předložená publikace.

Autoři jsou si vědomi relativní hodnoty předkládaného „katalogu“, který přes všechno úsilí shromáždit co nejvíce údajů nemůže být úplný. Také naše výzva k zaslání citací publikovaných prací o motýlech na území Čech se setkala jen s částečným ohlasem. Spíše než za uzavřené dílo bude proto možné považovat připravený seznam za pracovní verzi, kterou bude třeba v budoucnu doplňovat a zdokonalovat. V každém případě však budou mít lepidopterologové k dispozici přehlednou pracovní pomůcku, která jim umožní základní orientaci v systému řádu Lepidoptera a v synonymice jednotlivých druhů a která se stane výchozí informací pro další faunistický výzkum motýlů na území Čech.

Základem nově předkládaného „Katalogu motýlů Čech“ jsou již zmíněná díla Sternecka (1929) a Sternecka & Zimmermanna (1933), v nichž je uvedeno z území Čech 2326 druhů, nepočítáme-li asi 250 dalších druhů, jejichž výskyt je oběma autory v různé míře zpochybněn. Údaje těchto dvou autorů kriticky přejímáme. Abychom zdůraznili jejich význam jako výchozího informačního materiálu, přiřazujeme jim v seznamu použitých literárních pramenů pořadová čísla 1 a 2, kdežto další faunistické práce jsou řazeny obvyklým způsobem abecedně. K přehodnocení údajů z Prodromu došlo zvláště u druhů, u kterých nastaly v průběhu let změny v taxonomickém pojetí, nebo které byly (s ohledem na tehdejší stav znalostí) evidentně chybně určeny. Je však třeba s uznáním konstatovat, že Jacob Sterneck a Friedrich Zimmermann přistupovali k hodnocení faunistických údajů velmi kriticky a svůj „Prodromus“ sestavili vyčerpávajícím a na tehdejší dobu obdivuhodným způsobem.

Území, které zahrnuje předkládaná publikace, je vymezeno historickými hranicemi Čech, případně hranicemi Země české v rámci předválečného Československa. Je to území totožné s tím, o kterém pojednával Sterneček (1929) a je znázorněno na přiložené mapce (obr. 1).

I když seznamy faun na území jednotlivých států bývají často příležitostí k řešení taxonomických nebo systematických problémů, v našem Katalogu motýlů Čech jsme se těmto otázkám většinou vyhnuli. Domníváme se, že zde pro tuto problematiku není vhodný ani dostatečný prostor, neboť účel katalogu je jiný. Z pragmatických důvodů jsme proto převzali prakticky beze změn členění řádu a pojetí čeledí a nižších taxonů včetně sledu druhů z Katalogu motýlů moravsko-slezského regionu (Laštůvka et al. 1993) a nepřihlíželi jsme k nejnovějším katalogům evropských Lepidopter (např. Vives Moreno 1994, Karsholt & Razowski 1996), neboť se domníváme, že to zájemcům umožní snadné porovnávání fauny motýlů obou regionů v rámci České republiky. K menším změnám jsme výjimečně přikročili pouze s přihlédnutím k nově publikovaným výsledkům některých autorů o taxonomii dílčích skupin a dále jsme podle nejnovější literatury upravili synonymiku na druhové úrovni, pokud došlo ke změnám od r. 1993. Také pokud jde o dodržování koncovek druhových jmen ve shodě s gramatickým rodem rodových jmen jsme se až na výjimky přidrželi pojetí Laštůvky et al. (1993) ve smyslu 3. vydání ICZN z roku 1985, kapitola VII, článek 31b (Houša & Štys 1988). Nezařazujeme ekologickou ani ochrannou klasifikaci jednotlivých druhů, neboť je v podstatě shodná v celé České republice a odkazujeme v tomto směru na již zmíněný moravsko-slezský katalog.

Pro zkušenostech s používáním moravsko-slezského katalogu a dvou slovenských (Patočka, Reiprich & Pastorális 1989, Pastorális & Reiprich 1995) jsme jednotlivé druhy průběžně očíslovali, neboť to usnadňuje jejich hledání pomocí rejstříku. Číslování je však čistě praktickou pomůckou a nemá souvislost s číslováním druhů v jakémkoliv jiném katalogu nebo číslovaném seznamu motýlů, jak bývá někdy zvykem.

Pokud jde o synonyma a homonyma platných jmen druhů, nebyl záměrem jejich úplný výčet, nýbrž pouze informace o těch nejdůležitějších. Omezili jsme se na ta, která jsou v lepidopterologické literatuře posledních let nejčastěji používána, na jména, která se objevují ve Sternečkově Prodromu českých motýlů a ta, která by mohla vyvolat pochybnosti o identitě jednotlivých druhů. U uvedených synonym a homonym neuvádíme závorky, neboť by nebylo možné při neustálých nomenklatorických změnách tuto úlohu v rozumné době důsledně dokončit. Z důvodu úspory místa jsme se u těchto jmen omezili také na použití zkratk autorů taxonů. U platných jmen jsou zkracovány z téhož důvodu pouze dlouhé a frekventované autorské dvojice nebo jména, jako jsou „Denis & Schiffermüller“ a „Herrich-Schäffer“, případně několik málo dalších. Pro vysvětlení použitých zkratk může posloužit „Seznam použitých zkratk autorů“, uvedený v závěru publikace.

V rámci přípravy seznamu jsme revidovali a uvádíme pokud možno veškerou literaturu o motýlí fauně Čech, která vyšla od třicátých let tohoto století, tj. od zveřejnění prodromů českých motýlů (Sterneck 1929, Sterneček & Zimmermann 1933), ze starších prací pouze takové, o nichž se oba autoři nezmíní. Citace uvedené Sternečkem a Zimmermannem neopakujeme, s výjimkou těch, ze kterých jsme čerpali nové nebo revidované údaje. V seznamu pramenů jsou zachyceny především faunistické práce, z prací taxonomických a aplikovaných pak pouze takové, v nichž se odkazuje na materiál pocházející z území Čech (např. materiál pro taxonomické studie, pro entomologické experimenty, fenologická pozorování zemědělských a lesnických škůdců apod.). Doufáme, že předkládaný soupis faunistických prací z území Čech (byť zřejmě ne zcela úplný) bude pro budoucí práci lepidopterologů cenným informačním materiálem.

Sbírkovými prameny jsou především soukromé sbírky jednotlivých členů autorského kolektivu a dalších kolegů a některé menší sbírky v profesionálních institucích. Z časových důvodů bylo nutno upustit od revize rozsáhlých sbírek v některých větších muzeích, jejichž fondy nejsou vždy dostatečně přístupné a přehledně uspořádané. Jejich časově náročná revize bude zřejmě v budoucnu zdrojem doplňků, případně oprav tohoto katalogu. Také ostatní sbírky byly revidovány pouze účelově, nikoliv vyčerpávajícím způsobem. Při práci jsme se nemohli vyhnout hodnocení některých sporných starších, ale i novějších údajů a ne vždy se nám podařilo najít dokladové exempláře pochybných nálezů.

Při hodnocení současného stavu české fauny Lepidopter je třeba vzít v úvahu zásadní změny české krajiny ve 20. století a vývoj klimatu. Z tohoto úhlu pohledu není třeba pochybovat o některých nálezech z 19. století, i když se nám dnes zdají neuvěřitelné. Na druhé straně jsou však údaje, které je nutno brát s rezervou jednak s ohledem na někdejší úroveň determinace, která se prováděla téměř výhradně podle habitu, jednak s ohledem na podceňování významu datových etiket některými staršími sběrateli. Mnohé „lokality“ jsou spíše údajem o bydlišti sběratele, než o výskytu motýla, což je poplatné tehdejšímu zvyklostem. Takovými chybami je zatíženo značné množství starších údajů např. z okolí Karlových Varů (ale i z jiných míst) a proto je již Sterneck do svého prodrumu nepřijal. Také materiál z chovů může být cizí proveniencí a není to na etiketách dostatečně odlišeno. Naproti tomu současná úroveň dopravy umožňuje zavlečení nejrůznějších druhů z poměrně vzdálených oblastí a k tomu napomáhá i nežádoucí praxe některých chovatelů hmyzu vypouštět do volné přírody přebytečné nebo poškozené exempláře z chovů. Takový druh, stejně jako některý migrant, může vytvořit dočasný výsadek, který může na lokalitě i řadu let přežívat. Údaje tohoto druhu sice neignorujeme, ale doprovázíme je patřičným komentářem, případně zařazujeme do neakceptovaných dat.

Abychom poskytli v seznamu nejstručnější formou co nejvíce informací, zavedli jsme některé symboly, které usnadní rychlou orientaci:

68 - Prosté číslo literárního pramenu: Výskyt je spolehlivě doložen jak v minulosti, tak recentně. Je uvedena první citace druhu v literatuře, většinou od r. 1929, resp. 1933.

(2) - Číslo pramenu v závorce: Údaj o výskytu není spolehlivě doložen, většinou velmi staré nálezy s pochybnými etiketami, pokud není dokladový materiál vůbec ztracen. Výskyt v Čechách však není vyloučen.

* - Znak * u čísla pramenu: Výskyt je doložen v minulosti, recentní nálezy však chybějí.

K - Symbol K u čísla pramenu znamená odkaz na samostatný bližší komentář o problematice druhu. Komentář je uveden pod shodným pořadovým číslem, které bylo přiřazeno příslušnému druhu.

N - Nový druh pro Čechy, případně celou Českou republiku. V kapitole „Nové, z Čech dosud neuváděné druhy“ jsou uvedeny podrobnější údaje o zjištěném výskytu pod shodným pořadovým číslem, které bylo přiřazeno příslušnému druhu. V závorce za lokalitou je uveden kód čtverce pro faunistické síťové mapování (Novák 1989, Pruner & Míka 1996) (obr. 1).

P - Potvrzené a dosud nepublikované údaje o nálezech druhů, jejichž výskyt na území Čech byl znám pouze v minulosti nebo byl nález sporný (viz číslo pramenu v závorce). Jsou též uvedeny dodatečné údaje o některých nově objevených nebo vzácných druzích. V kapitole „Nově potvrzené a ověřené nálezy druhů“ jsou uvedeny podrobnější údaje o zjištěném výskytu pod shodným pořadovým číslem, které bylo přiřazeno příslušnému druhu. V závorce za lokalitou je uveden kód čtverce pro faunistické síťové mapování.

- M - Obligátní nebo občasný migrant. Druh, který není schopen na území Čech přezimovat, případně je místní populace pravidelně posilována imigrací.
- I - Druh je považován za introdukovaný (zavlečený, vypuštěný z chovu).
- X - Druh je považován za nezvěstný, případně vyhynulý.

Dílo je psáno souběžně česky a německy. Připojen je úvod a názvy kapitol v angličtině. Práce je výsledkem desetičlenného kolektivu, který se shodl na kompromisní celkové koncepci. Seznamy některých čeledí a nadčeledí připravili specialisté, kteří se těmito skupinami zabývají: G. Elsner (Gelechiidae), J. Jaroš (Tortricidae), J. Liška (Elachistidae, Scythrididae), I. Novák & K. Spitzer (Noctuidae), M. Petrů (Gracillariidae), J. Skyva (Alucitidae, Pterophoridae), K. Špatenka (Sesiidae), J. Vávra (Nepticulidae, Coleophoridae) a Z. Weidenhoffer (Hesperiidae, Papilionoidea). Ostatní čeledi byly připraveny společně a revidovány celým kolektivem. Za pomoc při přípravě rukopisu, podněty a kritické připomínky jsme zavázáni celé řadě kolegů. Doc. Z. Laštůvkovi (Brno) za pročtení celého rukopisu, různé doplňky a poskytnutí počítačového souboru moravsko-slezského katalogu pro usnadnění práce, Ing. Z. Kolečkovi (Praha), Ing. J. Markovi (Brno), Prof. H. Malickému (Lunz a. S., Rakousko) a p. J. Franzovi (Rybničná) za pomoc při soustřeďování faunistické literatury, PhDr. V. Felixovi (Praha), p. A. Laštůvkovi (Prostějov), Prof. D. Povolnému (Brno), p. D. Ričlovi (Jílové u Prahy) a Mgr. V. Vrabčovi (Kolín) za poskytnutí některých dosud nepublikovaných údajů. Zvláštní dík zasluhují pánové J. Franz a B. Goater (Hants, Anglie), kteří se ochotně ujali jazykové revize německého a anglického textu. Své příspěvky do seznamu faunistických prací nám poskytla celá řada členů ČSE, za jejichž pochopení jsme jim rovněž zavázáni.

Praha, říjen 1997

Autoři

EINLEITUNG

In den letzten Jahrzehnten machte die Erforschung der Lepidopteren Böhmens einen großen Fortschritt durch, doch fehlte eine Publikation, die die angehäuften Ergebnisse zusammenfassen und den gegenwärtigen Stand der Kenntnisse über die böhmische Fauna zeigen würde. Das letzte Gesamtwerk ist der „Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens“ von Jacob Sterneck (1929), welcher die damals vergleichbar gut erforschte Makrolepidopterengruppe umfaßt. Der zweite Teil, an dem sich als Mitarbeiter Friedrich Zimmermann beteiligte, erschien im J. 1933 und faßt die Kenntnisse über die sog. Mikrolepidopteren zusammen. Diese waren jedoch ziemlich lückenhaft erforscht, weil mit den Mikrolepidopteren sich am Anfang des Jahrhunderts in Böhmen nur wenige Personen beschäftigten. Seit dieser Zeit sind mehr als 60 Jahre vergangen, im Laufe deren zwar einige umfangreiche faunistische Studien erschienen sind (Hrubý 1959, Voldřich 1963, Novák & Spitzer 1972, Krampl 1973, Soldát & Starý 1978, Jaroš 1984 u.a.), aber die meisten Daten sind in verschiedenen, mehr oder weniger bekannten, oft schon eingestellten Zeitschriften und in oft nur schwer zugänglichen Sammelchriften und anderen seltenen Publikationen zerstreut.

Die lobenswerte Absicht die Verzeichnisse der Insekten der Tschechoslowakei vorzubereiten, entstand in der entomologischen Abteilung des Nationalmuseums in Prag und realisierte sich der Reihe nach unter der Mitarbeit von Spezialisten der Tschechoslowakischen entomologischen Gesellschaft. Der erste Band der Serie erschien im J. 1977 und die meisten Insektenordnungen wurden allmählich bearbeitet. Es ist ein wenig paradox, daß eine der attraktivsten Gruppen, nämlich die Lepidopteren, unbearbeitet blieb. Die Verspätung in der Vorbereitung des Verzeichnisses der tschechoslowakischen Lepidopteren führte unter den Lepidopterologen zu einer gewissen Ungeduld, die im J. 1989 zu einer selbständigen Bearbeitung der slowakischen Lepidopteren (Patočka, Reiprich, Pastorális 1989) führte und im J. 1993 entstand ein analoges Verzeichnis aus dem Territorium Mährens und Schlesiens (Laštůvka et al. 1993). In dieser Situation erwies sich als dringend die Vollendung des Verzeichnisses von Böhmen voranzutreiben und die Lepidopterologengruppe aus der Tschechischen entomologischen Gesellschaft hat sich entschlossen, diese Arbeit zu übernehmen.

Die Autoren sind sich des relativen Wertes des vorgelegten „Katalogs“ bewußt, der trotz der Bestrebung die meisten Angaben zusammenzutragen, kaum vollständig sein kann. Auch unser Aufruf an die Kollegen für Zusendung der Böhmen betreffenden faunistischen Arbeiten hatte nur teilweisen Widerhall. Eher als für ein vollendetes Werk wird es möglich sein, den vorbereiteten Katalog für eine Arbeitsversion zu halten, die in der Zukunft vervollständigt werden muß. Unsere Lepidopterologen werden jedoch in jedem Fall ein übersichtliches Arbeitshilfsmittel bekommen, das ihnen eine Grundorientierung im Lepidopterensystem und in der Synonymik der einzelnen Arten und die Ausgangsinformation für weitere Erforschung der Lepidopteren auf dem böhmischen Gebiet geben kann.

Die Grundlage des neu vorgelegten Katalogs der böhmischen Lepidopteren sind die oben erwähnten Werke von Sterneck (1929) und Sterneck & Zimmermann (1933), wo aus Böhmen 2326 Arten angeführt sind, wenn wir nicht weitere etwa 250 Arten mitzählen, deren Vorkommen im verschiedenen Maße bezweifelt wurde. Wir übernehmen kritisch die dort publizierten Angaben. Um die Bedeutung dieser Bücher als Ausgangsinformationsmaterial zu unterstreichen, ordnen wir ihnen im Verzeichnis der benutzten Quellen die laufenden Nummern 1 und 2 zu, während die üb-

rigen literarischen Quellen auf übliche Weise alphabetisch geordnet wurden. Zur Umwertung der Daten aus dem Prodnromus sind wir besonders bei denjenigen Arten gegriffen, bei denen es im Laufe der Jahre zu Veränderungen im taxonomischen Status kam, oder die (hinsichtlich der damaligen Kenntnisse) evident falsch determiniert worden waren. Es muß jedoch mit Anerkennung festgestellt werden, daß Jacob Sterneck und Friedrich Zimmermann zur Bewertung der älteren Angaben sehr kritisch zutraten und ihr Prodnromus auf eine erschöpfende Weise und hinsichtlich damaliger Zeit wunderbar zusammenstellten.

Das in diesem Katalog behandelte Gebiet ist durch die historischen Grenzen Böhmens, eventuell durch die Grenze Böhmens im Rahmen der vorkrieglichen Tschechoslowakei umgrenzt. Das Gebiet ist dasselbe, das Sterneck (1929) behandelt und auf seiner Landkarte angegeben hat (Abb. 1.).

Wenn auch die Verzeichnisse der nationalen Faunen oft eine Gelegenheit zur Lösung der taxonomischen oder systematischen Probleme bieten, in unserem Katalog haben wir diese Fragen meistens gemieden. Wir nehmen nämlich an, daß es hier für diese Problematik nicht den üblichen Raum gibt, denn das Ziel des Katalogs ist verschieden. Aus pragmatischen Gründen haben wir die Auffassung der Ordnung, der Familien und Folge von Arten aus dem Katalog der mährisch-schlesischen Region (Laštůvka et al. 1993) praktisch ohne Änderungen übernommen und haben zu den neuesten Katalogen der europäischen Lepidopteren (z.B. Vives Moreno 1994, Karsholt & Razowski 1996) nicht Bezug genommen, denn wir behaupten, daß es für die tschechischen Entomologen praktischer sein könnte, die beiden Landesfaunen (die böhmische und mährische), leicht vergleichen zu können. Auf kleinere Änderungen sind wir nur mit Rücksicht auf die neu publizierten Resultate einiger Autoren, was die Taxonomie einiger Teilgruppen betrifft, eingegangen. Auch hinsichtlich der Endungen von lateinischen Namen der Arten und deren Übereinstimmung mit dem grammatischen Geschlecht der Gattungen haben wir uns an die Auffassung von Laštůvka et al. (1993) im Einklang mit der 3. Auflage des ICZN vom J. 1985, Kapitel 7, Absatz 31b (Houša & Štys 1988) gehalten. Wir fügen nicht die ökologische und naturschutzliche Klassifikation der einzelnen Arten ein, weil diese grundsätzlich in der gesamten Tschechischen Republik dieselbe ist und verweisen in dieser Richtung auf den mehrmals erwähnten mährisch-schlesischen Katalog.

Mit den Erfahrungen mit dem Gebrauch des vorher erwähnten und auch der slowakischen Kataloge (Patočka, Reiprich & Pastorális 1989, Pastorális & Reiprich 1995) haben wir uns entschlossen die einzelnen Arten zu numerieren, denn es erleichtert deren Auffinden mittels Registers. Die durchlaufende Numerierung ist jedoch ein rein praktisches Hilfsmittel und hat keinen Zusammenhang mit einer Numerierung der Arten in anderen Lepidopterenkatalogen.

Bei den Synonymen und Homonymen der gültigen Artnamen gab es kein Bestreben um deren vollständige Aufzählung, sondern nur um eine Information über die wichtigsten. Wir haben uns auf diejenigen beschränkt, die in der lepidopterologischen Literatur der letzten Jahre oft benutzt werden, die im Sternecks Prodnromus vorkommen und die Zweifel über die Identität der Arten hervorbringen könnten. Zu den Synonymen und Homonymen fügen wir keine Klammern bei, denn es wäre nicht möglich, mit ununterbrochenen nomenklatorischen Änderungen, diese Aufgabe in einer vernünftigen Zeitspanne zu beenden. Wegen Platzeinsparung haben wir bei den Synonymen nur Abkürzungen der Autorennamen benutzt. Bei den gültigen Namen sind aus demselben Grund die oft vorkommenden langen Namenpaare und Namen wie „Denis & Schiffermüller“ und „Herrich-Schäffer“ und wenige andere verkürzt. Zur Erläuterung der benutzten Abkürzungen kann das „Verzeichnis der Autorenabkürzungen“ am Ende der Publikation dienen.

Bei der Vorbereitung des Verzeichnisses haben wir die möglichst gesamte lepidopterologische faunistische Literatur über Böhmen seit den 30. Jahren, d.h. seit Sternecks und Zimmermanns Prodromen gesichtet und ein Literaturverzeichnis beigefügt. Von den älteren Arbeiten sind nur diejenigen ergänzt, die diese zwei Autoren nicht anführen. Im Prodromus angeführte Arbeiten wiederholen wir nicht, mit Ausnahme deren, aus den wir neue oder revidierte Angaben ausnützten. Das Verzeichnis der Quellen umfaßt vor allem faunistische Beiträge. Von den taxonomischen Arbeiten und der angewandten Entomologie sind nur diejenigen angeführt, die auf böhmisches Material verweisen (z.B. Material für taxonomische Studien, entomologische Versuche, phänologische Beobachtungen der Schaderreger usw.). Wir glauben, daß das Verzeichnis der böhmischen faunistischen Literatur für die künftige Arbeit der Lepidopterologen ein wertvolles Hilfsmittel sein wird.

Als Sammlungsquellen haben wir vor allem die Privatsammlungen der einzelnen Mitglieder des Autorenkollektivs und weiteren Kollegen und einige kleinere Institutsammlungen überprüft. Wegen Zeitmangel mußten wir auf Revisionen umfangreicher Sammlungen in größeren Museen verzichten, unter anderem auch infolgedessen, daß diese Sammlungen nicht immer zugänglich und systematisch geordnet sind. Ihre an Zeit anspruchsvolle Revision wird in der Zukunft sicher eine Quelle mancher Ergänzungen oder Verbesserungen werden. Auch die anderen Sammlungen wurden nicht erschöpfend revidiert. Bei der Arbeit konnten wir die Bewertung mancher älteren aber auch neueren Angaben nicht vermeiden, aber nicht immer ist es uns gelungen die Belegstücke der zweifelhaften Angaben zu finden.

Bei der Bewertung des heutigen Standes der böhmischen Lepidopterenfauna ist es notwendig grundsätzliche Änderungen der böhmischen Gegend im 20. Jahrhundert und Klimaänderungen in Betracht zu ziehen. Aus diesem Grund sollte man solche manche Angaben aus dem 19. Jahrhundert, welche auch heutzutage unglaublich erscheinen, nicht bezweifeln. Andererseits gibt es Angaben, bei denen Vorsicht geboten ist, entweder mit Rücksicht auf den damaligen Stand der Determination, die fast ausschließlich auf habituellen Merkmalen beruhte, oder wegen nicht sorgfältig ausgefüllten Fundortetiketten früherer Sammler. Manche „Lokalitäten“ sind eher Angaben über den Wohnort des Sammlers als über das Auftreten vom Schmetterling. Mit solchen falschen Angaben ist z.B. eine Menge von den älteren Angaben aus der Umgebung von Karlsbad (aber auch anderen Regionen) belastet und deswegen hat sie schon Sterneck in seinem Prodromus nicht aufgenommen. Auch Zuchtmaterial kann verschiedener Provenienz und ihre Etiketten irreleitend sein. Demgegenüber mit dem gegenwärtigen Verkehrsniveau kann eine Verschleppung verschiedenster Arten von relativ entfernten Gegenden ganz möglich sein und dazu tritt auch eine unerwünschte Praxis einiger Schmetterlingszüchter die überflüssigen oder teilweise beschädigten Falter in die freie Natur loszulassen. So eine Art, ebenso wie ein Migrant kann eine vorübergehende Population gründen, die in der Gegend mehrere Jahre überleben kann. Wir vermeiden zwar solche Angaben nicht, begleiten sie aber mit einem Kommentar, eventuell reihen sie zu den nicht akzeptierten Angaben.

Wir haben ins Verzeichnis mehrere Symbole eingeführt, die eine schnellere Orientation ermöglichen:

- 68 - Einfache Nummer der literarischen Quelle: Vorkommen belegt in der Vergangenheit als auch der Gegenwart. Die erste Literaturangabe, meistens seit 1929 (bzw. 1933) ist angeführt.
- (2) - Nummer in Klammern: Die bisherigen Angaben sind unsicher, meistens alte Funde mit ungenügenden Etiketten, oder wenn das Belegstück nicht auffindbar ist. Das Vorkommen in Böhmen ist jedoch nicht ausgeschlossen.

- * - Sternchen bei der Quellennummer: Vorkommen in der Vergangenheit, nicht aber rezent belegt.
- K - Ein Kommentar über die Problematik der Art ist beigelegt. Der Kommentar ist unter derselben Nummer wie die Art im Verzeichnis angeführt.
- N - Bisher nicht publizierte Art, neu für Böhmen oder die ganze Tschechische Republik. In dem Kapitel „Neue, aus Böhmen bisher nicht angegebene Arten“ sind ausführliche Angaben über die neuen Arten angeführt. In Klammern nach der Lokalität ist der numerische Kode für die faunistische Rasterkartierung angegeben (Novák 1989, Pruner & Mika 1996) (Abb. 1).
- P - Neu bestätigte Arten, deren Vorkommen in Böhmen nur in der Vergangenheit belegt worden oder unsicher war. Auch zusätzliche Angaben über unlängst entdeckte oder einige seltene Arten sind angeführt, das alles in dem Kapitel „Neu bestätigte und überprüfte Artenangaben“. In Klammern nach der Lokalität ist der numerische Kode für die faunistische Rasterkartierung angegeben.
- M - Obligatorischer oder fakultativer Migrant. Eine Art, die auf dem Territorium Böhmens nicht überwintern kann, oder deren ansässige Population mit Zuflug vom Süden regelmäßig verstärkt wird.
- I - Die Art ist für introduziert (von der Zucht losgelassen) gehalten.
- X - Die Art ist für verschollen, bzw. ausgestorben gehalten.

Das Werk ist parallel im Tschechischen und Deutsch geschrieben, mit englischer Einleitung und Titeln der Kapitel. Es ist ein Arbeitsresultat des zehngliederigen Kollektivs, das sich auf einer Kompromißfassung einigte. Die Teilverzeichnisse einzelner Familien haben die Spezialisten vorbereitet, die sich mit den jeweiligen Familien beschäftigen: G. Elsner (Gelechiidae), J. Jaroš (Tortricidae), J. Liška (Elachistidae, Scythrididae), I. Novák & K. Spitzer (Noctuidae), M. Petrů (Gracillariidae), J. Skyva (Alucitidae, Pterophoridae), K. Špatenka (Sesiidae), J. Vávra (Nepticulidae, Coleophoridae) und Z. Weidenhoffer (Hesperiidae, Papilionoidea). Die übrigen Familien wurden gemeinsam vorbereitet und von allen Mitarbeitern revidiert. Für die Mitarbeit bei der Vorbereitung des Katalogs sind wir manchen Kollegen sehr verbunden. Doz. Z. Laštůvka (Brno) hat den Manuskript bereitwillig durchgelesen, zahlreiche kritische Bemerkungen gemacht und uns die Komputerversion des mährisch-schlesischen Katalogs geboten, welche unsere Arbeit erleichtert hat. Ing. Z. Kolečka (Prag), Prof. H. Malicky (Lunz a. S., Österreich), Ing. J. Marek (Brno) und J. Franz (Rybníčná) haben uns manche literarische Angaben übergeben, der letzte von ihnen besonders aus den älteren deutschen Zeitschriften. Die Herren PhDr. V. Felix (Prag), A. Laštůvka (Prostějov), Prof. D. Povolný (Brno), D. Ričl (Jílové u Prahy) und Mgr. V. Vrabec (Kolín) haben uns einige unpublizierte Angaben zugeleitet. Einen vorzüglichen Dank verdienen die Herren J. Franz und B. Goater (Hants, England), die die Sprachrevision des deutschen und englischen Texts gefälligst übernommen haben. Beiträge zum Verzeichnis der faunistischen Literatur hat uns eine ganze Reihe Mitglieder der Tschechischen entomologischen Gesellschaft geboten, den wir für ihr Verständnis und Hilfe mit Dank verbunden bleiben.

Prag, Oktober 1997

Die Autoren

INTRODUCTION

The investigation of the lepidopteran fauna of Bohemia has made considerable progress in recent decades, but an up-to-date check-list which would show the present state of knowledge has been lacking until now. The last complex work by Sterneck, "Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens", appeared in 1929 and embraced the comparatively well known group of Macrolepidoptera. The second part of the Prodromus (1933) in which F. Zimmermann shared authorship summarised knowledge of the Microlepidoptera and was much less complete because lepidopterists had shown comparatively little interest in these insects at the beginning of the 20th century. Over the next 60 or so years several comprehensive papers were published (Hrubý 1959, Voldřich 1963, Novák & Spitzer 1972, Krampl 1973, Soldát & Starý 1978, Jaroš 1984 etc.) but most contributions were scattered in various more or less well-known journals some of which no longer exist, and in proceedings and other incidental publications which are difficult to obtain.

The creditable idea to publish check-list of the insects of Czechoslovakia was initiated by the Entomological Department of the National Museum, Prague and, in co-operation with several specialists in the Czechoslovak Entomological Society, a number of individual tomes have already been published. The first of these was in 1977, and between then and 1993 most insect orders had been covered. Paradoxically, one of the most attractive groups, namely Lepidoptera, remained unfinished. This delay in the preparation of the Czechoslovak check-list of Lepidoptera by the National Museum in Prague was a cause of impatience to Czechoslovak lepidopterists and that is why the "List of Lepidoptera found or expected in Slovakia" (Patočka, Reiprich & Pastorális 1989) was published, and a similar list for Moravia-Silesia by Laštůvka et al. in 1993. Clearly the preparation of a proper Bohemian check-list was very urgent, and a group of lepidopterists in the Czech Entomological Society decided to fulfil this task.

The authors are aware that the list remains incomplete despite great efforts to accumulate all available data. Our appeal to members of the Society for information on papers about the country's lepidopteran fauna resulted in only a partial response. It is therefore best to regard this book as a provisional, working version that can be improved and updated in the future. Nevertheless, we hope that lepidopterists will now have a manual at their disposal in which they will find information on the latest systems of classification and synonymy and which will provide a basis for future investigation of Lepidoptera in the territory of Bohemia.

The basis of the new catalogue are the above-mentioned books by Sterneck (1929) and Sterneck & Zimmermann (1933). We designate these as numbers 1 and 2 in the list of references to underline their importance as the initial source of information. Other references are arranged alphabetically in the usual way. A reappraisal of Jacob Sterneck and Friedrich Zimmermann's approach was necessary with regard to certain species which, in the light of more recent taxonomic work, were evidently incorrectly determined. Even so, in their work the available data were very critically evaluated in accordance with current knowledge and arranged in an exhaustive and praiseworthy manner.

The territory covered by the check-list is delimited by the historical boundary of Bohemia or by that of Bohemia within the country of Czechoslovakia before World War II. It is thus the same area dealt with by Sterneck (1929) and figured in his book (Fig. 1).

We have avoided any attempt (with a few exceptions) to solve taxonomic and systematic problems in our catalogue, partly through lack of space and also because the aim of the book is diffe-

rent. For practical reasons we have largely followed the systematic order in the Moravian-Silesian catalogue (Laštůvka et al. 1993) and have not taken into account several new catalogues of European Lepidoptera (e.g. Vives Moreno 1994, Karsholt & Razowski 1996). In this way we hope to make it easier to compare the diversity of species in both parts of the Czech Republic. We have included a few minor changes proposed in certain recent papers dealing with the taxonomy of small groups of Lepidoptera. We followed also the approach of Laštůvka et al. (1993) in adjusting the endings of specific names to agree with the gender of the genus names (sensu the ICZN, 1985, chapter VII, para. 31b) (Houša & Štys 1988). We omit notes on ecology and conservation of individual species because such data refer to the whole of the Czech Republic and can be found in the above-mentioned Moravian-Silesian catalogue. Experience with this and the Slovak catalogues (Patočka, Reiprich & Pastorális 1989, Pastorális & Reiprich 1995) led us to give numbers to the individual species to facilitate finding them in the index of names. However, it should be noted that these numbers have no significance other than to give a practical help and have no relationship with numbering found in other catalogues of Lepidoptera.

Regarding synonyms and homonyms, we have checked and included only those which are most frequently encountered in the literature or which are used in Sterneck's *Prodromus*, in order to avoid mistakes in identifying species. With respect to many nomenclatoric equivocations, parentheses are not given here. To save space, we have used standard abbreviations of authors' names of synonyms and homonyms. In regard to the valid names, authors' names are given in full, with the exception of long ones such as "Denis & Schiffermüller", "Herrich-Schäffer" and a few others. The abbreviations used are listed at the end of the publication.

We have decided that it would be useful to include a list of Czech faunistic papers published since 1929 (resp. 1933) in the Bibliography. Prior to 1929 (1933), only those papers which were omitted in Sterneck's and Zimmermann's *Prodromus* are included, and we do not list references given by those authors with exception of few ones with omitted or checked data. In the Bibliography, first faunistic papers are presented. Papers on applied biology are included only when experimental or study material originated from Bohemia (insects for taxonomic studies, entomological experiments, phenological monitoring of pest species, etc.). We hope that the list of faunistic papers will provide a valuable source of information for anyone undertaking future research in this field.

The catalogue was compiled from information gleaned from the private collections of the authors and their colleagues, and from several small institutional collections. It was impossible to work through vast collections in the larger museums, which are not always easily accessible nor well-arranged, but it is expected that these will in future provide a resource for improving and complementing the present check-list. As far as possible, old published data were checked, but it was not always possible to find voucher material in support of doubtful records.

In order to evaluate the present state of the Czech fauna, it is necessary to take into account dramatic changes to the landscape which have occurred during the 20th century, as well as climatic changes. It is therefore not always safe to cast doubt on numerous findings from the 19th century, unbelievable as they may seem today. On the other hand, many old records must be taken very cautiously because of the possibility of incorrect determination, mostly made by examining superficial features alone, and the underestimation of the importance of proper labelling by the older entomologists. Many "localities" refer rather to the addresses of the collectors than to the places of capture! For example, many records from the neighbourhood of Karlovy Vary

(Western Bohemia) (of other areas, as well) abound with such mistakes, and this is why Sterneck did not include them in the Czech fauna. Bred specimens can also be of various origin, and this fact is not always made clear on the labels. On the other hand, in recent times, the amount of air, road and rail traffic makes it possible for many species to be introduced into the country from far away places. Further, the undesirable practice of some amateurs of releasing surplus of damaged specimens from rearings may help in the spread of certain species. Such specimens may become established in a locality for several years before dying out. When such instances are known to us, we do not ignore them but include an appropriate comment or place them among unaccepted data.

We have utilised several symbols which will help in understanding the list of species:

- 68 - Number of bibliographic reference in which a species' occurrence is confirmed in the past and at present. The first, mostly post-1929 (resp. 1933) reference in the literature is given.
- (2) - Number in parentheses indicates that a species is not adequately documented. Usually refers to very old and uncertain records, specimens without labels or with dubious ones, but which could nevertheless occur in Bohemia.
- * - Asterisk indicates that occurrence is confirmed for the past, but recent records are lacking.
- K - This symbol refers to a comment (see the chapter "Comments") which has the same ordinal number as the species on the list.
- N - New species for Bohemia or the whole Czech Republic previously unpublished. More detailed information about these discoveries is given in the chapter "New species for the Bohemian fauna". The number in parentheses following the locality means the code of the faunistic grid mapping field (Novák 1989, Pruner & Míka 1996) (Fig. 1).
- P - New evidence for the occurrence of species the presence of which was previously in doubt is given in the chapter "Recently confirmed and verified records". Several supplementary data on recently discovered or rare species were added, too. The number in parentheses following the locality means the code of the faunistic grid mapping field.
- M - Obligatory or facultative migrant. A species which is unable to survive the winter in Central Europe, or in which the local population is regularly reinforced by immigration.
- I - Species considered to have been introduced.
- X - Species considered to be missing or extinct in the territory under review.

The catalogue, written in Czech and German with English Introduction and headings, is the result of the work of ten entomologists who are agreed on the same general approach. Following specialists have compiled lists of particular families or superfamilies: G. Elsner (Gelechiidae), J. Jaroš (Tortricidae), J. Liška (Elachistidae, Scythrididae), I. Novák & K. Spitzer (Noctuidae), M. Petrů (Gracillariidae), J. Skyva (Alucitidae, Pterophoridae), K. Špatenka (Sesiidae), J. Vávra (Nepticulidae, Coleophoridae) and Z. Weidenhoffer (Hesperiidae, Papilionoidea). All other groups have been dealt with by collective effort. We are grateful to a number of colleagues for their help and critical comments during preparation of the manuscript. Z. Laštůvka (Brno) has read through the manuscript, completed various data and facilitated our work by providing us with the computer-file of the Moravian-Silesian Catalogue. Z. Kolečka (Prague), H. Malicky (Lunz a. S., Austria), J. Marek (Brno) and J. Franz (Rybníčná), supplied us with numerous references of the Czech faunistic literature, the latter among them from the older German journals. V. Felix (Prague), A. Laštůvka (Prostějov), D. Povolný (Brno), D. Ričl (Jílové u Prahy) and

V. Vrabec (Kolín) have provided us with unpublished faunistic data and results of their investigations. We are greatly indebted to J. Franz and B. Goater (Hants, England) for their kind checking the German and English versions of the Catalogue. A number of colleagues from the Czech Entomological Society passed references of papers on Czech butterflies and moths to us and we thank them for their assistance.

Prague, October 1997

The authors

PŘEHLED SYSTÉMU S POČTY DRUHŮ
SYSTEM MIT ARTENZAHLEN
SYSTEM WITH NUMBERS OF SPECIES

A - Nadčeledi a vyšší systematické jednotky. - Überfamilien und höhere systematische Einheiten.

B - Čeledi. - Familien.

C - Podčeledi. - Unterfamilien.

	A	B	C
Řád - Ordnung:			
LEPIDOPTERA	2936		
Podřád - Unterordnung:			
ZEUGLOPTERA	6		
Micropterigoidea	6		
Micropterigidae		6	
Podřád - Unterordnung:			
GLOSSATA	2930		
Infrařád - Infraordnung:			
DACNONYPHA	8		
Eriocranioidea	8		
Eriocraniidae		8	
Infrařád - Infraordnung:			
EXOPORIA	5		
Hepialoidea	5		
Hepialidae		5	
Infrařád - Infraordnung:			
HETERONEURA	2917		
Serie - Serie:			
MONOTRYZIA	157		
Nepticuloidea	107		
Opostegidae		3	
Nepticulidae		104	
Incurvarioidae	43		
Heliozelidae		3	
Adelidae		25	
Incurvariidae		15	
Tischerioidea	7		
Tischeriidae		7	
Serie - Serie:			
DITRYZIA	2760		
Tineoidea	82		

	A	B	C
Psychidae		29	
Naryciinae			7
Taleporiinae			2
Psychinae			9
Oiketicinae			11
Tineidae		53	
Scardiinae			3
Euplocaminae			1
Myrmecozelinae			6
Teichobiinae			2
Meessiinae			7
Nematopogoninae			16
Tineinae			17
Hieroxestinae			1
Gracillarioidea	129		
Gracillariidae		107	
Gracillariinae			41
Lithocolletinae			63
Phyllocnistinae			3
Roeslerstammiidae		2	
Bucculatricidae		15	
Douglasiidae		5	
Yponomeutoidea	102		
Yponomeutidae		52	
Scythropiinae			1
Yponomeutinae			20
Praydinae			3
Argyresthiinae			28
Ypsolophidae		19	
Ypsolophinae			16
Ochsenheimeriinae			3
Plutellidae		12	
Plutellinae			6
Acrolepiinae			6
Glyphipterigidae		7	

	A	B	C
Orthotaeliinae			1
Glyphipteriginae			6
Heliodinidae		1	
Bedelliidae		1	
Lyonetiidae		10	
Cemiostominae			6
Lyonetiinae			4
Gelechioidea	584		
Oecophoridae		111	
Depressariinae			67
Ethmiinae			5
Oecophorinae			35
Chimabachinae			3
Stathmopodinae			1
Elachistidae		68	
Coleophoridae		138	
Agonoxenidae		6	
Batrachedridae		2	
Momphidae		14	
Cosmopterigidae		17	
Antequerinae			2
Cosmopteriginae			12
Chrysopeleiinae			3
Scythrididae		20	
Blastobasidae		7	
Symmocinae			3
Blastobasinae			4
Gelechiidae		201	
Aristoteliinae			41
Gelechiinae			111
Anacampsinae			28
Chelariinae			6
Dichomeridinae			15
Cossoidea	3		
Cossidae		3	
Zeuzerinae			1
Cossinae			2
Sesioidea	31		
Brachodidae		1	
Sesiidae		30	
Tinithiinae			2

	A	B	C
Sesiinae			28
Zygaenoidea	20		
Zygaenidae		18	
Procridinae			6
Zygaeninae			12
Limacodidae		2	
Choreutoidea	7		
Choreutidae		7	
Tortricoidae	411		
Tortricidae		411	
Tortricinae			136
Chlidanotinae			3
Olethreutinae			272
Schreckensteinioidae	1		
Schreckensteiniidae		1	
Epermenioidea	9		
Epermeniidae		9	
Alucitoidea	5		
Alucitidae		5	
Pterophoroidea	48		
Pterophoridae		48	
Agdistinae			1
Platyptiliinae			28
Pterophorinae			19
Copromorphoidea	2		
Carposinidae		2	
Pyraloidea	220		
Pyalidae		93	
Galleriinae			7
Phycitinae			78
Pyalinae			8
Crambidae		127	
Nymphulinae			5
Schoenobiinae			3
Crambinae			40
Scopariinae			15

	A	B	C		A	B	C
Evergestinae			8	Theclinae			8
Odontiinae			5	Polyommatainae			29
Glaphyriinae			1				
Heliothelinae			1	Drepanoidea	15		
Pyraustinae			49	Drepanidae		15	
Thyridoidea	1			Drepaninae			7
Thyrididae		1		Thyatirinae			8
Lasiocampoidea	18			Geometroidea	367		
Lasiocampidae		18		Geometridae		367	
Bombycoidea	24			Archiearinae			3
Lemoniidae		2		Oenochrominae			2
Endromidae		1		Geometrinae			12
Sphingidae		18		Sterrhinae			50
Sphinginae			7	Larentiinae			197
Macroglossinae			11	Ennominae			103
Saturniidae		3		Noctuoidea	536		
Hesperioidea	16			Notodontidae		34	
Hesperiidae		16		Notodontinae			33
Papilionoidea	129			Thaumetopoeinae			1
Papilionidae		5		Lymantriidae		14	
Parnassiinae			3	Arctiidae		42	
Papilioninae			2	Lithosiinae			18
Pieridae		16		Arctiinae			22
Dismorphiinae			2	Ctenuchinae			2
Pierinae			6	Noctuidae		446	
Coliadinae			8	Herminiinae			12
Nymphalidae		37		Rivulinae			3
Apaturinae			2	Hypenodinae			3
Limenitinae			4	Hypeninae			5
Nymphalinae			10	Catocalinae			23
Argynniinae			13	Nolinae			8
Melitaeinae			8	Sarothripinae			3
Satyridae		25		Chloephorinae			4
Melanargiinae			1	Pantheinae			3
Satyrinae			15	Acronictinae			22
Coenonymphinae			5	Acontiinae			9
Pararginae			4	Plusiinae			21
Riodinidae		1		Cuculliinae			23
Lycaenidae		45		Heliothinae			8
Lycaeninae			8	Ipimorphinae			155
				Hadeninae			67
				Noctuinae			77

SEZNAM MOTÝLŮ ČECH
VERZEICHNIS DER FALTER BÖHMENS
LIST OF THE BOHEMIAN LEPIDOPTERA

LEPIDOPTERA

ZEUGLOPTERA

Micropterigoidea

Micropterigidae

MICROPTERIX Hübner, 1825

- | | | |
|----|--------------------------------------|-----|
| 1. | <i>calthella</i> (Linnaeus, 1761) | 2 |
| | <i>silesiaca</i> Toll, 1942 | |
| 2. | <i>tunbergella</i> (Fabricius, 1787) | 2 |
| 3. | <i>aureatella</i> (Scopoli, 1763) | 2 |
| | <i>ammanella</i> Hb., 1810 | |
| 4. | <i>osthelderi</i> Heath, 1975 | N |
| 5. | <i>schaefferi</i> Heath, 1975 | 236 |
| | <i>ammanella</i> auct., nec Hb. 1810 | |
| | <i>anderschella</i> H.-S., 1855 | |
| 6. | <i>aruncella</i> (Scopoli, 1763) | 2 |
| | <i>seppella</i> F., 1777 | |

GLOSSATA

DACNONYPHA

Eriocranioidea

Eriocraniidae

DYSERIOCRANIA Spuler, 1910

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 7. | <i>subpurpurella</i> (Haworth, 1828) | 2 |
| | <i>fastuosella</i> Z., 1839 | |

ERIOCRANIA Zeller, 1851

- | | | |
|-----|--|---|
| 8. | <i>chrysolepidella</i> Zeller, 1851 | 2 |
| 9. | <i>unimaculella</i> (Zetterstedt, 1839) | 2 |
| 10. | <i>sparrmannella</i> (Bosc, 1791) | 2 |
| 11. | <i>salopiella</i> (Stainton, 1854) | N |
| 12. | <i>cicatricella</i> (Zetterstedt, 1839) | 2 |
| | <i>purpurella</i> Hw., 1828, nec Thbg., 1788 | |
| | <i>haworthi</i> Brad., 1966 | |
| 13. | <i>sangii</i> (Wood, 1891) | N |
| 14. | <i>semipurpurella</i> (Stephens, 1835) | 2 |

EXOPORIA

Hepialoidea

Hepialidae

HEPIALUS Fabricius, 1775

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 15. | <i>humuli</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| 16. | <i>sylvinus</i> (Linnaeus, 1761) | 2 |
| 17. | <i>hecta</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| 18. | <i>lupulinus</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |
| 19. | <i>fusconebulosus</i> (De Geer, 1778) | 2 |

HETERONEURA

MONOTRYSIA

Nepticuloidea

Opostegidae

OPOSTEGA Zeller, 1839

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 20. | <i>salaciella</i> (Treitschke, 1833) | 2 |
| | <i>reliquella</i> Z., 1848 | |

PSEUDOPOSTEGA Kozlov, 1985

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 21. | <i>crepusculella</i> (Zeller, 1839) | 2 |
| 22. | <i>auritella</i> (Hübner, 1813) | 2 |

Nepticulidae

ENTEUCHA Meyrick, 1915

- | | | |
|-----|----------------------------------|-----|
| 23. | <i>acetosae</i> (Stainton, 1854) | 352 |
|-----|----------------------------------|-----|

STIGMELLA Schrank, 1802

- | | | |
|-----|---|-------|
| 24. | <i>naturnella</i> (Klimesch, 1936) | 641 * |
| 25. | <i>lapponica</i> (Wocke, 1862) | 641 |
| 26. | <i>confusella</i> (Wood & Walsingham, 1894) | 641 |
| 27. | <i>freyella</i> (Heyden, 1858) | 2 |
| 28. | <i>tiliae</i> (Frey, 1856) | 2 |
| 29. | <i>betulicola</i> (Stainton, 1856) | 2 |
| 30. | <i>sakhalinella</i> Puplesis, 1984 | 999 |

distinguenda auct., nec Hein., 1862

- | | | |
|-----|------------------------------------|-----|
| 31. | <i>luteella</i> (Stainton, 1857) | 641 |
| 32. | <i>glutinosae</i> (Stainton, 1858) | 2 |

distinguenda Hein., 1862

- | | | |
|-----|--|---|
| 33. | <i>alnetella</i> (Stainton, 1856) | 2 |
| 34. | <i>microtheriella</i> (Stainton, 1854) | 2 |
| 35. | <i>prunetorum</i> (Stainton, 1855) | 2 |
| 36. | <i>aceris</i> (Frey, 1857) | 2 |
| 37. | <i>malella</i> (Stainton, 1854) | 2 |

nigrobrunella Grosch., 1839

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 38. | <i>rhannella</i> (H.-S., 1860) | 2 |
| 39. | <i>catharticella</i> (Stainton, 1853) | 2 |
| 40. | <i>anomalella</i> (Goeze, 1783) | 2 |

aeneella Hein., 1862

fletcheri Tutt, 1899

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|
| 41. | <i>centifoliella</i> (Zeller, 1848) | 2 |
| 42. | <i>viscerella</i> (Stainton, 1853) | 999 |
| 43. | <i>ulmiphaga</i> (Preissecker, 1942) | 934 * |

gracilivora Sk., 1942

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 44. | <i>ulmivora</i> (Fologne, 1860) | 2 |
|-----|---------------------------------|---|

ulmifoliae Her., 1931

ulmicola Her., 1932

- | | | |
|-----|----------------------------------|-----|
| 45. | <i>thuringiaca</i> (Petty, 1904) | 2 |
| 46. | <i>paradoxa</i> (Frey, 1858) | 2 * |

nitidella Hein., 1862

47.	<i>tormalis</i> (Wood, 1890)	(999)	80.	<i>incognitella</i> (H.-S., 1855)	2
48.	<i>regiella</i> (H.-S., 1855)	641		<i>pomella</i> Vgh., 1858	
	<i>corvimontana</i> Her., 1935			<i>mali</i> Her., 1932	
49.	<i>crataegella</i> (Klimesch, 1936)	N	81.	<i>perpygmaeella</i> (Doubleday, 1859)	2
50.	<i>magdalenae</i> (Klimesch, 1950)	338		<i>pygmaeella</i> Hw., 1828	
	<i>nylandriella</i> auct., nec Tgstr., 1848		82.	<i>hemargyrella</i> (Kollar, 1832)	2
51.	<i>nylandriella</i> (Tengström, 1848)	641		<i>basalella</i> H.-S., 1855	
	<i>aucupariae</i> Frey, 1857		83.	<i>speciosa</i> (Frey, 1858)	2
52.	<i>oxyacanthella</i> (Stainton, 1854)	2	84.	<i>lonicerarum</i> (Frey, 1857)	999
	<i>aeneella</i> auct., nec Hein., 1862		85.	<i>basiguttella</i> (Heinemann, 1862)	640
	<i>cotoneastri</i> Sorh., 1922			<i>cerricolella</i> Klim., 1946	
53.	<i>pyri</i> (Glitz, 1865)	2 P	86.	<i>dorsiguttella</i> (Johansson, 1971)	352
54.	<i>minusculella</i> (H.-S., 1855)	2	87.	<i>ruficapitella</i> (Haworth, 1828)	2
55.	<i>desperatella</i> (Frey, 1856)	2	88.	<i>atricapitella</i> (Haworth, 1828)	2
	<i>pyricola</i> Wck., 1877		89.	<i>samiatella</i> (Zeller, 1839)	2
56.	<i>hybnerella</i> (Hübner, 1796)	2	90.	<i>roborella</i> (Johansson, 1971)	351
	<i>gratiosella</i> Dup., 1843		91.	<i>eberhardi</i> (Johansson, 1971)	352
	<i>ignobilella</i> Stt., 1849			<i>TRIFURCULA</i> Zeller, 1848	
57.	<i>mespicicola</i> (Frey, 1856)	2	92.	<i>headleyella</i> (Stainton, 1854)	352
	<i>ariella</i> H.-S., 1860		93.	<i>thymi</i> (Szöcs, 1965)	N
58.	<i>floslactella</i> (Haworth, 1828)	2	94.	<i>cryptella</i> (Stainton, 1856)	N
59.	<i>carpinella</i> (Heinemann, 1862)	2	95.	<i>eurema</i> (Tutt, 1899)	339
60.	<i>tityrella</i> (Stainton, 1854)	2	96.	<i>immundella</i> (Zeller, 1839)	2
	<i>turicella</i> H.-S., 1855		97.	<i>pallidella</i> (Duponchel, 1843)	2
61.	<i>salicis</i> (Stainton, 1854)	2	98.	<i>moravica</i> Z. Laštůvka	N
	<i>auritella</i> Sk., 1939			* & A. Laštůvka, 1994	
	<i>arbusculae</i> Klim., 1951		99.	<i>subnitidella</i> (Duponchel, 1843)	339
62.	<i>vimineticola</i> (Frey, 1856)	(2) 352		<i>PARAFOMORIA</i> van Nieukerken, 1983	
63.	<i>myrtillella</i> (Stainton, 1857)	2	100.	<i>helianthemella</i> (H.-S., 1860)	2
64.	<i>zelleriella</i> (Snellen, 1875)	N		<i>BOHEMANNIA</i> Stainton, 1859	
65.	<i>obliquella</i> (Heinemann, 1862)	641	101.	<i>pulverosella</i> (Stainton, 1849)	641
66.	<i>pallidiciliella</i> Klimesch, 1946	352		<i>ECTOEDEMA</i> Busck, 1907	
67.	<i>trimaculella</i> (Haworth, 1828)	2	102.	<i>sericopeza</i> (Zeller, 1839)	2
	<i>populella</i> H.-S., 1855		103.	<i>louisella</i> (Sircom, 1849)	641
68.	<i>assimilella</i> (Zeller, 1848)	641	104.	<i>decentella</i> (H.-S., 1855)	2
69.	<i>sorbi</i> (Stainton, 1861)	641	105.	<i>weaveri</i> (Stainton, 1855)	2
	<i>cotoneastrella</i> Web., 1936		106.	<i>septembrella</i> (Stainton, 1849)	2
70.	<i>plagicolella</i> (Stainton, 1854)	2	107.	<i>atrifrontella</i> (Stainton, 1851)	352
71.	<i>lemniscella</i> (Zeller, 1839)	2	108.	<i>liebwerdella</i> Zimmermann, 1940	997
	<i>marginicolella</i> Stt., 1853		109.	<i>longicaudella</i> Klimesch, 1953	352
72.	<i>continuella</i> (Stainton, 1856)	235	110.	<i>amani</i> Svensson, 1966	351
73.	<i>aurella</i> (Fabricius, 1775)	2	111.	<i>intimella</i> (Zeller, 1848)	2
	<i>fragariella</i> Hein., 1860		112.	<i>hannoverella</i> (Glitz, 1872)	2
	<i>gei</i> Wck., 1871		113.	<i>turbidella</i> (Zeller, 1848)	2
74.	<i>splendidissimella</i> (H.-S., 1855)	2	114.	<i>klimeschi</i> (Skala, 1933)	351
75.	<i>pretiosa</i> (Heinemann, 1862)	(510)	115.	<i>argyropeza</i> (Zeller, 1839)	2
	<i>bolli</i> Frey, 1873		116.	<i>albifasciella</i> (Heinemann, 1871)	640
76.	<i>tormenillella</i> (H.-S., 1860)	2	117.	<i>subbimaculella</i> (Haworth, 1828)	2
77.	<i>aeneofasciella</i> (H.-S., 1855)	338	118.	<i>heringi</i> (Toll, 1934)	126
78.	<i>poterii</i> (Stainton, 1857)	338		<i>zimmermanni</i> Her., 1942	
	<i>comari</i> Wck., 1862		119.	<i>agrimoniae</i> (Frey, 1858)	2
79.	<i>lediella</i> (Schleich, 1867)	2	120.	<i>angulifasciella</i> (Stainton, 1849)	2

121.	<i>atricollis</i> (Stainton, 1857)	641
	<i>aterrima</i> Wck., 1865	
	<i>staphyleae</i> Zimm., 1944	
122.	<i>arcuatella</i> (H.-S., 1855)	2
123.	<i>rubivora</i> (Wocke, 1860)	352
124.	<i>spinosa</i> (Joannis, 1908)	559
125.	<i>occultella</i> (Linnaeus, 1767)	2
	<i>argentipedella</i> Z., 1839	
126.	<i>minimella</i> (Zetterstedt, 1839)	641 P
	<i>woolhopiella</i> Stt., 1887	

Incurvarioidae

Heliozelidae

HELIOZELA Herrich-Schäffer, 1853

127.	<i>sericiella</i> (Haworth, 1828)	2
	<i>metallicella</i> Dup., 1840	
	<i>stanneella</i> F. v. R., 1841	
	<i>saltatricella</i> F. v. R., 1841	
	ANTISPILA Hübner, 1825	
128.	<i>metallella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>pfeifferella</i> Hb., 1813	
129.	<i>treitschkiella</i> (Fischer v. R., 1843)	2
	<i>petryi</i> Mart., 1898	

Adelidae

NEMATOPOGON Zeller, 1839

130.	<i>pilellus</i> (D. & Sch., 1775)	2
131.	<i>schwarziellus</i> Zeller, 1839	2
	<i>panzerellus</i> auct., nec F., 1794	
132.	<i>adansoniellus</i> (de Villers, 1789)	2
	<i>panzerellus</i> F., 1794	
133.	<i>metaxellus</i> (Hübner, 1813)	2
134.	<i>swammerdamellus</i> (Linnaeus, 1758)	2
135.	<i>robertellus</i> (Clerck, 1759)	2
	<i>pilulellus</i> Hb., 1813	

ADELA Latreille, 1796

136.	<i>metallica</i> (Poda, 1761)	2
137.	<i>cupriacella</i> (Hübner, 1819)	2
138.	<i>violaria</i> Razowski, 1978	352
	<i>violella</i> Stt., 1851, nec D. & Sch., 1775	
139.	<i>fasciella</i> (Fabricius, 1775)	2
140.	<i>minimella</i> (D. & Sch., 1775)	2
141.	<i>dumerilella</i> Duponchel, 1839	(2) 695
142.	<i>associatella</i> Zeller, 1839	2 *
143.	<i>degeerella</i> (Linnaeus, 1758)	2
144.	<i>congruella</i> Fischer v. R., 1840	2
145.	<i>ochsenheimerella</i> (Hübner, 1813)	2
146.	<i>croesella</i> (Scopoli, 1763)	2
147.	<i>reaumurella</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>viridella</i> Sc., 1763	
148.	<i>violella</i> (D. & Sch., 1775)	2
149.	<i>mazzolella</i> (Hübner, 1796)	N

150.	<i>cuprella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	CAUCHAS Zeller, 1839	
151.	<i>leucocerella</i> (Scopoli, 1763)	2
152.	<i>rufimitrella</i> (Scopoli, 1763)	2
153.	<i>fibulella</i> (D. & Sch., 1775)	2
154.	<i>rufifrontella</i> (Treitschke, 1833)	2

Incurvariidae

PHYLLOPORIA Heinemann, 1870

155.	<i>bistrigella</i> (Haworth, 1828)	2
	INCURVARIA Haworth, 1828	
156.	<i>oehlmanniella</i> (Hübner, 1796)	2
157.	<i>vetulella</i> (Zetterstedt, 1839)	2
158.	<i>koerneriella</i> (Zeller, 1839)	2
159.	<i>pectinea</i> Haworth, 1828	2
160.	<i>mascullella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>musculella</i> F., 1787	

LAMPRONIA Stephens, 1829

161.	<i>luzella</i> (Hübner, 1817)	2
162.	<i>capitella</i> (Clerck, 1759)	2
163.	<i>flavimitrella</i> (Hübner, 1817)	2
164.	<i>redimitella</i> (Liening & Zeller, 1846)	397
165.	<i>morosa</i> Zeller, 1852	2
166.	<i>fuscatella</i> (Tengström, 1848)	387
167.	<i>corticella</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>rubicella</i> Bjerk., 1781	
168.	<i>rupella</i> (D. & Sch., 1775)	2
169.	<i>praelatella</i> (D. & Sch., 1775)	2

Tischerioidae

Tischeriidae

TISCHERIA Zeller, 1839

170.	<i>ekebladella</i> (Bjerkander, 1795)	2
	<i>complanella</i> Hb., 1817	
171.	<i>dodonaea</i> Stainton, 1858	2
172.	<i>decidua</i> Wocke, 1876	2
173.	<i>marginata</i> (Haworth, 1828)	2
174.	<i>heinemannii</i> Wocke, 1871	500
175.	<i>gaunacella</i> (Duponchel, 1843)	2
176.	<i>angusticolllella</i> (Duponchel, 1843)	2

DITRYZIA

Tineoidae

Psychidae

Naryciinae

DIPLODOMA Zeller, 1852

177.	<i>laichartingellum</i> (Goeze, 1783)	2
	<i>herminatum</i> Fourcroy, 1785	
	<i>marginipunctellum</i> Sph., 1829	
	NARYCIA Stephens, 1836	
178.	<i>duplicella</i> (Goeze, 1783)	2
179.	<i>astrella</i> (H.-S., 1851)	2

<i>EOSOLENOBIA</i> Filipjev, 1924			
180.	<i>mannii</i> (Zeller, 1852)	2	
<i>DAHLICA</i> Enderlein, 1912			
181.	<i>triquetrella</i> (Hübner, 1813)	2	
182.	<i>nickerlii</i> (Heinemann, 1870)	2	
<i>SIEDERIA</i> Meier, 1953			
183.	<i>pineti</i> (Zeller, 1852)	2	
<i>listerella</i> L., 1761			
Taleporiinae			
<i>TALEPORIA</i> Hübner, 1825			
184.	<i>politella</i> (Ochsenheimer, 1816)	(2)	
185.	<i>tubulosa</i> (Retzius, 1783)	2	
Psychinae			
<i>BACOTIA</i> Tutt, 1899			
186.	<i>claustrella</i> (Bruand, 1845)	(1) 976	
<i>sepium</i> Spr., 1846			
<i>PROUTIA</i> Tutt, 1899			
187.	<i>betulina</i> (Zeller, 1839)	(1) 872	
<i>PSYCHE</i> Schrank, 1801			
188.	<i>casta</i> (Pallas, 1767)	1	
189.	<i>crassiorella</i> (Bruand, 1851)	(1) 872	
<i>BIJUGIS</i> Heylaerts, 1881			
190.	<i>bombycella</i> (D. & Sch., 1775)	1	
191.	<i>pectinella</i> (D. & Sch., 1775)	(1) 63	
<i>REBELIA</i> Heylaerts, 1900			
192.	<i>herrichiella</i> Strand, 1912	N	
<i>plumella</i> sensu O., 1810, nec D. & Sch., 1775			
<i>PSYCHIDEA</i> Rambur, 1866			
193.	<i>nudella</i> (Ochsenheimer, 1810)	(1)	
<i>EPICHNOPTERIX</i> Hübner, 1825			
194.	<i>plumella</i> (D. & Sch., 1775)	1	
<i>pulla</i> Esp., 1785			
Oiketicinae			
<i>ACANTHOPSYCHE</i> Heylaerts, 1881			
195.	<i>atra</i> (Linnaeus, 1767)	1	
<i>CANEPHORA</i> Hübner, 1822			
196.	<i>hirsuta</i> (Poda, 1761)	1	
<i>unicolor</i> Hfn., 1766			
<i>PACHYTHELIA</i> Westwood, 1848			
197.	<i>villosella</i> (Ochsenheimer, 1810)	1	
<i>PTILOCEPHALA</i> Rambur, 1866			
198.	<i>muscella</i> (D. & Sch., 1775)	1	
199.	<i>plumifera</i> (Ochsenheimer, 1810)	1	
<i>MEGALOPHANES</i> Heylaerts, 1881			
200.	<i>viciella</i> (D. & Sch., 1775)	1	
<i>PHALACROPTERIX</i> Hübner, 1825			
201.	<i>graslinella</i> (Boisduval, 1852)	1	
<i>STERRHOPTERIX</i> Hübner, 1825			
202.	<i>fusca</i> (Haworth, 1809)	1	
203.	<i>standfussi</i> (Wocke, 1851)	866	
<i>APTERONA</i> Milliére, 1857			
204.	<i>helicoidella</i> (Vallot, 1827)	1	
<i>crenulella</i> Brd., 1853			
<i>EUMASIA</i> Chrétien, 1904			
205.	<i>parietariella</i> (Heydenreich, 1851)	2	
<i>crepusculella</i> M.-R., 1920			
Tineidae			
Scardiinae			
<i>MOROPHAGA</i> Herrich-Schäffer, 1853			
206.	<i>choragella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
<i>SCARDIA</i> Treitschke, 1830			
207.	<i>tessulatella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2	
208.	<i>boletella</i> (Fabricius, 1794)	352	
<i>polypori</i> Esp., 1804			
Euplocaminae			
<i>EUPLOCAMUS</i> Latreille, 1809			
209.	<i>anthracinalis</i> (Scopoli, 1763)	2	
Mymecozelinae			
<i>HAPLOTINEA</i> Diakonoff & Hinton, 1956			
210.	<i>insectella</i> (Fabricius, 1794)	2	
<i>misella</i> Z., 1839			
211.	<i>ditella</i> (Pierce & Diakonoff, 1938)	525	
<i>ANEMALLOTA</i> Zagulajev, 1965			
212.	<i>praetoriella</i> (Christoph, 1872)	352	
<i>CEPHIMALLOTA</i> Bruand, 1851			
213.	<i>angusticostella</i> (Zeller, 1839)	387	
<i>hasarorum</i> Zag., 1965			
214.	<i>crassiflavella</i> Bruand, 1851	(525) K	
<i>simplicella</i> Z., 1852			
<i>REISSERITA</i> Agenjo, 1952			
215.	<i>relicinella</i> (H.-S., 1853)	(2) K	
Teichobiinae			
<i>PSYCHOIDES</i> Bruand, 1853			
216.	<i>verhuellus</i> Bruand, 1853	2 *	
<i>verhuellus</i> Stt., 1854			
<i>LYPUSA</i> Zeller, 1852			
217.	<i>maurella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
Meessiinae			
<i>ISCHNOSCIA</i> Meyrick, 1895			
218.	<i>borreonella</i> (Millière, 1874)	(2) K	
<i>INFURCITINEA</i> Spuler, 1910			
219.	<i>argentimaculella</i> (Stainton, 1849)	2 *	
220.	<i>albicomella</i> (Stainton, 1851)	2	
221.	<i>ignicomella</i> (Heydenreich, 1851)	2	
221a.	<i>roesslerella</i> (Heyden, 1865)	982a	

<i>STENOPTINEA</i> Dietz, 1905			
222.	<i>cyaneimarmorella</i> (Millière, 1854)	691	
<i>AGNATHOSIA</i> Amsel, 1954			
223.	<i>mendicella</i> (D. & Sch., 1775)	352	
Nemapogoninae			
<i>NEMAPOGON</i> Schrank, 1802			
224.	<i>granellus</i> (Linnaeus, 1758)	2	
225.	<i>cloacellus</i> (Haworth, 1828)	2	
226.	<i>wolffiellus</i> Krs. & Niels., 1976	695	
227.	<i>variellus</i> (Clemens, 1859)	525	
	<i>personellus</i> Pier. & Mtc., 1934		
228.	<i>inconditellus</i> (Lucas, 1956)	526	
	<i>heydeni</i> G. Pet., 1957		
229.	<i>ruricolellus</i> (Stainton, 1849)	525	
230.	<i>clematellus</i> (Fabricius, 1781)	2	
	<i>arcellus</i> auct., nec F., 1777		
231.	<i>picarellus</i> (Clerck, 1759)	920	
232.	<i>fungivorellus</i> (Benander, 1939)	536	
<i>ANEMAPOGON</i> Zagulajev, 1963			
233.	<i>quercicolellus</i> (Zeller, 1852)	2	
<i>ARCHINEMAPOGON</i> Zagulajev, 1962			
234.	<i>yildizae</i> Kocak, 1981	2	
	<i>laterellus</i> Thbg., 1794, nec D. & Sch., 1775		
	<i>arcuatellus</i> Stt., 1854, nec Schr., 1802		
235.	<i>nigralbellus</i> (Zeller, 1839)	351	
<i>NEMAXERA</i> Zagulajev, 1964			
236.	<i>betulinella</i> (Paykull, 1785)	2	
	<i>corticella</i> Curt., 1834		
	<i>emortuella</i> Z., 1839		
<i>TRIAXOMERA</i> Zagulajev, 1959			
237.	<i>fulvimitrella</i> (Sodoffsky, 1830)	2	
238.	<i>parasitella</i> (Hübner, 1796)	2	
<i>NEUROTHAUMASIA</i> Le Marchand, 1934			
239.	<i>ankerella</i> (Mann, 1867)	N	
Tineinae			
<i>MONOPIS</i> Hübner, 1825			
240.	<i>laevigella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
	<i>rusticella</i> Hb., 1798		
241.	<i>weaverella</i> (Scott, 1858)	291	
242.	<i>obviella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
	<i>ferruginella</i> Hb., 1813		
243.	<i>imella</i> (Hübner, 1813)	2	
244.	<i>monachella</i> (Hübner, 1796)	2	
<i>TRICHOPHAGA</i> Ragonot, 1894			
245.	<i>tapetzella</i> (Linnaeus, 1758)	2	
<i>TINEOLA</i> Herrich-Schäffer, 1853			
246.	<i>bisselliella</i> (Hummel, 1823)	2	
<i>NIDITINEA</i> G. Petersen, 1957			
247.	<i>fuscella</i> (Linnaeus, 1758)	2	
	<i>fuscipunctella</i> Hw., 1828		
248.	<i>striolella</i> (Matsumura, 1931)	291	
	<i>piecella</i> Bent., 1935		
	<i>pacifella</i> Zag., 1965		
<i>TINEA</i> Linnaeus, 1758			
249.	<i>columbariella</i> Wocke, 1877	525	
250.	<i>pellionella</i> (Linnaeus, 1758)	2	
251.	<i>translucens</i> Meyrick, 1917	291	
	<i>leonhardi</i> G. Pet., 1957		
252.	<i>dubiella</i> Stainton, 1859	895	
	<i>turicensis</i> M.-R., 1920		
253.	<i>pallescentella</i> Stainton, 1851	2	
254.	<i>semifulvella</i> Haworth, 1828	2	
255.	<i>trinitella</i> Thunberg, 1794	2	
	<i>lapella</i> Hb., 1796		
256.	<i>steueri</i> Petersen, 1966	215	
Hieroxestinae			
<i>OINOPHILA</i> Stephens, 1848			
257.	<i>v-flava</i> (Haworth, 1828)	2 *	
Gracillarioidea			
Gracillariidae			
Gracillariinae			
<i>CALOPTILIA</i> Hübner, 1825			
258.	<i>cuculipennella</i> (Hübner, 1796)	2	
259.	<i>populetorum</i> (Zeller, 1839)	2	
260.	<i>roscipennella</i> (Hübner, 1796)	913	
261.	<i>elongella</i> (Linnaeus, 1761)	2	
262.	<i>betulicola</i> (Hering, 1928)	735	
263.	<i>rufipennella</i> (Hübner, 1796)	2	
264.	<i>azaleella</i> (Brants, 1913)	2 * I	
265.	<i>alchimiella</i> (Scopoli, 1763)	2	
266.	<i>robustella</i> Jäckh, 1972	18	
267.	<i>stigmatella</i> (Fabricius, 1781)	2	
268.	<i>falconipennella</i> (Hübner, 1813)	2	
	<i>oneratella</i> Z., 1847		
269.	<i>onustella</i> (Hübner, 1813)	2 *	
270.	<i>hemidactylella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
271.	<i>fidella</i> (Reutti, 1853)	559	
272.	<i>syringella</i> (Fabricius, 1794)	2	
<i>POVOLNYA</i> Kuznetsov, 1979			
273.	<i>leucapennella</i> (Stephens, 1835)	2 *	
	<i>sulphurella</i> auct., nec F., 1776		
<i>ASPILAPTERYX</i> Spuler, 1910			
274.	<i>tringipennella</i> (Zeller, 1839)	2	
275.	<i>limosella</i> (Duponchel, 1844)	2	
<i>CALYBITES</i> Hübner, 1822			
276.	<i>phasianipennellus</i> (Hübner, 1813)	2	
	<i>quadruplellus</i> Z., 1839		
<i>EUCALYBITES</i> Kumata, 1982			
277.	<i>auroguttellus</i> (Stephens, 1835)	2	

ORNIXOLA Kuznetsov, 1979			311.	<i>tenerellus</i> (Joannis, 1915)	2
278.	<i>caudulatella</i> (Zeller, 1839)	2 *		<i>tenellus</i> Z., 1846, nec Dup. 1873	
MICRURAPTERYX Spuler, 1910			312.	<i>strigulatellus</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2
279.	<i>kollariella</i> (Zeller, 1839)	2	313.	<i>rajellus</i> (Linnaeus, 1758)	2
PARECTOPA Clemens, 1860				<i>alnifoliellus</i> Hb., 1796	
280.	<i>ononidis</i> (Zeller, 1839)	2		<i>alniellus</i> Z., 1846	
281.	<i>robiniella</i> Clemens, 1863	352 I	314.	<i>alpinus</i> (Frey, 1856)	103
LEUCOSPILAPTERYX Spuler, 1910				<i>hauderiellus</i> Rbl., 1913	
282.	<i>omissella</i> (Stainton, 1848)	998	315.	<i>coryli</i> (Nicelli, 1851)	2
ACROCERCOPS Wallengren, 1881			316.	<i>esperellus</i> (Goeze, 1783)	2
283.	<i>brongniardellus</i> (Fabricius, 1798)	2		<i>quinmatus</i> Fourcroy, 1785	
SAUTERINA Kuznetsov, 1979				<i>carpinicolellus</i> Stt., 1854	
284.	<i>hofmanniella</i> (Schleich, 1867)	2	317.	<i>corylifoliellus</i> (Hübner, 1796)	2
PARORNIX Spuler, 1910				<i>betulae</i> Z., 1839	
285.	<i>fagivora</i> (Frey, 1861)	2	318.	<i>leucographellus</i> (Zeller, 1850)	N
286.	<i>anglicella</i> (Stainton, 1850)	2 K	319.	<i>cavellus</i> (Zeller, 1846)	2
	<i>fragariae</i> Stt., 1874		320.	<i>ulmifoliellus</i> (Hübner, 1817)	2
287.	<i>carpinella</i> (Frey, 1863)	2	321.	<i>anderidae</i> (Fletcher, 1885)	99
288.	<i>anguliferella</i> (Zeller, 1847)	2	322.	<i>stettinensis</i> (Nicelli, 1852)	2
289.	<i>devoniella</i> (Stainton, 1850)	2	323.	<i>kleemannellus</i> (Fabricius, 1781)	2
	<i>avelanella</i> Stt., 1854		324.	<i>froelichiellus</i> (Zeller, 1839)	2
290.	<i>petiolella</i> (Frey, 1863)	896	325.	<i>nicellii</i> (Stainton, 1851)	2
291.	<i>betulae</i> (Stainton, 1854)	2	326.	<i>schreberellus</i> (Fabricius, 1781)	2
292.	<i>scoticella</i> (Stainton, 1850)	2	327.	<i>agilellus</i> (Zeller, 1846)	2
293.	<i>szoecsi</i> Gozmány, 1952	N	328.	<i>tristrigellus</i> (Haworth, 1828)	509
	<i>amygdalella</i> Kuzn., 1978		329.	<i>acaciellus</i> (Duponchel, 1843)	K N *
294.	<i>finitimella</i> (Zeller, 1850)	2	330.	<i>scabiosellus</i> (Douglas, 1853)	N *
295.	<i>torquillella</i> (Zeller, 1850)	2	331.	<i>emberizaepennellus</i> (Bouché, 1834)	2
CALLISTO Stephens, 1834			332.	<i>lantanelus</i> (Schrank, 1802)	2
296.	<i>denticulella</i> (Thunberg, 1794)	2	333.	<i>cerasicoellus</i> (H.-S., 1855)	2
	<i>guttea</i> Hw., 1828		334.	<i>pomonellus</i> (Zeller, 1846)	509
297.	<i>coffeella</i> (Zetterstedt, 1839)	2 *		<i>spinicolellus</i> Z., 1846	
	<i>interruptella</i> Zett., 1839		335.	<i>blancardellus</i> (Fabricius, 1781)	2
298.	<i>insperatella</i> (Nickerl, 1864)	2 *		<i>concomitellus</i> Banks, 1899	
Lithocolletinae			336.	<i>mespilellus</i> (Hübner, 1805)	2
PHYLLONORYCTER Hübner, 1822			337.	<i>oxyacanthae</i> (Frey, 1856)	2
299.	<i>robiniellus</i> (Clemens, 1859)	N I	338.	<i>cydoniellus</i> (D. & Sch., 1775)	2
300.	<i>helianthemellus</i> (H.-S., 1861)	2		<i>gregori</i> Pov., 1949	
301.	<i>harrisellus</i> (Linnaeus, 1761)	2	339.	<i>sorbi</i> (Frey, 1855)	2
	<i>cramerellus</i> F., 1777		340.	<i>junoniellus</i> (Zeller, 1846)	2
302.	<i>quercifoliellus</i> (Zeller, 1839)	2	341.	<i>populifoliellus</i> (Treitschke, 1833)	2
303.	<i>roboris</i> (Zeller, 1839)	2	342.	<i>pastorellus</i> (Zeller, 1846)	2
304.	<i>mannii</i> (Zeller, 1846)	95	343.	<i>sagitellus</i> (Bjerkander, 1790)	2
305.	<i>maestingellus</i> (Müller, 1764)	2		<i>tremulae</i> Z., 1846	
	<i>faginellus</i> Z., 1846		344.	<i>comparellus</i> (Duponchel, 1843)	2
306.	<i>lautellus</i> (Zeller, 1846)	2		<i>cerrutiellus</i> Hart., 1952	
307.	<i>muelleriellus</i> (Zeller, 1839)	2	345.	<i>apparellus</i> (H.-S., 1855)	2
	<i>amyotellus</i> Dup., 1840		346.	<i>connexellus</i> (Zeller, 1846)	2
308.	<i>heegeriellus</i> (Zeller, 1846)	2	347.	<i>dubitellus</i> (H.-S., 1855)	2
309.	<i>scitulellus</i> (Duponchel, 1843)	95	348.	<i>salictellus</i> (Zeller, 1846)	2
310.	<i>saportellus</i> (Duponchel, 1840)	2		<i>viminiellus</i> Sirc., 1848	
	<i>hortellus</i> auct., nec F., 1794		349.	<i>hilarellus</i> (Zetterstedt, 1839)	2
				<i>spinolellus</i> Dup., 1840	
				<i>groenlieni</i> Her., 1926	

350.	<i>salicicolellus</i> (Sircom, 1848)	2
351.	<i>quinqueguttellus</i> (Stainton, 1851)	99
352.	<i>platani</i> (Staudinger, 1870)	693
353.	<i>acerifoliellus</i> (Zeller, 1839)	2
	<i>sylvellus</i> Hw., 1828, nec Hb. 1813	
354.	<i>platanoidellus</i> (Joannis, 1920)	510
355.	<i>geniculellus</i> (Ragonot, 1874)	2
	<i>acernellus</i> Z., 1846, nec Dup. 1843	
356.	<i>medicaginellus</i> (Gerasimov, 1930)	895
357.	<i>insignitellus</i> (Zeller, 1846)	2
358.	<i>scopariellus</i> (Zeller, 1846)	2
359.	<i>fraxinellus</i> (Zeller, 1846)	2
360.	<i>nigrescentellus</i> (Logan, 1851)	2
	<i>breimiellus</i> Frey, 1855	

CAMERARIA Chapman, 1902

361.	<i>ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	N I
------	--	-----

Phyllocnistinae

PHYLLOCNISTIS Zeller, 1848

362.	<i>saligna</i> (Zeller, 1839)	2
363.	<i>labyrinthella</i> (Bjerkander, 1790)	118
	<i>sorhageniella</i> Lüd., 1900	
	<i>xenia</i> Her., 1936	
364.	<i>unipunctella</i> (Stephens, 1834)	118
	<i>suffusella</i> Z., 1847	

Roeslerstammiidae

ROESLERSTAMMIA Zeller, 1839

365.	<i>erxlebella</i> (Fabricius, 1787)	2
366.	<i>pronubella</i> (D. & Sch., 1775)	2

Bucculatricidae

BUCCULATRIX Zeller, 1839

367.	<i>cristatella</i> (Zeller, 1839)	2
368.	<i>nigricomella</i> (Zeller, 1839)	2
369.	<i>gnaphaliella</i> (Treitschke, 1833)	2
370.	<i>absinthii</i> Gartner, 1865	2 *
371.	<i>artemisiella</i> H.-S., 1855	2
	<i>artemisiae</i> auct., nec Nick., 1864	
372.	<i>ratisbonensis</i> Stainton, 1861	2
373.	<i>nottei</i> Petry, 1912	695
374.	<i>albedinella</i> (Zeller, 1839)	2
	<i>boyerella</i> Dup., 1840	
375.	<i>demaryella</i> (Duponchel, 1840)	N
376.	<i>bechsteinella</i> (Bech. & Scharf., 1805)	2
	<i>crataegi</i> Z., 1839	
377.	<i>ulmella</i> Zeller, 1848	2
378.	<i>ulmifoliae</i> Hering, 1931	N
379.	<i>cidarella</i> (Zeller, 1839)	2
380.	<i>thoracella</i> (Thunberg, 1794)	2
381.	<i>frangutella</i> (Goeze, 1783)	2
	<i>frangulella</i> auct., lapsus calami	

Douglasiidae

TINAGMA Zeller, 1839

382.	<i>signatum</i> Gaedike, 1991	N
383.	<i>perdicellum</i> Zeller, 1839	2
384.	<i>ocnerostomellum</i> (Stainton, 1850)	90
385.	<i>balteolellum</i> (Fischer v. R., 1841)	2
	<i>KLIMESCHIA</i> Amsel, 1938	
386.	<i>transversella</i> (Zeller, 1839)	2

Yponomeutoidea

Yponomeutidae

Scythropiinae

SCYTHROPIA Hübner, 1825

387.	<i>crataegella</i> (Linnaeus, 1767)	2
------	-------------------------------------	---

Yponomeutinae

YPONOMEUTA Latreille, 1796

388.	<i>evonymellus</i> (Linnaeus, 1758)	2
389.	<i>padellus</i> (Linnaeus, 1758)	2
390.	<i>malinellus</i> Zeller, 1838	2
391.	<i>cagnagellus</i> (Hübner, 1813)	2
	<i>cognatellus</i> auct., lapsus calami	
392.	<i>irrorellus</i> (Hübner, 1796)	(2) 215
393.	<i>rorrellus</i> (Hübner, 1796)	695
394.	<i>plumbellus</i> (D. & Sch., 1775)	2
395.	<i>sedellus</i> Treitschke, 1832	2

vigintipunctatus Retz., 1783

EUHYPONOMEUTA Toll, 1941

396.	<i>stannellus</i> (Thunberg, 1794)	85
------	------------------------------------	----

KESSLERIA Nowicki, 1846

397.	<i>alpicella</i> (Stainton, 1851)	2 K P
------	-----------------------------------	-------

PSEUDOSWAMMERDAMIA Friese, 1960

398.	<i>combinella</i> (Hübner, 1786)	2
	<i>SWAMMERDAMIA</i> Hübner, 1825	
399.	<i>caesiella</i> (Hübner, 1796)	2
	<i>heroldella</i> Hb., 1825	

400.	<i>pyrella</i> (de Villers, 1789)	2
------	-----------------------------------	---

401.	<i>compunctella</i> (H.-S., 1855)	2
------	-----------------------------------	---

PARASWAMMERDAMIA Friese, 1960

402.	<i>albicapitella</i> (Scharfenberg, 1805)	695
------	---	-----

403.	<i>lutarea</i> (Haworth, 1828)	2
------	--------------------------------	---

nebulella Gz., 1783, nec D. & Sch., 1775

CEDESTIS Zeller, 1839

404.	<i>gysseleniella</i> Zeller, 1839	2
------	-----------------------------------	---

405.	<i>subfasciella</i> (Stephens, 1834)	2
------	--------------------------------------	---

farinatella Dup., 1840

OCNEROSTOMA Zeller, 1847

406.	<i>pinariellum</i> Zeller, 1847	2
------	---------------------------------	---

copiosellum Frey, 1856

407.	<i>friesei</i> Svensson, 1966	67
------	-------------------------------	----

Praydinae		
ATEMELIA Herrich-Schäffer, 1853		
408.	<i>torquatella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2
PRAYS Hübner, 1825		
409.	<i>fraxinellus</i> (Bjerkander, 1784)	2
<i>curtisellus</i> Don., 1793		
410.	<i>ruficeps</i> (Heinemann, 1854)	304
Argyresthiinae		
ARGYRESTHIA Hübner, 1825		
411.	<i>laevigatella</i> (Heydenreich, 1851)	2
412.	<i>illuminatella</i> Zeller, 1839	2
413.	<i>glabratella</i> (Zeller, 1847)	2
414.	<i>bergiella</i> (Ratzeburg, 1840)	2
<i>certella</i> Z., 1847		
415.	<i>praecocella</i> Zeller, 1839	N
416.	<i>trifasciata</i> Staudinger, 1871	N
417.	<i>reticulata</i> Staudinger, 1877	N
418.	<i>arceuthina</i> Zeller, 1839	2
419.	<i>thuiella</i> (Packard, 1871)	N I
420.	<i>abdominalis</i> Zeller, 1839	2 *
421.	<i>aurulentella</i> Stainton, 1849	291
422.	<i>brockeella</i> (Hübner, 1813)	2
423.	<i>ivella</i> (Haworth, 1828)	2
424.	<i>goedartella</i> (Linnaeus, 1758)	2
425.	<i>pygmaeella</i> (D. & Sch., 1775)	2
<i>rudolphella</i> Esp., 1791		
426.	<i>glaucinella</i> Zeller, 1839	998
427.	<i>sorbiella</i> (Treitschke, 1833)	2
428.	<i>curvella</i> (Linnaeus, 1761)	2
<i>cornella</i> auct., nec F., 1775		
429.	<i>retinella</i> Zeller, 1839	2
430.	<i>fundella</i> (Fischer v. R., 1835)	2
431.	<i>spinosella</i> Stainton, 1849	2
<i>mendica</i> auct., nec Hb., 1796		
432.	<i>conjugella</i> Zeller, 1839	2
433.	<i>pulchella</i> Lienig & Zeller, 1846	2
434.	<i>semifusca</i> (Haworth, 1828)	2
<i>spiniella</i> Z., 1839		
435.	<i>pruniella</i> (Clerck, 1759)	2
<i>ephippella</i> F., 1777		
436.	<i>bonnetella</i> (Linnaeus, 1758)	2
<i>nitidella</i> D. & Sch., 1775		
437.	<i>albistria</i> (Haworth, 1828)	2
438.	<i>semitestacella</i> (Curtis, 1833)	2
Ypsolophidae		
Ypsolophinae		
YPSOLOPHA Latreille, 1796		
439.	<i>mucronella</i> (Scopoli, 1763)	2
440.	<i>nemorella</i> (Linnaeus, 1758)	2
441.	<i>dentella</i> (Fabricius, 1775)	2
<i>xylostella</i> auct., nec L., 1758		
442.	<i>falcella</i> (D. & Sch., 1775)	2
443.	<i>asperella</i> (Linnaeus, 1761)	2
444.	<i>scabrella</i> (Linnaeus, 1761)	2
445.	<i>horridella</i> (Treitschke, 1835)	2
446.	<i>lucella</i> (Fabricius, 1775)	2
447.	<i>alpella</i> (D. & Sch., 1775)	2
448.	<i>sylvella</i> (Linnaeus, 1767)	2
449.	<i>persicella</i> (Fabricius, 1787)	(2) P
450.	<i>parenthesella</i> (Linnaeus, 1761)	2
451.	<i>ustella</i> (Clerck, 1759)	2
<i>radiatella</i> Don., 1794		
452.	<i>coriabella</i> (H.-S., 1854)	2
453.	<i>sequella</i> (Clerck, 1759)	2
454.	<i>vittella</i> (Linnaeus, 1758)	2
Ochsenheimeriinae		
OCHSENHEIMERIA Hübner, 1825		
455.	<i>taurella</i> (D. & Sch., 1775)	2 *
<i>mediopectinella</i> Hw., 1828		
<i>birdella</i> Curt., 1831		
456.	<i>urella</i> Fischer v. R., 1842	384
457.	<i>vacculella</i> Fischer v. R., 1842	2
Plutellidae		
Plutellinae		
PLUTELLA Schrank, 1802		
458.	<i>xylostella</i> (Linnaeus, 1758)	2 M
<i>maculipennis</i> Curt., 1832		
459.	<i>porrectella</i> (Linnaeus, 1758)	2
RHIGOGNOSTIS Zeller, 1857		
460.	<i>senilella</i> (Zetterstedt, 1839)	2
461.	<i>annulatella</i> (Curtis, 1832)	2 *
462.	<i>incarnatella</i> (Steudel, 1873)	2
EIDOPHASIA Stephens, 1842		
463.	<i>messingiella</i> (Fischer v. R., 1840)	2
Acrolepiinae		
DIGITIVALVA Gaedike, 1970		
464.	<i>arnicella</i> (Heyden, 1863)	2
465.	<i>reticulella</i> (Hübner, 1796)	2
<i>cariosella</i> Tr., 1835		
466.	<i>granitella</i> (Treitschke, 1833)	2
ACROLEPIOPSIS Gaedike, 1970		
467.	<i>assectella</i> (Zeller, 1839)	2
468.	<i>betulella</i> (Curtis, 1850)	91
<i>ursinella</i> Web., 1945		
ACROLEPIA Curtis, 1838		
469.	<i>autumnitella</i> Curtis, 1838	N

Glyphipterigidae			
Orthotaeliinae			
<i>ORTHOTAELIA</i> Stephens, 1834			
470.	<i>sparganella</i> (Thunberg, 1788)	2	
Glyphipteriginae			
<i>GLYPHIPTERIX</i> Hübner, 1825			
471.	<i>simpliciella</i> (Stephens, 1834)	2	
	<i>fischerella</i> Z., 1839		
472.	<i>equitella</i> (Scopoli, 1763)	2	
	<i>majorella</i> Hein., 1876		
	<i>minorella</i> Snell., 1882		
473.	<i>forsterella</i> (Fabricius, 1781)	2	
474.	<i>haworthana</i> (Stephens, 1834)	2	
475.	<i>thrasonella</i> (Scopoli, 1763)	2	
476.	<i>bergstraesserella</i> (Fabricius, 1781)	2	
Heliodinidae			
<i>HELIODINES</i> Stainton, 1854			
477.	<i>roesella</i> (Linnaeus, 1758)	2 *	
Bedelliidae			
<i>BEDELLIA</i> Stainton, 1849			
478.	<i>somnulentella</i> (Zeller, 1847)	2	
Lyonetiidae			
Cemistominae			
<i>PARALEUCOPTERA</i> Heinrich, 1918			
479.	<i>sinuella</i> (Reutti, 1853)	2 P	
	<i>susinella</i> H.-S., 1855		
<i>LEUCOPTERA</i> Hübner, 1825			
480.	<i>laburnella</i> (Stainton, 1851)	2	
	<i>walesella</i> Stt., 1858		
481.	<i>spartifoliella</i> (Hübner, 1813)	2	
482.	<i>lotella</i> (Stainton, 1858)	2	
483.	<i>malifoliella</i> (Costa, 1836)	2	
	<i>scitella</i> Z., 1839		
484.	<i>lustratella</i> (H.-S., 1855)	2	
Lyonetiinae			
<i>LYONETIA</i> Hübner, 1825			
485.	<i>prunifoliella</i> (Hübner, 1796)	2	
486.	<i>clerkella</i> (Linnaeus, 1758)	2	
487.	<i>ledi</i> Wocke, 1859	2	
488.	<i>pulverulentella</i> Zeller, 1839	2 *	
Gelechioidea			
Oecophoridae			
Depressariinae			
<i>SEMIOSCOPI</i> Hübner, 1825			
489.	<i>strigulana</i> (Fabricius, 1787)	2	
490.	<i>steinkellneriana</i> (D. & Sch., 1775)	2	
491.	<i>oculella</i> (Thunberg, 1794)	2	
	<i>anella</i> Hb., 1796		
492.	<i>avellanella</i> (Hübner, 1793)	2	
<i>ANCHINIA</i> Hübner, 1825			
493.	<i>daphnella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
494.	<i>cristalis</i> (Scopoli, 1763)	2	
<i>LUQUETIA</i> Leraut, 1991			
495.	<i>lobella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
<i>EXAERETIA</i> Stainton, 1849			
496.	<i>ciniflonella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	67	
497.	<i>allisella</i> Stainton, 1849	2	
498.	<i>culcitella</i> (H.-S., 1854)	115	
<i>AGONOPTERIX</i> Hübner, 1825			
499.	<i>ocellana</i> (Fabricius, 1775)	2	
500.	<i>conterminella</i> (Zeller, 1839)	2	
501.	<i>liturosa</i> (Haworth, 1811)	2	
	<i>liturella</i> Hb., 1796		
502.	<i>hypericella</i> (Hübner, 1817)	2	
	<i>impurella</i> Tr., 1835		
503.	<i>alstromeriana</i> (Clerck, 1759)	2	
504.	<i>quadripunctata</i> (Wocke, 1857)	N	
505.	<i>heracliana</i> (Linnaeus, 1758)	2	
	<i>applana</i> F., 1777		
506.	<i>ciliella</i> (Stainton, 1849)	2	
507.	<i>selini</i> (Heinemann, 1870)	895	
508.	<i>hippomarathri</i> (Nickerl, 1864)	2	
509.	<i>parilella</i> (Treitschke, 1835)	(2) P	
510.	<i>curvipunctosa</i> (Haworth, 1811)	2	
	<i>zephyrella</i> Hb., 1813		
511.	<i>cnicella</i> (Treitschke, 1832)	2	
512.	<i>capreolella</i> (Zeller, 1839)	2	
513.	<i>purpurea</i> (Haworth, 1811)	2	
514.	<i>yeatiana</i> (Fabricius, 1781)	2	
515.	<i>astrantiae</i> (Heinemann, 1870)	695	
516.	<i>angelicella</i> (Hübner, 1813)	2	
517.	<i>senecionis</i> (Nickerl, 1864)	235	
	<i>sarracenella</i> Rössl., 1866		
518.	<i>nanatella</i> (Stainton, 1849)	920	
519.	<i>kaekeritziana</i> (Linnaeus, 1767)	2	
	<i>flavella</i> Hb., 1796		
520.	<i>pallorella</i> (Zeller, 1839)	2	
521.	<i>laterella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
522.	<i>carduella</i> (Hübner, 1817)	N	
523.	<i>arenella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
524.	<i>propinquella</i> (Treitschke, 1835)	2	
525.	<i>subpropinquella</i> (Stainton, 1849)	2	
526.	<i>doronicella</i> (Wocke, 1849)	2	
527.	<i>petasitis</i> (Standfuss, 1851)	2	
528.	<i>scopariella</i> (Heinemann, 1870)	690	
529.	<i>atomella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
530.	<i>assimilella</i> (Treitschke, 1832)	2	
531.	<i>nervosa</i> (Haworth, 1811)	2	
	<i>costosa</i> Hw., 1811		

532.	<i>furvella</i> (Treitschke, 1832)	2	564.	<i>luctuosella</i> (Duponchel, 1840)	918
533.	<i>rotundella</i> (Douglas, 1846)	316	565.	<i>nubilosella</i> (H.-S., 1854)	2
<i>DEPRESSARIA</i> Haworth, 1811			566.	<i>similella</i> (Hübner, 1796)	2
534.	<i>emeritella</i> Stainton, 1849	540	<i>SCHIFFERMUELLERINA</i> Leraut, 1989		
535.	<i>olerella</i> Zeller, 1854	2	567.	<i>grandis</i> (Desvignes, 1842)	998 *
536.	<i>albipunctella</i> (D. & Sch., 1775)	2	<i>TICHONIA</i> Hübner, 1825		
537.	<i>pulcherrimella</i> Stainton, 1849	2	568.	<i>tinctella</i> (Hübner, 1796)	2
538.	<i>douglasella</i> Stainton, 1849	2	<i>BATIA</i> Stephens, 1834		
539.	<i>beckmanni</i> Heinemann, 1870	N	569.	<i>unitella</i> (Hübner, 1796)	2
540.	<i>sordidatella</i> Tengström, 1848	2	570.	<i>lambdella</i> (Donovan, 1793)	N
	<i>weirella</i> Stt., 1849			<i>magnatella</i> Jäckh, 1942	
	<i>gudmanni</i> Rbl., 1927		571.	<i>internella</i> Jäckh, 1972	N
541.	<i>badiella</i> (Hübner, 1796)	2	<i>EPICALLIMA</i> Dyar, 1903		
542.	<i>pimpinellae</i> Zeller, 1839	2	572.	<i>formosella</i> (D. & Sch., 1775)	2
543.	<i>pastinacella</i> (Duponchel, 1838)	2	<i>BORKHAUSENIA</i> Hübner, 1825		
	<i>heracliana</i> auct., nec L., 1758		573.	<i>fuscescens</i> (Haworth, 1828)	2
544.	<i>cervicella</i> H.-S., 1854	2	574.	<i>minutella</i> (Linnaeus, 1758)	2
545.	<i>daucella</i> (D. & Sch., 1775)	2	575.	<i>luridicomella</i> (H.-S., 1856)	215
546.	<i>ultimella</i> Stainton, 1849	215	<i>TELECHRYISIS</i> Toll, 1956		
547.	<i>chaerophylli</i> Zeller, 1839	2	576.	<i>tripuncta</i> (Haworth, 1828)	2 P
548.	<i>depressana</i> (Fabricius, 1775)	2	<i>DECANTHA</i> Busck, 1908		
	<i>depressella</i> auct.		577.	<i>borkhauseni</i> (Zeller, 1839)	2 *
549.	<i>artemisiae</i> Nickerl, 1864	2 *	<i>FABIOLA</i> Busck, 1908		
550.	<i>silesiaca</i> Heinemann, 1870	895	578.	<i>pokornyi</i> (Nickerl, 1864)	2
<i>LEVIPALPUS</i> Hannemann, 1953			<i>METALAMPRA</i> Toll, 1956		
551.	<i>hepatariellus</i> (Lienig & Zeller, 1846)	67	579.	<i>cinnamomea</i> (Zeller, 1839)	2
<i>AMPHISBATIS</i> Zeller, 1870			<i>BISIGNA</i> Toll, 1956		
552.	<i>incongruella</i> (Stainton, 1849)	2	580.	<i>procerella</i> (D. & Sch., 1775)	2
<i>PSEUDATEMELIA</i> Rebel, 1910			<i>ESPERIA</i> Hübner, 1825		
553.	<i>josephinae</i> (Toll, 1956)	67	581.	<i>oliviella</i> (Fabricius, 1794)	2 *
554.	<i>flavifrontella</i> (D. & Sch., 1775)	2	<i>OECOPHORA</i> Latreille, 1796		
555.	<i>subochreella</i> (Doubleday, 1859)	695	582.	<i>bractella</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>panzerella</i> auct., nec F., 1794		<i>HARPELLA</i> Schrank, 1802		
<i>Ethmiinae</i>			583.	<i>forficella</i> (Scopoli, 1763)	2
<i>ETHMIA</i> Hübner, 1819			<i>OROPHIA</i> Hübner, 1825		
556.	<i>dodecea</i> (Haworth, 1828)	907	584.	<i>ferrugella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>decemguttella</i> Hb., 1810		585.	<i>denisella</i> (Fabricius, 1787)	2
557.	<i>quadrillella</i> (Goeze, 1783)	2	586.	<i>sordidella</i> (Hübner, 1796)	(2) 607
	<i>funerella</i> F., 1787		<i>HYPERCALLIA</i> Stephens, 1829		
558.	<i>pusiella</i> (Linnaeus, 1758)	2	587.	<i>citrinalis</i> (Scopoli, 1763)	2 *
559.	<i>terminella</i> Fletcher, 1938	2	<i>CARCINA</i> Hübner, 1825		
	<i>sexpunctella</i> Hb., 1810, nec F., 1794		588.	<i>quercana</i> (Fabricius, 1775)	2
560.	<i>bipunctella</i> (Fabricius, 1775)	2	<i>ENDROSIS</i> Hübner, 1825		
<i>Oecophorinae</i>			589.	<i>sarcitrella</i> (Linnaeus, 1758)	2
<i>SCHIFFERMUELLERIA</i> Hübner, 1825				<i>lactella</i> D. & Sch., 1775	
561.	<i>schaefferella</i> (Linnaeus, 1758)	2	<i>HOFMANNOPHILA</i> Spuler, 1910		
<i>DENISIA</i> Hübner, 1825			590.	<i>pseudospretella</i> (Stainton, 1849)	2
562.	<i>stipella</i> (Linnaeus, 1758)	2	<i>HOLOSCOLIA</i> Zeller, 1839		
563.	<i>augustella</i> (Hübner, 1796)	215	591.	<i>huebneri</i> Kocak, 1980	2
				<i>forficella</i> Hb., 1813, nec Sc., 1763	
			<i>APLOTA</i> Stephens, 1834		
			592.	<i>palpella</i> (Haworth, 1828)	2

<i>PLEUROTA</i> Hübner, 1825			
593.	<i>pyropella</i> (D. & Sch., 1775)	K N	
594.	<i>bicostella</i> (Clerck, 1759)	2	
<i>DEUTEROGONIA</i> Rebel, 1901			
595.	<i>pudorina</i> (Wocke, 1857)	2	
Chimabachinae			
<i>DIURNEA</i> Haworth, 1811			
596.	<i>fagella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
597.	<i>lipsiella</i> (D. & Sch., 1775)	2	
	<i>phryganella</i> Hb., 1796		
<i>CHEIMOPHILA</i> Hübner, 1825			K
598.	<i>salicella</i> (Hübner, 1796)	2	
Stathmopodinae			
<i>STATHMOPODA</i> Herrich-Schäffer, 1853			
599.	<i>pedella</i> (Linnaeus, 1761)	2	
Elachistidae			
<i>MENDESIA</i> Joannis, 1902			
600.	<i>farinella</i> (Thunberg, 1794)	18	
	<i>subargentella</i> Datt., 1932		
<i>PERITTIA</i> Stainton, 1854			
601.	<i>herrickiella</i> (H.-S., 1855)	2	
<i>STEPHENSIA</i> Stainton, 1858			
602.	<i>brunnichella</i> (Linnaeus, 1767)	2	
603.	<i>abbreviatella</i> (Stainton, 1851)	352	
	<i>myosotivora</i> M.-R., 1937		
<i>ELACHISTA</i> Treitschke, 1833			
604.	<i>regificella</i> Sircom, 1849	2	
	<i>magnificella</i> auct., nec Dup., 1843		
605.	<i>gleichenella</i> (Fabricius, 1781)	2	
	<i>magnificella</i> Dup., 1843		
606.	<i>pigerella</i> (H.-S., 1854)	2	
	<i>muehligiella</i> Frey, 1856		
607.	<i>quadripunctella</i> (Hübner, 1825)	2	
	<i>quadrella</i> sensu Hb., 1805, nec D. & Sch., 1775		
608.	<i>tetragonella</i> (H.-S., 1855)	N	
609.	<i>biatomella</i> (Stainton, 1848)	N	
610.	<i>martinii</i> Hofmann, 1898	2	
611.	<i>poae</i> Stainton, 1855	N	
612.	<i>atricomella</i> Stainton, 1849	(2) P	
	<i>holdenella</i> Stt., 1854		
613.	<i>kilmunella</i> Stainton, 1849	498	
	<i>stagnalis</i> Frey, 1859		
614.	<i>alpinella</i> Stainton, 1854	695	
	<i>monticola</i> Wck., 1876		
615.	<i>compsa</i> Traugott-Olsen, 1974	N	
616.	<i>elegans</i> Frey, 1859	2 *	
617.	<i>luticomella</i> Zeller, 1839	2	
618.	<i>albifrontella</i> (Hübner, 1817)	2	
619.	<i>bifasciella</i> Treitschke, 1833	2	
620.	<i>nobilella</i> Zeller, 1839	2	
621.	<i>apicipunctella</i> Stainton, 1849	2	
622.	<i>subnigrella</i> Douglas, 1853	2	
623.	<i>herrickii</i> Frey, 1859	2	
	<i>reuttiana</i> Frey, 1859		
624.	<i>orstadii</i> Palm, 1943	N	
625.	<i>pomerana</i> (Frey, 1870)	215	
626.	<i>humilis</i> Zeller, 1850	2	
	<i>perplexella</i> Stt., 1859		
627.	<i>canapennella</i> (Hübner, 1813)	2	
	<i>pulchella</i> Hw., 1828		
	<i>incanella</i> H.-S., 1855		
628.	<i>anserinella</i> Zeller, 1839	2	
629.	<i>rufocinerea</i> (Haworth, 1828)	(2)	
630.	<i>monosemiella</i> Rössler, 1881	2	
	<i>cerusella</i> Hb., 1796, nec D. & Sch., 1775		
631.	<i>argentella</i> (Clerck, 1759)	2	
	<i>cygnipennella</i> Hb., 1796		
632.	<i>pollutella</i> (Duponchel, 1843)	2	
633.	<i>pollinariella</i> Zeller, 1839	2	
634.	<i>collitella</i> (Duponchel, 1843)	N	
635.	<i>heringi</i> Rebel, 1899	896	
636.	<i>hedemanni</i> Rebel, 1899	N	
637.	<i>nolckeni</i> Sulcs, 1992	896	
638.	<i>subocellea</i> (Stephens, 1834)	2	
	<i>disertella</i> H.-S., 1855		
639.	<i>dispilella</i> Zeller, 1839	2 K	
	<i>distigmatella</i> Frey, 1859		
640.	<i>steueri</i> Traugott-Olsen, 1990	837	
641.	<i>gregori</i> Traugott-Olsen, 1988	K N	
642.	<i>svenssoni</i> Traugott-Olsen, 1988	K N	
643.	<i>dispunctella</i> (Duponchel, 1843)	2 K	
644.	<i>spumella</i> Caradja, 1920	N	
645.	<i>rudectella</i> Stainton, 1851	2	
646.	<i>squamosella</i> (Duponchel, 1843)	2	
647.	<i>bedellella</i> (Sircom, 1848)	2	
	<i>nigrella</i> H.-S., 1855		
	<i>lugdunensis</i> Frey, 1859		
648.	<i>littoricola</i> Le Marchand, 1938	505	
649.	<i>pullicomella</i> Zeller, 1839	2	
650.	<i>chrysodesmella</i> Zeller, 1850	2	
651.	<i>megerlella</i> (Hübner, 1810)	N	
	<i>obliquella</i> Stt., 1854		
652.	<i>cingillella</i> (H.-S., 1855)	2 *	
653.	<i>unifasciella</i> (Haworth, 1828)	896	
654.	<i>gangabella</i> Zeller, 1850	2	
	<i>taeniatella</i> Stt., 1857		
655.	<i>subalbidella</i> Schläger, 1847	290	
656.	<i>adscitella</i> Stainton, 1851	215 K	
	<i>revinctella</i> auct., nec Z., 1850		
657.	<i>bisulcella</i> (Duponchel, 1843)	897	
	<i>zonariella</i> Tgstr., 1848		

<i>BISELACHISTA</i> Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen, 1977			690.	<i>idaeaella</i> Hofmann, 1869	396
658.	<i>trapeziella</i> (Stainton, 1849)	2	691.	<i>vacciniella</i> H.-S., 1861	2 K
659.	<i>ornitopodella</i> (Frey, 1859)	(2)		<i>betulaenanae</i> Klim., 1958	
660.	<i>serricornis</i> (Stainton, 1854)	235	692.	<i>lusciniapennella</i> (Treitschke, 1833)	2
661.	<i>occidentalis</i> (Frey, 1883)	838		<i>vimineitella</i> Z., 1849	
662.	<i>utonella</i> (Frey, 1856)	2	693.	<i>albitarsella</i> Zeller, 1849	2
	<i>paludum</i> Frey, 1859		694.	<i>pulmonariella</i> Ragonot, 1874	397
663.	<i>albidella</i> (Nylander, 1848)	2	695.	<i>ledi</i> Stainton, 1860	2
	<i>rhynchosporaella</i> Stt., 1848		696.	<i>vitisella</i> Gregson, 1856	2
<i>COSMIOTES</i> Clemens, 1860			697.	<i>glitzella</i> Hofmann, 1869	998
664.	<i>freyerella</i> (Hübner, 1825)	2	698.	<i>murinella</i> Tengström, 1847	352
	<i>nigrella</i> auct., nec H.-S., 1855		699.	<i>juncicolella</i> Stainton, 1851	2
	<i>gregsoni</i> Stt., 1855		700.	<i>orbitella</i> Zeller, 1849	2
665.	<i>exactella</i> (H.-S., 1855)	2	701.	<i>binderella</i> (Kollar, 1832)	2
	<i>parvulella</i> H.-S., 1855		702.	<i>potentillae</i> Elisha, 1885	397
666.	<i>stabilella</i> (Stainton, 1858)	2 *	703.	<i>violacea</i> (Ström, 1783)	2
667.	<i>consortella</i> (Stainton, 1851)	397		<i>hornigi</i> Toll, 1952	
Coleophoridae				<i>paripennella</i> auct., nec Z., 1839	
<i>AUGASMA</i> Herrich-Schäffer, 1853			704.	<i>ahenella</i> Heinemann, 1876	2
668.	<i>aeratellum</i> (Zeller, 1839)	2	705.	<i>trifolii</i> (Curtis, 1832)	2
<i>METRIOTES</i> Herrich-Schäffer, 1853				<i>frischella</i> auct., nec L., 1758	
669.	<i>lutarea</i> (Haworth, 1828)	2	706.	<i>frischella</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>modestella</i> Dup., 1839			<i>alcyonipennella</i> auct., nec Koll., 1832	
<i>COLEOPHORA</i> Hübner, 1822			707.	<i>alcyonipennella</i> (Kollar, 1832)	682
670.	<i>albella</i> (Thunberg, 1788)	2 *		<i>cupariella</i> Z., 1847	
	<i>leucapennella</i> Hb., 1796			<i>cuprifulgella</i> Toll, 1962	
671.	<i>spiraeella</i> Rebel, 1916	918	708.	<i>conyzae</i> Zeller, 1868	695
672.	<i>lutipennella</i> (Zeller, 1838)	2	709.	<i>ptarmicia</i> Walsingham, 1910	2 *
673.	<i>ochripennella</i> Zeller, 1849	2		<i>zimmermanni</i> Rbl., 1937	
674.	<i>gryphipennella</i> (Hübner, 1796)	2	710.	<i>lineolea</i> (Haworth, 1828)	2
675.	<i>flavipennella</i> (Duponchel, 1843)	2	711.	<i>hemerobiella</i> (Scopoli, 1763)	2
676.	<i>adjectella</i> H.-S., 1861	352	712.	<i>lithargyrinella</i> Zeller, 1849	695
677.	<i>milvipennis</i> Zeller, 1839	235		<i>olivaceella</i> Stt., 1854	
678.	<i>alnifoliae</i> Barasch, 1934	925		<i>solitariella</i> H.-S., 1855	
679.	<i>badiipennella</i> (Duponchel, 1843)	2	713.	<i>colutella</i> (Fabricius, 1794)	2
680.	<i>limosipennella</i> (Duponchel, 1843)	2		<i>crocinella</i> Tgstr., 1848	
681.	<i>siccifolia</i> Stainton, 1856	2	714.	<i>trifariella</i> Zeller, 1849	2
682.	<i>kroneella</i> Fuchs, 1899	925 *	715.	<i>genistae</i> Stainton, 1857	(2)
683.	<i>coracipennella</i> (Hübner, 1796)	2	716.	<i>saturatella</i> Stainton, 1850	2
	<i>nigricella</i> Stph., 1835			<i>bilineatella</i> auct., nec Z., 1849	
684.	<i>serratella</i> (Linnaeus, 1761)	2	717.	<i>niveicostella</i> Zeller, 1839	2 *
	<i>fuscadinella</i> Z., 1849		718.	<i>albicostella</i> (Duponchel, 1842)	2
685.	<i>spinella</i> (Schränk, 1802)	509	719.	<i>discordella</i> Zeller, 1849	2
	<i>cerasivorella</i> Pack., 1870		720.	<i>chalcogrammella</i> Zeller, 1839	2
	<i>serratella</i> sensu Toll, 1953, nec L., 1761		721.	<i>vulpecula</i> Zeller, 1849	N
686.	<i>prunifoliae</i> Doets, 1944	895	722.	<i>deauratella</i> Lienig & Zeller, 1846	2
687.	<i>trigeminella</i> Fuchs, 1881	396	723.	<i>mayrella</i> (Hübner, 1813)	2
688.	<i>cornutella</i> H.-S., 1861	2 *		<i>spissicornis</i> Hw., 1828	
	<i>cornuta</i> Hein. & Wck., 1876		724.	<i>ballotella</i> (Fischer v. R., 1839)	2
689.	<i>fuscocuprella</i> H.-S., 1855	2	725.	<i>anatipennella</i> (Hübner, 1796)	2
				<i>bernoulliella</i> auct., nec Gz., 1783	
			726.	<i>albidella</i> (D. & Sch., 1775)	2

727.	<i>kuehnella</i> (Goeze, 1783)	2		<i>flavaginella</i> sensu Toll, 1953, nec Lienig & Zeller,	
	<i>palliatella</i> Zinck., 1813		1846		
728.	<i>ibipennella</i> Zeller, 1849	2		<i>benanderi</i> Kan., 1941	
	<i>nemorum</i> Hein., 1854				
729.	<i>betulella</i> Heinemann, 1876	2	767.	<i>motacillella</i> Zeller, 1849	2
730.	<i>zelleriella</i> Heinemann, 1854	2	768.	<i>sternipennella</i> (Zetterstedt, 1839)	2
731.	<i>currucipennella</i> Zeller, 1839	2		<i>flavaginella</i> Lienig & Zeller, 1846	
732.	<i>pyrrhulipennella</i> Zeller, 1839	2	769.	<i>squamosella</i> Stainton, 1856	N
733.	<i>brevipalpella</i> Wocke, 1874	352		<i>erigerella</i> Ford, 1935	
734.	<i>serratulella</i> H.-S., 1855	2 *		<i>sabulicola</i> Ben., 1939	
735.	<i>virgatella</i> Zeller, 1849	2 *	770.	<i>versurella</i> Zeller, 1849	934
736.	<i>chamaedriella</i> Bruand, 1852	2		<i>klimeschi</i> Vlach, 1942	
	<i>chamaedryella</i> Stt., 1859		771.	<i>vestianella</i> (Linnaeus, 1758)	2
737.	<i>serpylletorum</i> Hering, 1889	695		<i>laripennella</i> Zett., 1839	
738.	<i>auricella</i> (Fabricius, 1794)	2	772.	<i>pappiferella</i> Hofmann, 1869	2 *
739.	<i>gallipennella</i> (Hübner, 1796)	2	773.	<i>artemiscolella</i> Bruand, 1855	695
740.	<i>dignella</i> Toll, 1961	K N	774.	<i>odorariella</i> Mühlig & Frey, 1857	(2)
741.	<i>coronillae</i> Zeller, 1849	2		<i>chrysocomae</i> Her., 1942	
742.	<i>vibicigerella</i> Zeller, 1839	923	775.	<i>adelogrammella</i> Zeller, 1849	396
743.	<i>conspicueella</i> Zeller, 1849	2		<i>separatella</i> Ben., 1939	
744.	<i>partitella</i> Zeller, 1849	925	776.	<i>succursella</i> H.-S., 1855	352
745.	<i>ditella</i> Zeller, 1849	(2) P	777.	<i>galbulipennella</i> Zeller, 1838	2
	<i>tanacetii</i> Rössl., 1866			<i>otitae</i> Z., 1839	
	<i>roessleri</i> Wck., 1876		778.	<i>campestriphaga</i> Bald. & Patz., 1980	2
746.	<i>caelebipennella</i> Zeller, 1839	2		<i>granulatella</i> auct., nec Z., 1849	
747.	<i>vibicella</i> (Hübner, 1813)	2	779.	<i>galatellae</i> Hering, 1942	127
748.	<i>vicinella</i> Zeller, 1849	2	780.	<i>miliefolii</i> Zeller, 1849	2
749.	<i>ochrea</i> (Haworth, 1828)	2	781.	<i>peribenanderi</i> Toll, 1943	396
750.	<i>lixella</i> Zeller, 1849	2		<i>therinella</i> sensu Pier. & Mtc., 1935, nec Tgstr., 1848	
751.	<i>ornatipennella</i> (Hübner, 1796)	2		<i>benanderi</i> Toll, 1942	
752.	<i>vulnerariae</i> Zeller, 1839	2 *	782.	<i>thymi</i> Hering, 1942	695
	<i>icterella</i> Dup., 1840		783.	<i>amellivora</i> Baldizzzone, 1979	2
753.	<i>pennella</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>linearicella</i> auct., nec Z., 1849	
	<i>onosmella</i> Brahm, 1791			<i>calcariella</i> auct., nec Chrét., 1901	
754.	<i>laricella</i> (Hübner, 1817)	2	784.	<i>ramosella</i> Zeller, 1849	835 P
755.	<i>caespititiella</i> Zeller, 1839	682		<i>albicornis</i> auct., nec Ben., 1936	
	<i>agramella</i> Wood, 1892			<i>vlachi</i> Toll, 1953	
756.	<i>tamesis</i> Waters, 1929	352	785.	<i>trochilella</i> (Duponchel, 1843)	2
757.	<i>glaucicolella</i> Wood, 1892	895		<i>troglydytella</i> auct., nec Dup., 1843	
758.	<i>otidipennella</i> (Hübner, 1817)	2	786.	<i>frankii</i> Schmidt, 1886	998 *
	<i>murinipennella</i> Dup., 1844		787.	<i>linosyridella</i> Fuchs, 1880	998 *
759.	<i>alticolella</i> Zeller, 1849	2	788.	<i>directella</i> Zeller, 1849	2
	<i>caespititiella</i> auct., nec Z., 1839		789.	<i>expressella</i> Klemensiewicz, 1883	396
760.	<i>taeniipennella</i> H.-S., 1855	2		<i>subdirectella</i> Kan., 1941	
761.	<i>sylvaticella</i> Wood, 1892	689	790.	<i>striatipennella</i> Nylander, 1848	689
762.	<i>obsenella</i> H.-S., 1855	695 K	791.	<i>solitariella</i> Zeller, 1849	2
	<i>virgaureae</i> Stt., 1857		792.	<i>tanacetii</i> Mühlig, 1865	877
763.	<i>therinella</i> Tengström, 1848	2	793.	<i>artemisiella</i> Scott, 1861	352
764.	<i>pratella</i> Zeller, 1871	396	794.	<i>argentula</i> (Stephens, 1834)	2
765.	<i>linosyris</i> Hering, 1937	125	795.	<i>follicularis</i> (Vallot, 1802)	682
766.	<i>saxicolella</i> (Duponchel, 1843)	396		<i>troglydytella</i> Dup., 1843	
	<i>annulatella</i> sensu Pier. & Mtc., 1935, nec Nyl., 1848			<i>inulifolia</i> Ben., 1939	
			796.	<i>granulatella</i> Zeller, 1849	2

	<i>artemisiae</i> Mühl., 1864	
797.	<i>adpersella</i> Benander, 1939	396
798.	<i>silene</i> H.-S., 1855	2
799.	<i>nutantella</i> Mühlig & Frey, 1857	2 *
800.	<i>graminicoella</i> Heinemann, 1876	101
801.	<i>saponariella</i> Heeger, 1848	935
802.	<i>clypeiferella</i> Hofmann, 1871	2
803.	<i>binotapennella</i> (Duponchel, 1843)	2 *
804.	<i>squalorella</i> Zeller, 1849	396
805.	<i>unipunctella</i> Zeller, 1849	2

Agonoxenidae

	CHRYSOCLISTA Stainton, 1854	
806.	<i>linneella</i> (Clerck, 1759)	2 *
	HEINEMANNIA Wocke, 1876	
807.	<i>laspeyrella</i> (Hübner, 1796)	2
808.	<i>festivella</i> (D. & Sch., 1775)	920
	SPULERIA Hofmann, 1897	
809.	<i>flavicaput</i> (Haworth, 1828)	2
	<i>aurifrontella</i> G., 1832	
	BLASTODACNA Wocke, 1876	
810.	<i>hellerella</i> (Duponchel, 1838)	2
811.	<i>atra</i> (Haworth, 1828)	2
	<i>putripennella</i> Z., 1839	

Batrachedridae

	BATRACHEDRA Herrich-Schäffer, 1853	
812.	<i>praeangusta</i> (Haworth, 1828)	2
813.	<i>pinicoella</i> (Zeller, 1839)	2

Momphidae

	MOMPHA Hübner, 1825	
814.	<i>lengiella</i> (Hübner, 1796)	2
	<i>epilobiella</i> Röm., 1794, nec D. & Sch., 1775	
815.	<i>terminella</i> (Hmphr. & Ww., 1845)	2
816.	<i>locupletella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>schrunkella</i> Hb., 1805	
817.	<i>raschkiella</i> (Zeller, 1839)	2
818.	<i>miscella</i> (D. & Sch., 1775)	2
819.	<i>idaei</i> (Zeller, 1839)	2
820.	<i>conturbatella</i> (Hübner, 1819)	2
821.	<i>ochraceella</i> (Curtis, 1839)	2
822.	<i>lacteella</i> (Stephens, 1834)	(2) 384
823.	<i>propinquella</i> (Stainton, 1851)	2
824.	<i>divisella</i> H.-S., 1854	2 *
	<i>decorella</i> Stph., 1834, nec Hw., 1828	
825.	<i>sturnipennella</i> (Treitschke, 1833)	2
	<i>nodicoella</i> Fuchs, 1902	
826.	<i>subbistrigella</i> (Haworth, 1828)	2 *
827.	<i>epilobiella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>fulvescens</i> Hw., 1828	

Cosmopterigidae

	Antequerinae	
	PANCALIA Stephens, 1829	
828.	<i>leuwenhoekella</i> (Linnaeus, 1761)	2
829.	<i>schwarzella</i> (Fabricius, 1798)	2
	<i>latreillella</i> Curt., 1830	
	Cosmopteriginae	
	COSMOPTERIX Hübner, 1825	
830.	<i>zieglerella</i> (Hübner, 1810)	2
	<i>eximia</i> Hw., 1828	
831.	<i>orichalcea</i> Stainton, 1861	351
832.	<i>scribaiella</i> Zeller, 1850	2 *
833.	<i>lienigiella</i> Lienig & Zeller, 1846	N
	ETEODALEA Hodges, 1962	
834.	<i>albiapicella</i> (Duponchel, 1843)	2 *
835.	<i>tririvella</i> (Staudinger, 1870)	582
836.	<i>anonymella</i> (Riedl, 1965)	235
837.	<i>gronoviella</i> (Scopoli, 1772)	2 *
	<i>serratella</i> Tr., 1833	
	ISIDIELLA Riedel, 1965	
838.	<i>nickerlii</i> (Nickerl, 1864)	2 *
	VULCANIELLA Riedl, 1965	
839.	<i>pomposella</i> (Zeller, 1839)	N
840.	<i>extremella</i> (Wocke, 1871)	397
	LIMNAECIA Stainton, 1851	
841.	<i>phragmitella</i> Stainton, 1851	2
	Chrysopoleiinae	
	SORHAGENIA Spuler, 1910	
842.	<i>ramniella</i> (Zeller, 1839)	2
843.	<i>lophyrella</i> (Douglas, 1846)	695
844.	<i>janiszewskae</i> Riedl, 1962	304
	Scythrididae	
	SCYTHRIS Hübner, 1825	
845.	<i>obscorella</i> (Scopoli, 1763)	2 *
846.	<i>cuspidella</i> (D. & Sch., 1775)	2
847.	<i>potentillella</i> (Zeller, 1847)	N
848.	<i>limbella</i> (Fabricius, 1775)	2
	<i>chenopodiella</i> Hb., 1813	
849.	<i>knochella</i> (Fabricius, 1794)	2
850.	<i>scopolella</i> (Linnaeus, 1767)	2
	<i>triguttella</i> Dup., 1840	
851.	<i>bifissella</i> (Hofmann, 1889)	304
852.	<i>pauella</i> (H.-S., 1855)	2
853.	<i>clavella</i> (Zeller, 1855)	376
854.	<i>productella</i> (Zeller, 1839)	(2)
855.	<i>inspersella</i> (Hübner, 1817)	2
856.	<i>noriceella</i> (Zeller, 1843)	2
857.	<i>picaepennis</i> (Haworth, 1828)	2
	<i>senescens</i> Stt., 1850	
858.	<i>palustris</i> (Zeller, 1855)	18
	<i>matiacella</i> Rössl., 1866	

859.	<i>laminella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>succisae</i> Rössl., 1866	
	<i>schuetzei</i> Fuchs, 1901	
860.	<i>tributella</i> (Zeller, 1847)	(2) 304
	<i>denigratella</i> H.-S., 1855	
	<i>parvella</i> H.-S., 1855	
861.	<i>siccella</i> (Zeller, 1839)	2
862.	<i>crassiuscula</i> (H.-S., 1855)	2 K
863.	<i>fuscoaenea</i> (Haworth, 1828)	2
864.	<i>dissimilella</i> (H.-S., 1855)	2

Blastobasidae

Symmocinae

OEGOCONIA Stainton, 1854

865.	<i>quadripuncta</i> (Haworth, 1828)	2
866.	<i>deauratella</i> (H.-S., 1854)	215
867.	<i>caradjai</i> Pop. & Cap., 1965	352

Blastobasinae

BLASTOBASIS Zeller, 1855

868.	<i>phycidella</i> (Zeller, 1839)	2
	<i>HYPATOPA</i> Walsingham, 1907	
869.	<i>binotella</i> (Thunberg, 1794)	2
870.	<i>segnella</i> (Zeller, 1873)	215
	<i>perfugella</i> Jon., 1985	
871.	<i>inunctella</i> (Zeller, 1839)	2

Gelechiidae

Aristoteliinae

PYNCOSTOLA Meyrick, 1917

872.	<i>bohemiella</i> (Nickerl, 1864)	2 *
	<i>METZNERIA</i> Zeller, 1839	

873.	<i>lappella</i> (Linnaeus, 1758)	2
874.	<i>ehikeella</i> Gozmány, 1954	N
875.	<i>metzneriella</i> (Stainton, 1851)	2
876.	<i>aestivella</i> (Zeller, 1839)	2
	<i>carlinella</i> Stt., 1851	

877.	<i>paucipunctella</i> (Zeller, 1839)	2
878.	<i>neuropterella</i> (Zeller, 1839)	2

ISOPHRICITIS Meyrick, 1917

879.	<i>striatella</i> (D. & Sch., 1775)	2
880.	<i>anthemidella</i> (Wocke, 1871)	2

APODIA Heinemann, 1870

881.	<i>bifractella</i> (Duponchel, 1843)	695 K
------	--------------------------------------	-------

EULAMPROTES Bradley, 1971

882.	<i>wilkella</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>pictella</i> Z., 1839	
883.	<i>superbella</i> (Zeller, 1839)	2
884.	<i>libertinella</i> (Zeller, 1872)	(2)
885.	<i>unicolorella</i> (Duponchel, 1843)	2
886.	<i>atrella</i> (D. & Sch., 1775)	2

ARGOLAMPROTES Benander, 1945

887.	<i>micella</i> (D. & Sch., 1775)	2
------	----------------------------------	---

MONOCHROA Heinemann, 1870

888.	<i>tenebrella</i> (Hübner, 1817)	2
889.	<i>conspersella</i> (H.-S., 1854)	N
890.	<i>elongella</i> (Heinemann, 1870)	352
891.	<i>inflexella</i> Svensson, 1992	N
892.	<i>lutulentella</i> (Zeller, 1839)	(2) P
893.	<i>lucidella</i> (Stephens, 1834)	2
894.	<i>suffusella</i> (Douglas, 1850)	897
895.	<i>palustrella</i> (Douglas, 1850)	N

roziskella Rbl., 1909

896.	<i>hornigi</i> (Staudinger, 1883)	2
897.	<i>rumicetella</i> (Hofmann, 1868)	2
898.	<i>sepicolella</i> (H.-S., 1854)	(2) P
899.	<i>cytisella</i> (Curtis, 1837)	2
900.	<i>simplicella</i> (Lienig & Zeller, 1846)	N

CHRYSOESTHIA Hübner, 1825

901.	<i>drurella</i> (Fabricius, 1775)	2
	<i>hermanella</i> auct., nec F., 1781	
902.	<i>eppelsheimi</i> (Staudinger, 1885)	509
903.	<i>sexguttella</i> (Thunberg, 1794)	2
	<i>stipella</i> auct., nec L., 1758	

PTOCHEUUSA Heinemann, 1870

904.	<i>abnormella</i> (H.-S., 1854)	N *
------	---------------------------------	-----

ARISTOTELIA Hübner, 1825

905.	<i>decurtella</i> (Hübner, 1813)	2
906.	<i>subericinella</i> (Duponchel, 1843)	2 *
907.	<i>ericinella</i> (Zeller, 1839)	2
908.	<i>brizella</i> (Treitschke, 1833)	2

XYSTOPHORA Wocke, 1876

909.	<i>pulveratella</i> (H.-S., 1854)	N
910.	<i>carchariella</i> (Zeller, 1839)	2 *

MEGACRASPEDUS Zeller, 1839

911.	<i>separatellus</i> (Fischer v. R., 1843)	2
912.	<i>binotellus</i> (Duponchel, 1843)	2
913.	<i>dolosellus</i> (Zeller, 1839)	2 *

Gelechiinae

STENOLECHIA Meyrick, 1894

914.	<i>gemma</i> (Linnaeus, 1758)	2
------	-------------------------------	---

STENOLECHIODES Elsner, 1996

915.	<i>pseudogemmellus</i> Elsner, 1996	64 K
------	-------------------------------------	------

PARACHRONISTIS Meyrick, 1925

916.	<i>albiceps</i> (Zeller, 1839)	2
------	--------------------------------	---

RECURVARIA Haworth, 1828

917.	<i>nanella</i> (D. & Sch., 1775)	2
918.	<i>leucatella</i> (Clerck, 1759)	2

EXOTELEIA Wallengren, 1881

919.	<i>dodecella</i> (Linnaeus, 1758)	2
------	-----------------------------------	---

PSEUDOTELPHUSA Janse, 1958

920.	<i>scalella</i> (Scopoli, 1763)	2
------	---------------------------------	---

921.	<i>tessella</i> (Linnaeus, 1758)	(2) 608	958.	<i>tragicellus</i> (Heyden, 1865)	682
	<i>TELEIODES</i> Sattler, 1960		959.	<i>distinctellus</i> (Zeller, 1839)	2
922.	<i>vulgellus</i> (D. & Sch., 1775)	2	960.	<i>continuellus</i> (Zeller, 1839)	2
923.	<i>scriptellus</i> (Hübner, 1796)	2 K	961.	<i>perpetuellus</i> (H.-S., 1854)	2 *
924.	<i>paripunctellus</i> (Thunberg, 1794)	2		<i>PROLITA</i> Leraut, 1993	
	<i>triparellus</i> Z., 1839		962.	<i>sexpunctella</i> (Fabricius, 1794)	2
925.	<i>wagae</i> (Nowicki, 1860)	N		<i>virgella</i> Thbg., 1794	
926.	<i>aenigma</i> Sattler, 1983	N		<i>longicornis</i> Curt., 1827	
927.	<i>notatellus</i> (Hübner, 1813)	2		<i>zebrella</i> Tr., 1833	
928.	<i>proximellus</i> (Hübner, 1796)	2	963.	<i>solutella</i> (Zeller, 1839)	2 *
929.	<i>saltuum</i> (Zeller, 1878)	2		<i>AROGA</i> Busck, 1914	
930.	<i>alburnellus</i> (Zeller, 1839)	2	964.	<i>velocella</i> (Zeller, 1839)	2
931.	<i>fugitivellus</i> (Zeller, 1839)	2	965.	<i>flavicomella</i> (Zeller, 1839)	2
932.	<i>fugacellus</i> (Zeller, 1839)	2		<i>NEOFACULTA</i> Gozmány, 1955	
933.	<i>decorellus</i> (Haworth, 1812)	2	966.	<i>infernella</i> (H.-S., 1854)	2
	<i>humeralis</i> Z., 1839			<i>infernalis</i> H.-S., 1854	
934.	<i>luculellus</i> (Hübner, 1813)	2	967.	<i>ericetella</i> (Geyer, 1832)	2
935.	<i>flavimaculellus</i> (H.-S., 1854)	303		<i>betulae</i> auct., nec Hw., 1828	
936.	<i>sequax</i> (Haworth, 1828)	2		<i>FILATIMA</i> Busck, 1939	
	<i>TELEIOPSIS</i> Sattler, 1960		968.	<i>spurcella</i> (Duponchel, 1843)	2
937.	<i>diffinis</i> (Haworth, 1828)	2		<i>NEOFRISERIA</i> Sattler, 1960	
	<i>ATHRIPS</i> Billberg, 1820		969.	<i>peliiella</i> (Treitschke, 1835)	2
938.	<i>mouffetellus</i> (Linnaeus, 1758)	2	970.	<i>singula</i> (Staudinger, 1876)	N
939.	<i>nigricostellus</i> (Duponchel, 1842)	2		<i>suppeliella</i> Wls., 1896	
940.	<i>pruinosellus</i> (Lienig & Zeller, 1846)	235		<i>MIRIFICARMA</i> Gozmány, 1955	
941.	<i>rancidellus</i> (H.-S., 1854)	2	971.	<i>mulinella</i> (Zeller, 1839)	2
	<i>vepretellus</i> Z., 1870		972.	<i>interrupta</i> (Curtis, 1827)	2
	<i>BRYOTROPHA</i> Heinemann, 1870			<i>interruptella</i> Hb., 1796, nec Gz., 1783	
942.	<i>basaltinella</i> (Zeller, 1839)	2	973.	<i>lentiniosella</i> (Zeller, 1839)	2
943.	<i>umbrosella</i> (Zeller, 1839)	2	974.	<i>maculatella</i> (Hübner, 1796)	2
	<i>oppositella</i> auct., nec F., 1775		975.	<i>cytisella</i> (Treitschke, 1833)	2 *
944.	<i>affinis</i> (Haworth, 1828)	2		<i>GELECHIA</i> Hübner, 1825	
945.	<i>similis</i> (Stainton, 1854)	824 P	976.	<i>rhombella</i> (D. & Sch., 1775)	2
946.	<i>senectella</i> (Zeller, 1839)	2	977.	<i>scotinella</i> H.-S., 1854	2
	<i>ciliatella</i> H.-S., 1854		978.	<i>sabinella</i> (Zeller, 1839)	2
	<i>obscorella</i> Hein., 1870		979.	<i>sororculella</i> (Hübner, 1817)	2
947.	<i>boreella</i> (Douglas, 1851)	735	980.	<i>cuneatella</i> Douglas, 1852	2
948.	<i>terrella</i> (D. & Sch., 1775)	2	981.	<i>muscosella</i> Zeller, 1839	2
	<i>suspectella</i> Hein., 1870		982.	<i>asinella</i> (Hübner, 1796)	2 *
949.	<i>desertella</i> (Douglas, 1850)	2	983.	<i>nigra</i> (Haworth, 1828)	2
	<i>decrepidella</i> H.-S., 1854		984.	<i>turpella</i> (D. & Sch., 1775)	2
950.	<i>galbanella</i> (Zeller, 1839)	2		<i>pinguinella</i> Tr., 1832	
	<i>ilmatoriella</i> Hofm., 1893		985.	<i>rhombelliformis</i> Staudinger, 1871	352
	<i>CHIONODES</i> Hübner, 1825		986.	<i>sestertiella</i> H.-S., 1854	(2) P
951.	<i>viduellus</i> (Fabricius, 1794)	2		<i>PSORICOPTERA</i> Stainton, 1854	
952.	<i>lugubrellus</i> (Fabricius, 1794)	66	987.	<i>gibbosella</i> (Zeller, 1839)	2
953.	<i>electellus</i> (Zeller, 1839)	2		<i>ILSEOPSIS</i> Povolný, 1965	
954.	<i>fumatellus</i> (Douglas, 1850)	2	988.	<i>acuminatella</i> (Sircom, 1850)	2
	<i>oppletellus</i> H.-S., 1854		989.	<i>brahmiella</i> (Heyden, 1862)	(2)
955.	<i>luctuellus</i> (Hübner, 1793)	236 P	990.	<i>proclivella</i> (Fuchs, 1886)	N
956.	<i>nebulosellus</i> (Heinemann, 1870)	2		<i>rancidella</i> auct., nec H.-S., 1854	
957.	<i>ignorantellus</i> (H.-S., 1854)	215	991.	<i>artemisiella</i> (Treitschke, 1833)	2

992.	<i>klimeschi</i> (Povolný, 1967)	N	1026.	<i>humerala</i> (D. & Sch., 1775)	2
993.	<i>ocellatella</i> (Boyd, 1858)	352	1027.	<i>chilonella</i> (Treitschke, 1833)	2
994.	<i>obsoletella</i> (Fischer v. R., 1841)	2	1028.	<i>sicariella</i> (Zeller, 1839)	2
995.	<i>atriplicella</i> (Fischer v. R., 1841)	2	1029.	<i>consanguinella</i> H.-S., 1854	2
996.	<i>murinella</i> (Duponchel, 1843)	(2)	<i>STOMOPTERYX</i> Heinemann, 1870		
997.	<i>costella</i> (Hmphr. & Ww., 1845)	(2)	1030.	<i>remissella</i> (Zeller, 1847)	2 K
<i>GNORIMOSCHEMA</i> Busck, 1900			<i>rufobasella</i> Rbl., 1916		
998.	<i>steueri</i> Povolný, 1975	N	1031.	<i>hungaricella</i> Gozmány, 1957	N K
<i>SCROBIPALPULA</i> Povolný, 1964			<i>APROAEREMA</i> Durrant, 1897		
999.	<i>psilella</i> (H.-S., 1854)	2 K	1032.	<i>anthyllidella</i> (Hübner, 1813)	2
1000.	<i>tussilaginis</i> (Frey, 1867)	2 K	<i>SYNCOPACMA</i> Meyrick, 1925		
<i>tussilaginnella</i> Hein., 1870			1033.	<i>vinella</i> (Bankes, 1898)	N
<i>SCROBIPALPOPSIS</i> Povolný, 1967			<i>biformella</i> Schütze, 1902		
1001.	<i>petasitis</i> (Pfaffen-zeller, 1867)	(2)	1034.	<i>sangiella</i> (Stainton, 1863)	N
<i>KLIMESCHIOPSIS</i> Povolný, 1967			1035.	<i>coronillella</i> (Treitschke, 1833)	2
1002.	<i>kiningerella</i> (Duponchel, 1843)	2	1036.	<i>cinctella</i> (Clerck, 1759)	2
<i>COSMARDIA</i> Povolný, 1965			<i>vorticella</i> Sc., 1763		
1003.	<i>moritzella</i> (Treitschke, 1835)	540	<i>ligulella</i> D. & Sch., 1775		
<i>EPHYSTERIS</i> Meyrick, 1908			1037.	<i>cincticulella</i> (Bruand, 1850)	(2) 824 K
1004.	<i>inustella</i> (Zeller, 1839)	(2) (269)	1038.	<i>larseniella</i> Gozmány, 1957	897
<i>CARYOCOLUM</i> Gregor & Povolný, 1954			<i>ligulella</i> auct., nec D. & Sch., 1775		
1005.	<i>fischerellum</i> (Treitschke, 1833)	2	1039.	<i>taeniolella</i> (Zeller, 1839)	2
1006.	<i>tischeriellum</i> (Zeller, 1839)	2	1040.	<i>albipalpella</i> (H.-S., 1854)	(2) K
1007.	<i>alsinellum</i> (Zeller, 1868)	(2) P	<i>LIXODESSA</i> Gozmány, 1957		
1008.	<i>vicinellum</i> (Douglas, 1851)	N	1041.	<i>ochrofasciella</i> (Toll, 1936)	896
<i>inflatellum</i> Chrét., 1901			<i>IWARUNA</i> Gozmány, 1957		
1009.	<i>cauligenellum</i> (Schmid, 1863)	2	1042.	<i>biguttella</i> (Duponchel, 1843)	(2) K
1010.	<i>leucomelanellum</i> (Zeller, 1839)	2	<i>ACANTHOPHILA</i> Heinemann, 1870		
1011.	<i>schleichi</i> (Christoph, 1872)	65	1043.	<i>alacella</i> (Zeller, 1839)	2
1012.	<i>marmoreum</i> (Haworth, 1828)	2 *	1044.	<i>latipennella</i> (Rebel, 1937)	215
1013.	<i>klosi</i> (Rebel, 1917)	N	<i>ACOMPسيا</i> Hübner, 1825		
1014.	<i>blandellum</i> (Douglas, 1852)	2	1045.	<i>cinerella</i> (Clerck, 1759)	2
<i>maculeum</i> auct., nec Hw., 1828			1046.	<i>minorella</i> Rebel, 1899	124 K
1015.	<i>proximum</i> (Haworth, 1828)	2	<i>ANACAMPSIS</i> Curtis, 1827		
<i>maculiferellum</i> Dgl., 1851			1047.	<i>populella</i> (Clerck, 1759)	2
1016.	<i>tricolorellum</i> (Haworth, 1812)	2	1048.	<i>blattariella</i> (Hübner, 1796)	352
1017.	<i>junctellum</i> (Douglas, 1851)	2	<i>betulinella</i> Vári, 1941		
1018.	<i>cassellum</i> (Walker, 1864)	N	1049.	<i>timidella</i> (Wocke, 1887)	176
<i>albifasciellum</i> Toll, 1936			<i>quercella</i> Chrét., 1907		
1019.	<i>huebneri</i> (Haworth, 1828)	2	<i>disquei</i> Meess, 1907		
<i>knaggsiellum</i> Stt., 1866			1050.	<i>scintillella</i> (Fischer v.R., 1841)	2
1020.	<i>kroesmanniellum</i> (H.-S., 1854)	2	1051.	<i>obscuraella</i> (D. & Sch., 1775)	2
<i>huebneri</i> auct., nec Hw., 1828			<i>subsequella</i> Hb., 1796		
<i>NOTHRIS</i> Hübner, 1825			<i>Chelariinae</i>		
1021.	<i>verbascella</i> (D. & Sch., 1775)	2	<i>SITOTROGA</i> Heinemann, 1870		
1022.	<i>lemniscella</i> (Zeller, 1839)	918	1052.	<i>cerealella</i> (Olivier, 1789)	2 I
<i>REUTTIA</i> Hofmann, 1898			<i>PLATYEDRA</i> Meyrick, 1895		
1023.	<i>subocellea</i> (Stephens, 1834)	2	1053.	<i>subcinerea</i> (Haworth, 1828)	N
<i>Anacampsinae</i>			<i>vilella</i> Z., 1847		
<i>SOPHRONIA</i> Hübner, 1825			<i>PEXICOPIA</i> Common, 1958		
1024.	<i>semicostella</i> (Hübner, 1813)	2	1054.	<i>umbrella</i> (D. & Sch., 1775)	2
1025.	<i>ascalis</i> Gozmány, 1951	N	<i>malvella</i> Hb., 1805		

ANARSIA Zeller, 1839		
1055.	<i>lineatella</i> Zeller, 1839	2
1056.	<i>spartiella</i> (Schränk, 1802)	2 P
HYPATIMA Hübner, 1825		
1057.	<i>rhomboïdella</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>huebnerella</i> Don., 1806	
Dichomeridinae		
MESOPHLEPS Hübner, 1825		
1058.	<i>silacella</i> (Hübner, 1796)	2
	UNCUSTRIODONTA Agenjo, 1952	K
1059.	<i>trinotella</i> (H.-S., 1856)	2
	TELEPHILA Meyrick, 1923	
1060.	<i>schmidtella</i> (Heyden, 1848)	469
DICHOMERIS Hübner, 1818		
1061.	<i>marginella</i> (Fabricius, 1781)	2 P
1062.	<i>juniperella</i> (Linnaeus, 1761)	2
1063.	<i>ustalella</i> (Fabricius, 1794)	2
	<i>ustulella</i> auct., lapsus calami	
1064.	<i>limosella</i> (Schläger, 1849)	2 *
1065.	<i>derasella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>fusciella</i> Hb., 1796	
1066.	<i>barbella</i> (D. & Sch., 1775)	2 *
1067.	<i>rasilella</i> (H.-S., 1854)	N
BRACHMIA Hübner, 1825		
1068.	<i>blandella</i> (Fabricius, 1798)	897
	<i>gerronella</i> Z., 1850	
1069.	<i>inornatella</i> (Douglas, 1850)	2
HELCYSTOGRAMMA Zeller, 1877		
1070.	<i>lineolellum</i> (Zeller, 1839)	N
1071.	<i>lutatellum</i> (H.-S., 1854)	2
1072.	<i>rufescens</i> (Haworth, 1828)	2
Cossoidea		
Cossidae		
Zeuzerinae		
ZEUZERA Latreille, 1804		
1073.	<i>pyrina</i> (Linnaeus, 1761)	1
Cossinae		
COSSUS Fabricius, 1793		
1074.	<i>cossus</i> (Linnaeus, 1758)	1
DYSPESSA Hübner, 1820		
1075.	<i>ulula</i> (Borkhausen, 1790)	612
Sesioidea		
Brachodidae		
BRACHODES Guenée, 1845		
1076.	<i>appendiculatus</i> (Esper, 1783)	2

Sesiidae		
Tinthiinae		
PENNISETIA Dehne, 1850		
1077.	<i>hylaeiformis</i> (Laspeyres, 1801)	1
1078.	<i>bohémica</i> Králíček & Povolný, 1974	286 K
Sesiinae		
SESIA Fabricius, 1775		
1079.	<i>apiformis</i> (Clerck, 1759)	1
1080.	<i>bembeciformis</i> (Hübner, 1806)	1
	<i>crabroniformis</i> Lew., 1797, nec D. & Sch., 1775	
1081.	<i>melanocephala</i> Dalman, 1816	1
PARANTHRENE Hübner, 1819		
1082.	<i>tabaniformis</i> (Rottensburg, 1775)	1
1083.	<i>insolita</i> Le Cerf, 1914	52
	<i>novaki</i> Toš., 1987	
SYNANTHEDON Hübner, 1819		
1084.	<i>scoliaeformis</i> (Borkhausen, 1789)	1
1085.	<i>spheciiformis</i> (D. & Sch., 1775)	1
1086.	<i>stomoxiformis</i> (Hübner, 1790)	1
1087.	<i>culiciformis</i> (Linnaeus, 1758)	1
1088.	<i>formicaeformis</i> (Esper, 1783)	1
1089.	<i>flaviventris</i> (Stgr., 1883)	282
1090.	<i>andrenaeformis</i> (Laspeyres, 1801)	612
1091.	<i>soffneri</i> Špatenka, 1983	803
1092.	<i>vespiformis</i> (Linnaeus, 1761)	1
1093.	<i>myopaeformis</i> (Borkhausen, 1789)	1
1094.	<i>conopiformis</i> (Esper, 1782)	1
1095.	<i>tipuliformis</i> (Clerck, 1759)	1
1096.	<i>cephiformis</i> (Ochsenheimer, 1808) (1)	587
1097.	<i>loranthi</i> (Králíček, 1966)	775
	<i>cryptica</i> Kr. & Pov., 1977	
BEMBECIA Hübner, 1819		
1098.	<i>ichneumoniformis</i> (D. & Sch., 1775)	1
1099.	<i>albanensis</i> (Rebel, 1918)	805
SYNANSPHECIA Capuse, 1973		
1100.	<i>triannuliformis</i> (Freyer, 1845)	1
1101.	<i>muscaeformis</i> (Esper, 1783)	1
	<i>aestivata</i> Kr., 1969	
1102.	<i>affinis</i> (Staudinger, 1856)	N K
CHAMAESPHECIA Spuler, 1910		
1103.	<i>dumonti</i> Le Cerf, 1922	342 K
	<i>similis</i> Lašt., 1983	
1104.	<i>leucopsiformis</i> (Esper, 1800)	1
1105.	<i>empiformis</i> (Esper, 1783)	1
1106.	<i>tenthrediniformis</i> (D. & Sch., 1775)	N
	<i>taediiformis</i> Frr., 1836	

Zygaenoidea		
Zygaenidae		
Procridinae		
<i>RHAGADES</i> Wallengren, 1863		
1107.	<i>pruni</i> (D. & Sch., 1775)	1
<i>ADSCITA</i> Retzius, 1783		
1108.	<i>subsolana</i> (Staudinger, 1862)	621
1109.	<i>globulariae</i> (Hübner, 1793)	1
1110.	<i>notata</i> (Zeller, 1847)	568
1111.	<i>geryon</i> (Hübner, 1813)	621
1112.	<i>statices</i> (Linnaeus, 1758)	1

Zygaeninae		
<i>ZYGAENA</i> Fabricius, 1775		
1113.	<i>carniolica</i> (Scopoli, 1763)	1
1114.	<i>osterodensis</i> Reiss, 1921	1
<i>scabiosae</i> auct., nec Scheven, 1777		
1115.	<i>loti</i> (D. & Sch., 1775)	1
<i>achilleae</i> Esp., 1780		
1116.	<i>viciae</i> (D. & Sch., 1775)	1
<i>meliloti</i> Esp., 1793		
1117.	<i>epialtes</i> (Linnaeus, 1767)	1
1118.	<i>angelicae</i> Ochsenheimer, 1808	1
1119.	<i>filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	1
1120.	<i>trifolii</i> (Esper, 1783)	1
1121.	<i>lonicerae</i> (Scheven, 1777)	1
1122.	<i>laeta</i> (Hübner, 1790)	1
1123.	<i>minos</i> (D. & Sch., 1775)	1
1124.	<i>purpuralis</i> (Brünnich, 1763)	1

Limacodidae		
<i>APODA</i> Haworth, 1809		
1125.	<i>limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	1
<i>HETEROGENEA</i> Knoch, 1783		
1126.	<i>asella</i> (D. & Sch., 1775)	1

Choreutoidea		
Choreutidae		
<i>ANTHOPHILA</i> Haworth, 1811		
1127.	<i>fabriciana</i> (Linnaeus, 1767)	2
<i>urticana</i> D. & Sch., 1775		
<i>PROCHOREUTIS</i> Diakonoff & Heppner, 1980		
1128.	<i>myllerana</i> (Fabricius, 1794)	2
1129.	<i>sestediiana</i> (Fabricius, 1776)	215
<i>TEBENNA</i> Billberg, 1820		
1130.	<i>bjerkandrella</i> (Thunberg, 1784)	195
<i>CHOREUTIS</i> Hübner, 1825		
1131.	<i>pariana</i> (Clerck, 1759)	2
1132.	<i>diana</i> (Hübner, 1822)	67
1133.	<i>vinosa</i> Diakonoff, 1978	N K

Tortricicoidea		
Tortricidae		
Tortricinae		
<i>PANDEMIS</i> Hübner, 1825		
1134.	<i>corylana</i> (Fabricius, 1794)	2
1135.	<i>cerasana</i> (Hübner, 1786)	2
<i>ribeana</i> Hb., 1799		
1136.	<i>cinnamomeana</i> (Treitschke, 1830)	2
1137.	<i>heparana</i> (D. & Sch., 1775)	2
1138.	<i>dumetana</i> (Treitschke, 1835)	316
<i>ARGYROTAENIA</i> Stephens, 1852		
1139.	<i>ljungiana</i> (Thunberg, 1797)	913
<i>pulchellana</i> Hw., 1811		
<i>politana</i> Hw., 1811		
<i>CHORISTONEURA</i> Lederer, 1859		
1140.	<i>diversana</i> (Hübner, 1817)	2
1141.	<i>murinana</i> (Hübner, 1799)	2
1142.	<i>hebenstreitella</i> (Müller, 1764)	2
<i>sorbiana</i> Hb., 1799		
<i>ARCHIPS</i> Hübner, 1822		
1143.	<i>oporanus</i> (Linnaeus, 1758)	2
<i>piceanus</i> L., 1758		
1144.	<i>podanus</i> (Scopoli, 1763)	2
1145.	<i>betulanus</i> (Hübner, 1787)	2
<i>decretanus</i> Tr., 1835		
1146.	<i>crataeganus</i> (Hübner, 1799)	2
1147.	<i>xylosteanus</i> (Linnaeus, 1758)	2
1148.	<i>rosanus</i> (Linnaeus, 1758)	2
<i>SYNDEMIS</i> Hübner, 1825		
1149.	<i>musculana</i> (Hübner, 1799)	2
<i>DICHELIA</i> Guenée, 1845		
1150.	<i>histrionana</i> (Frölich, 1828)	2
<i>PTYCHOLOMOIDES</i> Obraztsov, 1954		
1151.	<i>aeriferanus</i> (H.-S., 1851)	2
<i>APHELIA</i> Hübner, 1825		
1152.	<i>viburnana</i> (D. & Sch., 1775)	(2) P
<i>viburniana</i> F., 1787		
1153.	<i>paleana</i> (Hübner, 1793)	2
<i>icterana</i> Frl., 1828		
1154.	<i>unitana</i> (Hübner, 1799)	209
<i>CLEPSIS</i> Guenée, 1845		
1155.	<i>senecionana</i> (Hübner, 1819)	2
<i>rusticana</i> Hb., 1799		
<i>helvolana</i> Frl., 1828		
1156.	<i>rogana</i> (Guenée, 1845)	2
<i>dohrmiana</i> H.-S., 1856		
1157.	<i>rurinana</i> (Linnaeus, 1758)	2
<i>senialbana</i> Gn., 1845		
1158.	<i>spectrana</i> (Treitschke, 1830)	2
<i>costana</i> auct., nec D. & Sch., 1775		
1159.	<i>consimilana</i> (Hübner, 1817)	695
<i>unifasciana</i> Dup., 1843		

1160.	<i>pallidana</i> (Fabricius, 1776)	2		<i>NEOSPHALEROPTERA</i> Réal, 1953	
	<i>strigana</i> Hb., 1799			1184. <i>nubilana</i> (Hübner, 1799)	2
	<i>stramineana</i> H.-S., 1851			<i>oxyacanthana</i> auct., nec H.-S., 1851	
	<i>ADOXOPHYES</i> Meyrick, 1881			<i>EANA</i> Billberg, 1820	
1161.	<i>orana</i> (Fischer v. R., 1834)	2		1185. <i>argentana</i> (Clerck, 1759)	2
	<i>reticulana</i> Hb., 1819, nec Hw., 1811			1186. <i>osseana</i> (Scopoli, 1763)	2
	<i>PTYCHOLOMA</i> Stephens, 1829			1187. <i>canescana</i> (Guenée, 1845)	2
1162.	<i>lecheanum</i> (Linnaeus, 1758)	2		1188. <i>penziana</i> (Thunberg, 1791)	2
	<i>LOZOTAENIA</i> Stephens, 1829			1189. <i>incanana</i> (Stephens, 1852)	695
1163.	<i>forsterana</i> (Fabricius, 1781)	2		1190. <i>derivana</i> (La Harpe, 1858)	2
	<i>PARAMESIA</i> Stephens, 1829			<i>DOLOPLOCA</i> Hübner, 1825	
1164.	<i>gnomana</i> (Clerck, 1759)	2		1191. <i>punctulana</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>costana</i> D. & Sch., 1775			<i>XEROCNEPHASIA</i> Leraut, 1979	
	<i>PERICLEPSIS</i> Bradley, 1977			1192. <i>rigana</i> (Sodoffsky, 1829)	2 *
1165.	<i>cinctana</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>ALEIMMA</i> Hübner, 1825	
	<i>EPAGOGE</i> Hübner, 1825			1193. <i>loeflingianum</i> (Linnaeus, 1758)	2
1166.	<i>grotiana</i> (Fabricius, 1781)	2		<i>ectypanum</i> Hb., 1800	
	<i>CAPUA</i> Stephens, 1834			<i>TORTRIX</i> Linnaeus, 1758	
1167.	<i>vulgana</i> (Frölich, 1828)	2		1194. <i>viridana</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>favillaceana</i> Hb., 1817, nec Hb., 1799			<i>SPATALISTIS</i> Meyrick, 1907	
	<i>PHILEDONE</i> Hübner, 1825			1195. <i>bifasciana</i> (Hübner, 1787)	2
1168.	<i>gerningana</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>CROESIA</i> Hübner, 1825	
	<i>PHILEDONIDES</i> Obraztsov, 1954			1196. <i>bergmanniana</i> (Linnaeus, 1758)	2
1169.	<i>rhombicanus</i> (H.-S., 1851)	2		1197. <i>forsskaleana</i> (Linnaeus, 1758)	2
1170.	<i>lunanus</i> (Thunberg, 1784)	2		1198. <i>holmiana</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>prodromanus</i> Hb., 1816			<i>ACLERIS</i> Hübner, 1825	
	<i>PSEUDARGYROTOZA</i> Obraztsov, 1954			1199. <i>comariana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	923 *
1171.	<i>conwagana</i> (Fabricius, 1775)	2		1200. <i>laterana</i> (Fabricius, 1794)	2
	<i>EULIA</i> Hübner, 1825			<i>latifasciana</i> Hw., 1811	
1172.	<i>ministrana</i> (Linnaeus, 1758)	2		<i>comparana</i> Hb., 1823	
	<i>CNEPHASIA</i> Curtis, 1826			<i>schalleriana</i> auct., nec L., 1761	
1173.	<i>communana</i> (H.-S., 1851)	195		1201. <i>sparsana</i> (D. & Sch., 1775)	2
1174.	<i>stephensiana</i> (Doubleday, 1849)	2		<i>sponsana</i> F., 1787	
	<i>alternella</i> auct., nec D. & Sch., 1775			1202. <i>rhombana</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>chrysanthæana</i> auct., nec Dup., 1843			<i>contaminana</i> Hb., 1799	
1175.	<i>pumicana</i> (Zeller, 1847)	494		1203. <i>shepherdana</i> (Stephens, 1852)	689
1176.	<i>pasiuana</i> (Hübner, 1799)	(2) 267		1204. <i>aspersana</i> (Hübner, 1817)	2
	<i>pascuana</i> Hb., 1822			1205. <i>ferrugana</i> (D. & Sch., 1775)	2
1177.	<i>alticolana</i> (H.-S., 1851)	2		<i>tripunctulana</i> Hw., 1811	
1178.	<i>asseclana</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>lithargyrana</i> H.-S., 1851	
	<i>interjectana</i> Hw., 1811			<i>rubidana</i> H.-S., 1851	
	<i>virgaureana</i> Tr., 1835			<i>selasana</i> H.-S., 1851	
1179.	<i>oxyacanthana</i> (H.-S., 1851)	(2) 293		1206. <i>notana</i> (Donovan, 1806)	2
1180.	<i>genitalana</i> Pier. & Mtc., 1922	(923) 291		<i>tripunctana</i> Hb., 1799	
1181.	<i>incertana</i> (Treitschke, 1835)	2		<i>ferrugana</i> auct., nec D. & Sch., 1775	
	<i>minorana</i> H.-S., 1851			1207. <i>quercinana</i> (Zeller, 1849)	2
	<i>TORTRICODES</i> Guenée, 1845			1208. <i>schalleriana</i> (Linnaeus, 1761)	2
1182.	<i>alternellus</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>logiana</i> sensu F., 1775, nec Cl., 1759	
	<i>tortricellus</i> Hb., 1796			1209. <i>variegana</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>EXAPATE</i> Hübner 1825			1210. <i>roscidana</i> (Hübner, 1799)	2
1183.	<i>congelatella</i> (Clerck, 1759)	2		1211. <i>gochiella</i> (Goeze, 1783)	N
				<i>boscana</i> F., 1794	

1212.	<i>logiana</i> (Clerck, 1759)	2	1247.	<i>smeathmanniana</i> (Fabricius, 1781)	2
	<i>niveana</i> F., 1787		1248.	<i>rutilana</i> (Hübner, 1817)	(2) 913
1213.	<i>hastiana</i> (Linnaeus, 1758)	2	1249.	<i>tesserana</i> (D. & Sch., 1775)	2
1214.	<i>cristana</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>aleella</i> Schz., 1776	
1215.	<i>hyemana</i> (Haworth, 1811)	2 *	1250.	<i>margarotana</i> (Duponchel, 1836)	(2) P
	<i>mixtana</i> Hb., 1813			<i>scabidulana</i> Ld., 1855	
1216.	<i>lipsiana</i> (D. & Sch., 1775)	2	1251.	<i>williana</i> (Brahm, 1791)	2
1217.	<i>rufana</i> (D. & Sch., 1775)	(2) 208		<i>zephyrana</i> Tr., 1830	
	<i>apiciana</i> Hb., 1793		1252.	<i>hartmanniana</i> (Clerck, 1759)	2
1218.	<i>lorquiniana</i> (Duponchel, 1835)	214	1253.	<i>flagellana</i> (Duponchel, 1836)	2
1219.	<i>umbrana</i> (Hübner, 1799)	2	1254.	<i>francillana</i> (Fabricius, 1794)	384
1220.	<i>abietana</i> (Hübner, 1822)	2	1255.	<i>kindermanniana</i> (Treitschke, 1830)	2 *
1221.	<i>maccana</i> (Treitschke, 1835)	2		<i>COCHYLIDIA</i> Obraztsov, 1956	
1222.	<i>literana</i> (Linnaeus, 1758)	2	1256.	<i>rupicola</i> (Curtis, 1834)	735
1223.	<i>emargana</i> (Fabricius, 1775)	2	1257.	<i>heydeniana</i> (H.-S., 1851)	351
	<i>TRACHYSMIA</i> Guenée, 1845			<i>erigerana</i> Wls., 1891	
1224.	<i>inopiana</i> (Haworth, 1811)	351	1258.	<i>implicitana</i> (Wocke, 1856)	(2) 195
1225.	<i>schreibersiana</i> (Frölich, 1828)	2		<i>COCHYLIS</i> Treitschke, 1829	
1226.	<i>sodaliana</i> (Haworth, 1811)	291	1259.	<i>roseana</i> (Haworth, 1811)	2
	<i>PHTHEOCHROA</i> Stephens, 1829		1260.	<i>flaviciliana</i> (Westwood, 1854)	N
1227.	<i>rugosana</i> (Hübner, 1799)	(2) K P	1261.	<i>hybridella</i> (Hübner, 1813)	2
	<i>COCHYLIMORPHA</i> Razowski, 1959		1262.	<i>dubitana</i> (Hübner, 1799)	2
1228.	<i>hilarana</i> (H.-S., 1851)	2	1263.	<i>atricapitana</i> (Stephens, 1852)	352
1229.	<i>straminea</i> (Haworth, 1811)	2	1264.	<i>pallidana</i> Zeller, 1847	2
1230.	<i>alternana</i> (Stephens, 1834)	934	1265.	<i>posterana</i> Zeller, 1847	2
	<i>PHALONIDIA</i> Le Marchand, 1933		1266.	<i>nana</i> (Haworth, 1811)	2
1231.	<i>gilvicomana</i> (Zeller, 1847)	2		<i>FALSEUNCARIA</i> Obraztsov & Swatschek, 1958	
1232.	<i>curvistrigana</i> (Stainton, 1859)	2 *	1267.	<i>ruficiliana</i> (Haworth, 1811)	2
1233.	<i>manniana</i> (Fischer v. R., 1839)	2		<i>ciliella</i> sensu Hb., 1796, nec D. & Sch., 1775	
	<i>udana</i> Gn., 1845			<i>SPARGANOTHIS</i> Hübner, 1825	
1234.	<i>vectisana</i> (Hmphr. & Ww., 1845)	384	1268.	<i>rubicundana</i> (H.-S., 1856)	635 * K
	<i>geyeriana</i> H.-S., 1851		1269.	<i>pillieriana</i> (D. & Sch., 1775)	2
1235.	<i>alimana</i> (Ragonot, 1883)	215			
	<i>udana</i> auct., nec Gn., 1845			Chlidanotinae	
1236.	<i>permixtana</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>OLINDIA</i> Guenée, 1845	
	<i>mussehlana</i> Tr., 1835		1270.	<i>schumacherana</i> (Fabricius, 1787)	2
	<i>AGAPETA</i> Hübner, 1822			<i>ulmana</i> Hb., 1823	
1237.	<i>hamana</i> (Linnaeus, 1758)	2		<i>ISOTRIAS</i> Meyrick, 1895	
1238.	<i>zoegana</i> (Linnaeus, 1767)	2	1271.	<i>hybridana</i> (Hübner, 1817)	2
	<i>EUPOECILIA</i> Stephens, 1829		1272.	<i>rectifasciana</i> (Haworth, 1811)	2
1239.	<i>angustana</i> (Hübner, 1799)	2			
1240.	<i>ambiguella</i> (Hübner, 1796)	2		Olethreutinae	
1241.	<i>sanguisorbana</i> (H.-S., 1856)	2		<i>CELYPHA</i> Hübner, 1825	
	<i>PROCHLIDONIA</i> Razowski, 1960		1273.	<i>striana</i> (D. & Sch., 1775)	2
1242.	<i>amiantana</i> (Hübner, 1799)	2 P	1274.	<i>woodiana</i> (Barrett, 1882)	69
	<i>AETHES</i> Billberg, 1820		1275.	<i>rufana</i> (Scopoli, 1763)	2
1243.	<i>cnicana</i> (Westwood, 1854)	195	1276.	<i>rosaceana</i> (Schläger, 1847)	(2)
1244.	<i>rubigana</i> (Treitschke, 1830)	2		<i>purpurana</i> Hw., 1811, nec Thbg., 1784	
	<i>badiana</i> auct., nec D. & Sch., 1775		1277.	<i>rurestrana</i> (Duponchel, 1843)	2
1245.	<i>margaritana</i> (Haworth, 1811)	2		<i>lucivagana</i> Lienig & Zeller, 1846	
	<i>dipoltella</i> Hb., 1813		1278.	<i>flavipalpana</i> (H.-S., 1851)	208
1246.	<i>triangulana</i> (Treitschke, 1835)	352	1279.	<i>capreolana</i> (H.-S., 1851)	2

1280.	<i>cespitana</i> (Hübner, 1817)	2	1314.	<i>infida</i> (Heinrich, 1926)	206
	OLETHREUTES Hübner, 1822		1315.	<i>lineana</i> (D. & Sch., 1775)	907
1281.	<i>arcuellus</i> (Clerck, 1759)	2		<i>scriptana</i> Hb., 1799	
1282.	<i>arbutellus</i> (Linnaeus, 1758)	2	1316.	<i>turbidana</i> Hübner, 1825	2
1283.	<i>ledianus</i> (Linnaeus, 1758)	2		<i>corticana</i> sensu Hb., 1799, nec D. & Sch., 1775	
1284.	<i>dalecarlianus</i> (Guenée, 1845)	913	1317.	<i>capreana</i> (Hübner, 1817)	2
1285.	<i>bifascianus</i> (Haworth, 1811) (2)	206	1318.	<i>betuletana</i> (Haworth, 1811)	2
	<i>decrepitanus</i> H.-S., 1851		1319.	<i>sororculana</i> (Zetterstedt, 1839)	2
1286.	<i>mygindianus</i> (D. & Sch., 1775)	2	1320.	<i>sauciana</i> (Frölich, 1828)	2
1287.	<i>umbrosanus</i> (Freyer, 1842)	2	1321.	<i>inundana</i> (D. & Sch., 1775)	2
1288.	<i>obsoletanus</i> (Zetterstedt, 1839)	2		ENDOTHENIA Stephens, 1852	
	<i>sudetanus</i> Stdfs., 1846		1322.	<i>gentianaearana</i> (Hübner, 1799)	2
1289.	<i>dissolutanus</i> (Stange, 1886)	206		<i>gentiana</i> Hb., 1810	
1290.	<i>schulzianus</i> (Fabricius, 1776)	2		<i>gentianana</i> Hb., 1825	
1291.	<i>turfosanus</i> (H.-S., 1851)	66	1323.	<i>oblongana</i> (Haworth, 1811)	2
1292.	<i>micanus</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>sellana</i> Fril., 1828	
	<i>olivanus</i> Tr., 1830		1324.	<i>marginana</i> (Haworth, 1811)	352
1293.	<i>palustranus</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2	1325.	<i>ustulana</i> (Haworth, 1811)	352
1294.	<i>stibianus</i> (Guenée, 1845)	2		<i>carbonana</i> Dbl., 1849	
1295.	<i>bipunctanus</i> (Fabricius, 1794)	2		<i>fuligana</i> auct., nec D. & Sch., 1775	
1296.	<i>rivulanus</i> (Scopoli, 1763)	2	1326.	<i>nigricostana</i> (Haworth, 1811)	2
1297.	<i>lacumanus</i> (D. & Sch., 1775)	2	1327.	<i>ericetana</i> (Hmphr. & Ww., 1845)	2
1298.	<i>aurofascianus</i> (Haworth, 1811) (2)			<i>trifoliaria</i> H.-S., 1851	
	<i>latifascianus</i> Hw., 1812		1328.	<i>quadrimaculana</i> (Haworth, 1811)	2
1299.	<i>sideranus</i> (Treitschke, 1835)	2		<i>antiquana</i> Hb., 1822	
	PRISTEROGNATHA Obraztsov, 1960		1329.	<i>lapideana</i> (H.-S., 1851)	2
1300.	<i>penthinana</i> (Guenée, 1845)	2		LOBESIA Guenée, 1845	
1301.	<i>fuligana</i> (D. & Sch., 1775)	2	1330.	<i>reliquana</i> (Hübner, 1825)	2
	PSEUDOTHERMENIAS Obraztsov, 1960			<i>permixtana</i> sensu Hb., 1799, nec D. & Sch., 1775	
1302.	<i>abietana</i> (Fabricius, 1787)	2	1331.	<i>bicinctana</i> (Duponchel, 1844)	N
	<i>hercyniana</i> Bech. & Scharf., 1805		1332.	<i>abscisana</i> (Doubleday, 1849)	352
	<i>clausathaliana</i> Sax., 1840			<i>fuligana</i> sensu Hw., 1811, nec D. & Sch., 1775	
	HEDYA Hübner, 1825		1333.	<i>botrana</i> (D. & Sch., 1775)	2
1303.	<i>pruniana</i> (Hübner, 1799)	2		BACTRA Stephens, 1834	
1304.	<i>nubiferana</i> (Haworth, 1811) ¹	2	1334.	<i>lancealana</i> (Hübner, 1799)	2
	<i>dimidioalba</i> Retz., 1783			<i>nigrovittana</i> Sph., 1852	
	<i>variegana</i> auct., nec D. & Sch., 1775		1335.	<i>lacteana</i> Caradja, 1916	208
1305.	<i>ochroleucana</i> (Frölich, 1828)	2		<i>gozmanyana</i> Toll, 1958	
1306.	<i>dimidiana</i> (Clerck, 1759)	2	1336.	<i>furfurana</i> (Haworth, 1811)	2
	<i>schreberiana</i> L., 1761			ATERPIA Guenée, 1845	
1307.	<i>roseomaculana</i> (H.-S., 1851)	2	1337.	<i>corticana</i> (D. & Sch., 1775)	2 P
1308.	<i>salicella</i> (Linnaeus, 1758)	2		<i>charpentierana</i> Hb., 1823	
1309.	<i>atropunctana</i> (Zetterstedt, 1839)	2		EUDEMIS Hübner, 1825	
	<i>dimidiana</i> Sodoff., 1830, nec Fril., 1828		1338.	<i>profundana</i> (D. & Sch., 1775)	2
	CYMOLOMIA Lederer, 1859		1339.	<i>porphyra</i> (Hübner, 1799)	208
1310.	<i>hartigiana</i> (Saxesen, 1840)	2		ANCYLIS Hübner, 1825	
	ORTHOTAENIA Stephens, 1829		1340.	<i>laetana</i> (Fabricius, 1775)	2
1311.	<i>undulana</i> (D. & Sch., 1775)	2	1341.	<i>comptana</i> (Frölich, 1828)	2
	<i>urticana</i> Hb., 1799		1342.	<i>unculana</i> (Haworth, 1811)	2
	PSEUDOSCIAPHILA Obraztsov, 1966			<i>derasana</i> Hb., 1813	
1312.	<i>branderiana</i> (Linnaeus, 1758)	2	1343.	<i>uncella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	APOTOMIS Hübner, 1825			<i>uncana</i> Hb., 1799	
1313.	<i>semifasciana</i> (Haworth, 1811)	2	1344.	<i>unguicella</i> (Linnaeus, 1758)	2

1345.	<i>mitterbacheriana</i> (D. & Sch., 1775)	2	1382.	<i>crenana</i> (Hübner, 1817)	2
1346.	<i>upupana</i> (Treitschke, 1835)	2	1383.	<i>thapsiana</i> (Zeller, 1847)	2 *
1347.	<i>geminana</i> (Donovan, 1806)	2	1384.	<i>kochiana</i> (H.-S., 1851)	923
	<i>biarcuana</i> Sph., 1834		1385.	<i>pygmaeana</i> (Hübner, 1799)	2
1348.	<i>diminutana</i> (Haworth, 1811)	2	1386.	<i>subsequana</i> (Haworth, 1811)	(2) P
1349.	<i>subarcuana</i> (Douglas, 1847)	2 *		<i>RHOPOBOTA</i> Lederer, 1859	
	<i>inornatana</i> H.-S., 1851		1387.	<i>ustomaculana</i> (Curtis, 1831)	2
1350.	<i>obtusana</i> (Haworth, 1811)	2	1388.	<i>naevana</i> (Hübner, 1817)	2
1351.	<i>tineana</i> (Hübner, 1799)	2		<i>unipunctana</i> Hw., 1811, nec Don., 1805	
1352.	<i>achatana</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>geminana</i> Sph., 1852	
1353.	<i>badiana</i> (D. & Sch., 1775)	2	1389.	<i>stagnana</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>lundana</i> F., 1777			<i>fractifasciana</i> Hw., 1811	
1354.	<i>myrtillana</i> (Treitschke, 1830)	2	1390.	<i>myrtillana</i> (Hmphr. & Ww., 1845)	2
1355.	<i>apicella</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>vacciniana</i> Lienig & Zeller, 1846	
	<i>siculana</i> Hb., 1799			<i>ZEIRAPHERA</i> Treitschke, 1829	
	<i>EPINOTIA</i> Hübner, 1825		1391.	<i>ratzeburgiana</i> (Saxesen, 1840)	2
1356.	<i>trigonella</i> (Linnaeus, 1758)	2		<i>paludiphila</i> Toll, 1957	
	<i>stroemiana</i> F., 1781		1392.	<i>rufimitrana</i> (H.-S., 1851)	2
	<i>similana</i> Hb., 1793		1393.	<i>isertana</i> (Fabricius, 1794)	2
1357.	<i>sordidana</i> (Hübner, 1824)	(2) 925		<i>corticana</i> Hb., 1813	
1358.	<i>solandriana</i> (Linnaeus, 1758)	2	1394.	<i>griseana</i> (Hübner, 1799)	2
	<i>trapezana</i> F., 1787			<i>diniana</i> (Gn., 1845)	
1359.	<i>brunnichana</i> (Linnaeus, 1767)	2		<i>GYPSONOMA</i> Meyrick, 1895	
	<i>sinuana</i> D. & Sch., 1775		1395.	<i>dealbana</i> (Frölich, 1828)	2
1360.	<i>maculana</i> (Fabricius, 1775)	2		<i>incarnana</i> sensu Hw., 1811, nec <i>incarnatana</i> Hb., 1800	
	<i>ophthalmicana</i> Hb., 1799		1396.	<i>aceriana</i> (Duponchel, 1843)	2
1361.	<i>caprana</i> (Fabricius, 1798)	2	1397.	<i>minutana</i> (Hübner, 1799)	2
	<i>semifuscana</i> Sph., 1834		1398.	<i>sociana</i> (Haworth, 1811)	2
1362.	<i>abbreviana</i> (Fabricius, 1794)	2		<i>neglectana</i> Dup., 1844	
	<i>trimaculana</i> Don., 1806		1399.	<i>oppressana</i> (Treitschke, 1835)	2
1363.	<i>subocellana</i> (Donovan, 1806)	2	1400.	<i>nitidulana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2
1364.	<i>bilunana</i> (Haworth, 1811)	2		<i>ericetana</i> H.-S., 1851	
1365.	<i>ramella</i> (Linnaeus, 1758)	2		<i>GIBBERIFERA</i> Obratzsov, 1946	
	<i>paykulliana</i> F., 1787		1401.	<i>simplana</i> (Fischer v. R., 1836)	2
1366.	<i>demarniana</i> (Fischer v. R., 1840)	2		<i>EPIBLEMA</i> Hübner, 1825	
1367.	<i>immundana</i> (Fischer v. R., 1839)	2	1402.	<i>cynosbatellum</i> (Linnaeus, 1758)	2
1368.	<i>tetraquetrana</i> (Haworth, 1811)	2		<i>tripunctanum</i> D. & Sch., 1775	
1369.	<i>nisella</i> (Clerck, 1759)	2	1403.	<i>tetragonanum</i> (Stephens, 1834)	(2) 691
	<i>cinereana</i> Hw., 1811		1404.	<i>uddmannianum</i> (Linnaeus, 1758)	2
1370.	<i>tenerana</i> (D. & Sch., 1775)	2	1405.	<i>incarnatanum</i> (Hübner, 1800)	2
	<i>penkleriana</i> F. v. R., 1839		1406.	<i>roboranum</i> (D. & Sch., 1775)	2
1371.	<i>nigricana</i> (H.-S., 1851)	2		<i>aquanum</i> Hb., 1799	
1372.	<i>pusillana</i> (Peyerimhoff, 1863)	514	1407.	<i>trimaculanum</i> (Haworth, 1811)	2
1373.	<i>tedella</i> (Clerck, 1759)	2		<i>suffusanum</i> Dup., 1843	
1374.	<i>fraternana</i> (Haworth, 1811)	(2) 923	1408.	<i>rosaecolanum</i> (Doubleday, 1850)	171
	<i>proximana</i> H.-S., 1851		1409.	<i>grandaevanum</i> (Lienig & Zeller, 1846)	351
1375.	<i>nemorivaga</i> (Tengström, 1848)	98	1410.	<i>turbidanum</i> (Treitschke, 1835)	509
1376.	<i>signatana</i> (Douglas, 1845)	2	1411.	<i>foenellum</i> (Linnaeus, 1758)	2
1377.	<i>granitana</i> (H.-S., 1851)	2		<i>scopolianum</i> D. & Sch., 1775	
1378.	<i>rubiginosana</i> (H.-S., 1851)	2		<i>pflugianum</i> F., 1787, nec Hw., 1811	
1379.	<i>cruciana</i> (Linnaeus, 1761)	2	1412.	<i>costipunctanum</i> (Haworth, 1811)	2
1380.	<i>gimmerthaliana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	67		<i>trigeminanum</i> Sph., 1834	
1381.	<i>nanana</i> (Treitschke, 1835)	2			

1413.	<i>sticticanum</i> (Fabricius, 1794)	2	1442.	<i>laricana</i> (Heinemann, 1863)	2
	<i>brunnichianum</i> Hb., 1825			<i>BLASTESTHIA</i> Obratzsov, 1960	
	<i>farfae</i> Fletcher, 1938		1443.	<i>posticana</i> (Zetterstedt, 1839)	2
1414.	<i>scutulanum</i> (D. & Sch., 1775)	2	1444.	<i>turionella</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>pflugianum</i> Hw., 1811, nec F., 1787			<i>turionana</i> Hw., 1811	
	<i>luctuosanum</i> Dup., 1836		1445.	<i>mughiana</i> (Zeller, 1868)	2
1415.	<i>cirsianum</i> (Zeller, 1843)	2		<i>CLAVIGESTA</i> Obratzsov, 1946	
	<i>luctuosanum</i> auct., nec Dup., 1836		1446.	<i>sylvestrana</i> (Curtis, 1850)	(682)
1416.	<i>graphanum</i> (Treitschke, 1835)	2		<i>RHYACIONIA</i> Hübner, 1825	
1417.	<i>similanum</i> (D. & Sch., 1775)	2	1447.	<i>buoliana</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>asseclanum</i> sensu Hb., 1799, nec D. & Sch., 1775		1448.	<i>pinicolana</i> (Doubleday, 1849)	577
1418.	<i>hepaticanum</i> (Treitschke, 1835)	2	1449.	<i>pinivorana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2
1419.	<i>junctanum</i> (H.-S., 1856)	2	1450.	<i>duplana</i> (Hübner, 1813)	2
	<i>PELOCHRISTA</i> Lederer, 1859		1451.	<i>piniana</i> (H.-S., 1851)	(2) 352
1420.	<i>caecimaculana</i> (Hübner, 1799)	2		<i>RETINIA</i> Guenée, 1845	
1421.	<i>medullana</i> (Staudinger, 1879)	N	1452.	<i>resinella</i> (Linnaeus, 1758)	2
1422.	<i>infidana</i> (Hübner, 1824)	2		<i>BARBARA</i> Heinrich, 1923	
1423.	<i>hepatariana</i> (H.-S., 1851)	(2) 692	1453.	<i>herrichiana</i> Obratzsov, 1960	(2) P
	<i>ERIOPSELA</i> Guenée, 1845			<i>margarotana</i> H.-S., 1848	
1424.	<i>quadrana</i> (Hübner, 1813)	2		<i>ENARMONIA</i> Hübner, 1826	
	<i>EUCOSMA</i> Hübner, 1823		1454.	<i>formosana</i> (Scopoli, 1763)	2
1425.	<i>hohenwartiana</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>woeberiana</i> D. & Sch., 1775	
	<i>scopoliana</i> Hw., 1811			<i>SELENODES</i> Guenée, 1845	
	<i>cana</i> auct., nec Hw., 1811		1455.	<i>karelica</i> (Tengström, 1875)	2
1426.	<i>fulvana</i> (Stephens, 1834)	2		<i>textana</i> Frl., 1828, nec Hb., 1799	
	<i>jaceana</i> auct., nec H.-S., 1851			<i>EUCOSMOMORPHA</i> Obratzsov, 1951	
1427.	<i>balatonana</i> (Osthelder, 1937)	206	1456.	<i>albersana</i> (Hübner, 1813)	2
	<i>danicana</i> Schantz, 1962			<i>LATHRONYPHA</i> Meyrick, 1926	
	<i>fulvana</i> auct., nec Sph., 1834		1457.	<i>strigana</i> (Fabricius, 1775)	2
1428.	<i>cana</i> (Haworth, 1811)	2		<i>hypericana</i> Hb., 1799	
	<i>hohenwartiana</i> auct., nec D. & Sch., 1775			<i>COLLICULARIA</i> Obratzsov, 1960	
1429.	<i>obumbratana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2	1458.	<i>microgrammana</i> (Guenée, 1845)	2
	<i>expallidana</i> auct., nec Hw., 1811			<i>STROPHEDEA</i> Herrich-Schäffer, 1854	
1430.	<i>albidulana</i> (H.-S., 1851)	2	1459.	<i>weirana</i> (Douglas, 1850)	2
1431.	<i>pauperana</i> (Duponchel, 1843)	384		<i>flexana</i> auct., nec Z., 1849	
1432.	<i>pupillana</i> (Clerck, 1759)	2	1460.	<i>nitidana</i> (Fabricius, 1794)	2
1433.	<i>lacteana</i> (Treitschke, 1835)	695		<i>flexana</i> Z., 1849	
	<i>maritima</i> Hmphr. & Ww., 1845			<i>PAMMENE</i> Hübner, 1825	
1434.	<i>metzneriana</i> (Treitschke, 1830)	208	1461.	<i>aurana</i> (Fabricius, 1775)	2
1435.	<i>aemulana</i> (Schläger, 1849)	352		<i>aurantiana</i> Koll., 1832	
1436.	<i>aspidiscana</i> (Hübner, 1817)	2	1462.	<i>gallicana</i> (Guenée, 1845)	73
1437.	<i>conterminana</i> (Guenée, 1845)	2	1463.	<i>splendidulana</i> (Guenée, 1845)	2
1438.	<i>campoliliana</i> (D. & Sch., 1775)	2	1464.	<i>luedersiana</i> (Sorhagen, 1885)	206
	<i>nigromaculana</i> Hw., 1811		1465.	<i>obscurana</i> (Stephens, 1834)	2
	<i>THIODIA</i> Hübner, 1825		1466.	<i>agnotana</i> Rebel, 1914	N
1439.	<i>citrana</i> (Hübner, 1799)	2	1467.	<i>amygdalana</i> (Duponchel, 1843)	2 *
	<i>FOVEIFERA</i> Obratzsov, 1946		1468.	<i>inquilina</i> Fletcher, 1938	2
1440.	<i>torridana</i> (Lederer, 1859)	N		<i>fimbriana</i> Hw., 1811, nec Thbg., 1791	
	<i>hastana</i> sensu Hb., 1799, nec <i>hastiana</i> L., 1758		1469.	<i>argyrana</i> (Hübner, 1799)	2
	<i>SPILONOTA</i> Stephens, 1829		1470.	<i>albuginana</i> (Guenée, 1845)	695
1441.	<i>ocellana</i> (D. & Sch., 1775)	2	1471.	<i>insulana</i> (Guenée, 1845)	2 *

1472.	<i>gallicollana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2	1510.	<i>funebrana</i> (Treitschke, 1835)	2
1473.	<i>suspectana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	908	1511.	<i>molesta</i> (Busck, 1916)	176
	<i>fraxinana</i> Peyer., 1871		1512.	<i>lobarzewskii</i> (Nowicki, 1860)	174
1474.	<i>spiniana</i> (Duponchel, 1843)	2		<i>prunivorana</i> Rag., 1879	
1475.	<i>populana</i> (Fabricius, 1787)	2	1513.	<i>lathyрана</i> (Hübner, 1813)	(2) 907
1476.	<i>aurita</i> Razowski, 1991	37		<i>scopariana</i> H.-S., 1851	
	<i>aurantiana</i> Stgr., 1871, nec Koll., 1832		1514.	<i>jungiella</i> (Clerck, 1759)	2
1477.	<i>regiana</i> (Zeller, 1849)	2		<i>perlepidana</i> Hw., 1811	
1478.	<i>trauniana</i> (D. & Sch., 1775)	2	1515.	<i>nebritana</i> (Treitschke, 1830)	2
1479.	<i>fasciana</i> (Linnaeus, 1761)	2	1516.	<i>fissana</i> (Frölich, 1828)	2
	<i>juliana</i> Curt., 1836		1517.	<i>discretana</i> (Wocke, 1861)	2
	<i>herrichiana</i> Hein., 1854		1518.	<i>lunulana</i> (D. & Sch., 1775)	2
1480.	<i>germana</i> (Hübner, 1799)	2		<i>dorsana</i> auct., nec F., 1775	
1481.	<i>ochsenheimeriana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2	1519.	<i>orobana</i> (Treitschke, 1830)	2
1482.	<i>rhediella</i> (Clerck, 1759)	2	1520.	<i>caecana</i> (Schläger, 1847)	N
	CYDIA Hübner, 1825		1521.	<i>compositella</i> (Fabricius, 1775)	2
1483.	<i>succedana</i> (D. & Sch., 1775)	2	1522.	<i>coronillana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2
1484.	<i>medicaginis</i> (Kuznetsov, 1962)	206	1523.	<i>pallifrontana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2
1485.	<i>oxytropidis</i> (Martini, 1912)	N		DICHRORAMPHA Guenée, 1845	
1486.	<i>pactolana</i> (Zeller, 1840)	2	1524.	<i>petiverella</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>pinetana</i> Schl., 1847			<i>dorsana</i> F., 1775	
1487.	<i>grunertiana</i> (Ratzeburg, 1868)	352	1525.	<i>alpinana</i> (Treitschke, 1830)	2
1488.	<i>duplicana</i> (Zetterstedt, 1839)	2	1526.	<i>flavidorsana</i> Knaggs, 1867	2 P
	<i>interruptana</i> H.-S., 1851		1527.	<i>plumbagana</i> (Treitschke, 1830)	2
1489.	<i>cognatana</i> (Barrett, 1874)	208	1528.	<i>heegerana</i> (Duponchel, 1843)	2
1490.	<i>servillana</i> (Duponchel, 1836)	2	1529.	<i>incognitana</i> (Krem. & Masl., 1933)	351
1491.	<i>splendana</i> (Hübner, 1799)	2	1530.	<i>sequana</i> (Hübner, 1799)	2
	<i>penkleriana</i> auct., nec D. & Sch., 1775		1531.	<i>acuminatana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	2
1492.	<i>fagiglandana</i> (Zeller, 1841)	2	1532.	<i>consortana</i> Stephens, 1852	352
	<i>grossana</i> Hw., 1811, nec Thbg., 1791		1533.	<i>simpliciana</i> (Haworth, 1811)	2
1493.	<i>amplana</i> (Hübner, 1799)	695	1534.	<i>montanana</i> (Duponchel, 1843)	(2)
1494.	<i>inquinatana</i> (Hübner, 1799)	2		<i>alpestrana</i> H.-S., 1851	
1495.	<i>conicolana</i> (Heylaerts, 1874)	2 *		<i>tanacetii</i> Stt., 1857	
1496.	<i>nigricana</i> (Fabricius, 1794)	2	1535.	<i>gueneeana</i> Obratzsov, 1953	206
	<i>rusticella</i> Cl., 1759		1536.	<i>agilana</i> (Tengström, 1848)	N
1497.	<i>cosmophorana</i> (Treitschke, 1835)	2	1537.	<i>distinctana</i> Heinemann, 1863	2 *
1498.	<i>indivisa</i> (Danilevsky, 1963)	303	1538.	<i>gruneriana</i> (H.-S., 1851)	2 *
1499.	<i>coniferana</i> (Saxesen, 1840)	2	1539.	<i>podoliensis</i> (Toll, 1942)	304
1500.	<i>illutana</i> (H.-S., 1851)	(2) 303	1540.	<i>incursana</i> (H.-S., 1851)	2
1501.	<i>pomonella</i> (Linnaeus, 1758)	2	1541.	<i>cacaleana</i> (H.-S., 1851)	(2) 913
1502.	<i>milleniana</i> (Adamczewski, 1967)	2	1542.	<i>plumbana</i> (Scopoli, 1763)	2
	<i>zebeana</i> auct., nec Ratz., 1840			<i>saturnana</i> Gn., 1845	
	<i>decidiana</i> Steuer, 1969		1543.	<i>sedatana</i> (Busck, 1906)	2
1503.	<i>zebeana</i> (Ratzeburg, 1840)	N		<i>saturnana</i> auct., nec Gn., 1845	
1504.	<i>corollana</i> (Hübner, 1823)	2	1544.	<i>aeratana</i> (Pier. & Mtc., 1915)	206
1505.	<i>leguminana</i> (Lienig & Zeller, 1846)	293			
1506.	<i>strobilella</i> (Linnaeus, 1758)	2		Schreckensteinioidae	
1507.	<i>gemmiferana</i> (Treitschke, 1835)	2		Schreckensteiniidae	
1508.	<i>janthinana</i> (Duponchel, 1835)	2		SCHRECKENSTEINIA Hübner, 1825	
1509.	<i>tenebrosana</i> (Duponchel, 1843)	2	1545.	<i>festaliella</i> (Hübner, 1819)	2
	<i>roseticolana</i> Z., 1849				

Epermenioidea			MARASMARCHA Meyrick, 1886		
Epermeniidae			1573. <i>lunaedactyla</i> (Haworth, 1811)	2	
<i>OCHROMOLOPIS</i> Hübner, 1825			<i>phaeodactyla</i> Hb., 1813		
1546. <i>ictella</i> (Hübner, 1813)	89		CNAEMIDOPHORUS Wallengren, 1862		
<i>PHAULERNIS</i> Meyrick, 1895			1574. <i>rhododactylus</i> (D. & Sch., 1775)	2	
1547. <i>dentella</i> (Zeller, 1839)	2		AMBLYPPTILIA Hübner, 1825		
1548. <i>fulviguttella</i> (Zeller, 1839)	2		1575. <i>acanthadactyla</i> (Hübner, 1813)	2	
<i>CATAPLECTICA</i> Walsingham, 1894			1576. <i>punctidactyla</i> (Haworth, 1811)	2	
1549. <i>profugella</i> (Stainton, 1856)	2 *		<i>cosmodactyla</i> Hb., 1819		
EPERMENIA Hübner, 1825			STENOPTILIA Hübner, 1825		
1550. <i>pontificella</i> (Hübner, 1796)	2		1577. <i>pelidnodactyla</i> (Stein, 1837)	2	
1551. <i>illigerella</i> (Hübner, 1813)	2		1578. <i>coprodactyla</i> (Stainton, 1851)	2 *	
1552. <i>falciformis</i> (Haworth, 1828)	N		1579. <i>zophodactyla</i> (Duponchel, 1840)	2	
1553. <i>chaerophyllella</i> (Goeze, 1783)	2		1580. <i>bipunctidactyla</i> (Scopoli, 1763)	2	
1554. <i>insecurella</i> (Stainton, 1849)	91		1581. <i>annadactyla</i> Sutter, 1988	762	
Alucitoidea			<i>annickiana</i> Gib., 1989		
Alucitidae			1582. <i>pterodactyla</i> (Linnaeus, 1761)	2	
<i>ALUCITA</i> Linnaeus, 1758			PLATYPPTILIA Hübner, 1825		
1555. <i>hexadactyla</i> (Linnaeus, 1758)	2 *		1583. <i>tesseradactyla</i> (Linnaeus, 1761)	2	
1556. <i>grammodactyla</i> Zeller, 1841	2		1584. <i>calodactyla</i> (D. & Sch., 1775)	2	
1557. <i>huebneri</i> Wallengren, 1859	2 *		<i>zetterstedtii</i> Z., 1841		
1558. <i>desmodactylla</i> Zeller, 1847	2 *		1585. <i>gonodactyla</i> (D. & Sch., 1775)	2	
PTEROTOPTERYX Hannemann, 1959			<i>trigonodactyla</i> Hw., 1811		
1559. <i>dodecadactyla</i> (Hübner, 1813)	2		1586. <i>nemoralis</i> (Zeller, 1841)	2	
Pterophoroidea			GILLMERIA Tutt, 1905		
Pterophoridae			1587. <i>tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	2	
Agdistinae			<i>ochrodactyla</i> D. & Sch., 1775		
<i>AGDISTIS</i> Hübner, 1825			1588. <i>pallidactyla</i> (Haworth, 1811)	2	
1560. <i>adactyla</i> (Hübner, 1819)	2		<i>bertrami</i> Rössl., 1864		
Platyptiliinae			Pterophorinae		
<i>OXYPTILUS</i> Zeller, 1841			MERRIFIELDIA Tutt, 1905		
1561. <i>pilosellae</i> (Zeller, 1841)	2		1589. <i>leucodactyla</i> (D. & Sch., 1775)	2	
1562. <i>chrysodactylus</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>tridactyla</i> auct., nec L., 1758		
<i>hieracii</i> Z., 1841			1590. <i>tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	398	
1563. <i>ericetorum</i> (Stainton, 1851)	N		<i>fuscolimbata</i> Dup., 1844		
1564. <i>parvidactylus</i> (Haworth, 1811)	2		1591. <i>baliodactyla</i> (Zeller, 1841)	2	
CROMBRUGGHIA Tutt, 1906			PTEROPHORUS Schäffer, 1766		
1565. <i>distans</i> (Zeller, 1847)	2		1592. <i>pentadactylus</i> (Linnaeus, 1758)	2	
1566. <i>tristis</i> (Zeller, 1841)	2		PORRITTIA Tutt, 1905		
GEINA Tutt, 1906			1593. <i>galactodactyla</i> (D. & Sch., 1775)	2	
1567. <i>didactyla</i> (Linnaeus, 1758)	2		CALYCIPHORA Kasy, 1960		
BUCKLERIA Tutt, 1905			1594. <i>albodactyla</i> (Fabricius, 1794)	400	
1568. <i>paludum</i> (Zeller, 1839)	998		<i>xerodactyla</i> Z., 1841		
CAPPERIA Tutt, 1905			1595. <i>homoiodactyla</i> (Kasy, 1960)	398	
1569. <i>britanniodactyla</i> (Gregson, 1869)	(2)		PSELNOPHORUS Wallengren, 1881		
1570. <i>celeusi</i> (Schmid, 1886)	2		1596. <i>heterodactylus</i> (Müller, 1764)	2	
1571. <i>lorana</i> (Fuchs, 1895)	659		<i>brachydactylus</i> Koll., 1832		
1572. <i>trichodactyla</i> (D. & Sch., 1775)	876		ADAINA Tutt, 1905		
<i>leonuri</i> Stng., 1882			1597. <i>microdactyla</i> (Hübner, 1813)	2	
			HELLINSIA Tutt, 1905		
			1598. <i>didactylites</i> (Ström, 1783)	2	
			<i>scarodactyla</i> Hb., 1813		

1599.	<i>distincta</i> (H.-S., 1855)	2			<i>PEMPELIA</i> Hübner, 1825	
1600.	<i>carphodactyla</i> (Hübner, 1813)	2			1621. <i>palumbella</i> (D. & Sch., 1775)	2
1601.	<i>inulae</i> (Zeller, 1852)	871			<i>contubernella</i> Hb., 1796	
1602.	<i>osteodactyla</i> (Zeller, 1841)	2			1622. <i>obductella</i> (Zeller, 1839)	2
1603.	<i>tephradactyla</i> (Hübner, 1813)	2			1623. <i>formosa</i> (Haworth, 1811)	2
1604.	<i>lienigiana</i> (Zeller, 1852)	903			<i>SALEBRIOPSIS</i> Hannemann, 1965	
	<i>OIDAEMATOPHORUS</i> Wallengren, 1862				1624. <i>albicilla</i> (H.-S., 1849)	N
1605.	<i>lithodactylus</i> (Treitschke, 1833)	2			<i>SCIOTA</i> Hulst, 1888	
1606.	<i>constanti</i> (Ragonot, 1876)	2 *			1625. <i>rhenella</i> (Zincken, 1818)	2
	<i>EMMELINA</i> Tutt, 1905				<i>rhenalis</i> Hb., 1825	
1607.	<i>monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)	2			1626. <i>hostilis</i> (Stephens, 1834)	2
	Copromorphoidea				1627. <i>adelphella</i> (Fischer v. R., 1836)	925
	Carposinidae				<i>rhenella</i> auct., nec Zinck., 1818	
	<i>CARPOSINA</i> Herrich-Schäffer, 1853				<i>MEGASIS</i> Guenée, 1845	K
1608.	<i>berberidella</i> H.-S., 1853	2 *			1628. <i>dilucidella</i> (Duponchel, 1836)	2
1609.	<i>scirrhosella</i> H.-S., 1853	(468) 907 P			<i>ilignella</i> Z., 1839	
	Pyraloidea				<i>SELAGIA</i> Hübner, 1825	
	Pyralidae				1629. <i>argyrella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	Galleriinae				1630. <i>spadicella</i> (Hübner, 1796)	2
	<i>GALLERIA</i> Fabricius, 1798				<i>janthinella</i> Hb., 1813	
1610.	<i>mellonella</i> (Linnaeus, 1758)	2			<i>PHYCITA</i> Curtis, 1828	
	<i>cereana</i> L., 1767				1631. <i>roborella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>ACHROIA</i> Hübner, 1819				<i>spissicella</i> F., 1779	
1611.	<i>grisella</i> (Fabricius, 1794)	2			<i>roboralis</i> Hb., 1825	
	<i>CORCYRA</i> Ragonot, 1885				<i>DIORYCTRIA</i> Zeller, 1846	
1612.	<i>cephalonica</i> (Stainton, 1866)	N I			1632. <i>abietella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>APHOMIA</i> Hübner, 1825				1633. <i>simplicella</i> Heinemann, 1863	897
1613.	<i>sociella</i> (Linnaeus, 1758)	2			<i>mutatella</i> Fuchs, 1903	
	<i>colonella</i> L., 1758				1634. <i>schuetzeella</i> Fuchs, 1899	2
	<i>tribunella</i> D. & Sch., 1775				1635. <i>sylvestrella</i> (Ratzeburg, 1840)	897
	<i>MELISSOBLAPTES</i> Zeller, 1839				<i>splendidella</i> H.-S., 1848	
1614.	<i>zelleri</i> Joannis, 1932	2			<i>CATASTIA</i> Hübner, 1825	
	<i>bipunctatus</i> Z., 1848, nec Curt., 1828				1636. <i>marginata</i> (D. & Sch., 1775)	2 X
1615.	<i>foedellus</i> (Zeller, 1839)	124 *			<i>flaviciliella</i> Hb., 1790	
	<i>LAMORIA</i> Walker, 1863				<i>EPISCHNIA</i> Hübner, 1825	
1616.	<i>anella</i> (D. & Sch., 1775)	2 *			1637. <i>prodromella</i> (Hübner, 1796)	2
	Phycitinae				<i>HYPOCHALCIA</i> Hübner, 1825	
	<i>ANERASTIA</i> Hübner, 1825				1638. <i>ahenella</i> (D. & Sch., 1775)	2
1617.	<i>lotella</i> (Hübner, 1813)	2			<i>aeneella</i> Hb., 1796	
	<i>miniosella</i> Zinck., 1818				<i>rubiginella</i> Tr., 1833	
	<i>CRYPTOBLABES</i> Zeller, 1848				1639. <i>lignella</i> (Hübner, 1796)	2 *
1618.	<i>bistriga</i> (Haworth, 1811)	2			<i>melanella</i> Tr., 1832	
	<i>rutilella</i> Z., 1839				1640. <i>decorella</i> (Hübner, 1817)	2
	<i>obsoletella</i> Hein., 1865				<i>ELEGIA</i> Ragonot, 1887	
	<i>ONCOCERA</i> Stephens, 1829				1641. <i>similella</i> (Zincken, 1818)	2
1619.	<i>semirubella</i> (Scopoli, 1763)	2			<i>METRIOSTOLA</i> Ragonot, 1893	K
	<i>carnella</i> L., 1767				1642. <i>betulae</i> (Goeze, 1778)	2
	<i>LAODAMIA</i> Ragonot, 1888				<i>PYLA</i> Grote, 1882	
1620.	<i>faecella</i> (Zeller, 1839)	2			1643. <i>fusca</i> (Haworth, 1811)	2
					<i>spadicella</i> Zinck., 1818	
					<i>KHORASSANIA</i> Amsel, 1951	
					1644. <i>compositella</i> (Treitschke, 1835)	2

<i>ETIELLA</i> Zeller, 1839			<i>ECCOPISA</i> Zeller, 1848		
1645.	<i>zinckenella</i> (Treitschke, 1832)	2	1671.	<i>effractella</i> Zeller, 1848	N
<i>TRACHONITIS</i> Zeller, 1848			<i>ASSARA</i> Walker, 1863		
1646.	<i>cristella</i> (D. & Sch., 1775)	695	1672.	<i>terebrella</i> (Zincken, 1818)	2
<i>cristalis</i> Hb., 1825			<i>EUZOPHERA</i> Zeller, 1867		
<i>PEMPELIELLA</i> Caradja, 1916			1673.	<i>pinguis</i> (Haworth, 1811)	2
1647.	<i>dilutella</i> (D. & Sch., 1775)	2	1674.	<i>bigella</i> (Zeller, 1848)	583
<i>diluta</i> Hw., 1811			<i>stenopycha</i> H.-S., 1855		
1648.	<i>ornatella</i> (D. & Sch., 1775)	2	1675.	<i>cinerosella</i> (Zeller, 1839)	2
1649.	<i>subornatella</i> (Duponchel, 1836)	2 * K	1676.	<i>fuliginosella</i> (Heinemann, 1865)	583
<i>ACROBASIS</i> Zeller, 1839			<i>NYCTEGRETIS</i> Zeller, 1848		
1650.	<i>sodalella</i> Zeller, 1848	2	1677.	<i>lineana</i> (Scopoli, 1786)	2
1651.	<i>consociella</i> (Hübner, 1813)	2	<i>achatinella</i> Hb., 1824		
1652.	<i>glaucella</i> Staudinger, 1859	N	<i>ANCYLOSIS</i> ZELLER, 1839		
<i>fallouella</i> Rag., 1871			1678.	<i>cinnamomella</i> (Duponchel, 1836)	2
1653.	<i>obtusella</i> (Hübner, 1796)	2	1679.	<i>oblitella</i> (Zeller, 1848)	583
<i>obtusella</i> Hw., 1811			<i>HOMOEOSOMA</i> Curtis, 1833		
<i>CONOBATHRA</i> Meyrick, 1886			1680.	<i>sinuellum</i> (Fabricius, 1794)	583
1654.	<i>repandana</i> (Fabricius, 1798)	2	1681.	<i>nebulellum</i> (D. & Sch., 1775)	2
<i>tumidella</i> Zinck., 1818			1682.	<i>nimbellum</i> (Duponchel, 1836)	2
<i>zelleri</i> Rag., 1885			<i>PHYCITODES</i> Hampson, 1917		
1655.	<i>tumidana</i> (D. & Sch., 1775)	2	1683.	<i>binaevellus</i> (Hübner, 1813)	195
<i>TRACHYCERA</i> Ragonot, 1893			1684.	<i>saxicolus</i> (Vaughan, 1870)	583
1656.	<i>marmorea</i> (Haworth, 1811)	2	1685.	<i>albatellus</i> (Ragonot, 1887)	583
1657.	<i>advenella</i> (Zincken, 1818)	2	1686.	<i>maritimus</i> (Tengström, 1848)	N
1658.	<i>legatea</i> (Haworth, 1811)	2	<i>carlinellus</i> Hein., 1865		
<i>legatella</i> Hb., 1796, nec D. & Sch., 1775			<i>VITULA</i> Ragonot, 1887		
<i>legatalis</i> Hb., 1825			1687.	<i>biviella</i> (Zeller, 1848)	735
1659.	<i>suavella</i> (Zincken, 1818)	2	<i>PLODIA</i> Guenée, 1845		
<i>EURHODOPE</i> Hübner, 1825			1688.	<i>interpunctella</i> (Hübner, 1813)	2 I
1660.	<i>rosella</i> (Scopoli, 1763)	2	<i>EPHESTIA</i> Guenée, 1845		
<i>pudoralis</i> D. & Sch., 1775			1689.	<i>kuehniella</i> Zeller, 1879	2
1661.	<i>cirrigerella</i> (Zincken, 1818)	2	1690.	<i>elutella</i> (Hübner, 1796)	2
<i>NEPHOPTERIX</i> Hübner, 1825			1691.	<i>parasitella</i> Staudinger, 1859	583
1662.	<i>angustella</i> (Hübner, 1796)	2	<i>CADRA</i> Walker, 1864		
<i>GLYPTOTELES</i> Zeller, 1848			1692.	<i>cautella</i> (Walker, 1863)	583 I
1663.	<i>leucacrinella</i> Zeller, 1848	2	1693.	<i>calidella</i> (Guenée, 1845)	918
<i>MYELOIS</i> Hübner, 1825			1694.	<i>figulilella</i> (Gregson, 1871)	583
1664.	<i>circumvoluta</i> (Fourcroy, 1785)	2			
<i>cribrella</i> Hb., 1796			<i>Pyralinae</i>		
<i>MYELOPSIS</i> Heinrich, 1956			<i>HYP SOPY G I A</i> Hübner, 1825		
1665.	<i>tetricella</i> (D. & Sch., 1775)	2	1695.	<i>costalis</i> (Fabricius, 1775)	2
<i>ECTOMYELOIS</i> Heinrich, 1956			<i>fimbrialis</i> D. & Sch., 1775		
1666.	<i>ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	2 *	<i>SYNAPHE</i> Hübner, 1825		
<i>APOMYELOIS</i> Heinrich, 1956			1696.	<i>punctalis</i> (Fabricius, 1775)	2
1667.	<i>bistriatella</i> (Hulst, 1887)	68	<i>angustalis</i> D. & Sch., 1775		
<i>GYMNANCYLA</i> Zeller, 1848			<i>ORTHOPYGIA</i> Ragonot, 1890		
1668.	<i>hornigii</i> (Lederer, 1853)	2	1697.	<i>glaucinalis</i> (Linnaeus, 1758)	2
1669.	<i>canella</i> (D. & Sch., 1775)	583	<i>nitidalis</i> F., 1775		
<i>ZOPHODIA</i> Hübner, 1825			<i>PYRALIS</i> Linnaeus, 1758		
1670.	<i>grossulariella</i> (Zincken, 1818)	2	1698.	<i>farinalis</i> (Linnaeus, 1758)	2
<i>convolutella</i> Hb., 1796, nec D. & Sch., 1775			1699.	<i>regalis</i> (D. & Sch., 1775)	2

1700.	<i>perversalis</i> (H.-S., 1849)	202			
	AGLOSSA Latreille, 1796				
1701.	<i>pinguinis</i> (Linnaeus, 1758)	2			
	ENDOTRICHA Zeller, 1847				
1702.	<i>flammealis</i> (D. & Sch., 1775)	2			
	Crambidae				
	Nymphulinae				
	ACENTRIA Stephens, 1829				
1703.	<i>ephemerella</i> (D. & Sch., 1775)	2			
	<i>nivea</i> Oliv., 1791				
	ELOPHILA Hübner, 1822				
1704.	<i>nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)	2			
	<i>rivulata</i> Sc., 1763				
	CATACLYSTA Hübner, 1825				
1705.	<i>lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	2			
	PARAPOYNX Hübner, 1825				
1706.	<i>stratitotum</i> (Linnaeus, 1758)	2			
	NYMPHULA Schrank, 1802				
1707.	<i>stagnata</i> (Donovan, 1806)	2			
	Schoenobiinae				
	SCHOENOBIUS Duponchel, 1836				
1708.	<i>gigantellus</i> (D. & Sch., 1775)	2			
1709.	<i>forficellus</i> (Thunberg, 1794)	2			
	DONACAULA Meyrick, 1890				
1710.	<i>mucronellus</i> (D. & Sch., 1775)	2			
	Crambinae				
	EUCHROMIUS Guenée, 1845				
1711.	<i>ocelleus</i> (Haworth, 1811)	N			
	CHILO Zincken, 1817				
1712.	<i>phragmitellus</i> (Hübner, 1810)	2			
	CALAMOTROPHA Zeller, 1863				
1713.	<i>paludella</i> (Hübner, 1824)	2			
	CHRYSOLEUCHIA Hübner, 1825				
1714.	<i>culmella</i> (Linnaeus, 1758)	2			
	<i>hortuella</i> Hb., 1796				
	CRAMBUS Fabricius, 1798				
1715.	<i>pascuellus</i> (Linnaeus, 1758)	2			
1716.	<i>silvellus</i> (Hübner, 1813)	2			
1717.	<i>uliginosellus</i> Zeller, 1850	2			
	<i>scoticus</i> auct., nec. Ww., 1849				
1718.	<i>ericellus</i> (Hübner, 1813)	2			
1719.	<i>alienellus</i> (Germ. & Kf., 1817)	2			
1720.	<i>pratellus</i> (Linnaeus, 1758)	2			
	<i>dumetellus</i> Hb., 1813				
1721.	<i>lathoniellus</i> (Zincken, 1817)	2			
	<i>pratellus</i> auct., nec L., 1758				
1722.	<i>hamellus</i> (Thunberg, 1788)	2			
1723.	<i>perlellus</i> (Scopoli, 1763)	2			
	<i>warringtonellus</i> Stt., 1849				
	AGRIPHILA Hübner, 1825				
1724.	<i>deliella</i> (Hübner, 1813)	352			
1725.	<i>tristella</i> (D. & Sch., 1775)	2			
1726.	<i>inquinatella</i> (D. & Sch., 1775)	2			
1727.	<i>selasella</i> (Hübner, 1813)	2			
1728.	<i>poliella</i> (Treitschke, 1832)	2			
1729.	<i>straminella</i> (D. & Sch., 1775)	2			
	<i>culmella</i> auct., nec L., 1758				
1730.	<i>geniculea</i> (Haworth, 1811)	695			
	CATOPTRIA Hübner, 1825				
1731.	<i>permutatella</i> (H.-S., 1848)	2			
	<i>hercyniae</i> Hein., 1854				
1732.	<i>osthelderi</i> (de Lattin, 1950)	310			
1733.	<i>maculalis</i> (Zetterstedt, 1839)	2 *			
1734.	<i>mytilella</i> (Hübner, 1805)	2			
1735.	<i>pinella</i> (Linnaeus, 1758)	2			
	<i>virginella</i> Sc., 1763				
1736.	<i>margaritella</i> (D. & Sch., 1775)	2			
1737.	<i>fulgidella</i> (Hübner, 1813)	877 *			
1738.	<i>falsella</i> (D. & Sch., 1775)	2			
1739.	<i>confusella</i> (Staudinger, 1882)	2			
1740.	<i>verella</i> (Zincken, 1817)	N			
1741.	<i>lythargyrella</i> (Hübner, 1796)	2			
	XANTHOCRAMBUS Bleszynski, 1955				
1742.	<i>saxonellus</i> (Zincken, 1821)	2			
	CHRYSOCRAMBUS Bleszynski, 1957				
1743.	<i>craterellus</i> (Scopoli, 1763)	N			
	THISANOTIA Hübner, 1825				
1744.	<i>chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763)	2			
	PEDIASIA Hübner, 1825				
1745.	<i>fascelinella</i> (Hübner, 1813)	2			
1746.	<i>luteella</i> (D. & Sch., 1775)	2			
1747.	<i>truncatella</i> (Zetterstedt, 1839)	2			
1748.	<i>contaminella</i> (Hübner, 1796)	2			
	<i>squalidalis</i> Hb., 1825				
	PLATYTES Guenée, 1845				
1749.	<i>cerussellus</i> (D. & Sch., 1775)	2			
	<i>quadrellus</i> D. & Sch., 1775				
1750.	<i>alpinellus</i> (Hübner, 1813)	2			
	Scopariinae				
	GESNERIA Hübner, 1825				
1751.	<i>centuriella</i> (D. & Sch., 1775)	2 *			
	SCOPARIA Haworth, 1811				
1752.	<i>subfusca</i> Haworth, 1811	2			
	<i>cembrella</i> auct., nec L., 1761				
	<i>zelleri</i> Wck., 1855				
1753.	<i>basistrigalis</i> Knaggs, 1866	2			
1754.	<i>ambigualis</i> (Treitschke, 1829)	2			
1755.	<i>ancipitella</i> (La Harpe, 1855)	2			
	<i>ulmella</i> Knaggs, 1867				

1756.	<i>pyralella</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>arundinata</i> Thbg., 1792	
	<i>dubitalis</i> Hb., 1796	
1757.	<i>ingratella</i> (Zeller, 1846)	2 *
	<i>DIPLEURINA</i> Chapman, 1912	
1758.	<i>lacustrata</i> (Panzer, 1804)	2
	<i>crataegella</i> auct., nec L., 1767	
	<i>EUDONIA</i> Billberg, 1820	
1759.	<i>pallida</i> (Curtis, 1827)	2
1760.	<i>petrophila</i> (Standfuss, 1848)	2
1761.	<i>murana</i> (Curtis, 1827)	2
1762.	<i>truncicolella</i> (Stainton, 1849)	2
1763.	<i>laetella</i> (Zeller, 1846)	2 *
1764.	<i>mercurella</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>frequentella</i> Stt., 1849	
1765.	<i>sudetica</i> (Zeller, 1839)	2
<i>Evergestinae</i>		
	<i>EVERGESTIS</i> Hübner, 1825	
1766.	<i>limbata</i> (Linnaeus, 1767)	2
1767.	<i>aenealis</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>furvalis</i> Hb., 1796	
1768.	<i>frumentalis</i> (Linnaeus, 1761)	2
1769.	<i>sophialis</i> (Fabricius, 1787)	2
1770.	<i>forficalis</i> (Linnaeus, 1758)	2
1771.	<i>politilis</i> (D. & Sch., 1775)	2
1772.	<i>pallidata</i> (Hufnagel, 1767)	2
	<i>straminalis</i> Hb., 1793	
1773.	<i>extimalis</i> (Scopoli, 1763)	2
	<i>margaritalis</i> D. & Sch., 1775	
<i>Odontiinae</i>		
	<i>CYNAEDA</i> Hübner, 1825	
1774.	<i>dentalis</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>ATRALATA</i> Sylvén, 1947	
1775.	<i>albofascialis</i> (Treitschke, 1829)	2
	<i>TITANIO</i> Hübner, 1825	
1776.	<i>normalis</i> (Hübner, 1796)	2
	<i>EURRHYPIS</i> Hübner, 1825	
1777.	<i>pollinalis</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>APORODES</i> Guenée, 1854	
1778.	<i>floralis</i> (Hübner, 1809)	(2)
<i>Glaphyriinae</i>		
	<i>HELLULA</i> Guenée, 1854	
1779.	<i>undalis</i> (Fabricius, 1775)	729 M
<i>Heliothelinae</i>		
	<i>HELIOTHELA</i> Guenée, 1854	
1780.	<i>wulfeniana</i> (Scopoli, 1763)	2
	<i>atralis</i> Hb., 1788	

<i>Pyraustinae</i>		
	<i>PYRAUSTA</i> Schrank, 1802	
1781.	<i>aurata</i> (Scopoli, 1763)	2
1782.	<i>purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)	2
1783.	<i>ostrinalis</i> (Hübner, 1796)	2
1784.	<i>porphyralis</i> (D. & Sch., 1775)	2
1785.	<i>sanguinalis</i> (Linnaeus, 1767)	2 *
1786.	<i>castalis</i> (Treitschke, 1829)	2 X
1787.	<i>despicata</i> (Scopoli, 1763)	2
	<i>cespitalis</i> D. & Sch., 1775	
1788.	<i>obfuscata</i> (Scopoli, 1763)	560
1789.	<i>nigrata</i> (Scopoli, 1763)	2
	<i>cingularis</i> D. & Sch., 1775	
1790.	<i>cingulata</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>LOXOSTEGE</i> Hübner, 1825	
1791.	<i>sticticalis</i> (Linnaeus, 1761)	2 M
1792.	<i>turbidalis</i> (Treitschke, 1829)	2
	<i>URESIPHITA</i> Hübner, 1825	
1793.	<i>gilvata</i> (Fabricius, 1794)	2
	<i>polygonalis</i> auct., nec D. & Sch., 1775	
	<i>limbalis</i> auct., nec L., 1767	
	<i>ECPYRRHORRHOE</i> Hübner, 1825	
1794.	<i>rubiginalis</i> (Hübner, 1796)	2
	<i>SITOCHROA</i> Hübner, 1825	
1795.	<i>palealis</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>selenalis</i> Hb., 1819	
1796.	<i>verticalis</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>PARACORSIA</i> Marion, 1959	
1797.	<i>repandalis</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>MICROSTEGA</i> Meyrick, 1890	K
1798.	<i>pandalis</i> (Hübner, 1825)	2
1799.	<i>hyalinalis</i> (Hübner, 1796)	2
	<i>OSTRINIA</i> Hübner, 1825	
1800.	<i>palustralis</i> (Hübner, 1796)	387
1801.	<i>nubilalis</i> (Hübner, 1796)	2
	<i>silacealis</i> Hb., 1796	
	<i>EURRHYPARA</i> Hübner, 1825	
1802.	<i>hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	2
	<i>urticata</i> L., 1761	
	<i>PERINEPHELA</i> Hübner, 1825	
1803.	<i>lancealis</i> (D. & Sch., 1775)	2
	<i>PHLYCTAENIA</i> Hübner, 1825	
1804.	<i>coronata</i> (Hufnagel, 1767)	2
	<i>sambucalis</i> D. & Sch., 1775	
1805.	<i>perlucidalis</i> (Hübner, 1809)	695
1806.	<i>stachydalis</i> (Zincken, 1821)	2
	<i>MUTUURAI</i> Munroe, 1976	
1807.	<i>terrealis</i> (Treitschke, 1829)	2
	<i>ANANIA</i> Hübner, 1823	
1808.	<i>verbascalis</i> (D. & Sch., 1775)	695
	<i>PSAMMOTIS</i> Hübner, 1825	
1809.	<i>pulveralis</i> (Hübner, 1796)	2

<i>EBULEA</i> Doubleday, 1849			1834.	<i>catax</i> (Linnaeus, 1758)	1 *
1810.	<i>crocealis</i> (Hübner, 1796)	2	1835.	<i>rimicola</i> (D. & Sch., 1775)	1 X
<i>OPSIBOTYS</i> Warren, 1890			<i>MALACOSOMA</i> Hübner, 1820		
1811.	<i>fuscalis</i> (D. & Sch., 1775)	2	1836.	<i>neustria</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>UDEA</i> Guenée, 1845			1837.	<i>castrense</i> (Linnaeus, 1758)	1
1812.	<i>nebulalis</i> (Hübner, 1796)	2	<i>LASIOCAMPA</i> Schrank, 1802		
	<i>pratilis</i> Z., 1841		1838.	<i>trifolii</i> (D. & Sch., 1775)	1
1813.	<i>lutealis</i> (Hübner, 1809)	2	1839.	<i>quercus</i> (Linnaeus, 1758)	1
1814.	<i>fulvalis</i> (Hübner, 1809)	2	<i>MACROTHYLACIA</i> Rambur, 1866		
1815.	<i>prunalis</i> (D. & Sch., 1775)	2	1840.	<i>rubi</i> (Linnaeus, 1758)	1
	<i>nivealis</i> F., 1781		<i>DENDROLIMUS</i> Germar, 1812		
1816.	<i>inquinalis</i> (Lienig & Zeller, 1846)	67	1841.	<i>pini</i> (Linnaeus, 1758)	1
1817.	<i>decrepitalis</i> (H.-S., 1848)	2	<i>EUTHRIX</i> Meigen, 1830		
1818.	<i>alpinalis</i> (D. & Sch., 1775)	2	1842.	<i>potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	1
1819.	<i>elutalis</i> (D. & Sch., 1775)	2	<i>COSMOTRICHE</i> Hübner, 1820		
	<i>albidalis</i> Hb., 1796		1843.	<i>lobulina</i> (D. & Sch., 1775)	1
1820.	<i>olivalis</i> (D. & Sch., 1775)	2		<i>lunigera</i> Esp., 1783	
1821.	<i>hamalis</i> (Thunberg, 1788)	2	<i>PHYLLODESMA</i> Hübner, 1820		
	<i>nyctemeralis</i> Hb., 1809		1844.	<i>ilicifolium</i> (Linnaeus, 1758)	1
1822.	<i>ferrugalis</i> (Hübner, 1796)	2 M	1845.	<i>tremulifolium</i> (Hübner, 1810)	1
	<i>martialis</i> Gn., 1854		<i>GASTROPACHA</i> Ochsenheimer, 1810		
<i>MECYNA</i> Doubleday, 1849			1846.	<i>quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	1
1823.	<i>flavalis</i> (D. & Sch., 1775)	2	1847.	<i>populifolia</i> (D. & Sch., 1775)	1 *
<i>NOMOPHILA</i> Hübner, 1825			<i>ODONESTIS</i> Germar, 1812		
1824.	<i>noctuella</i> (D. & Sch., 1775)	2 M	1848.	<i>pruni</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>DOLICHARTHRIA</i> Stephens, 1834			B o m b y c o i d e a		
1825.	<i>punctalis</i> (D. & Sch., 1775)	2	Lemoniidae		
<i>DIASEMIA</i> Hübner, 1825			<i>LEMONIA</i> Hübner, 1820		
1826.	<i>reticularis</i> (Linnaeus, 1761)	2	1849.	<i>taraxaci</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>litterata</i> Sc., 1763		1850.	<i>dumi</i> (Linnaeus, 1761)	1
<i>PLEUROPTYA</i> Meyrick, 1890			Endromidae		
1827.	<i>ruralis</i> (Scopoli, 1763)	2	<i>ENDROMIS</i> Ochsenheimer, 1810		
	<i>verticalis</i> auct., nec L., 1758		1851.	<i>versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>PALPITA</i> Hübner, 1808			Sphingidae		
1828.	<i>unionalis</i> (Hübner, 1796)	112 M	Sphinginae		
<i>AGROTERA</i> Schrank, 1802			<i>AGRIUS</i> Hübner, 1819		
1829.	<i>nemoralis</i> (Scopoli, 1763)	2	1852.	<i>convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	1 M
	<i>erosalis</i> F., 1794		<i>ACHERONTIA</i> Laspeyrès, 1809		
Thyridoidea			1853.	<i>atropos</i> (Linnaeus, 1758)	1 M
Thyrididae			<i>SPHINX</i> Linnaeus, 1758		
<i>THYRIS</i> Laspeyrès, 1803			1854.	<i>ligustri</i> Linnaeus, 1758	1
1830.	<i>fenestrella</i> (Scopoli, 1763)	1	1855.	<i>pinastri</i> Linnaeus, 1758	1
Lasiocampoidea			<i>MIMAS</i> Hübner, 1819		
Lasiocampidae			1856.	<i>tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>POECILOCAMPA</i> Stephens, 1828			<i>SMERINTHUS</i> Latreille, 1802		
1831.	<i>populi</i> (Linnaeus, 1758)	1	1857.	<i>ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>TRICHIURA</i> Stephens, 1828			<i>LAOTHOE</i> Fabricius, 1807		
1832.	<i>crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	1	1858.	<i>populi</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>ERIOGASTER</i> Germar, 1810					
1833.	<i>lanestris</i> (Linnaeus, 1758)	1			

Macroglossinae		
<i>HEMARIS</i> Dalman, 1816		
1859.	<i>tityus</i> (Linnaeus, 1758)	1
1860.	<i>fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>MACROGLOSSUM</i> Scopoli, 1777		
1861.	<i>stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	1 M
<i>PROSERPINUS</i> Hübner, 1819		
1862.	<i>proserpina</i> (Pallas, 1772)	1
<i>DAPHNIS</i> Hübner, 1819		
1863.	<i>nerii</i> (Linnaeus, 1758)	1 * M
<i>HYLES</i> Hübner, 1819		
1864.	<i>euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	1
1865.	<i>gallii</i> (Rottemburg, 1775)	1
1866.	<i>livornica</i> (Esper, 1780)	1 M
	<i>lineata</i> auct., nec F., 1775	
<i>DEILEPHILA</i> Laspeyres, 1809		
1867.	<i>elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	1
1868.	<i>porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>HIPPOTION</i> Hübner, 1819		
1869.	<i>celerio</i> (Linnaeus, 1758)	1 * M
Saturniidae		
<i>AGLIA</i> Ochsenheimer, 1810		
1870.	<i>tau</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>SATURNIA</i> Schrank, 1802		
1871.	<i>pyri</i> (D. & Sch., 1775)	1 ? I
1872.	<i>pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	1
Hesperioidea		
Hesperidae		
<i>ERYNNIS</i> Schrank, 1801		
1873.	<i>tages</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>CARCHARODUS</i> Hübner, 1819		
1874.	<i>alceae</i> (Esper, 1780)	1
<i>SPIALIA</i> Swinhoe, 1912		
1875.	<i>sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	1
	<i>sao</i> Hb., 1803, nec Brgstr., 1779	
<i>PYRGUS</i> Hübner, 1819		
1876.	<i>malvae</i> (Linnaeus, 1758)	1
1877.	<i>armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	433
1878.	<i>alveus</i> (Hübner, 1803)	1
1879.	<i>serratulae</i> (Rambur, 1839)	1
1880.	<i>carthami</i> (Hübner, 1813)	1
	<i>fritillarius</i> Poda, 1761	
<i>CARTEROCEPHALUS</i> Lederer, 1852		
1881.	<i>palaemon</i> (Pallas, 1771)	1
1882.	<i>silvicolus</i> (Meigen, 1829)	454 * K I
<i>HETEROPTERUS</i> Duméril, 1806		
1883.	<i>morpheus</i> (Pallas, 1771)	(1) 423
<i>THYMELICUS</i> Hübner, 1819		
1884.	<i>sylvestris</i> (Poda, 1761)	1
1885.	<i>lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	1
1886.	<i>acteon</i> (Rottemburg, 1775)	1

<i>HESPERIA</i> Fabricius, 1793		
1887.	<i>comma</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>OCHLODES</i> Scudder, 1872		
1888.	<i>venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	1
Papilionoidea		
Papilionidae		
Parnassiinae		
<i>ZERYNTHIA</i> Ochsenheimer, 1816		
1889.	<i>polyxena</i> (D. & Sch., 1775)	836 I
	<i>hyppisyle</i> F., 1777	
<i>PARNASSIUS</i> Latreille, 1804		
1890.	<i>apollo</i> (Linnaeus, 1758)	1 K X
1891.	<i>mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	1 K P
Papilioninae		
<i>IPHICLIDES</i> Hübner, 1819		
1892.	<i>podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>PAPILIO</i> Linnaeus, 1758		
1893.	<i>machaon</i> Linnaeus, 1758	1
Pieridae		
Dismorphiinae		
<i>LEPTIDEA</i> Billberg, 1820		
1894.	<i>sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	1
1895.	<i>reali</i> Reissinger, 1989	825 K
Pierinae		
<i>APORIA</i> Hübner, 1819		
1896.	<i>crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	1 M
<i>PIERIS</i> Schrank, 1801		
1897.	<i>brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	1
1898.	<i>rapae</i> (Linnaeus, 1758)	1
1899.	<i>napi</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>PONTIA</i> Fabricius, 1807		
1900.	<i>daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	1 M
<i>ANTHOCHARIS</i> Boisduval, Rambur, Duméril & Graslin, 1833		
1901.	<i>cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	1
Coliadinae		
<i>COLIAS</i> Fabricius, 1807		
1902.	<i>palaeno</i> (Linnaeus, 1761)	1
1903.	<i>hyale</i> (Linnaeus, 1758)	1
1904.	<i>alfacariensis</i> Ribbe, 1905	448
	<i>australis</i> Verity, 1911	
1905.	<i>chrysotheme</i> (Esper, 1781)	1 X
1906.	<i>myrmidone</i> (Esper, 1781)	1 M
1907.	<i>crocea</i> (Fourcroy, 1785)	1 M
	<i>edusa</i> F., 1787	
1908.	<i>erate</i> (Esper, 1805)	330 K

<i>GONEPTERYX</i> Leach, 1815			<i>BRENTHIS</i> Hübner, 1819		
1909.	<i>rhanni</i> (Linnaeus, 1758)	1	1933.	<i>ino</i> (Rottemburg, 1775)	1
Nymphalidae			<i>BOLORIA</i> Moore, 1900		
Apaturinae			1934.	<i>sylene</i> (D. & Sch., 1775)	1
<i>APATURA</i> Fabricius, 1807			<i>euphrasia</i> Lew., 1795		
1910.	<i>iris</i> (Linnaeus, 1758)	1	1935.	<i>euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	1
1911.	<i>ilia</i> (D. & Sch., 1775)	1	1936.	<i>dia</i> (Linnaeus, 1767)	1
Limenitinae			1937.	<i>aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	1 K
<i>LIMENITIS</i> Fabricius, 1807			<i>arsilache</i> Knoch, 1781, nec Esp., 1780		
1912.	<i>populi</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>pales</i> auct., nec D. & Sch., 1775		
1913.	<i>camilla</i> (Linnaeus, 1764)	1	<i>PROCLOSSIANA</i> Reuss, 1926		
<i>sibilla</i> L., 1769			1938.	<i>eunomia</i> (Esper, 1799)	61
<i>NEPTIS</i> Fabricius, 1807			<i>aphirape</i> Hb., 1800		
1914.	<i>sappho</i> (Pallas, 1771)	1 X	Melitaeinae		
<i>aceris</i> Esp., 1783			<i>MELITAEA</i> Fabricius, 1807		
1915.	<i>rivularis</i> (Scopoli, 1763)	1	1939.	<i>cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>lucilla</i> D. & Sch., 1775			1940.	<i>phoebe</i> (D. & Sch., 1775)	1 *
<i>coenobita</i> Stoll., 1796			1941.	<i>didyma</i> (Esper, 1779)	1
Nymphalinae			1942.	<i>diamina</i> (Lang, 1789)	1
<i>NYMPHALIS</i> Kluk, 1780			<i>dictynna</i> Esp., 1779, nec D. & Sch., 1775		
1916.	<i>polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	1	1943.	<i>athalia</i> (Rottemburg, 1775)	1 K
1917.	<i>xanthomelas</i> (D. & Sch., 1775)	1 X	<i>neglecta</i> Pfau, 1962		
1918.	<i>vaualbum</i> (D. & Sch., 1775)	415 * M	1944.	<i>aurelia</i> Nickerl, 1850	1
<i>l-album</i> Esp., 1781			<i>parthenie</i> auct., nec Brgstr., 1780		
1919.	<i>antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>EUPHYDRYAS</i> Scudder, 1872		
<i>INACHIS</i> Hübner, 1819			1945.	<i>matura</i> (Linnaeus, 1758)	1 K
1920.	<i>io</i> (Linnaeus, 1758)	1	1946.	<i>aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	1 K
<i>AGLAIS</i> Dalman, 1816			Satyridae		
1921.	<i>urticae</i> (Linnaeus, 1758)	1	Melanargiinae		
<i>VANESSA</i> Fabricius, 1807			<i>MELANARGIA</i> Meigen, 1828		
1922.	<i>atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	1 M	1947.	<i>galathea</i> (Linnaeus, 1758)	1
1923.	<i>cardui</i> (Linnaeus, 1758)	1 M	Satyrinae		
<i>POLYGONIA</i> Hübner, 1819			<i>HIPPARCHIA</i> Fabricius, 1807		
1924.	<i>c-album</i> (Linnaeus, 1758)	1	1948.	<i>fagi</i> (Scopoli, 1763)	1 *
<i>ARASCHNIA</i> Hübner, 1819			<i>hermione</i> L., 1764		
1925.	<i>levana</i> (Linnaeus, 1758)	1	1949.	<i>alcyone</i> (D. & Sch., 1775)	1
Argynninae			1950.	<i>semele</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>ARGYNNIS</i> Fabricius, 1807			1951.	<i>statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	1 X
1926.	<i>paphia</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>CHAZARA</i> Moore, 1893		
1927.	<i>pandora</i> (D. & Sch., 1775)	597 * M	1952.	<i>briseis</i> (Linnaeus, 1764)	1
<i>maja</i> Cramer, 1775			<i>MINOIS</i> Hübner, 1819		
1928.	<i>laodice</i> (Pallas, 1771)	N I	1953.	<i>dryas</i> (Scopoli, 1763)	1
1929.	<i>aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>BRINTESIA</i> Fruhstorfer, 1911		
1930.	<i>adippe</i> (D. & Sch., 1775)	1	1954.	<i>circe</i> (Fabricius, 1775)	1
<i>phryxa</i> Brgstr., 1780			<i>EREBIA</i> Dalman, 1816		
1931.	<i>niobe</i> (Linnaeus, 1758)	1	1955.	<i>ligea</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>ISSORIA</i> Hübner, 1819			1956.	<i>euryale</i> (Esper, 1805)	1
1932.	<i>lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	1 M	1957.	<i>epiphron</i> (Knoch, 1783)	682 K I

1958.	<i>aethiops</i> (Esper, 1777)	1			<i>SATYRIUM</i> Scudder, 1876	
1959.	<i>medusa</i> (D. & Sch., 1775)	1			1983. <i>pruni</i> (Linnaeus, 1758)	1
	<i>MANIOLA</i> Schrank, 1801				1984. <i>w-album</i> (Knoch, 1782)	1
1960.	<i>jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	1			1985. <i>spini</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>HYPONEPHELE</i> Muschamp, 1915				1986. <i>ilicis</i> (Esper, 1779)	1
1961.	<i>lycaon</i> (Kühn, 1774)	1			1987. <i>acaciae</i> (Fabricius, 1787)	1
	<i>APHANTOPUS</i> Wallengren, 1853				<i>CALLOPHRYS</i> Billberg, 1820	
1962.	<i>hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	1			1988. <i>rubi</i> (Linnaeus, 1758)	1
Coenonymphinae						
	<i>COENONYMPHA</i> Hübner, 1819				Polyommatainae	
1963.	<i>pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	1			<i>LAMPIDES</i> Hübner, 1819	
1964.	<i>tullia</i> (Müller, 1764)	1			1989. <i>boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	1 * M
	<i>tiphon</i> Rott., 1775				<i>CUPIDO</i> Schrank, 1801	
1965.	<i>hero</i> (Linnaeus, 1761)	1 X			1990. <i>minimus</i> (Fuessly, 1775)	1
1966.	<i>arcania</i> (Linnaeus, 1761)	1			1991. <i>argiades</i> (Pallas, 1771)	1
	<i>amyntas</i> Poda, 1761				<i>CELASTRINA</i> Tutt, 1906	
1967.	<i>glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	1			1992. <i>argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	1
	<i>iphis</i> auct., nec Dr., 1773				<i>PSEUDOPHILOTES</i> Beuret, 1958	
Pararginae						
	<i>PARARGE</i> Hübner, 1819				1993. <i>baton</i> (Bergsträsser, 1779)	1 K
1968.	<i>aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	1			1994. <i>vicrama</i> (Moore, 1865)	(1) 330 K
	<i>LASIOMMATA</i> Westwood, 1841				<i>SCOLITANTIDES</i> Hübner, 1819	
1969.	<i>megea</i> (Linnaeus, 1767)	1			1995. <i>orion</i> (Pallas, 1771)	1
1970.	<i>maera</i> (Linnaeus, 1758)	1			<i>GLAUCOPSYCHE</i> Scudder, 1872	
	<i>LOPINGA</i> Moore, 1893				1996. <i>alexis</i> (Poda, 1761)	1
1971.	<i>achine</i> (Scopoli, 1763)	1			<i>cyllarus</i> Rott., 1775	
Riodinidae						
	<i>HAMEARIS</i> Hübner, 1819				<i>MACULINEA</i> van Eecke, 1915	
1972.	<i>lucina</i> (Linnaeus, 1758)	1			1997. <i>alcon</i> (D. & Sch., 1775)	1 K
Lycaenidae						
	Lycaeninae				1998. <i>rebeli</i> (Hirschke, 1904)	330 K
	<i>LYCAENA</i> Fabricius, 1807				1999. <i>arion</i> (Linnaeus, 1758)	1
1973.	<i>helle</i> (D. & Sch., 1775)	(1) K X			2000. <i>teleius</i> (Bergsträsser, 1779)	1
	<i>amphidamas</i> Esp., 1780				<i>euphemus</i> Hb., 1800	
1974.	<i>phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	1 M			2001. <i>nausithous</i> (Bergsträsser, 1779)	1
1975.	<i>dispar</i> (Haworth, 1803)	(1) 14 K X			<i>arcas</i> Rott., 1775, nec Dr., 1773	
1976.	<i>virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)	1			<i>PLEBEJUS</i> Kluk, 1780	
1977.	<i>tityrus</i> (Poda, 1761)	1			2002. <i>argus</i> (Linnaeus, 1758)	1
	<i>dorylas</i> Rott., 1775				2003. <i>idas</i> (Linnaeus, 1761)	21 K
1978.	<i>alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	1			2004. <i>argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	1
1979.	<i>hippothoe</i> (Linnaeus, 1761)	1			<i>ismenias</i> Mg., 1830, nec Hfmsg., 1804	
1980.	<i>thersamon</i> (Esper, 1784)	1 K X			<i>ARICIA</i> Reichenbach, 1817	
Theclinae						
	<i>THECLA</i> Fabricius, 1807				2005. <i>agestis</i> (D. & Sch., 1775)	1 K
1981.	<i>betulae</i> (Linnaeus, 1758)	1			<i>astrarche</i> Brgstr., 1779	
	<i>QUERCUSIA</i> Verity, 1943	K			<i>alexis</i> Rott., 1775	
1982.	<i>quercus</i> (Linnaeus, 1758)	1			2006. <i>artaxerxes</i> (Fabricius, 1793)	(1) K
					<i>allous</i> G., 1837	
					<i>EUMEDONIA</i> Forster, 1938	
					2007. <i>eumedon</i> (Esper, 1780)	1
					<i>chiron</i> Rott., 1775, nec F., 1775	
					<i>VACCINIINA</i> Tutt, 1909	
					2008. <i>optilete</i> (Knoch, 1781)	1
					<i>CYANIRIS</i> Dalman, 1816	
					2009. <i>semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	1

	<i>POLYOMMATUS</i> Latreille, 1804	
2010.	<i>damon</i> (D. & Sch., 1775)	1
2011.	<i>dorylas</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>argester</i> Brgrstr., 1779	
	<i>hylas</i> Esp., 1778	
2012.	<i>amandus</i> (Schneider, 1792)	1
2013.	<i>thersites</i> (Cantener, 1834)	1
2014.	<i>icarus</i> (Rottemburg, 1775)	1
2015.	<i>coridon</i> (Poda, 1761)	1
2016.	<i>bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	1
	<i>MELEAGERIA</i> De Sagarra, 1925	
2017.	<i>daphnis</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>meleager</i> Esp., 1779	

Drepanoidea

Drepanidae

Drepaninae

	<i>CILIX</i> Leach, 1815	
2018.	<i>glaucatus</i> (Scopoli, 1763)	1
	<i>FALCARIA</i> Haworth, 1809	
2019.	<i>lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)	1
	<i>DREPANA</i> Schrank, 1802	
2020.	<i>falcatoria</i> (Linnaeus, 1758)	1
2021.	<i>curvatula</i> (Borkhausen, 1790)	1 P
	<i>SABRA</i> Bode, 1907	
2022.	<i>harpagula</i> (Esper, 1786)	1
	<i>WATSONALLA</i> Minet, 1985	
2023.	<i>binaria</i> (Hufnagel, 1767)	1
2024.	<i>cultraria</i> (Fabricius, 1775)	1

Thyatirinae

	<i>THYATIRA</i> Ochseneheimer, 1816	
2025.	<i>batis</i> (Linnaeus, 1758)	1
	<i>HABROSYNE</i> Hübner, 1821	
2026.	<i>pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	1
	<i>derasa</i> L., 1767	
	<i>TETHEA</i> Ochseneheimer, 1816	
2027.	<i>ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	1
	<i>octogesimea</i> Hb., 1786	
2028.	<i>or</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>TETHEELLA</i> Werny, 1966	
2029.	<i>fluctuosa</i> (Hübner, 1803)	1
	<i>OCHROPACHA</i> Wallengren, 1871	
2030.	<i>duplaris</i> (Linnaeus, 1761)	1
	<i>ACHLYA</i> Billberg, 1820	
2031.	<i>flavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	1
	<i>POLYPLOCA</i> Hübner, 1821	
2032.	<i>ridens</i> (Fabricius, 1787)	1

Geometroidea

Geometridae

Archiearinae

ARCHIEARIS Hübner, 1823

2033.	<i>parthenias</i> (Linnaeus, 1761)	1
2034.	<i>notha</i> (Hübner, 1803)	1
2035.	<i>puella</i> (Esper, 1787)	1

Oenochrominae

ALSOPHILA Hübner, 1825

2036.	<i>aescularia</i> (D. & Sch., 1775)	1
2037.	<i>aceraria</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>quadripunctaria</i> Esp., 1800	

Geometrinae

APLASTA Hübner, 1823

2038.	<i>ononaria</i> (Fuessly, 1783)	288
-------	---------------------------------	-----

PSEUDOTERPNA Hübner, 1823

2039.	<i>pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	1
-------	----------------------------------	---

GEOMETRA Linnaeus, 1758

2040.	<i>papilionaria</i> (Linnaeus, 1758)	1
-------	--------------------------------------	---

COMIBAENA Hübner, 1823

2041.	<i>bajularia</i> (D. & Sch., 1775)	1
-------	------------------------------------	---

pustulata Hfn., 1767, nec Müll., 1764

THETIDIA Boisduval, 1840

2042.	<i>smaragdaria</i> (Fabricius, 1787)	1
-------	--------------------------------------	---

HEMITHEA Duponchel, 1829

2043.	<i>aestivaria</i> (Hübner, 1799)	1
-------	----------------------------------	---

strigata Müll., 1764, nec Sc., 1763

CHLORISSA Stephens, 1831

2044.	<i>viridata</i> (Linnaeus, 1758)	1
-------	----------------------------------	---

2045.	<i>cloraria</i> (Hübner, 1813)	1
-------	--------------------------------	---

porrinata Z., 1848

THALERA Hübner, 1823

2046.	<i>fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	1
-------	-----------------------------------	---

HEMISTOLA Warren, 1893

2047.	<i>chrysoprasaria</i> (Esper, 1794)	1
-------	-------------------------------------	---

immaculata auct., nec Thbg., 1784

biliolata auct., nec Vill., 1789

JODIS Hübner, 1823

2048.	<i>lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	1
-------	-----------------------------------	---

2049.	<i>putata</i> (Linnaeus, 1758)	1
-------	--------------------------------	---

Sterrhinae

CYCLOPHORA Hübner, 1822

2050.	<i>pendularia</i> (Clerck, 1759)	211 K
-------	----------------------------------	-------

orbicularia Hb., 1799

2051.	<i>albiocellaria</i> (Hübner, 1789)	1
-------	-------------------------------------	---

lenigiaria Fuchs, 1883

2052.	<i>annularia</i> (Fabricius, 1775)	1
-------	------------------------------------	---

annulata Schz., 1775

2053.	<i>albipunctata</i> (Hufnagel, 1767)	1
-------	--------------------------------------	---

pendularia auct., nec Cl. 1759

2054.	<i>quercimontaria</i> (Bastelberger, 1897)	1	2087.	<i>seriata</i> (Schrank, 1802)	1
2055.	<i>porata</i> (Linnaeus, 1767)	1		<i>incanata</i> D. & Sch., 1775, nec L., 1758	
2056.	<i>punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	1		<i>virgularia</i> sensu Hb., 1799	
2057.	<i>linearia</i> (Hübner, 1799)	1	2088.	<i>sylvestraria</i> (Hübner, 1799)	1
	<i>TIMANDRA</i> Duponchel, 1829			<i>straminata</i> Tr., 1835, nec Bkh., 1794	
2058.	<i>comae</i> Schmidt, 1931	1 K	2089.	<i>biselata</i> (Hufnagel, 1767)	1
	<i>griseata</i> auct., nec W. Pet., 1902			<i>bisetata</i> Rott. 1777	
	<i>amata</i> auct., nec L., 1758		2090.	<i>rusticata</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>SCOPULA</i> Schrank, 1802			<i>vulpinaria</i> H.-S., 1851	
2059.	<i>immorata</i> (Linnaeus, 1758)	1	2091.	<i>emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	1
2060.	<i>nemoraria</i> (Hübner, 1799)	1	2092.	<i>pallidata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2061.	<i>umbelaria</i> (Hübner, 1813)	1	2093.	<i>nitidata</i> (H.-S., 1861)	N
2062.	<i>nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)	1	2094.	<i>aversata</i> (Linnaeus, 1758)	1
	<i>strigilaria</i> Hb., 1799		2095.	<i>straminata</i> (Borkhausen, 1794)	1
2063.	<i>virgulata</i> (D. & Sch., 1775)	288 K		<i>inornata</i> Hw., 1810	
	<i>strigaria</i> Hb., 1799		2096.	<i>deversaria</i> (H.-S., 1847)	1
2064.	<i>ornata</i> (Scopoli, 1763)	1	2097.	<i>moniliata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2065.	<i>decorata</i> (D. & Sch., 1775)	1		<i>RHODOSTROPHIA</i> Hübner, 1823	
	<i>violata</i> Thbg., 1784		2098.	<i>vibicaria</i> (Clerck, 1759)	1
2066.	<i>rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	1		<i>RHODOMETRA</i> Meyrick, 1892	
2067.	<i>marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	1	2099.	<i>sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	481 M
2068.	<i>flaccidaria</i> (Zeller, 1852)	372			
2069.	<i>incanata</i> (Linnaeus, 1758)	1		Larentiinae	
2070.	<i>corrivalaria</i> (Kretschmar, 1862)	895		<i>LYTHRIA</i> Hübner, 1823	
2071.	<i>immutata</i> (Linnaeus, 1758)	1	2100.	<i>purpuraria</i> (Linnaeus, 1758)	1
2072.	<i>ternata</i> Schrank, 1802	1	2101.	<i>cruentaria</i> (Hufnagel, 1767)	1
	<i>fumata</i> Sph., 1831			<i>rotaria</i> F., 1798	
2073.	<i>floslactata</i> (Haworth, 1809)	1		<i>purpurata</i> auct., nec L., 1758	
	<i>remutaria</i> sensu Hb., 1799, nec <i>remutata</i> L., 1758			<i>CATACLYSME</i> Hübner, 1825	
2074.	<i>subpunctaria</i> (H.-S., 1847)	845	2102.	<i>riguata</i> (Hübner, 1813)	1
	<i>punctata</i> Sc., 1763, nec Cl., 1759			<i>PHIBALAPTERYX</i> Stephens, 1829	
	<i>IDAEA</i> Treitschke, 1825		2103.	<i>virgata</i> (Hufnagel, 1767)	1
2075.	<i>muricata</i> (Hufnagel, 1767)	1		<i>SCOTOPTERYX</i> Hübner, 1825	
2076.	<i>dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	1	2104.	<i>moeniata</i> (Scopoli, 1763)	1
2077.	<i>aureolaria</i> (D. & Sch., 1775)	1	2105.	<i>bipunctaria</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>trilineata</i> Sc., 1772, nec Hfn., 1767		2106.	<i>chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	1
2078.	<i>contiguaria</i> (Hübner, 1799)	1		<i>limitata</i> Sc., 1763	
	<i>eburnata</i> Wck., 1850		2107.	<i>mucronata</i> (Scopoli, 1763)	1 K
2079.	<i>serpentata</i> (Hufnagel, 1767)	1	2108.	<i>luridata</i> (Hufnagel, 1767)	1 K
	<i>trifasciata</i> Sc., 1772			<i>plumbaria</i> F., 1775	
	<i>similata</i> Thbg., 1784			<i>ORTHONAMA</i> Hübner, 1825	
2080.	<i>rufaria</i> (Hübner, 1799)	1	2109.	<i>vittata</i> (Borkhausen, 1794)	1
2081.	<i>ochrata</i> (Scopoli, 1763)	1		<i>lignata</i> Hb., 1799	
2082.	<i>laevigata</i> (Scopoli, 1763)	1	2110.	<i>obstipata</i> (Fabricius, 1794)	1 M
2083.	<i>dilutaria</i> (Hübner, 1799)	1		<i>fluviata</i> Hb., 1799	
	<i>interjectaria</i> Bsd., 1840			<i>XANTHORHOE</i> Hübner, 1825	
2084.	<i>fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)	1	2111.	<i>biriviata</i> (Borkhausen, 1794)	1
2085.	<i>humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	1		<i>pomoeraria</i> Ev., 1844	
	<i>osseata</i> D. & Sch., 1775		2112.	<i>designata</i> (Hufnagel, 1767)	1
2086.	<i>inquinata</i> (Scopoli, 1763)	1	2113.	<i>spadicearia</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>herbariata</i> F., 1798		2114.	<i>ferrugata</i> (Clerck, 1759)	1
	<i>pusillaria</i> Hb., 1799			<i>unidentaria</i> Hw., 1809	

2115.	<i>quadrifasciata</i> (Clerck, 1759)	1		<i>ECLIPTOPERA</i> Warren, 1894	
2116.	<i>montanata</i> (D. & Sch., 1775)	1	2146.	<i>silaceata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2117.	<i>fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	1	2147.	<i>capitata</i> (H.-S., 1839)	1
2118.	<i>incursata</i> (Hübner, 1813)	1		<i>CHLOROCLYSTA</i> Hübner, 1825	
	<i>CATARHOE</i> Herbulot, 1951		2148.	<i>siterata</i> (Hufnagel, 1767)	1
2119.	<i>rubidata</i> (D. & Sch., 1775)	1	2149.	<i>miata</i> (Linnaeus, 1758)	1
2120.	<i>cuculata</i> (Hufnagel, 1767)	1	2150.	<i>citrata</i> (Linnaeus, 1761)	1
	<i>EPIRRHOE</i> Hübner, 1825			<i>immanata</i> Hw., 1809	
2121.	<i>hastulata</i> (Hübner, 1790)	1	2151.	<i>truncata</i> (Hufnagel, 1767)	1
	<i>luctuata</i> Hb., 1799, nec D. & Sch., 1775		2152.	<i>infuscata</i> (Tengström, 1869)	296
2122.	<i>tristata</i> (Linnaeus, 1758)	1		<i>CIDARIA</i> Treitschke, 1825	
2123.	<i>alternata</i> (Müller, 1764)	1	2153.	<i>fulvata</i> (Forster, 1771)	1
	<i>sociata</i> Bkh., 1794			<i>PLEMYRIA</i> Hübner, 1825	
2124.	<i>rivata</i> (Hübner, 1813)	1	2154.	<i>rubiginata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2125.	<i>molluginata</i> (Hübner, 1813)	1		<i>bicolorata</i> Hfn., 1767, nec Hfn., 1766	
2126.	<i>galiata</i> (D. & Sch., 1775)	1		<i>THERA</i> Stephens, 1831	
	<i>COSTACONVEXA</i> Agenjo, 1949		2155.	<i>firmata</i> (Hübner, 1822)	1
2127.	<i>polygrammata</i> (Borkhausen, 1794)	271	2156.	<i>obeliscata</i> (Hübner, 1787)	1 K
	<i>CAMPTOGRAMMA</i> Stephens, 1831		2157.	<i>variata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2128.	<i>bilineatum</i> (Linnaeus, 1758)	1	2158.	<i>britannica</i> (Turner, 1925)	288
	<i>ENTEPHRIA</i> Hübner, 1825			<i>albonigrata</i> Gornik, 1942	
2129.	<i>flavicinctata</i> (Hübner, 1813)	1	2159.	<i>vetustata</i> (D. & Sch., 1775)	1 K
2130.	<i>infidaria</i> (La Harpe, 1853)	1		<i>stragulata</i> Hb., 1809	
2131.	<i>caesiata</i> (D. & Sch., 1775)	1	2160.	<i>cognata</i> (Thunberg, 1792)	938
	<i>LARENTIA</i> Treitschke, 1825		2161.	<i>juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	1
2132.	<i>clavaria</i> (Haworth, 1809)	1		<i>EUSTROMA</i> Hübner, 1825	
	<i>cervinata</i> auct., nec D. & Sch., 1775		2162.	<i>reticulatum</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>ANTICLEA</i> Stephens, 1831			<i>ELECTROPHAES</i> Prout, 1923	
2133.	<i>badiata</i> (D. & Sch., 1775)	1	2163.	<i>corylata</i> (Thunberg, 1792)	1
2134.	<i>derivata</i> (D. & Sch., 1775)	1		<i>COLOSTYGiA</i> Hübner, 1825	
	<i>nigrofasciata</i> Gz., 1781		2164.	<i>aptata</i> (Hübner, 1813)	1
	<i>MESOLEUCA</i> Hübner, 1825		2165.	<i>olivata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2135.	<i>albicillata</i> (Linnaeus, 1758)	1	2166.	<i>pectinataria</i> (Knoch, 1781)	1
	<i>PELURGA</i> Hübner, 1825			<i>viridaria</i> F., 1775, nec Cl., 1759	
2136.	<i>comitata</i> (Linnaeus, 1758)	1		<i>HYDRIOMENA</i> Hübner, 1825	
	<i>LAMPROPTERYX</i> Stephens, 1831		2167.	<i>furcata</i> (Thunberg, 1784)	1
2137.	<i>suffumata</i> (D. & Sch., 1775)	1		<i>sordidata</i> F., 1794	
2138.	<i>otregiata</i> (Metcalf, 1917)	508	2168.	<i>impluviata</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>COSMORHOE</i> Hübner, 1825			<i>coerulata</i> F., 1777	
2139.	<i>ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	1		<i>autumnalis</i> Ström, 1783	
	<i>NEBULA</i> Bruand, 1846		2169.	<i>ruberata</i> (Freyer, 1831)	1
2140.	<i>salicata</i> (D. & Sch., 1775)	1		<i>COENOCALPE</i> Hübner, 1825	
	<i>EULITHIS</i> Hübner, 1821		2170.	<i>lapidata</i> (Hübner, 1809)	1
2141.	<i>prunata</i> (Linnaeus, 1758)	1		<i>HORISME</i> Hübner, 1825	
2142.	<i>testata</i> (Linnaeus, 1761)	1	2171.	<i>aquata</i> (Hübner, 1813)	1
2143.	<i>populata</i> (Linnaeus, 1758)	1	2172.	<i>vitalbata</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>dotata</i> L., 1758		2173.	<i>tersata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2144.	<i>mellinata</i> (Fabricius, 1787)	1	2174.	<i>radicaria</i> (La Harpe, 1855)	292
	<i>associata</i> Bkh., 1794			<i>laurinata</i> Schaw., 1919	
2145.	<i>pyraliata</i> (D. & Sch., 1775)	1	2175.	<i>corticata</i> (Treitschke, 1835)	1
	<i>dotata</i> Stgr., 1871, nec L., 1758			<i>MELANTHIA</i> Duponchel, 1829	
			2176.	<i>procellata</i> (D. & Sch., 1775)	1

<i>PAREULYPE</i> Herbulot, 1951		
2177.	<i>berberata</i> (D. & Sch., 1775)	1
<i>SPARGANIA</i> Guenée, 1857		
2178.	<i>luctuata</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>lugubrata</i> Stgr., 1871	
<i>RHEUMAPTERA</i> Hübner, 1822		
2179.	<i>hastata</i> (Linnaeus, 1758)	1
2180.	<i>subhastata</i> (Nolcken, 1870)	1 K
2181.	<i>cervinalis</i> (Scopoli, 1763)	1
	<i>cervinata</i> Hb., 1799, nec D. & Sch., 1775	
	<i>certata</i> Hb., 1825	
2182.	<i>undulata</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>TRIPHOSA</i> Stephens, 1829		
2183.	<i>dubitata</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>PHILEREME</i> Hübner, 1825		
2184.	<i>vetulata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2185.	<i>transversata</i> (Hufnagel, 1767)	1
	<i>rhamnata</i> D. & Sch., 1775	
<i>EUPHYIA</i> Hübner, 1825		
2186.	<i>biangulata</i> (Haworth, 1809)	1
	<i>picata</i> Hb., 1813	
2187.	<i>unangulata</i> (Haworth, 1809)	1
2189.	<i>frustata</i> (Treitschke, 1828)	1
<i>EPIRRITA</i> Hübner, 1822		
2189.	<i>dilutata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2190.	<i>christyi</i> (Allen, 1906)	419
2191.	<i>autumnata</i> (Borkhausen, 1794)	1
<i>OPEROPHTERA</i> Hübner, 1825		
2192.	<i>brumata</i> (Linnaeus, 1758)	1
2193.	<i>fagata</i> (Scharfenberg, 1805)	1
	<i>boreata</i> Hb., 1813	
<i>PERIZOMA</i> Hübner, 1825		
2194.	<i>taeniatum</i> (Stephens, 1831)	1
2195.	<i>affinitatum</i> (Stephens, 1831)	1
2196.	<i>alchemillatum</i> (Linnaeus, 1758)	1
2197.	<i>hydratum</i> (Treitschke, 1829)	1
2198.	<i>lugdunarium</i> (H.-S., 1855)	977
2199.	<i>bifaciatum</i> (Haworth, 1809)	1
	<i>unifasciatum</i> Hw., 1809	
2200.	<i>minoratum</i> (Treitschke, 1828)	1
2201.	<i>blandiatum</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>adaequatum</i> Bkh., 1794	
2202.	<i>albulatum</i> (D. & Sch., 1775)	1
2203.	<i>flavofasciatum</i> (Thunberg, 1792)	1
	<i>decoloratum</i> Hb., 1799	
2204.	<i>didymatum</i> (Linnaeus, 1758)	1
2205.	<i>obsoletarium</i> (H.-S., 1838)	218
2206.	<i>sagittatum</i> (Fabricius, 1787)	214
2207.	<i>verberatum</i> (Scopoli, 1763)	1
2208.	<i>parallelolineatum</i> (Retzius, 1783)	1
	<i>vespertarium</i> Bkh., 1794	

<i>EUPITHECIA</i> Curtis, 1825		
2209.	<i>haworthiata</i> Doubleday, 1856	1
	<i>isogrammaria</i> H.-S., 1858	
2210.	<i>abietaria</i> (Goeze, 1781)	1
	<i>pini</i> Retz., 1783	
	<i>togata</i> Hb., 1817	
2211.	<i>europaea</i> Lempke, 1969	1
	<i>bilunulata</i> auct., nec Zett., 1839	
	<i>strobilata</i> auct., nec Bkh., 1794	
2212.	<i>linariata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2213.	<i>pyreneata</i> Mabilille, 1871	1
2214.	<i>laquaearia</i> H.-S., 1848	1
2215.	<i>venosata</i> (Fabricius, 1787)	1
2216.	<i>tenuiata</i> (Hübner, 1813)	1
2217.	<i>inturbata</i> (Hübner, 1817)	1
2218.	<i>pusillata</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>sobrinata</i> Hb., 1817	
2219.	<i>abbreviata</i> Stephens, 1831	305
2220.	<i>dodoneata</i> Guenée, 1857	1
2221.	<i>virgaureata</i> Doubleday, 1861	1
2222.	<i>tripunctaria</i> H.-S., 1852	1
	<i>albipunctata</i> Hw., 1809, nec Hfn., 1767	
2223.	<i>lariciata</i> (Freyer, 1842)	1
2224.	<i>tantillaria</i> Boisduval, 1840	1
	<i>pusillata</i> auct., nec D. & Sch., 1775	
2225.	<i>conterminata</i> (Lienig & Zeller, 1846)	1 *
2226.	<i>lanceata</i> (Hübner, 1825)	1
2227.	<i>sinuosaria</i> (Eversmann, 1848)	527
2228.	<i>selinata</i> H.-S., 1861	31
2229.	<i>egenaria</i> H.-S., 1848	979
2230.	<i>silenata</i> Standfuss, 1848	1
2231.	<i>actaeata</i> Walderdorff, 1869	1
2232.	<i>pimpinellata</i> (Hübner, 1813)	1
2233.	<i>pauzellaria</i> Boisduval, 1840	288
	<i>euphrasiata</i> H.-S., 1861	
2234.	<i>denotata</i> (Hübner, 1813)	1
2235.	<i>plumbeolata</i> (Haworth, 1809)	1
2236.	<i>gelidata</i> Möschler, 1860	212
2237.	<i>nanata</i> (Hübner, 1813)	1
2238.	<i>innodata</i> (Hufnagel, 1767)	1
	<i>fraxinata</i> Grewe, 1863	
2239.	<i>distinctaria</i> H.-S., 1848	1
2240.	<i>simpliciata</i> (Haworth, 1809)	1
	<i>subnotata</i> Hb., 1813	
2241.	<i>centaureata</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>oblongata</i> Thbg., 1784	
2242.	<i>extraversaria</i> H.-S., 1852	1
2243.	<i>insignata</i> (Hübner, 1790)	1
2244.	<i>vulgata</i> (Haworth, 1809)	1
2245.	<i>assimilata</i> Doubleday, 1856	1
2246.	<i>immundata</i> (Lienig & Zeller, 1846)	1
2247.	<i>satyrata</i> (Hübner, 1813)	1

2248.	<i>cauchiata</i> (Duponchel, 1830)	1			<i>VENUSIA</i> Curtis, 1839	
2249.	<i>intricata</i> (Zetterstedt, 1839)	1			2282. <i>cambrica</i> Curtis, 1839	1
	<i>helveticaria</i> Bsd., 1840				<i>HYDRELIA</i> Hübner, 1825	
2250.	<i>absinthiata</i> (Clerck, 1759)	1			2283. <i>flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	1
2251.	<i>goossensiata</i> Mabilille, 1869	1			2284. <i>sylvata</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>callunae</i> Spr., 1867				<i>testaceata</i> Don., 1810	
2252.	<i>expallidata</i> Doubleday, 1856	1			2285. <i>blomeri</i> (Curtis, 1832)	1
2253.	<i>veratraria</i> H.-S., 1848	1			<i>EUCHOECA</i> Hübner, 1823	
2254.	<i>trisignaria</i> H.-S., 1848	1			2286. <i>nebulata</i> (Scopoli, 1763)	1
2255.	<i>indigata</i> (Hübner, 1813)	1			<i>obliterata</i> Hfn., 1767	
2256.	<i>irriguata</i> (Hübner, 1813)	(1)			<i>ASTHENA</i> Hübner, 1825	
2257.	<i>valerianata</i> (Hübner, 1813)	1			2287. <i>albula</i> (Hufnagel, 1767)	1
2258.	<i>semigraphata</i> Bruand, 1851	1			<i>candidata</i> D. & Sch., 1775	
2259.	<i>impurata</i> (Hübner, 1813)	798			2288. <i>anseraria</i> (H.-S., 1855)	1
2260.	<i>subumbrata</i> (D. & Sch., 1775)	1			<i>MINOA</i> Treitschke, 1825	
	<i>scabiosata</i> Bkh., 1794				2289. <i>murinata</i> (Scopoli, 1763)	1
2261.	<i>orphanata</i> Petersen, 1909	979			<i>LOBOPHORA</i> Curtis, 1825	
2262.	<i>subfuscata</i> (Haworth, 1809)	1			2290. <i>halterata</i> (Hufnagel, 1767)	1
	<i>castigata</i> Hb., 1813				<i>TRICHOPTERYX</i> Hübner, 1825	
2263.	<i>exiguata</i> (Hübner, 1813)	1			2291. <i>polycommata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2264.	<i>millefoliata</i> Rössler, 1866	1			2292. <i>carpinata</i> (Borkhausen, 1794)	1
2265.	<i>icterata</i> (de Villers, 1789)	1			<i>NOTHOCASIS</i> Prout, 1937	
	<i>subfulvata</i> Hw., 1809				2293. <i>sertata</i> (Hübner, 1817)	1
	<i>subfulvaria</i> Dbl., 1849				<i>PTERAPHERAPTERYX</i> Curtis, 1825	
2266.	<i>succenturiata</i> (Linnaeus, 1758)	1			2294. <i>sexalata</i> (Retzius, 1783)	1
	<i>GYMNOSCELIS</i> Mabilille, 1868				<i>sexalisata</i> Hb., 1788	
2267.	<i>rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	1			<i>ACASIS</i> Duponchel, 1845	
	<i>pumilata</i> Hb., 1813				2296. <i>viretata</i> (Hübner, 1799)	1
	<i>CHLOROCLYSTIS</i> Hübner, 1825				2296. <i>appensata</i> (Eversmann, 1842)	288
2268.	<i>v-ata</i> (Haworth, 1809)	1				
	<i>coronata</i> Hb., 1813				Ennominae	
	<i>RHINOPRORA</i> Warren, 1895				<i>ABRAXAS</i> Leach, 1815	
2269.	<i>rectangulata</i> (Linnaeus, 1758)	1			2297. <i>grossulariatus</i> (Linnaeus, 1758)	1
2270.	<i>chloerata</i> (Mabilille, 1870)	1			2298. <i>sylvatus</i> (Scopoli, 1763)	1
2271.	<i>debiliata</i> (Hübner, 1817)	1			<i>LOMASPILIS</i> Hübner, 1825	
	<i>ANTICOLLIX</i> Prout, 1938				2299. <i>marginata</i> (Linnaeus, 1758)	1
2272.	<i>sparsata</i> (Treitschke, 1828)	1			<i>LIGDIA</i> Guenée, 1857	
	<i>CHESIAS</i> Treitschke, 1825				2300. <i>adustata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2273.	<i>legatella</i> (D. & Sch., 1775)	1			<i>STEGANIA</i> Guenée, 1845	
	<i>spartiata</i> Fssl., 1781				2301. <i>dilectaria</i> (Hübner, 1790)	977
2274.	<i>rufata</i> (Fabricius, 1775)	1			<i>SEMIOTHISA</i> Hübner, 1818	K
	<i>CARSIA</i> Hübner, 1825				2302. <i>notata</i> (Linnaeus, 1758)	1
2275.	<i>sororiata</i> (Hübner, 1813)	1			2303. <i>alternata</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>paludata</i> Thbg., 1788, nec L., 1767				<i>alternaria</i> Hb., 1809	
	<i>APLOCERA</i> Stephens, 1827				2304. <i>signaria</i> (Hübner, 1809)	1
2276.	<i>plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	1			2306. <i>liturata</i> (Clerck, 1759)	1
2277.	<i>efformata</i> (Guenée, 1857)	1			2306. <i>clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	1
2278.	<i>praeformata</i> (Hübner, 1826)	1			2307. <i>glarearia</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>ODEZIA</i> Boisduval, 1840				2308. <i>artesiaria</i> (D. & Sch., 1775)	1
2279.	<i>atrata</i> (Linnaeus, 1758)	1			2309. <i>wauaria</i> (Linnaeus, 1758)	1
	<i>LITHOSTEGE</i> Hübner, 1825				2310. <i>brunneata</i> (Thunberg, 1784)	1
2280.	<i>griseata</i> (D. & Sch., 1775)	1			<i>fulvaria</i> Vill., 1789	
2281.	<i>farinata</i> (Hufnagel, 1767)	1				

NARRAGA Walker, 1861			2339.	<i>prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	1
2311.	<i>fasciolaria</i> (Hufnagel, 1767)	1 X	APOCHEIMA Hübner, 1825		
TEPHRINA Guenée, 1845			2340.	<i>hispidarium</i> (D. & Sch., 1775)	1
2312.	<i>arenacearia</i> (D. & Sch., 1775)	1	2341.	<i>pilosarium</i> (D. & Sch., 1775)	1
2313.	<i>murinaria</i> (D. & Sch., 1775)	1	<i>pedaria</i> F., 1787		
PSEUDOPANTHERA Hübner, 1823			LYCIA Hübner, 1825		
2314.	<i>macularia</i> (Linnaeus, 1758)	1	2342.	<i>hirtaria</i> (Clerck, 1759)	1
PLAGODIS Hübner, 1823			2343.	<i>zonaria</i> (D. & Sch., 1775)	1
2315.	<i>pulveraria</i> (Linnaeus, 1758)	1	2344.	<i>isabellae</i> (Harrison, 1914)	115
2316.	<i>dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	1	2345.	<i>pomonaria</i> (Hübner, 1790)	1
PACHYCNEMIA Stephens, 1829			BISTON Leach, 1815		
2317.	<i>hippocastanaria</i> (Hübner, 1799)	1	2346.	<i>stratarius</i> (Hufnagel, 1767)	1
PETROPHORA Hübner, 1811			2347.	<i>betularius</i> (Linnaeus, 1758)	1
2318.	<i>chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	1	AGRIOPIS Hübner, 1825		
<i>petraria</i> Hb., 1799			2348.	<i>leucophaearia</i> (D. & Sch., 1775)	1
OPISTHOGRAPTIS Hübner, 1823			2349.	<i>bajaria</i> (D. & Sch., 1775)	1
2319.	<i>luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	1	2350.	<i>aurantiaria</i> (Hübner, 1799)	1
EPIONE Duponchel, 1829			2351.	<i>marginaria</i> (Fabricius, 1776)	1
2320.	<i>repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	1	ERANNIS Hübner, 1825		
<i>apiciaria</i> D. & Sch., 1775			2352.	<i>defoliaria</i> (Clerck, 1759)	1
2321.	<i>vespertaria</i> (Linnaeus, 1767)	1	TEPHRONIA Hübner, 1825		
<i>paralellaria</i> D. & Sch., 1775			2353.	<i>sepiaria</i> (Hufnagel, 1767)	1
CEPPHIS Hübner, 1823			PERIBATODES Wehrli, 1943		
2322.	<i>advenaria</i> (Hübner, 1790)	1	2354.	<i>rhomboidarius</i> (D. & Sch., 1775)	1
ENNOMOS Treitschke, 1825			2355.	<i>secundarius</i> (D. & Sch., 1775)	1
2323.	<i>autumnarius</i> (Werneburg, 1859)	1	CLEORA Curtis, 1825		
2324.	<i>quercinarius</i> (Hufnagel, 1767)	1	2356.	<i>cinctaria</i> (D. & Sch., 1775)	1
2325.	<i>alniarius</i> (Linnaeus, 1758)	1	DEILEPTENIA Hübner, 1825		
2326.	<i>erosarius</i> (D. & Sch., 1775)	1	2357.	<i>ribeata</i> (Clerck, 1759)	1
2327.	<i>fuscantarius</i> (Haworth, 1809)	1	ALCIS Curtis, 1826		
SELENIA Hübner, 1823			2358.	<i>repandata</i> (Linnaeus, 1758)	1
2328.	<i>dentaria</i> (Fabricius, 1775)	1	2359.	<i>bastelbergeri</i> (Hirschke, 1908)	1
<i>bilunaria</i> Esp., 1795			<i>maculata</i> Stgr., 1892, nec Moore, 1868		
2329.	<i>lunularia</i> (Hübner, 1788)	1	2360.	<i>jubata</i> (Thunberg, 1788)	1
<i>lunaria</i> D. & Sch., 1775, nec F., 1775			HYPOMECEIS Hübner, 1821		
2330.	<i>tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)	1	2361.	<i>roboraria</i> (D. & Sch., 1775)	1
APEIRA Gistel, 1848			2362.	<i>punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	1
2331.	<i>syringaria</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>consortaria</i> F., 1787		
EPIRRANTHIS Hübner, 1823			FAGIVORINA Wehrli, 1943		
2332.	<i>diversata</i> (D. & Sch., 1775)	1	2363.	<i>arenaria</i> (Hufnagel, 1767)	1
ARTIORA Meyrick, 1892			<i>viduata</i> D. & Sch., 1775		
2333.	<i>evonymaria</i> (D. & Sch., 1775)	1	<i>angularia</i> Thbg., 1792		
ODONTOPERA Stephens, 1831			CLEORODES Warren, 1894		
2334.	<i>bidentata</i> (Clerck, 1759)	1	2364.	<i>lichenarius</i> (Hufnagel, 1767)	1
CROCALLIS Treitschke, 1825			ARICHANNA Moore, 1868		
2335.	<i>tusciaria</i> (Borkhausen, 1793)	308	2365.	<i>melanaria</i> (Linnaeus, 1758)	1
2336.	<i>elinguaria</i> (Linnaeus, 1758)	1	ECTROPIS Hübner, 1825		
OURAPTERYX Leach, 1814			2366.	<i>crepuscularia</i> (D. & Sch., 1775)	1
2337.	<i>sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>bistortata</i> Gz., 1781		
COLOTOIS Hübner, 1823			PARADARISA Warren, 1897		
2338.	<i>pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	1	2367.	<i>consonaria</i> (Hübner, 1799)	1
ANGERONA Duponchel, 1829			2368.	<i>similaria</i> (Hufnagel, 1767)	1

	<i>extersaria</i> Hb., 1799	
	<i>luridata</i> Bkh., 1794	
	ASCOTIS Hübner, 1825	
2369.	<i>selenaria</i> (Den. & Schiff., 1775)	1
	AETHALURA McDunnough, 1920	
2370.	<i>punctulata</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>punctularia</i> Hb., 1787	
	EMATURGA Lederer, 1853	
2371.	<i>atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	1
	SELIDOSEMA Hübner, 1823	
2372.	<i>plumarium</i> (D. & Sch., 1775)	(306)
2373.	<i>brunnearium</i> (de Villers, 1789)	1
	<i>ericetaria</i> Vill., 1789	
	BUPALUS Leach, 1815	
2374.	<i>piniarius</i> (Linnaeus, 1758)	1
	CABERA Treitschke, 1825	
2375.	<i>pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	1
2376.	<i>exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	1
	LOMOGRAPHIA Hübner, 1825	
2377.	<i>bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	1
2378.	<i>temerata</i> (D. & Sch., 1775)	1
2379.	<i>distinctata</i> (H.-S., 1839)	1
	<i>pictaria</i> auct., nec Thbg., 1788	
	THERIA Hübner, 1825	
2380.	<i>rupicaprararia</i> (D. & Sch., 1775)	1
	CAMPAEA Lamarck, 1816	
2381.	<i>margaritata</i> (Linnaeus, 1767)	1
2382.	<i>honoraria</i> (D. & Sch., 1775)	1
	HYLAEA Hübner, 1822	
2383.	<i>fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	1
	<i>prosapiaria</i> L., 1758	
	PUENGELERIA Rougemont, 1903	
2384.	<i>capreolaria</i> (D. & Sch., 1775)	1
	ODONTOGNOPHOS Wehrli, 1951	
2385.	<i>dumetatus</i> (Treitschke, 1827)	1
	GNOPHOS Treitschke, 1825	
2386.	<i>furvatus</i> (D. & Sch., 1775)	1
2387.	<i>obscuratus</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>obscurarius</i> Hb., 1799	
2388.	<i>ambiguatus</i> Duponchel, 1830	1
	CHARISSA Curtis, 1826	
2389.	<i>pullata</i> (D. & Sch., 1775)	1 K
2390.	<i>glaucinararia</i> (Hübner, 1799)	(1), 16 K
2391.	<i>intermedia</i> (Wehrli, 1917)	299 K
	ELOPHOS Boisduval, 1840	
2392.	<i>dilucidarius</i> (D. & Sch., 1775)	1
2393.	<i>vittarius</i> (Thunberg, 1788)	1
	<i>sordarius</i> Thbg., 1792	
2394.	<i>operarius</i> (Hübner, 1813)	1
	PSODOS Treitschke, 1827	
2395.	<i>quadrifarius</i> (Sulzer, 1776)	1
2396.	<i>alpinatus</i> (Scopoli, 1763)	1

	SIONA Duponchel, 1829	
2397.	<i>lineata</i> (Scopoli, 1763)	1
	ASPITATES Treitschke, 1825	
2398.	<i>gilvaria</i> (D. & Sch., 1775)	1
	PERCONIA Hübner, 1823	
2399.	<i>strigillaria</i> (Hübner, 1787)	1
	Noctuoidea	
	Notodontidae	
	Notodontinae	
	PHALERA Hübner, 1819	
2400.	<i>bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	1
	CERURA Schrank, 1802	
2401.	<i>vinula</i> (Linnaeus, 1758)	1
2402.	<i>erminea</i> (Esper, 1783)	1
	FURCULA Lamarck, 1816	
2403.	<i>bicipis</i> (Borkhausen, 1790)	1
2404.	<i>furcula</i> (Clerck, 1759)	1
2405.	<i>bifida</i> (Brahm, 1787)	1
	<i>hermelina</i> Gz., 1781: 227, nec Gz., 1781: 207	
	STAUROPUS Germar, 1812	
2406.	<i>fagi</i> (Linnaeus, 1758)	1
	PERIDEA Stephens, 1828	
2407.	<i>anceps</i> (Goeze, 1781)	1
	<i>trepida</i> Esp., 1786	
	SPATALIA Hübner, 1819	
2408.	<i>argentina</i> (D. & Sch., 1775)	1
	NOTODONTA Ochsenheimer, 1810	
2409.	<i>dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	1
2410.	<i>torva</i> (Hübner, 1803)	1
	<i>tritophus</i> Esp., 1786, nec D. & Sch., 1775	
	DRYMONIA Hübner, 1819	
2411.	<i>dodonaea</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>trimacula</i> Esp., 1785	
2412.	<i>ruficornis</i> (Hufnagel, 1766)	1
	<i>chaonia</i> D. & Sch., 1775	
2413.	<i>querna</i> (D. & Sch., 1775)	1
2414.	<i>velitaris</i> (Hufnagel, 1766)	1
2415.	<i>obliterata</i> (Esper, 1785)	1
	<i>melagona</i> Bkh., 1790	
	TRITOPHIA Kiriakoff, 1967	
2416.	<i>tritophus</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>phoebe</i> Sieb., 1790	
	HARPYIA Ochsenheimer, 1810	
2417.	<i>milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	1
	<i>terrifica</i> D. & Sch., 1775	
	PHEOSIA Hübner, 1819	
2418.	<i>gnoma</i> (Fabricius, 1776)	1
	<i>dictaeoides</i> Esp., 1789	
2419.	<i>tremula</i> (Clerck, 1759)	1
	PTILOPHORA Stephens, 1828	
2420.	<i>plumigera</i> (D. & Sch., 1775)	1

<i>PTEROSTOMA</i> Germar, 1812			<i>OCNERIA</i> Hübner, 1819	
2421.	<i>palpinum</i> (Clerck, 1759)	1	2446.	<i>detrita</i> (Esper, 1785) 1 *
<i>PTILODON</i> Hübner, 1822			Arctiidae	
2422.	<i>capucina</i> (Linnaeus, 1758)	1	Lithosiinae	
	<i>camelina</i> L., 1758		<i>THUMATHA</i> Walker, 1866	
<i>PTILODONTELLA</i> Kiriakoff, 1967			2447.	<i>senex</i> (Hübner, 1808) 1
2423.	<i>cucullina</i> (D. & Sch., 1775)	1	<i>SETINA</i> Schrank, 1802	
	<i>cuculla</i> Esp., 1786		2448.	<i>irrorella</i> (Linnaeus, 1758) 1
<i>LEUCODONTA</i> Staudinger, 1892			2449.	<i>roscida</i> (D. & Sch., 1775) 1
2424.	<i>bicoloria</i> (D. & Sch., 1775)	1	<i>MILTOCHRISTA</i> Hübner, 1819	
<i>ELIGMODONTA</i> Kiriakoff, 1967			2450.	<i>miniata</i> (Forster, 1771) 1
2425.	<i>ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>NUDARIA</i> Haworth, 1809	
<i>ODONTOSIA</i> Hübner, 1819			2451.	<i>mundana</i> (Linnaeus, 1761) 1
2426.	<i>carmelita</i> (Esper, 1798)	1	<i>PAIDIA</i> Hübner, 1819	
2427.	<i>sieversii</i> (Ménétrières, 1856)	27 ?I	2452.	<i>rica</i> (Freyer, 1858) 1
<i>GLUPHISIA</i> Boisduval, 1828				<i>murina</i> Hb., 1790, nec Hfn., 1766
2428.	<i>crenata</i> (Esper, 1785)	1	<i>ATOLMIS</i> Hübner, 1819	
	<i>rurea</i> F., 1787		2453.	<i>rubricollis</i> (Linnaeus, 1758) 1
<i>CLOSTERA</i> Samouelle, 1819			<i>CYBOSIA</i> Hübner, 1819	
2429.	<i>curtula</i> (Linnaeus, 1758)	1	2454.	<i>mesomella</i> (Linnaeus, 1758) 1
2430.	<i>anachoreta</i> (D. & Sch., 1775)	1	<i>PELOSIA</i> Hübner, 1819	
2431.	<i>anastomosis</i> (Linnaeus, 1758)	1	2455.	<i>muscerda</i> (Hufnagel, 1766) 1
2432.	<i>pigra</i> (Hufnagel, 1766)	1	<i>EILEMA</i> Hübner, 1819	
Thaumetopoeinae			2456.	<i>sororculum</i> (Hufnagel, 1766) 1
<i>THAUMETOPOEA</i> Hübner, 1820			2457.	<i>griseolum</i> (Hübner, 1803) 1
2433.	<i>pinivora</i> (Treitschke, 1834)	871 *	2458.	<i>lutarellum</i> (Linnaeus, 1758) 1
Lymantriidae			2459.	<i>pygmaeolum</i> (Doubleday, 1847) 1
<i>PENTHOPHERA</i> Germar, 1812				<i>pallifrons</i> Z., 1847
2434.	<i>morio</i> (Linnaeus, 1767)	1	2460.	<i>palliatellum</i> (Scopoli, 1763) 1
<i>ORGYIA</i> Ochseneheimer, 1810				<i>unita</i> D. & Sch., 1775
2435.	<i>recens</i> (Hübner, 1819)	1	2461.	<i>complanum</i> (Linnaeus, 1758) 1
	<i>gonostigma</i> auct., nec Sc., 1763		2462.	<i>lurideolum</i> (Zincken, 1817) 1
2436.	<i>antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	1	2463.	<i>depressum</i> (Esper, 1787) 1
<i>GYNAEPHORA</i> Hübner, 1819				<i>deplana</i> Esp., 1787, nec L., 1771
2437.	<i>fascelina</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>LITHOSIA</i> Fabricius, 1798	
2437a.	<i>selenitica</i> (Esper, 1789)	1 X	2464.	<i>quadra</i> (Linnaeus, 1758) 1
<i>CALLITEARA</i> Butler, 1881			Arctiinae	
2438.	<i>pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>SPIRIS</i> Hübner, 1819	
2439.	<i>abietis</i> (D. & Sch., 1775)	1	2465.	<i>striata</i> (Linnaeus, 1758) 1
<i>EUPROCTIS</i> Hübner, 1819			<i>COSCINIA</i> Hübner, 1819	
2440.	<i>chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	1	2466.	<i>cribraria</i> (Linnaeus, 1758) 1
	<i>phaeorrhoea</i> Hw., 1803			<i>cribrum</i> L., 1761
2441.	<i>similis</i> (Fuessly, 1775)	1	<i>UTETHEISA</i> Hübner, 1819	
<i>LEUCOMA</i> Hübner, 1822			2467.	<i>pulchella</i> (Linnaeus, 1758) 1 * M
2442.	<i>salicis</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>PARASEMIA</i> Hübner, 1820	
<i>ARCTORNIS</i> Germar, 1810			2468.	<i>plantaginis</i> (Linnaeus, 1758) 1
2443.	<i>l-nigrum</i> (Müller, 1764)	1	<i>HYPHORAIA</i> Hübner, 1820	
<i>LYMANTRIA</i> Hübner, 1819			2469.	<i>aulica</i> (Linnaeus, 1758) 1
2444.	<i>monacha</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>PERICALLIA</i> Hübner, 1820	
2445.	<i>dispar</i> (Linnaeus, 1758)	1	2470.	<i>matronula</i> (Linnaeus, 1758) 1, 524 X

<i>ARCTIA</i> Schrank, 1802			<i>MACROCHILO</i> Hübner, 1825		
2471.	<i>caja</i> (Linnaeus, 1758)	1	2493.	<i>cribrumalis</i> (Hübner, 1793)	(1) 429
2472.	<i>villica</i> (Linnaeus, 1758)	1 *	<i>HERMINIA</i> Latreille, 1802		
<i>AMMOBIOTA</i> Wallengren, 1885			2494.	<i>tarsipennalis</i> Treitschke, 1835	1
2473.	<i>festiva</i> (Hufnagel, 1766)	1 X	2495.	<i>tarsicrinalis</i> (Knoch, 1782)	1
	<i>hebe</i> L., 1767		2496.	<i>grisealis</i> (D. & Sch., 1775)	1
<i>DIACRISIA</i> Hübner, 1819				<i>nemoralis</i> F., 1775, nec Sc., 1763	
2474.	<i>sannio</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>POLYPOGON</i> Schrank, 1802		
	<i>vulpinaria</i> Fourcroy, 1785		2497.	<i>tentacularius</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>RHYPARIA</i> Hübner, 1825			2498.	<i>strigilatus</i> (Linnaeus, 1758)	1
2475.	<i>purpurata</i> (Linnaeus, 1758)	1		<i>barbalis</i> Cl., 1759	
<i>SPILOSOMA</i> Curtis, 1825			2499.	<i>lunalis</i> (Scopoli, 1763)	1
2476.	<i>lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	1		<i>tarsiplumalis</i> Hb., 1796	
	<i>menthastris</i> Esp., 1786		2500.	<i>zelleralis</i> (Wocke, 1850)	423
2477.	<i>luteum</i> (Hufnagel, 1766)	1		<i>tarsicristalis</i> H.-S., 1851	
	<i>lubricipeda</i> auct., nec L., 1758		<i>Rivulinae</i>		
2478.	<i>urticae</i> (Esper, 1789)	1	<i>RIVULA</i> Guenée, 1845		
<i>DIAPHORA</i> Stephens, 1827			2501.	<i>sericealis</i> (Scopoli, 1763)	1
2479.	<i>mendica</i> (Clerck, 1759)	1	<i>PARASCOTIA</i> Hübner, 1825		
<i>PHRAGMATOBIA</i> Stephens, 1828			2502.	<i>fuliginaria</i> (Linnaeus, 1761)	1
2480.	<i>fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>COLOBOCHYLA</i> Hübner, 1825		
2481.	<i>luctifera</i> (D. & Sch., 1775)	1 X	2503.	<i>salicalis</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>caesarea</i> Gz., 1781		<i>Hypenodinae</i>		
<i>CHELIS</i> Rambur, 1866			<i>SCHRANKIA</i> Hübner, 1825		
2482.	<i>maculosa</i> (D. & Sch., 1775)	1 *	2504.	<i>taenialis</i> (Hübner, 1809)	628
<i>EUCHARIA</i> Hübner, 1820			2505.	<i>costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)	1
2483.	<i>casta</i> (Esper, 1785)	1	<i>HYPENODES</i> Doubleday, 1850		
	<i>deserta</i> Bart., 1902		2506.	<i>humidialis</i> Doubleday, 1850	564
<i>CALLIMORPHA</i> Latreille, 1809				<i>turfosalis</i> Wck., 1850	
2484.	<i>quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	1	<i>Hypeninae</i>		
	<i>hera</i> L., 1767		<i>HYPENA</i> Schrank, 1802		
2485.	<i>dominula</i> (Linnaeus, 1758)	1	2507.	<i>crassalis</i> (Fabricius, 1787)	1
<i>TYRIA</i> Hübner, 1819				<i>fontis</i> Thbg., 1788	
2486.	<i>jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	1	2508.	<i>rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>Syntominiinae</i>			2509.	<i>proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>AMATA</i> Fabricius, 1807			2510.	<i>obesalis</i> Treitschke, 1829	1
2487.	<i>phegea</i> (Linnaeus, 1758)	1	<i>PHYTOMETRA</i> Haworth, 1809		
<i>DYSAUXES</i> Hübner, 1819			2511.	<i>viridaria</i> (Clerck, 1759)	1
2488.	<i>ancilla</i> (Linnaeus, 1767)	1	<i>Catocalinae</i>		
<i>Noctuidae</i>			<i>SCOLIOPTERYX</i> Germar, 1810		
<i>Hermiiniinae</i>			2512.	<i>libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>IDIA</i> Hübner, 1813			<i>CALYPTRA</i> Ochsenheimer, 1816		
2489.	<i>calvaria</i> (D. & Sch., 1775)	1	2513.	<i>thalictri</i> (Borkhausen, 1790)	824 X
<i>SIMPLICIA</i> Guenée, 1854				<i>capucina</i> Esp., 1789, nec L., 1767	
2490.	<i>rectalis</i> (Eversmann, 1842)	479	<i>CATOCALA</i> Schrank, 1802		
<i>TRISATELES</i> Tams, 1939			2514.	<i>sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	1
2491.	<i>emortualis</i> (D. & Sch., 1775)	1	2515.	<i>fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>PARACOLAX</i> Hübner, 1825			2516.	<i>nupta</i> (Linnaeus, 1767)	1
2492.	<i>tristalis</i> (Fabricius, 1794)	1	2517.	<i>elocata</i> (Esper, 1787)	1
	<i>glaucinalis</i> auct., nec L., 1758				
	<i>derivalis</i> Hb., 1796				

2518.	<i>electa</i> (Vieweg, 1790)	1			<i>BENA</i> Billberg, 1820	
2519.	<i>puerpera</i> (Giorna, 1791)	74	K I		2548. <i>bicolorana</i> (Fuessly, 1775)	1
2520.	<i>promissa</i> (D. & Sch., 1775)	1			<i>prasinana</i> auct., nec L., 1758	
2521.	<i>hymenaea</i> (D. & Sch., 1775)	626	*		<i>PSEUDOIPS</i> Hübner, 1822	
2522.	<i>conversa</i> (Esper, 1787)	1			2549. <i>prasinanus</i> (Linnaeus, 1758)	1
2523.	<i>fulminea</i> (Scopoli, 1763)	1			<i>faganus</i> F., 1781	
	<i>MINUCIA</i> Moore, 1885					
2524.	<i>lunaris</i> (D. & Sch., 1775)	1			Pantheinae	
	<i>PRODOTIS</i> John, 1910				<i>PANTHEA</i> Hübner, 1820	
2525.	<i>stolida</i> (Fabricius, 1775)	369	M		2550. <i>coenobita</i> (Esper, 1785)	1
	<i>LYGEPHILA</i> Billberg, 1820				<i>TRICHOSEA</i> Grote, 1875	
2526.	<i>lusoria</i> (Linnaeus, 1758)	754	*		2551. <i>ludifica</i> (Linnaeus, 1758)	1
2527.	<i>pastinum</i> (Treitschke, 1826)	1			<i>COLOCASIA</i> Ochseneheimer, 1816	
2528.	<i>viciae</i> (Hübner, 1822)	1			2552. <i>coryli</i> (Linnaeus, 1758)	1
2529.	<i>craccae</i> (D. & Sch., 1775)	1				
	<i>CATEPHIA</i> Ochseneheimer, 1816				Acronictinae	
2530.	<i>alchymista</i> (D. & Sch., 1775)	1			<i>MOMA</i> Hübner, 1820	
	<i>TYTA</i> Billberg, 1820				2553. <i>alpium</i> (Osbeck, 1778)	1
2531.	<i>luctuosa</i> (D. & Sch., 1775)	1			<i>ACRONICTA</i> Ochseneheimer, 1816	
	<i>CALLISTEGE</i> Hübner, 1823				2554. <i>megacephala</i> (D. & Sch., 1775)	1
2532.	<i>mi</i> (Clerck, 1759)	1			2555. <i>alni</i> (Linnaeus, 1767)	1
	<i>EUCLIDIA</i> Ochseneheimer, 1816				2556. <i>cuspis</i> (Hübner, 1813)	1
2533.	<i>glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	1			2557. <i>tridens</i> (D. & Sch., 1775)	1 *
	<i>LASPEYRIA</i> Germar, 1810				2558. <i>psi</i> (Linnaeus, 1758)	1
2534.	<i>flexula</i> (D. & Sch., 1775)	1			2559. <i>aceris</i> (Linnaeus, 1758)	1
					2560. <i>leporina</i> (Linnaeus, 1758)	1
	Nolinae				2561. <i>strigosa</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>MEGANOLA</i> Dyar, 1898				2562. <i>menyanthidis</i> (Esper, 1789)	1
2535.	<i>togatulalis</i> (Hübner, 1796)	1			2563. <i>auricoma</i> (D. & Sch., 1775)	1
2536.	<i>albula</i> (D. & Sch., 1775)	871			2564. <i>euphorbiae</i> (D. & Sch., 1775)	1
2537.	<i>strigula</i> (D. & Sch., 1775)	1			2565. <i>rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	1
	<i>NOLA</i> Leach, 1815				<i>CRANIOPHORA</i> Snellen, 1867	
2538.	<i>cucullatella</i> (Linnaeus, 1758)	1			2566. <i>ligustri</i> (D. & Sch., 1775)	1
2539.	<i>confusalis</i> (H.-S., 1847)	1			<i>SIMYRA</i> Ochseneheimer, 1816	
2540.	<i>aerugula</i> (Hübner, 1793)	1			2567. <i>nervosa</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>centonalis</i> Hb., 1796				2568. <i>albovenosa</i> (Goeze, 1781)	423
2541.	<i>cristatula</i> (Hübner, 1793)	977			<i>CRYPHIA</i> Hübner, 1818	
2542.	<i>cicatricalis</i> (Treitschke, 1835)	1			2569. <i>algae</i> (Fabricius, 1775)	1
					2570. <i>receptricula</i> (Hübner, 1803)	(1)
	Sarothripinae				2571. <i>fraudatricula</i> (Hübner, 1803)	1
	<i>NYCTEOLA</i> Hübner, 1822				2572. <i>ereptricula</i> (Treitschke, 1825)	1
2543.	<i>revayana</i> (Scopoli, 1772)	1			2573. <i>raptricula</i> (D. & Sch., 1775)	1
2544.	<i>degenerana</i> (Hübner, 1799)	1 *			<i>divisa</i> Esp., 1791	
2545.	<i>asiatica</i> (Krulikowsky, 1904)	74 ?M			2574. <i>domestica</i> (Hufnagel, 1766)	1
					<i>perla</i> F., 1775	
	Chloephorinae				Acontiinae	
	<i>EARIAS</i> Hübner, 1825				<i>EMMELIA</i> Hübner, 1821	
2546.	<i>clorana</i> (Linnaeus, 1761)	1			2575. <i>trabealis</i> (Scopoli, 1763)	1
	<i>prasinana</i> auct., nec L., 1758				<i>ACONTIA</i> Ochseneheimer, 1816	
2547.	<i>vernana</i> (Fabricius, 1787)	188			2576. <i>lucida</i> (Hufnagel, 1766)	1 *

<i>PROTODELTOTE</i> Ueda, 1984			
2577.	<i>pygarga</i> (Hufnagel, 1766)	1	
	<i>fasciana</i> auct., nec L., 1758		
	<i>fuscula</i> D. & Sch., 1775		
<i>DELTOTE</i> Reichenbach, 1817			
2578.	<i>bankiana</i> (Fabricius, 1775)	1	
	<i>olivana</i> D. & Sch., 1775		
	<i>argentula</i> Hb., 1787		
2579.	<i>uncula</i> (Clerck, 1759)	1	
2580.	<i>deceptor</i> (Scopoli, 1763)	1	
<i>PSEUDEUSTROTIA</i> Warren, 1913			
2581.	<i>candidula</i> (D. & Sch., 1775)	977	
<i>EUBLEMMA</i> Hübner, 1821			
2582.	<i>minutatum</i> (Fabricius, 1794)	1	
	<i>noctualis</i> Hb., 1796		
	<i>paula</i> Hb., 1809		
2583.	<i>purpurinum</i> (D. & Sch., 1775)	871	
Plusiinae			
<i>MACDUNNOUGHIA</i> Kostrowicki, 1961			
2584.	<i>confusa</i> (Stephens, 1850)	1 M	
<i>TRICHOPLUSIA</i> McDunnough, 1944			
2585.	<i>ni</i> (Hübner, 1803)	(1) M	
<i>LAMPROTES</i> Reichenbach, 1817			
2586.	<i>c-aureum</i> (Knoch, 1781)	1	
<i>POLYCHRYSLIA</i> Hübner, 1821			
2587.	<i>moneta</i> (Fabricius, 1787)	1	
<i>EUCHALCIA</i> Hübner, 1821			
2588.	<i>consona</i> (Fabricius, 1787)	1	
2589.	<i>modestoides</i> Poole, 1989	845	
	<i>modesta</i> Hb., 1786, nec Cr., 1777		
<i>PLUSIA</i> Ochsenheimer, 1816			
2590.	<i>festucae</i> (Linnaeus, 1758)	1	
2591.	<i>putnami</i> (Grote, 1873)	451	
<i>DIACHRYSLIA</i> Hübner, 1821			
2592.	<i>chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	1	
2593.	<i>tutti</i> (Kostrowicki, 1961)	K	
2594.	<i>chryson</i> (Esper, 1789)	(1) 184	
<i>AUTOGRAPHIA</i> Hübner, 1821			
2595.	<i>gamma</i> (Linnaeus, 1758)	1 M	
2596.	<i>pulchrina</i> (Haworth, 1809)	1	
	<i>v-aureum</i> Gn., 1852		
2597.	<i>buraetica</i> (Staudinger, 1892)	734	
2598.	<i>jota</i> (Linnaeus, 1758)	1 *	
2599.	<i>bractea</i> (D. & Sch., 1775)	1	
<i>SYNGRAPHIA</i> Hübner, 1821			
2600.	<i>ain</i> (Hochenwarth, 1785)	1	
2601.	<i>interrogationis</i> (Linnaeus, 1758)	1	
<i>ABROSTOLA</i> Ochsenheimer, 1816			
2602.	<i>tripartita</i> (Hufnagel, 1766)	1	
	<i>triplasia</i> auct., nec L., 1758		
2603.	<i>asclepiadis</i> (D. & Sch., 1775)	1	
2604.	<i>triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	1	
	<i>trigemina</i> Wern., 1864		
Cuculliinae			
<i>CUCULLIA</i> Schrank, 1802			
2605.	<i>absinthii</i> (Linnaeus, 1761)	1	
2606.	<i>fraudatrix</i> Eversmann, 1837	799	
2607.	<i>artemisiae</i> (Hufnagel, 1766)	1	
2608.	<i>chamomillae</i> (D. & Sch., 1775)	1	
2609.	<i>lucifuga</i> (D. & Sch., 1775)	1	
2610.	<i>lactucae</i> (D. & Sch., 1775)	1	
2611.	<i>umbratica</i> (Linnaeus, 1758)	1	
2612.	<i>campanulae</i> Freyer, 1831	1	
2613.	<i>tanacetii</i> (D. & Sch., 1775)	1 *	
2614.	<i>asteris</i> (D. & Sch., 1775)	1 *	
2615.	<i>thapsiphaga</i> Treitschke, 1826	1	
2616.	<i>lychnitis</i> Rambur, 1833	1	
2617.	<i>scrophulariae</i> (D. & Sch., 1775)	1	
2618.	<i>verbasci</i> (Linnaeus, 1758)	1	
<i>CALOPHASIA</i> Stephens, 1829			
2619.	<i>lunula</i> (Hufnagel, 1766)	1	
<i>OMPHALOPHANA</i> Hampson, 1906			
2620.	<i>antirrhini</i> (Hübner, 1803)	1 *	
<i>CALLIERGES</i> Hübner, 1821			
2621.	<i>ramosa</i> (Esper, 1786)	1	
<i>AMPHIPYRA</i> Ochsenheimer, 1816			
2622.	<i>pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)	1	
2623.	<i>berbera</i> Rungs, 1949	486	
2624.	<i>perflua</i> (Fabricius, 1787)	1	
2625.	<i>livida</i> (D. & Sch., 1775)	1 M	
2626.	<i>tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	1	
2627.	<i>tetra</i> (Fabricius, 1787)	1 X	
Heliothinae			
<i>HELIOTHIS</i> Ochsenheimer, 1816			
2628.	<i>viriplaca</i> (Hufnagel, 1766)	1 M	
	<i>dipsacea</i> L., 1767		
2629.	<i>maritima</i> Graslin, 1855	977 M	
2630.	<i>ononis</i> (D. & Sch., 1775)	1	
2631.	<i>peltigera</i> (D. & Sch., 1775)	1 M	
<i>HELICOVERPA</i> Hardwick, 1965			
2632.	<i>armigera</i> (Hübner, 1808)	1 M	
	<i>obsoleta</i> auct., nec Hb., 1803		
<i>PROTOSCHINIA</i> Hardwick, 1970			
2633.	<i>scutosa</i> (D. & Sch., 1775)	1 M	
<i>PYRRHIA</i> Hübner, 1821			
2634.	<i>umbra</i> (Hufnagel, 1766)	1	
<i>PERIPHANES</i> Hübner, 1821			
2635.	<i>delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	1 *	

Ipimorphinae			2661.	<i>scita</i> (Hübner, 1790)	1
<i>ELAPHRIA</i> Hübner, 1818				<i>HYPPA</i> Duponchel, 1845	
2636.	<i>venustula</i> (Hübner, 1790)	603	2662.	<i>rectilinea</i> (Esper, 1788)	1
<i>PANEMERIA</i> Hübner, 1823				<i>AUCHMIS</i> Hübner, 1821	
2637.	<i>tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	1	2663.	<i>detersa</i> (Esper, 1791)	1
<i>ACOSMETIA</i> Stephens, 1829				<i>comma</i> auct., nec L., 1761	
2638.	<i>caliginosa</i> (Hübner, 1813)	423		<i>ACTINOTIA</i> Hübner, 1821	
<i>CARADRINA</i> Ochseneimer, 1816			2664.	<i>polyodon</i> (Clerck, 1759)	1
2639.	<i>morpheus</i> (Hufnagel, 1766)	1		<i>CHLOANTHA</i> Boisduval, Rambur & Graslin, 1836	
<i>PLATYPERIGEA</i> Smith, 1894			2665.	<i>hyperici</i> (D. & Sch., 1775)	1
2640.	<i>kadenii</i> (Freyer, 1836)	1 *		<i>CALLOPISTRIA</i> Hübner, 1821	
<i>PARADRINA</i> Boursin, 1937			2666.	<i>juventina</i> (Stoll, 1782)	1
2641.	<i>selini</i> (Boisduval, 1840)	1		<i>EUCARTA</i> Lederer, 1857	
	<i>flavirena</i> Gn., 1852		2667.	<i>virgo</i> (Treitschke, 1835)	700 M
2642.	<i>clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	1 M		<i>IPIMORPHA</i> Hübner, 1821	
	<i>quadripunctata</i> F., 1775		2668.	<i>retusa</i> (Linnaeus, 1761)	1
<i>EREMODRINA</i> Boursin, 1937			2669.	<i>subtusa</i> (D. & Sch., 1775)	1
2643.	<i>gilva</i> (Donzel, 1837)	352		<i>ENARGIA</i> Hübner, 1821	
<i>HOPLODRINA</i> Boursin, 1937			2670.	<i>paleacea</i> (Esper, 1788)	1
2644.	<i>octogenaria</i> (Goeze, 1781)	1		<i>PARASTICHTIS</i> Hübner, 1821	
	<i>alsines</i> Brahm, 1791		2671.	<i>suspecta</i> (Hübner, 1817)	1
2645.	<i>blanda</i> (D. & Sch., 1775)	1	2672.	<i>ypsillon</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>taraxaci</i> Hb., 1813			<i>fissipuncta</i> Hw., 1809	
2646.	<i>superstes</i> (Ochseneimer, 1816)	1		<i>MESOGONA</i> Boisduval, 1840	
2647.	<i>respersa</i> (D. & Sch., 1775)	1	2673.	<i>acetosellae</i> (D. & Sch., 1775)	1
2648.	<i>ambigua</i> (D. & Sch., 1775)	1	2674.	<i>oxalina</i> (Hübner, 1803)	1
<i>ATYPHA</i> Hübner, 1821				<i>DICYCLA</i> Guenée, 1852	
2649.	<i>pulmonaris</i> (Esper, 1790)	506, 938	2675.	<i>oo</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>SPODOPTERA</i> Guenée, 1852				<i>COSMIA</i> Ochseneimer, 1816	
2650.	<i>exigua</i> (Hübner, 1808)	1 M	2676.	<i>affinis</i> (Linnaeus, 1767)	1
<i>CHILODES</i> Herrich-Schäffer, 1849			2677.	<i>diffinis</i> (Linnaeus, 1767)	1
2651.	<i>maritimus</i> (Tauscher, 1806)	1	2678.	<i>pyralina</i> (D. & Sch., 1775)	1
<i>ATHETIS</i> Hübner, 1821			2679.	<i>trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	1
2652.	<i>furvula</i> (Hübner, 1808)	N		<i>ATETHMIA</i> Hübner, 1821	
	<i>lenta</i> Tr., 1825		2680.	<i>ambusta</i> (D. & Sch., 1775)	1
2653.	<i>pallustris</i> (Hübner, 1808)	1		<i>XANTHIA</i> Ochseneimer, 1816	
<i>DYPTERYGIA</i> Stephens, 1829			2681.	<i>togata</i> (Esper, 1788)	1
2654.	<i>scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)	1		<i>lutea</i> Ström., 1783, nec Stoll, 1781	
<i>RUSINA</i> Stephens, 1829				<i>flavago</i> F., 1787, nec D. & Sch., 1775	
2655.	<i>ferruginea</i> (Esper, 1785)	1	2682.	<i>aurago</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>umbratica</i> Gz., 1781, nec L., 1758		2683.	<i>sulphurago</i> (D. & Sch., 1775)	1 *
	<i>tenebrosa</i> Hb., 1803		2684.	<i>icteritia</i> (Hufnagel, 1766)	1
<i>MORMO</i> Ochseneimer, 1816				<i>fulvago</i> auct., nec Cl., 1759	
2656.	<i>maura</i> (Linnaeus, 1758)	1	2685.	<i>gilvago</i> (D. & Sch., 1775)	1 *
<i>THALPOPHILA</i> Hübner, 1820			2686.	<i>ocellaris</i> (Borkhausen, 1792)	1
2657.	<i>matura</i> (Hufnagel, 1766)	1	2687.	<i>citrago</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>TRACHEA</i> Ochseneimer, 1816				<i>AGROCHOLA</i> Hübner, 1821	
2658.	<i>atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	1	2688.	<i>lychnidis</i> (D. & Sch., 1775)	1
<i>EUPLEXIA</i> Stephens, 1829				<i>pistacina</i> D. & Sch., 1775	
2659.	<i>lucipara</i> (Linnaeus, 1758)	1	2689.	<i>circellaris</i> (Hufnagel, 1766)	1
<i>PHLOGOPHORA</i> Treitschke, 1825			2690.	<i>lota</i> (Clerck, 1759)	1
2660.	<i>meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	1 M			

2691.	<i>macilenta</i> (Hübner, 1809)	1			<i>DRYOBOTODES</i> Warren, 1911	
2692.	<i>nitida</i> (D. & Sch., 1775)	1			2724. <i>eremita</i> (Fabricius, 1775)	1
	<i>lucida</i> auct., nec Hfn., 1766				<i>protea</i> D. & Sch., 1775	
2693.	<i>helvola</i> (Linnaeus, 1758)	1			<i>ANTITYPE</i> Hübner, 1821	
2694.	<i>humilis</i> (D. & Sch., 1775)	1			2725. <i>chi</i> (Linnaeus, 1758)	1
2695.	<i>litura</i> (Linnaeus, 1761)	1			<i>AMMOCONIA</i> Lederer, 1857	
2696.	<i>laevis</i> (Hübner, 1803)	1			2726. <i>caecimacula</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>SPUDAEA</i> Snellen, 1867				<i>POLYMIXIS</i> Hübner, 1820	
2697.	<i>ruticilla</i> (Esper, 1791)	1 X			2727. <i>polymita</i> (Linnaeus, 1761)	(953) K ?I
	<i>EUPSILIA</i> Hübner, 1821				2728. <i>xanthomista</i> (Hübner, 1819)	1
2698.	<i>transversa</i> (Hufnagel, 1766)	1			2729. <i>flavicincta</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>satellitica</i> L., 1767				2730. <i>gemmea</i> (Treitschke, 1825)	1
	<i>JODIA</i> Hübner, 1818				<i>BLEPHARITA</i> Hampson, 1907	
2699.	<i>croceago</i> (D. & Sch., 1775)	1			2731. <i>satura</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>CONISTRA</i> Hübner, 1821				<i>porphyrea</i> auct., nec D. & Sch., 1775	
2700.	<i>vaccinii</i> (Linnaeus, 1761)	1			2732. <i>amica</i> (Treitschke, 1825)	570 K
2701.	<i>ligula</i> (Esper, 1791)	1			<i>MNIOTYPE</i> Franclemont, 1941	
2702.	<i>rubiginosa</i> (Scopoli, 1763)	1			2733. <i>adusta</i> (Esper, 1790)	1
	<i>vaupunctatum</i> Esp., 1786				<i>APAMEA</i> Ochsenheimer, 1816	
2703.	<i>erythrocephala</i> (D. & Sch., 1775)	1			2734. <i>monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	1
2704.	<i>rubiginea</i> (D. & Sch., 1775)	1			2735. <i>sicula</i> (Turati, 1909)	300
	<i>EPISEMA</i> Ochsenheimer, 1816				<i>talosi</i> Kovács & Varga, 1969	
2705.	<i>glaucina</i> (Esper, 1789)	1			2736. <i>lithoxylaea</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>BRACHIONYPCHA</i> Hübner, 1819				2737. <i>sublustis</i> (Esper, 1788)	1
2706.	<i>sphinx</i> (Hufnagel, 1766)	1			2738. <i>crenata</i> (Hufnagel, 1766)	1
2707.	<i>nubeculosa</i> (Esper, 1785)	1			2739. <i>epomidion</i> (Haworth, 1809)	1
	<i>DASYPOLIA</i> Guenée, 1852				<i>characterica</i> auct., nec D. & Sch., 1775	
2708.	<i>templi</i> (Thunberg, 1792)	1			<i>hepatica</i> auct., nec Cl., 1759	
	<i>BRACHYLOMIA</i> Hampson, 1906				2740. <i>lateritia</i> (Hufnagel, 1766)	1
2709.	<i>viminalis</i> (Fabricius, 1776)	1			2741. <i>furva</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>APOROPHYLA</i> Guenée, 1841				2742. <i>maillardi</i> (Geyer, 1834)	973 *
2710.	<i>lutulenta</i> (D. & Sch., 1775)	1			2743. <i>rubirena</i> (Treitschke, 1825)	1
	<i>LITHOMOIA</i> Hübner, 1821				2744. <i>oblonga</i> (Haworth, 1809)	1
2711.	<i>solidaginis</i> (Hübner, 1803)	1			<i>abjecta</i> Hb., 1813	
	<i>LITHOPHANE</i> Hübner, 1821				2745. <i>remissa</i> (Hübner, 1809)	1
2712.	<i>semibrunnea</i> (Haworth, 1809)	1			<i>obscura</i> Hw., 1809	
2713.	<i>socia</i> (Hufnagel, 1766)	1			<i>gemina</i> Hb., 1813	
	<i>hepatica</i> auct., nec Cl., 1759				2746. <i>unanimis</i> (Hübner, 1813)	1
2714.	<i>ornitopus</i> (Hufnagel, 1766)	1			2747. <i>illyria</i> Freyer, 1846	602
2715.	<i>furcifera</i> (Hufnagel, 1766)	1			2748. <i>anceps</i> (D. & Sch., 1775)	1
2716.	<i>consocia</i> (Borkhausen, 1792)	508			<i>sordida</i> Bkh., 1816	
	<i>ingrica</i> H.-S., 1850				2749. <i>sordens</i> (Hufnagel, 1766)	1
2717.	<i>lamda</i> (Fabricius, 1787)	1			<i>basilinea</i> D. & Sch., 1775	
	<i>XYLENA</i> Ochsenheimer, 1816				2750. <i>scolopacina</i> (Esper, 1788)	1
2718.	<i>vetusta</i> (Hübner, 1813)	1			2751. <i>ophiogramma</i> (Esper, 1794)	1
2719.	<i>exsoleta</i> (Linnaeus, 1758)	1			<i>PABULATRIX</i> Sugi, 1982	K
	<i>MEGANEPHRIA</i> Hübner, 1821				2752. <i>pabulatricula</i> (Brahm, 1791)	1
2720.	<i>bimaculosa</i> (Linnaeus, 1767)	1 * K			<i>OLIGIA</i> Hübner, 1821	
	<i>ALLOPHYYES</i> Tams, 1942				2753. <i>strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	1
2721.	<i>oxyacanthae</i> (Linnaeus, 1758)	1			2754. <i>versicolor</i> (Borkhausen, 1792)	20
	<i>DICHONIA</i> Hübner, 1821				2755. <i>latruncula</i> (D. & Sch., 1775)	1
2722.	<i>aprilina</i> (Linnaeus, 1758)	1			2756. <i>fasciuncula</i> (Haworth, 1809)	479
2723.	<i>convergens</i> (D. & Sch., 1775)	1				

<i>MESOLIGIA</i> Boursin, 1965			2787.	<i>pygmina</i> (Haworth, 1809)	1
2757.	<i>furuncula</i> (D. & Sch., 1775)	1		<i>fulva</i> Hb., 1813	
	<i>bicoloria</i> Vill., 1789			<i>ORIA</i> Hübner, 1821	
2758.	<i>literosa</i> (Haworth, 1809)	547	2788.	<i>musculosa</i> (Hübner, 1808)	1
<i>MESAPAMEA</i> Heinicke, 1959				<i>SESAMIA</i> Guenée 1852	
2759.	<i>secalis</i> (Linnaeus, 1758)	1	2789.	<i>cretica</i> (Lederer, 1857)	371 K I
2760.	<i>didyma</i> (Esper, 1788)	213		<i>CHARANYCA</i> Billberg, 1820	
	<i>secalella</i> Remm, 1983		2790.	<i>trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	1
2761.	<i>remmi</i> Rezbanyai-Reser, 1985	570	<i>Hadeninae</i>		
<i>EREMOBIA</i> Stephens, 1829				<i>DISCESTRA</i> Hampson, 1905	
2762.	<i>ochroleuca</i> (D. & Sch., 1775)	1 *	2791.	<i>trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	1
<i>LUPERINA</i> Boisduval, 1829			2792.	<i>microndon</i> (Guenée, 1852)	(879) K
2763.	<i>testacea</i> (D. & Sch., 1775)	1		<i>marmorosa</i> Bkh., 1792, nec Esp., 1788	
2764.	<i>nickerlii</i> (Freyer, 1845)	1		<i>ANARTA</i> Ochsenheimer, 1816	
2765.	<i>zollikoferi</i> (Freyer, 1836)	1	2793.	<i>myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)	1
<i>RHIZEDRA</i> Warren, 1911			2794.	<i>cordigera</i> (Thunberg, 1788)	1
2766.	<i>lutosa</i> (Hübner, 1803)	1	<i>LACANOBIA</i> Billberg, 1820		
<i>AMPHIPOEA</i> Billberg, 1820			2795.	<i>w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	1
2767.	<i>oculea</i> (Linnaeus, 1761)	1		<i>genistae</i> Bkh., 1792	
	<i>nictitans</i> L., 1767		2796.	<i>aliena</i> (Hübner, 1809)	1
2768.	<i>fucosa</i> (Freyer, 1830)	419 K	2797.	<i>splendens</i> (Hübner, 1808)	(60) K
2769.	<i>lucens</i> (Freyer, 1845)	483 K	2798.	<i>oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	1
<i>HYDRAECIA</i> Guenée, 1841			2799.	<i>contigua</i> (D. & Sch., 1775)	1
2770.	<i>micacea</i> (Esper, 1789)	1	2800.	<i>thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	1
2771.	<i>ultima</i> Holst, 1965	486	2801.	<i>suasa</i> (D. & Sch., 1775)	1
2772.	<i>petasitis</i> Doubleday, 1847	191		<i>dissimilis</i> Knoch, 1781	
<i>GORTYNA</i> Ochsenheimer, 1816				<i>HADA</i> Billberg, 1820	
2773.	<i>flavago</i> (D. & Sch., 1775)	1	2802.	<i>plebeja</i> (Linnaeus, 1761)	1
	<i>ochracea</i> Hb., 1786			<i>nana</i> Hfn., 1766	
<i>CALAMIA</i> Hübner, 1821				<i>dentina</i> D. & Sch., 1775	
2774.	<i>tridens</i> (Hufnagel, 1766)	1		<i>AETHERIA</i> Hübner, 1821	
	<i>virens</i> L., 1767		2803.	<i>bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)	1
<i>STAUROPHORA</i> Reichenbach, 1817				<i>serena</i> F., 1775	
2775.	<i>celsia</i> (Linnaeus, 1758)	1	2804.	<i>dysodea</i> (D. & Sch., 1775)	1
<i>CELAENA</i> Stephens, 1829				<i>spinaciae</i> View., 1789	
2776.	<i>leucostigma</i> (Hübner, 1808)	1		<i>chrysozona</i> Bkh., 1792	
2777.	<i>haworthii</i> (Curtis, 1829)	563	<i>HADENA</i> Schrank, 1802		
<i>NONAGRIA</i> Ochsenheimer, 1816			2805.	<i>bicruris</i> (Hufnagel, 1766)	1
2778.	<i>typhae</i> (Thunberg, 1784)	1		<i>capsicola</i> D. & Sch., 1775	
<i>PHRAGMATIPHILA</i> Hampson, 1908			2806.	<i>luteago</i> (D. & Sch., 1775)	1
2779.	<i>nexa</i> (Hübner, 1808)	13	2807.	<i>albimacula</i> (Borkhausen, 1792)	1
<i>ARCHANARA</i> Walker, 1866			2808.	<i>compta</i> (D. & Sch., 1775)	1
2780.	<i>geminipuncta</i> (Haworth, 1809)	1	2809.	<i>confusa</i> (Hufnagel, 1766)	1
2781.	<i>dissoluta</i> (Treitschke, 1825)	423		<i>nana</i> Rott., 1776	
2782.	<i>sparganii</i> (Esper, 1790)	601	2810.	<i>filigrama</i> (Esper, 1788)	1
2783.	<i>algae</i> (Esper, 1789)	1	2811.	<i>rivularis</i> (Fabricius, 1775)	1
	<i>cannae</i> O., 1816			<i>cucubali</i> D. & Sch., 1775	
<i>CHORTODES</i> Tutt, 1897			2812.	<i>perplexa</i> (D. & Sch., 1775)	1
2784.	<i>minima</i> (Haworth, 1809)	1		<i>lepida</i> Esp., 1790	
	<i>arcuosa</i> Hw., 1809			<i>carphopaga</i> Bkh., 1792	
2785.	<i>extrema</i> (Hübner, 1809)	301	2813.	<i>irregularis</i> (Hufnagel, 1766)	1
2786.	<i>fluxa</i> (Hübner, 1809)	1			
	<i>hellmanni</i> Ev., 1843				

<i>SIDERIDIS</i> Hübner, 1821			
2814.	<i>lampra</i> (Schawerda, 1913)	1	
	<i>evidens</i> Hb., 1808, nec Thbg., 1784		
	<i>anapheles</i> Nye, 1975		
2815.	<i>albicolon</i> (Hübner, 1813)	1	
<i>HELIOPHOBUS</i> Boisduval, 1829			
2816.	<i>reticulatus</i> (Goeze, 1781)	1	
2817.	<i>kitti</i> (Schawerda, 1914)	619	
	<i>texturatus</i> auct., nec Alph., 1892		
<i>MELANCHRA</i> Hübner, 1820			
2818.	<i>persicariae</i> (Linnaeus, 1761)	1	
2819.	<i>pisi</i> (Linnaeus, 1758)	1	
<i>MAMESTRA</i> Ochsenheimer, 1816			
2820.	<i>brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	1	
<i>PAPESTRA</i> Sukhareva, 1973			
2821.	<i>biren</i> (Goeze, 1781)	1	
	<i>glauca</i> Hb., 1809		
<i>POLIA</i> Ochsenheimer, 1816			
2822.	<i>bombycina</i> (Hufnagel, 1766)	1	
	<i>advena</i> F., 1775		
2823.	<i>hepatica</i> (Clerck, 1759)	1	
	<i>tincta</i> Brahm, 1791		
2824.	<i>nebulosa</i> (Hufnagel, 1766)	1	
2825.	<i>serratilinea</i> Ochsenheimer, 1816	1	
<i>LEUCANIA</i> Ochsenheimer, 1816			
2826.	<i>obsoleta</i> (Hübner, 1803)	1	
2827.	<i>comma</i> (Linnaeus, 1761)	1	
<i>MYTHIMNA</i> Ochsenheimer, 1816			
2828.	<i>turca</i> (Linnaeus, 1761)	1	
2829.	<i>conigera</i> (D. & Sch., 1775)	1	
2830.	<i>ferrago</i> (Fabricius, 1787)	1	
	<i>lithargyria</i> Esp., 1788		
2831.	<i>albipuncta</i> (D. & Sch., 1775)	1	
2832.	<i>vitellina</i> (Hübner, 1808)	1 M	
2833.	<i>pudorina</i> (D. & Sch., 1775)	1	
	<i>impudens</i> Hb., 1803		
2834.	<i>straminea</i> (Treitschke, 1825)	1	
2835.	<i>impura</i> (Hübner, 1808)	1	
2836.	<i>pallens</i> (Linnaeus, 1758)	1	
2837.	<i>l-album</i> (Linnaeus, 1767)	1 M	
2838.	<i>scirpi</i> (Duponchel, 1836)	19	
	<i>sicula</i> auct., nec Tr., 1835		
2839.	<i>andereggii</i> (Boisduval, 1840)	465	
<i>PSEUDALETIA</i> Franclemont, 1951			
2840.	<i>unipuncta</i> (Haworth, 1809)	308 M	
<i>ORTHOSIA</i> Ochsenheimer, 1816			
2841.	<i>incerta</i> (Hufnagel, 1766)	1	
2842.	<i>gothica</i> (Linnaeus, 1758)	1	
2843.	<i>cruda</i> (D. & Sch., 1775)	1	
	<i>pulverulenta</i> Esp., 1786		
2844.	<i>miniosa</i> (D. & Sch., 1775)	1	
2845.	<i>opima</i> (Hübner, 1809)	1	
2846.	<i>populeti</i> (Fabricius, 1781)	1	
	<i>populi</i> Ström, 1783		
2847.	<i>cerasi</i> (Fabricius, 1775)	1	
	<i>stabilis</i> D. & Sch., 1775		
2848.	<i>gracilis</i> (D. & Sch., 1775)	1	
2849.	<i>munda</i> (D. & Sch., 1775)	1	
<i>PANOLIS</i> Hübner, 1821			
2850.	<i>flammea</i> (D. & Sch., 1775)	1	
	<i>griseovariegata</i> Gz., 1781		
	<i>piniperda</i> Panz., 1786		
<i>EGIRA</i> Duponchel, 1845			
2851.	<i>conspicillaris</i> (Linnaeus, 1758)	1	
<i>CERAPTERYX</i> Curtis, 1833			
2852.	<i>graminis</i> (Linnaeus, 1758)	1	
<i>THOLERA</i> Hübner, 1821			
2853.	<i>decimalis</i> (Poda, 1761)	1	
	<i>popularis</i> F., 1775		
2854.	<i>cespitis</i> (D. & Sch., 1775)	1	
<i>PACHETRA</i> Guenée, 1841			
2855.	<i>sagittigera</i> (Hufnagel, 1766)	1	
	<i>leucophaea</i> D. & Sch., 1775		
	<i>fulminea</i> F., 1777, nec Sc., 1763		
<i>ERIOPYGODES</i> Hampson, 1905			
2856.	<i>imbecillus</i> (Fabricius, 1794)	1	
<i>LASIONYCTA</i> Aurivillius, 1892			
2857.	<i>proxima</i> (Hübner, 1809)	1	
Noctuinae			
<i>AXYLIA</i> Hübner, 1821			
2858.	<i>putris</i> (Linnaeus, 1761)	1	
<i>CHROPLEURA</i> Hübner, 1821			
2859.	<i>flammatra</i> (D. & Sch., 1775)	1 *	
2860.	<i>musiva</i> (Hübner, 1803)	1	
2861.	<i>plecta</i> (Linnaeus, 1761)	1	
<i>DIARSIA</i> Hübner, 1821			
2862.	<i>medica</i> (Fabricius, 1775)	1	
	<i>festiva</i> D. & Sch., 1775		
	<i>primulae</i> Esp., 1788		
2863.	<i>dahlia</i> (Hübner, 1813)	1	
2864.	<i>brunnea</i> (D. & Sch., 1775)	1	
2865.	<i>rubi</i> (Vieweg, 1790)	1	
2866.	<i>florida</i> (Schmidt, 1859)	1	
<i>NOCTUA</i> Linnaeus, 1758			
2867.	<i>pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	1	
2868.	<i>orbona</i> (Hufnagel, 1766)	1	
2869.	<i>interposita</i> (Hübner, 1790)	977	
2870.	<i>comes</i> Hübner, 1813	1	
2871.	<i>fimbriata</i> (Schreber, 1759)	1	
2872.	<i>janthina</i> D. & Sch., 1775	1	
2873.	<i>interjecta</i> Hübner, 1802	19	
<i>EPILECTA</i> Hübner, 1821			
2874.	<i>linogrisea</i> (D. & Sch., 1775)	1	

<i>LYCOPHOTIA</i> Hübner, 1821			<i>CERASTIS</i> Ochsenheimer, 1816		
2875.	<i>molothina</i> (Esper, 1789)	1	2907.	<i>rubricosa</i> (D. & Sch., 1775)	1
2876.	<i>porphyrea</i> (D. & Sch., 1775)	1	2908.	<i>leucographa</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>strigula</i> Thbg., 1788		<i>NAENIA</i> Stephens, 1827		
<i>CHERSOTIS</i> Boisduval, 1840			2909.	<i>typica</i> (Linnaeus, 1758)	1
2877.	<i>rectangula</i> (D. & Sch., 1775)	1 M	<i>ANAPLECTOIDES</i> McDunnough, 1929		
2878.	<i>multangula</i> (Hübner, 1803)	1	2910.	<i>prasinus</i> (D. & Sch., 1775)	1
2879.	<i>margaritacea</i> (de Villers, 1789)	1	<i>PROTOLAMPRA</i> McDunnough, 1929		
2880.	<i>cuprea</i> (D. & Sch., 1775)	1	2911.	<i>sobrina</i> (Duponchel, 1843)	1
<i>RHYACIA</i> Hübner, 1821			<i>PERIDROMA</i> Hübner, 1821		
2881.	<i>simulans</i> (Hufnagel, 1766)	1	2912.	<i>saucium</i> (Hübner, 1808)	1 M
2882.	<i>lucipeta</i> (D. & Sch., 1775)	1	<i>PAREXARNIS</i> Boursin, 1946		
<i>EPIPSILIA</i> Hübner, 1821			2913.	<i>fugax</i> (Treitschke, 1825)	1
2883.	<i>latens</i> (Hübner, 1809)	1	<i>ACTEBIA</i> Stephens, 1829		
<i>PARADIARSIA</i> McDunnough, 1929			2914.	<i>praecox</i> (Linnaeus, 1758)	1
2884.	<i>glareosa</i> (Esper, 1788)	1	<i>EUXOA</i> Hübner, 1821		
<i>EUROIS</i> Hübner, 1821			2915.	<i>recussa</i> (Hübner, 1817)	1
2885.	<i>occultus</i> (Linnaeus, 1758)	1	2916.	<i>birivia</i> (D. & Sch., 1775)	1
<i>SPAELOTIS</i> Boisduval, 1840			2917.	<i>decora</i> (D. & Sch., 1775)	1
2886.	<i>ravida</i> (D. & Sch., 1775)	1	2918.	<i>aquilina</i> (D. & Sch., 1775)	1 K
	<i>obscura</i> Brahm., 1791		2919.	<i>nigricans</i> (Linnaeus, 1761)	1
2887.	<i>senna</i> (Freyer, 1829)	752 K I	2920.	<i>tritici</i> (Linnaeus, 1761)	1
<i>OPIGENA</i> Boisduval, 1840				<i>eruta</i> Hb., 1817	
2888.	<i>polygona</i> (D. & Sch., 1775)	1 M	2921.	<i>crypta</i> (Dadd, 1927)	824 P
<i>GRAPHIPHORA</i> Ochsenheimer, 1816			2922.	<i>obelisca</i> (D. & Sch., 1775)	1
2889.	<i>augur</i> (Fabricius, 1775)	1	2923.	<i>vitta</i> (Esper, 1789)	1
<i>EUGNORISMA</i> Boursin, 1946			<i>DICHAGYRIS</i> Lederer, 1857		
2890.	<i>depuncta</i> (Linnaeus, 1761)	1	2924.	<i>candelisequa</i> (D. & Sch., 1775)	1
<i>XESTIA</i> Hübner, 1818			<i>YIGOGA</i> Nye, 1975		
2891.	<i>speciosa</i> (Hübner, 1813)	1	2925.	<i>forcipula</i> (D. & Sch., 1775)	1
2892.	<i>sincera</i> (H.-S., 1851)	68	2926.	<i>signifera</i> (D. & Sch., 1775)	1 P
2893.	<i>rhaetica</i> (Staudinger, 1871)	708	<i>AGROTIS</i> Ochsenheimer, 1816		
2894.	<i>alpicola</i> (Zetterstedt, 1839)	881	2927.	<i>crassa</i> (Hübner, 1803)	1
2895.	<i>c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	1	2928.	<i>ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	1 M
2896.	<i>ditrapezium</i> (D. & Sch., 1775)	1	2929.	<i>exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	1
2897.	<i>triangulum</i> (Hufnagel, 1766)	1	2930.	<i>clavis</i> (Hufnagel, 1766)	1
2898.	<i>ashworthii</i> (Doubleday, 1855)	1		<i>corticea</i> D. & Sch., 1775	
	<i>candelisequa</i> Hb., 1813, nec D. & Sch., 1775		2931.	<i>segetum</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>candelarum</i> Stgr., 1871			<i>segetis</i> Hb., 1827	
2899.	<i>baja</i> (D. & Sch., 1775)	1	2932.	<i>vestigialis</i> (Hufnagel, 1766)	1
2900.	<i>rhomboidea</i> (Esper, 1790)	1	2933.	<i>cinerea</i> (D. & Sch., 1775)	1
	<i>stigmatica</i> Hb., 1813		<i>DILOBA</i> Boisduval, 1840		
2901.	<i>castanea</i> (Esper, 1798)	427	2934.	<i>caeruleocephala</i> (Linnaeus, 1758)	1
2902.	<i>collina</i> (Boisduval, 1840)	1	2935. = 221a.		
2903.	<i>sexstrigata</i> (Haworth, 1809)	496	2936. = 2437a.		
	<i>umbrosa</i> Hb., 1813				
2904.	<i>xanthographa</i> (D. & Sch., 1775)	1			
<i>EUGRAPHE</i> Hübner, 1821					
2905.	<i>sigma</i> (D. & Sch., 1775)	1			
	<i>signum</i> F., 1787				
2906.	<i>subrosea</i> (Stephens, 1829)	1			

214. *Cephimallota crassiflavella* Bruand, 1851

Druh byl z Čech uveden pouze Petersenem (1965), a to jako *C. simplicella* (Zeller, 1852). Vzhledem k určitým nejasnostem a synonymickým změnám v poslední době byl autory katalogu revidován všechny dostupný materiál, pocházející ze středních a severních Čech. Ve všech případech bylo zjištěno, že náleží blízkce příbuznému druhu *C. angusticostella* (Zeller, 1839), publikovanému z Čech v nedávné době ještě jako *C. hasarorum* Zagulajev, 1965 (Liška & Skyva 1991). Výskyt druhu *C. crassiflavella* není možno z uvedených důvodů považovat v Čechách za spolehlivě prokázaný. Podobný názor v současnosti vyslovují i Tokár, Slamka & Pastorális (1996).

Die Art wurde aus Böhmen nur von Petersen (1965) angeführt, und zwar als *C. simplicella* (Zeller, 1852). In bezug auf bestimmte Unklarheiten und synonymische Änderungen in der letzten Zeit wurde von den Autoren des Katalogs alles zugängliche Material aus Mittel- und Nordböhmen revidiert. In allen Fällen wurde festgestellt, daß es der nahestehenden Art *C. angusticostella* (Zeller, 1839) gehört, die unlängst von Böhmen noch als *C. hasarorum* Zagulajev, 1965 (Liška & Skyva 1991) publiziert wurde. Das Vorkommen von *C. crassiflavella* kann man aus den angeführten Gründen nicht für verlässlich halten. Eine ähnliche Ansicht sprechen in der Gegenwart auch Tokár, Slamka & Pastorális (1996) aus.

215. *Reisseria relicinella* (Herrich-Schäffer, 1853)

Z Čech dosud existuje pouze literární údaj Sternecka & Zimmermanna (1933), založený na 1 exempláři z Mikulášovic (5052), který pochází ze sbírky J. Manna. Nálezy tohoto teplomilného druhu jsou ve střední Evropě velmi vzácné a soustřeďují se převážně do její jihovýchodní části. Pro spolehlivé prokázání výskytu v Čechách jsou nutné další nálezy.

Aus Böhmen existiert bisher nur eine literarische Angabe von Sterneck & Zimmermann (1933), basierende auf einem einzigen Exemplar aus Mikulášovice (5052), das aus der Sammlung von J. Mann stammt. Funde dieser wärmeliebenden Art sind in Mitteleuropa sehr selten und stammen überwiegend aus dessen südöstlichem Teil. Für eine verlässliche Beweisung des Vorkommens in Böhmen sind weitere Funde erforderlich.

218. *Ischnoscia borreonella* (Millière, 1874)

Druh známý z Čech pouze na základě nálezu Kroneho z oblasti Krkonoš (Nickerl 1908). Sterneck & Zimmermann (1933) považují údaj za spolehlivý, Petersen (1965) však tohoto mola z našeho území neuvádí, přičemž však Nickerlův údaj ani nezmiňuje. S přihlédnutím ke známému rozšíření není sice jeho výskyt v Čechách vyloučen, pokud však nebude k dispozici nový spolehlivý nález, je nutno považovat zde tento druh za nejistý.

Diese Art ist aus Böhmen nur auf Grund eines Fundes von Krone aus dem Gebiet des Riesengebirges (Nickerl 1908) bekannt. Sterneck & Zimmermann (1933) halten diese Angabe für verlässlich, Petersen (1965) jedoch führt diese Motte aus unserem Gebiet nicht an, wobei er die nickerlsche Angabe nicht erwähnt. Mit Rücksicht auf die bekannte Verbreitung ist ihr Vorkommen in Böhmen nicht ausgeschlossen, aber bis zu einem verlässlichen Fund muß sie in Böhmen für unsicher gehalten werden.

286. *Parornix anglicella* (Stainton, 1850)

Mezi studovanými exempláři existují ve sbírkách entomologů v ČR i SR jedinci, kteří se liší výrazně ve stavbě kopulačních orgánů, především u samců. V publikaci Tokár,

Slamka & Pastorális (1996) jsou kopulační orgány obou pohlaví vyobrazeny a možnost, že jde o nový, doposud nepopsaný druh, naznačena.

Unter den studierten Exemplaren existieren in den entomologischen Sammlungen in der Tschechischen als auch Slovakischen Republik Individuen, die sich grundsätzlich im Bau der Kopulationsorgane, vor allem bei den Männchen unterscheiden. In der Publikation von Tokár, Slamka & Pastorális (1996) sind die Kopulationsorgane beider Geschlechter abgebildet und die Möglichkeit, daß es sich um eine neue, bisher unbeschriebene Art handeln könne, angedeutet.

329. *Phyllonorycter acaciellus* (Duponchel, 1843)

Z Čech existuje jediný starší ověřený údaj z Roudnice nad Labem (5551), dosud nepublikovaný. Doklad se nachází ve sbírce B. Starého v Praze. Výskyt je žádoucí potvrdit novějšími nálezy (viz též kapitolu „Nové, z Čech dosud neuváděné druhy“).

Aus Böhmen stammt nur eine ältere überprüfte, bisher nicht publizierte Angabe aus Roudnice nad Labem (5551). Das Belegstück befindet sich in der Sammlung von B. Starý (Prag). Eine Bestätigung durch neuere Funde ist erforderlich (siehe auch Kapitel „Neue, für Böhmen bisher nicht angegebene Arten“).

330. *Phyllonorycter scabiosellus* (Douglas, 1853)

Totéž co u předešlého druhu. Jediný doklad však pochází z Prahy.

Dasselbe wie bei der vorigen Art, das Belegstück stammt aber aus Prag.

397. *Kessleria alpicella* (Stainton, 1851)

Z Čech dosud existoval pouze jediný nález Nickerlův ze Svatého Jana pod Skalou (6050) (1 sameček vychován v roce 1868 z listové růžice *Saxifraga paniculata*, dokladový exemplář in coll. NMP). Sám Nickerl (1908) uvádí, že přes opakovanou snahu se mu další exempláře vychovat ani nalézt nepodařilo. Teprve v roce 1997 se podařilo výskyt na téže lokalitě znovu potvrdit (viz též kapitolu P - „Nově potvrzené a ověřené nálezy“). Výskyt tohoto druhu ve středních Čechách je ze zoogeografického hlediska velmi významný, neboť dosud je znám pouze z horských poloh Alp a Karpat.

Aus Böhmen stammte bisher nur ein einziger Fund von Nickerl aus Svatý Jan pod Skalou (6050) (1 Männchen im J. 1868 aus der Blattröse von *Saxifraga paniculata* gezüchtet, das Belegstück befindet sich in der Sammlung des NMP). Nickerl (1908) gibt selbst an, daß trotz wiederholtem Bestreben es ihm nicht gelungen ist weitere Exemplare zu züchten oder finden. Erst im J. 1997 ist es gelungen das Vorkommen auf derselben Lokalität wieder zu bestätigen (siehe auch Kapitel P - „Neu bestätigte und überprüfte Funde“). Das Vorkommen von dieser Art ist in Mittelböhmen aus dem zoogeographischen Standpunkt sehr bedeutsam, denn bisher ist sie nur von den Gebirgslagen der Alpen und Karpaten bekannt.

568. *TICHONIA* Hübner, 1825

In Karsholt & Razowski (1996): *CRASSA* Bruand, 1850.

584. *OROPHIA* Hübner, 1825

In Karsholt & Razowski (1996): *CEPHALISPHEIRA* Bruand, 1850.

593. *Pleurota pyropella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ze zkoumaného území existuje pouze nepublikovaný Schwarzův nález z roku 1933 z okolí Kácova (6256) (v současnosti in coll. Petrů). Výskyt v Čechách nutno potvrdit dalšími nálezy.

Aus dem untersuchten Gebiet existiert nur ein unpublizierter Fund von R. Schwarz vom J. 1933 aus der Umgebung von Kácov (6256) (in coll. Petrů). Das Vorkommen in Böhmen muß durch neue Funde bestätigt werden.

598. CHEIMOPHILA Hübner, 1825

In Karsholt & Razowski (1996): *DASYTROMA* Curtis, 1833.

639. Elachista dispilella Zeller, 1839

Validita *E. dispilella* a *E. distigmatella* Frey, 1859 je dosud nejasná. Příkladíme se k názoru, že nejde o dva samostatné druhy. Některé starší údaje o nálezech tohoto druhu se ve skutečnosti vztahují k nedávno popsanému druhu *E. steueri* Traugott-Olsen, 1990 (J. Liška revid.).

Die Validität von *E. dispilella* und *E. distigmatella* Frey, 1859 ist bisher unklar. Wir neigen zur Ansicht, daß es sich nicht um zwei Arten handelt. Einige ältere Angaben über diese Art beziehen sich tatsächlich auf die unlängst beschriebene Art *E. steueri* Traugott-Olsen, 1990 (J. Liška revid.).

641. Elachista gregori Traugott-Olsen, 1988

K tomuto druhu se ve skutečnosti vztahuje údaj o výskytu *E. hedemanni* Rebel, 1899 publikovaný Sterneckem & Zimmermannem (1933) (J. Liška revid.). Recentně je výskyt *E. gregori* v Čechách doložen sběry J. Lišky (viz též kapitolu „Nové, z Čech dosud neuváděné druhy“).

Auf diese Art bezieht sich in der Wirklichkeit eine Angabe über das Vorkommen von *E. hedemanni* Rebel, 1899, die von Sterneck & Zimmermann (1933) publiziert wurde (J. Liška revid.). Rezent ist das Vorkommen von *E. gregori* in Böhmen von J. Liška belegt (siehe auch Kapitel „Neue, für Böhmen bisher nicht angegebene Arten“).

642. Elachista svenssoni Traugott-Olsen, 1988

Spolehlivě doložen nálezy J. Lišky a J. Vávry (viz též kapitolu „Nové, z Čech dosud neuváděné druhy“). K tomuto druhu se pravděpodobně také vztahuje údaj Soldátův (1980), publikovaný jako „*E. triseriatella* Stt.“, neboť poblíže místa Soldátova sběru našel *E. svenssoni* P. Šrůtka (in coll. J. Liška). Soldátův autentický materiál nebyl prozatím ověřen.

Diese Art ist mit den Funden von J. Liška und J. Vávra verlässlich belegt (siehe auch Kapitel „Neue, für Böhmen bisher nicht angegebene Arten“). Zu dieser Art kann auch die Angabe von Soldát (1980) gehören, die als „*E. triseriatella* Stt.“ publiziert wurde, denn in der Nähe der Soldát's Lokalität hat P. Šrůtka *E. svenssoni* gefunden (in coll. J. Liška). Das autentische Material von Soldat wurde bis jetzt nicht überprüft.

643. Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)

Traugott-Olsen (1992) ve své revizi popsal ze skupiny *E. dispunctella* několik desítek nových druhů, z čehož více než 10 ze středoevropského prostoru. Český materiál nebyl zatím k žádnému z těchto druhů přiřazen, a to z důvodu určitých pochybností o validitě některých nově popsaných taxonů.

Traugott-Olsen (1992) hat in seiner Revision aus der Gruppe von *E. dispunctella* einige Zehnte neuer Arten beschrieben, von denen mehr als 10 aus dem mitteleuropäischen Raum. Das böhmische Material wurde bisher zu keiner von diesen Arten zugereicht, das aus den Gründen bestimmter Zweifel über die Validität einiger von den neu beschriebenen Arten.

656. Elachista adscitella Stainton, 1851

K tomuto druhu se ve skutečnosti vztahuje údaj Jaroše & Spitzera (1987) o výskytu *E. revinctella* Zeller, 1850, jenž byl donedávna s *E. adscitella* zaměňován (*E. revinctella* je typický mediteránní druh, ve střední Evropě nebyl dosud zjištěn a pravděpodobně se zde ani nevyskytuje).

Auf diese Art bezieht sich in der Wirklichkeit die Angabe von Jaroš & Spitzer (1987) über das Vorkommen von *E. revinctella* Zeller, 1850, die bislang mit *E. adscitella* verwechselt wurde (*E. revinctella* ist eine typische mediterrane Art, die in Mitteleuropa nicht festgestellt wurde und hier wahrscheinlich nicht vorkommt).

691. *Coleophora vacciniella* Herrich-Schäffer, 1861

Nejnovější studie severských autorů (Itämies & Tabell 1997) zpochybňuje validitu druhu *C. betulaenanae* Klimesch, 1958 a považuje ho za mladší synonymum druhu *C. vacciniella*. Současně autoři dokazují, že ani živná rostlina *Betula nana* nemůže být důvodem k vyčleňování *C. betulaenanae* jako samostatného druhu. Odchytky ve stavbě samčích kopulačních orgánů českého exempláře *C. cf. betulaenanae* jsou v rámci druhové variability a proto je třeba přijmout závěry zmíněných autorů.

Die neueste Studie nordischer Autoren (Itämies & Tabell 1997) bezweifelt die Validität der Art *Coleophora betulaenanae* Klimesch, 1958 und haltet sie für das jüngere Synonym der Art *C. vacciniella*. Die Autoren beweisen auch, daß nicht einmal die Nährpflanze *Betula nana* zur Bildung *C. betulaenanae* als selbständigen Art berechtigt. Die Abweichungen im Bau des männlichen Kopulationsorgans des einzigen tschechischen Exemplars von *C. cf. betulaenanae* befinden sich im Rahmen der Artvariabilität und so muß man die Schlüsse der erwähnten Autoren annehmen.

740. *Coleophora dignella* Toll, 1961

Druh považovaný donedávna za mladší synonymum *C. albostraminata* Toll, 1960 a pod tímto jménem uváděný ze střední Evropy (z území České republiky Markem et al. 1992). Na validitu druhu *C. dignella* poukázal Baldizzone (1994), revize středoevropského materiálu pak prokázala příslušnost ke druhu *C. dignella*. Nález v Čechách představuje nejsevernější známé místo výskytu.

Eine Art, bislang als jüngerer Synonym von *C. albostraminata* Toll, 1960 gehalten und unter diesem Namen von Mitteleuropa (aus dem Gebiet von Böhmen von Marek et al. 1992) angeführt. Baldizzone (1994) machte auf die Validität der Art aufmerksam, die Revision des mitteleuropäischen Materials zeigte dann die Angehörigkeit zur Art *C. dignella*. Der böhmische Fund stellt die nördlichst bekannte Lokalität vor.

762. *Coleophora obscenella* Herrich-Schäffer, 1855

Není vyloučeno, že jde o dva druhy, z nichž *C. obscenella* se vyvíjí na semenech *Solidago virgaurea* a na *Critinia linosyris*, kdežto exempláře pocházející ze semen *Aster amellus* by mohly patřit jinému, dosud neodlišenému druhu. Teprve podrobnější studium sbírkového materiálu může vnést světlo do této problematiky.

Man kann nicht ausschließen, daß es sich um zwei Arten handelt, von denen *C. obscenella* sich auf den Samen von *Solidago virgaurea* und *Critinia linosyris* entwickelt, während die Exemplare, die von den Samen von *Aster amellus* stammen, zu einer bisher ununterschiedenen Art gehören könnten. Erst ein ausführlicheres Studium des Sammlungsmaterials kann diese Frage aufhellen.

862. *Scythris crassiuscula* (Herrich-Schäffer, 1855)

Druh je uveden Sterneckem & Zimmermannem (1933) pod jménem „*Scythris fuscocuprea* Hw.“ [*Porrectaria fuscocuprea* Haworth, 1828 je však synonymem druhu *Monochroa tenebrella* (Hübner, 1817) - cf. Bengtsson 1997]. Výskyt potvrzen recentně opakovanými sběry J. Lišky.

Die Art wurde von Sterneck & Zimmermann (1933) unter dem Namen „*Scythris fuscocuprea* Hw.“ angeführt [*Porrectaria fuscocuprea* Haworth, 1828 ist aber Synonymum der Art *Monochroa tenebrella* (Hübner, 1817) - cf. Bengtsson 1997]. Das Vorkommen wurde durch wiederholte Funde von J. Liška bestätigt.

881. *Apodia bifractella* (Duponchel, 1843)

Velmi podobná tomuto druhu je *A. martinii* Petry, 1911 popsaná ze severního Durynska. Karsholt (1995) studoval obsáhlý materiál rodu *Apodia* Heinemann, 1870 a protože neshledal zásadních rozdílů mezi *A. bifractella* a *A. martinii*, ponechal otázku validity druhého druhu otevřenou s poznámkou, že se může jednat o komplex velmi blízkých druhů.

Sehr ähnlich zu dieser Art ist *A. martinii* Petry, 1911, von Nordthüringen beschrieben. Karsholt (1995) hat ein inhaltreiches Material der Gattung *Apodia* Heinemann, 1870 untersucht und weil er keine grundsätzliche Unterschiede zwischen *A. bifractella* und *A. martinii* gefunden hatte, ließ er die Frage der Validität der zweiten Art offen mit der Bemerkung, daß es sich um einen Komplex sehr naher Arten handeln könnte.

915. *Stenolechiodes pseudogemmellus* Elsner, 1996

Podle sdělení autora je správné datum uveřejnění taxonů *Stenolechiodes* Elsner a *S. pseudogemmellus* Elsner (ve smyslu ICZN, kap. V., čl. 21) 1996 a nikoliv 1995.

Nach der Mitteilung des Autors ist das richtige Datum der Veröffentlichung der Taxone *Stenolechiodes* Elsner und *S. pseudogemmellus* Elsner (im Sinne des ICZN, Kap. V., Art. 21) 1996, nicht 1995.

923. *Teleiodes scriptellus* (Hübner, 1796)

Rodové zařazení tohoto druhu je třeba považovat za provizorní a v současnosti je předmětem studia (G. Elsner, in prep.).

Die Gattungszugehörigkeit dieser Art muß man für provisorisch ansehen und ist in der Gegenwart ein Studiumgegenstand (G. Elsner, in prep.).

999. *Scrobipalpula psilella* (Herrich-Schäffer, 1854)

1000. *Scrobipalpula tussilaginis* (Frey, 1867)

D. Povolný (ústní sdělení) považuje *S. tussilaginis* a další evropské druhy rodu *Scrobipalpula* Povolný, 1964 za trofické formy *S. psilella*. Tento názor vyžaduje experimentální ověření.

D. Povolný (mündliche Mitteilung) hält *S. tussilaginis* und weitere europäische Arten der Gattung *Scrobipalpula* Povolný, 1964 für trophische Formen der *S. psilella*. Diese Ansicht braucht experimentelle Beglaubigung.

1023. *REUTTIA* Hofmann, 1898

In Karsholt & Razowski (1996): *THIOTRICA* Meyrick, 1886.

1030. *Stomopteryx remissella* (Zeller, 1847)

Podle Huemera & Tarmanna (1993) je *S. remissella* komplexem druhů s nutností revize.

Nach Huemer & Tarmann (1993) ist *S. remissella* ein Komplex von Arten und eine Revision ist nötig.

1031. *Stomopteryx hungaricella* Gozmány, 1957

Karsholt & Huemer (1995) vyslovují domněnku, že taxon *S. hungaricella* představuje více než jeden druh. Jediný exemplář nalezený v Čechách (viz kapitulu „Nové, z Čech dosud neuváděné druhy“) se shoduje s původním popisem (Gozmány 1957).

Karsholt & Huemer (1995) sprechen die Annahme aus, daß das Taxon *S. hungaricella* mehr als eine Art darstellt. Das einzige Exemplar, das in Böhmen gefunden wurde (siehe Kapitel „Neue, für Böhmen bisher nicht angegebene Arten“), stimmt mit der ursprünglichen Beschreibung (Gozmány 1957) überein.

1037. *Syncopacma cincticulella* (Bruand, 1850)

1040. *Syncopacma albipalpella* (Herrich-Schäffer, 1854)

1042. *Iwaruna biguttella* (Duponchel, 1843)

Druhy rodů *Syncopacma* Meyrick, 1925, *Lixodessa* Gozmány, 1957 a *Iwaruna* Gozmány, 1957 jsou variabilní co do velikosti imagi i kresby křídel. Proto jsou všechny determinace na základě vnějších znaků nespolehlivé a vyžadují revizi.

Die Arten der Gattungen *Syncopacma* Meyrick, 1925, *Lixodessa* Gozmány, 1957 und *Iwaruna* Gozmány, 1957 sind variabel, was die Größe der Imagines als auch die Zeichnung der Flügel betrifft. Alle Determinationen auf Grund der äußeren Merkmale sind deswegen unverlässlich und bedürfen einer Revision.

1046. *Acompsia minorella* Rebel, 1899

Hering (1932) uvádí výskyt v Čechách, avšak bez přesnější lokalizace. Recentní potvrzení výskytu je žádoucí.

Hering (1932) gibt das Vorkommen in Böhmen an, aber ohne genaue Lokalität. Eine neue Bestätigung des Vorkommens ist erforderlich.

1059. *UNCUSTRIODONTA* Agenjo, 1952

In Karsholt & Razowski (1996): *CROSSOBELA* Meyrick, 1923.

1078. *Pennisetia bohémica* Králíček & Povolný, 1974

Druh byl u nás opakovaně publikován jako „*Bembecia pectinata* Stgr.“, poprvé Silbernagel (1943). Králíček & Povolný (1974) popsali *P. bohémica* jako samostatný druh, odlišný od východopalearktického *P. pectinata* (Staudinger, 1887). Je to zoogeograficky velmi pozoruhodný druh, známý dosud z Evropy pouze z území Čech a z Kavkazu (Laštůvka & Laštůvka 1995).

Die Art wurde bei uns wiederholt als „*Bembecia pectinata* Stgr.“ publiziert, zum erstenmal von Silbernagel (1943). Králíček & Povolný (1974) haben *P. bohémica* als eine selbständige, von der ostpaläarktischen *P. pectinata* (Staudinger, 1887) verschiedene Art beschrieben. Es ist eine zoogeographisch sehr bemerkenswerte Art, die bisher in Europa nur aus Böhmen und Kaukasus bekannt ist (Laštůvka & Laštůvka 1995).

1102. *Synansphecchia affinis* (Staudinger, 1856)

Údaj Silbernagela (1942) je založen na chybné determinaci, šlo o *Chamaesphecchia empiformis* (Esper, 1783) (K. Špatenka revid.). Druh u nás poprvé objevil J. Liška v jihozápadních Čechách, výskyt byl potvrzen v roce 1996 (viz též kapitulu „Nové, z Čech dosud neuváděné druhy“).

Die Angabe von Silbernagel (1942) basiert auf einer falschen Determination, denn es handelte sich um *Chamaesphecchia empiformis* (Esper, 1783) (K. Špatenka revid.). Die Art wurde in Südwestböhmen von J. Liška entdeckt und das Vorkommen im J. 1996 bestätigt (siehe auch Kapitel „Neue, für Böhmen bisher nicht angegebene Arten“).

1103. *Chamaesphecchia dumonti* Le Cerf, 1922

Druh byl u nás zjištěn již dříve, ovšem chybně determinován a publikován Silbernagel (1944) jako „*Chamaesphecchia bibioniformis* (Esp.)“.

Die Art wurde in Böhmen schon früher festgestellt, aber falsch determiniert und von Silbernagel (1944) als „*Chamaesphecchia bibioniformis* (Esp.)“ angegeben.

1133. *Choreutis vinosa* Diakonoff, 1978

Tento druh je dosud znám pouze z Dálného východu a jižní Sibiře (Danilevskij & Kuzněcov 1981) a nelze proto vyloučit, že v případě jediného exempláře z Čech, nalezeného ve voze městské dopravy, jde o zavlečeného jedince. Naproti tomu nedávno zaznamenaný výskyt příbuzných druhů *Anthophila abhasica* Danilevskij, 1976 a *Tebenna chingana* Danilevskij, 1969 (Reiprich 1985, Laštůvka et al. 1994, Elsner et al. 1997) ve střední Evropě naznačuje, že rozšíření této skupiny v Evropě je dosud nedostatečně prozkoumáno.

Diese Art ist nur vom Fernen Osten und Südsibirien bekannt (Danilevskij & Kuzněcov 1981) und man kann nicht ausschließen, daß im Falle des einzigen Exemplars, das im Wagen des Stadtverkehrs gefunden wurde, sich um ein eingeschlepptes Stück handelt. Demgegenüber das vor kurzem registrierte Vorkommen der verwandten Arten *Anthophila abhasica* Danilevskij, 1976 und *Tebenna chingana* Danilevskij, 1969 (Reiprich 1985, Laštůvka et al. 1994, Elsner et al. 1997) in Mitteleuropa deutet an, daß die Arealausbreitung dieser Gruppe in Europa noch nicht gut erforscht ist.

1227. *Phtheochroa rugosana* (Hübner, 1799)

Sterneck & Zimmermann (1933) uvádějí výskyt v Čechách, ale bez ověření dokladového materiálu nelze rozhodnout, zda jde skutečně o *P. rugosana* nebo o blízký druh *P. annae* Huemer, 1990. Výskyt druhu byl však v Čechách v poslední době potvrzen (viz kapitolu P - „Nově potvrzené a ověřené nálezy“).

Sterneck & Zimmermann (1933) geben zwar das Vorkommen in Böhmen an, aber ohne Überprüfung des Belegmaterials kann es nicht entschieden werden, ob es sich wirklich um *P. rugosana* oder um die nahestehende Art *P. annae* Huemer, 1990 handelt. Das Vorkommen dieser Art wurde jedoch unlängst in Böhmen bestätigt (siehe Kapitel P - „Neu bestätigte und überprüfte Funde“).

1268. *Sparganothis rubicundana* (Herrich-Schäffer, 1856)

Skala (1913) uvádí jako naleziště Králický Sněžník. Také Razowski (1981) uvádí tento druh z vrcholu „Sněžníku“ (tj. Králického Sněžníku). Poněvadž na vrcholu této hory probíhá česko-polská hranice a zároveň historické rozmezí mezi Čechami a Moravou, zařazujeme tento druh i do fauny Čech.

Skala (1913) führt Králický Sněžník als Fundort an. Auch Razowski (1981) gibt diese Art vom Gipfel dieses Berges an. Da die Grenze zwischen Polen und der Tschechischen Republik und auch die historische Grenze zwischen Böhmen und Mähren auf dem Gipfel des Berges laufen, reihen wir diese Art auch zu der böhmischen Fauna ein.

1628. *MEGASIS* Guenée, 1845

In Karsholt & Razowski (1996): *ISAURIA* Ragonot, 1887.

1642. *METRIOSTOLA* Ragonot, 1893

In Karsholt & Razowski (1996): *ORTHOLEPIS* Ragonot, 1887.

1649. *Pempeliella subornatella* (Duponchel, 1836)

Zde chápán jako samostatný druh, ale např. Karsholt & Razowski (1996) jej uvádějí jako mladší synonymum druhu *Pempelia dilutella* (Denis & Schiffermüller, 1775).

Hier für selbständige Art gehalten, aber z. B. Karsholt & Razowski (1996) geben sie als jüngeres Synonym der Art *Pempelia dilutella* (Denis & Schiffermüller, 1775) an.

1798. *MICROSTEGA* Meyrick, 1890

In Karsholt & Razowski (1996): *PARATALANTA* Meyrick, 1890.

1882. *Carterocephalus silvicolus* (Meigen, 1829)

Z Čech jsou známy pouze ojedinělé starší údaje (Moucha & Chvála 1957, Kuras & Beneš 1994). Jde zřejmě (podobně jako na Moravě a na Slovensku) o náhodně zalétlé jedince z oblasti souvislého areálu v severovýchodní Evropě.

Aus Böhmen sind nur vereinzelte ältere Angaben (Moucha & Chvála 1957, Kuras & Beneš 1994) bekannt. Es handelt sich offensichtlich (ähnlich wie in Mähren und der Slowakei) um zufällig sich verfliegene Exemplare aus dem Gebiet des zusammenhängenden Areals in nordöstlichem Europa.

1890. *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758)

Tento druh v Čechách vyhynul. Poslední nálezy pocházejí z 20. let tohoto století z Turnovska (5456, 5457), kde motýl nepochybně žil a je obvykle označován jako *P. apollo* ssp. *isaricus* Rebel, 1919. Ostatní výskyty jsou pochybné a mnohý materiál je zřejmě cizí provenience, jak uvádí již Sterneček (1929). V oblasti Šumavy jde nejspíše o jedince zanesené vzdušnými proudy z bavorských lokalit. Údajné pokusy o introdukci do Českého Středohoří na začátku století a potom znovu v 60. letech byly nepochybně neúspěšné. Do této kategorie je pravděpodobně možno zahrnout některé údaje, které uvádějí Vysoký, Klír & Fuksa (1987).

Diese Art ist in Böhmen ausgestorben. Die letzten Funde stammen aus den zwanziger Jahren des 20. Jh. aus der Umgebung von Turnov (5456, 5457), wo der Schmetterling zweifellos gelebt hatte und als *P. apollo* ssp. *isaricus* Rebel, 1919 gewöhnlich bezeichnet wurde. Die übrigen Angaben sind zweifelhaft und manches Material ist offensichtlich fremder Provenienz, wie schon Sterneček (1929) angibt. Im Gebiet des Böhmerwaldes handelte es sich am ehesten um Exemplare, die durch Luftströmungen von den bayrischen Lokalitäten eingetragen wurden. Die angeblichen Versuche um eine Introduktion in das Böhmisches Mittelgebirge am Anfang des Jahrhunderts und später noch mal in den 60. Jahren waren zweifellos ohne Erfolg. In diese Kategorie können wahrscheinlich einige Angaben eingereiht werden, die Vysoký, Klír & Fuksa (1987) angeben.

1891. *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758)

V současnosti je znám výskyt na jediné lokalitě v Čechách, v Polabí (Stiova 1984, V. Vrabec, osobní sdělení). Populace je značně zdecimována a druh je existenčně bezprostředně ohrožen. Z jiných lokalit v Čechách jsou pouze starší údaje.

In der Gegenwart ist die Art in Böhmen nur auf einer Lokalität in der Elbeebene bekannt (Stiova 1984, V. Vrabec, pers. Mitteilung). Die Population ist dort beträchtlich dezimiert und die Art ist in ihrer Existenz schwer bedroht. Von weiteren Lokalitäten in Böhmen gibt es nur ältere Angaben.

1895. *Leptidea reali* Reissinger, 1989

Nedávno popsáný druh, v minulosti nerozlišovaný od *L. sinapis* (Linnaeus, 1758). Sternečkovy (1929) údaje o *L. sinapis* zahrnují zřejmě oba druhy. V současnosti probíhá revize sbírkových materiálů, která ukáže rozšíření obou druhů v Čechách. Zdá se, že *L. reali* je rozšířen po celých Čechách a na některých místech je hojnější než *L. sinapis* (V. Vrabec, osobní sdělení).

Eine kürzlich beschriebene Art, die in der Vergangenheit nicht von *L. sinapis* (Linnaeus, 1758) unterschieden wurde. Die Angaben von Sterneček (1929) umfassen zweifellos beide Arten. Die laufende Revision der Sammlungen wird die Verbreitung dieser zwei Arten in

Böhmen zeigen. Es scheint, daß *L. reali* in ganzem Böhmen verbreitet und an manchen Stellen häufiger als *L. sinapis* ist (V. Vrabec, pers. Mitteilung).

1908. *Colias erate* (Esper, 1805)

Nový druh naší fauny z migrační vlny v devadesátých letech. Objeven prvně na Slovensku (Petrů & Böhm 1991), později na Moravě (Horák 1991, Stiova 1991) a nakonec i v Čechách (Kudrna 1994, Šumpich & Dvořák 1995), kde byl zjištěn i v okolí Prahy a Kolína (Vrabec 1996, též osobní sdělení V. Felixe).

Die neue Art der böhmischen Fauna stammt aus einer Migrationswelle der 90. Jahre. Sie wurde zum erstenmal in der Slowakei entdeckt (Petrů & Böhm 1991), später in Mähren (Horák 1991, Stiova 1991) und endlich auch in Böhmen (Kudrna 1994, Šumpich & Dvořák 1995), wo sie auch in der Umgebung von Prag und Kolín festgestellt wurde (Vrabec 1996, auch pers. Mitteilung von V. Felix).

1937. *Boloria aquilonaris* (Stichel, 1908)

Sterneck (1929) uvádí tento druh jako „*Argynnis pales* Schiff., var. *arsilache* Esp.“ Všechny tyto údaje se vztahují k druhu *B. aquilonaris*, kdežto *B. pales* (Denis & Schiffermüller, 1775) je znám nejbliže z Alp a Karpat. Druh v Čechách obývá horská a některá přechodová rašeliniště. Sterneckovy (1929) údaje z odlišných biotopů (Karlštejn - 6051 a Svatý Jan - 6050) jsou evidentně nesprávné.

Sterneck (1929) gibt die Art als „*Argynnis pales* Schiff., var. *arsilache* Esp.“ an. Alle diese Angaben beziehen sich auf *B. aquilonaris*, während *B. pales* (Denis & Schiffermüller, 1775) am nächsten von den Alpen und Karpaten bekannt ist. Die Art bewohnt in Böhmen Gebirgs- und einige Übergangsmoore. Sternecks Angaben von abweichenden Biotopen (Karlštejn - 6051 und Svatý Jan - 6050) sind sicher unrichtig.

1943. *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775)

K tomuto druhu je třeba přiřadit údaje o výskytu *M. neglecta* Pfau, 1962 na Šumavě (Weiss 1967). Taxon *M. neglecta*, popsáný z východní části Německa jako tyrfofilní a hygrophilní vikariant druhu *M. athalia*, byl v minulosti po určitou dobu považován za samostatný druh. Od 80. let je řadou autorů (např. Kudrna 1995) považován za synonymum druhu *M. athalia*.

Zu dieser Art muß man die Angaben über *M. neglecta* Pfau, 1962 im Böhmerwald (Weiss 1967) einreihen. Das Taxon *M. neglecta*, von östlichem Deutschland als tyrophiler und hygrophiler Vikariant der Art *M. athalia* beschrieben, wurde in der Vergangenheit eine Zeitlang für eine selbständige Art gehalten. Seit 80. Jahren wird es von manchen Autoren (z.B. Kudrna 1995) als das Synonymum von *M. athalia* angesehen.

1945. *Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758)

Výskyt tohoto druhu, který byl v Čechách považován za vyhynulý, byl nově potvrzen v Polabí (Vrabec 1994).

Das Vorkommen dieser Art, die in Böhmen für ausgestorben gehalten wurde, wurde neuerlich in der Elbeebene bestätigt (Vrabec 1994).

1946. *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775)

Výskyt tohoto druhu, který byl v Čechách považován za nezvěstný, byl nově potvrzen v západních Čechách (Mašek 1987).

Das Vorkommen dieser Art, die in Böhmen für verschollen galt, wurde neuerlich wieder im Westböhmen bestätigt (Mašek 1987).

1957. *Erebia epiphron* (Knoch, 1783)

V současné době je znám tento druh v Čechách pouze z východní části Krkonoš, avšak jde o populace introdukované ve 30. letech z Hrubého Jeseníku (Soffner 1960, 1967). Sterneck (1929) tohoto motýla z Čech neuvádí. Souběžná introdukce dalšího druhu z Jeseníků (*E. sudetica* Staudinger, 1861) se zřejmě nezdařila.

In der Gegenwart ist diese Art in Böhmen nur aus dem Osten des Riesengebirges bekannt, aber es handelt sich um die in den 30. Jahren vom Altvatergebirge introduzierten Populationen (Soffner 1960, 1967). Sterneck (1929) gibt diesen Schmetterling von Böhmen nicht an. Die parallele Introduktion einer weiteren Art aus demselben Gebirge (*E. sudetica* Staudinger, 1861) ist offenbar nicht gelungen.

1973. *Lycaena helle* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Mimo údaje Sternecka (1929) je tento druh z Čech neznám.

Bis auf die Angaben von Sterneck (1929) ist diese Art aus Böhmen unbekannt.

1975. *Lycaena dispar* (Haworth, 1803)

Sterneck (1929) cituje pouze údaje z 18. a 19. století z jižních Čech a nepřijímá je s důvěrou. Nelze vyloučit, že byly správné, neboť Baťa (1940) objevil tento druh později opět v jižních Čechách. Údajně (K. Špatenka, osob. sdělení) byl chytán ještě v 60. letech v okolí Vrábče (7052) na Českobudějovicku. V současné době je považován v Čechách za vyhynulý.

Sterneck (1929) gibt nur die Angaben vom 18. und 19. Jh. von Südböhmen mit Mißtrauen an. Es ist aber nicht ausgeschlossen, das sie richtig waren, denn Baťa (1940) entdeckte diese Art wieder später in Südböhmen. Sie wurde angeblich (K. Špatenka, pers. Mitteilung) noch in den 60. Jahren in der Umgebung von Vrábče (7052) unweit von České Budějovice gefangen. In der Gegenwart gilt sie in Böhmen für ausgestorben.

1980. *Lycaena thersamon* (Esper, 1784)

Sterneck (1929) uvádí několik údajů z minulého století a nepochybuje o výskytu v okolí Prahy, takže tento druh zařazuje do české fauny. Ostatní lokality uvádí s jistou nedůvěrou. Výskyt tohoto teplomilného druhu ve středních Čechách nelze v minulosti vyloučit, uváděné lokality jsou však dnes prakticky zničeny. Z novější doby není znám žádný doklad o výskytu, takže druh je považován za vyhynulý.

Sterneck (1929) gibt einige Angaben vom vergangenen Jahrhundert an und bezweifelt nicht das Vorkommen in der Umgebung von Prag, sodaß er diesen Schmetterling in die böhmische Fauna einreihet. Die übrigen Lokalitäten nimmt er mit gewissem Mißtrauen auf. Das historische Vorkommen dieser wärmeliebenden Art in Mittelböhmen kann man nicht ausschließen, die angegebenen Lokalitäten sind jedoch in der Gegenwart praktisch vernichtet. Aus der neueren Zeit ist keine Angabe über das Vorkommen bekannt, sodaß die Art für ausgestorben gehalten wird.

1982. *QUERCUSIA* Verity, 1943

In Karsholt & Razowski (1996): *NEOZEPHYRUS* Sibatani & Ito, 1942.

1993. *Pseudophilotes baton* (Bergsträsser, 1779)

1994. *Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865)

Druhy se habituálně neliší, ale jsou vzájemně jasně odlišitelné podle samčích kopulačních orgánů. V Sterneckově době byl *P. vicrama* považován pouze za subspecii *P. baton*. *P. vicrama* je znám ze xerothermních lokalit, zejména ve středních a severních Čechách, *P. baton* z refugií podobného charakteru v jižních Čechách. Přítomnost obou

druhů v Čechách je prokázána jak současnými sběry, tak revizí starých sbírkových materiálů (Kudrna 1994).

Diese zwei Arten unterscheiden sich nicht habituell, aber sind nach Kopulationsorganen klar zu bestimmen. In Sternecks Zeiten wurde *P. vicrama* nur für ssp. von *P. baton* gehalten. *P. vicrama* ist von den Steppenlokalitäten bekannt, vor allem in Mittel- und Nordböhmen, *P. baton* von den Steppenrefugien in Südböhmen. Die Anwesenheit beider Arten in Böhmen ist wie durch gegenwärtige Sammlungen als auch Revision der alten Sammlungsbelege nachgewiesen (Kudrna 1994).

1997. *Maculineaalcon* (Denis & Schiffermüller, 1775)

1998. *Maculinea rebeli* (Hirschke, 1904)

Taxonomický status těchto dvou druhů není zřejmě dořešen, imaga nejsou spolehlivě rozlišitelná. V literatuře jsou označovány jako biospecie. Housenka prvního instaru *M.alcon* žije na *Gentiana pneumonanthe*, housenka *M. rebeli* na *Gentiana cruciata*. Přijmemeli toto rozlišení, žijí na území Čech oba druhy.

Der taxonomische Status dieser zwei Arten ist offensichtlich nicht endgültig gelöst, die Imagines sind nicht verlässlich zu unterscheiden. In der Literatur sind sie als Biospecies bezeichnet. Die Raupe des ersten Entwicklungsstadiums von *M.alcon* lebt an *Gentiana pneumonanthe*, diejenige der *M. rebeli* an *Gentiana cruciata*. Wenn wir diese Unterscheidung ansehen wollen, leben auf dem Gebiet Böhmens beide Arten.

2003. *Plebejusidas* (Linnaeus, 1761)

Sterneck (1929) tento druh vůbec neuvádí, nejspíše z důvodu, že byl v rámci složité synonymiky ztotožňován s *P. argyrognomon* (viz ještě Bergmann 1952). Schwarz (1949) uvádí habituální rozlišovací znaky, ale poznamenává jen obecně, že „druh je u nás podobně rozšířen jako *P. argus* L., ale bývá méně hojný“, přičemž nelze usoudit, zda je možno pod formulaci „u nás“ zahrnout i území Čech, neboť Schwarz má mnoho poznatků také ze Slovenska. Forster (1936) v pojednání o geografickém rozšíření *P.idas* uvádí: „Außerdem führt Beuret noch an, daß ihm aus Sachsen, Schlesien, Böhmen und Polen Stücke vorliegen, welche eine Zwischenstellung zwischen *pseudoarmoricana* Beuret und *idasoides* Beuret einzunehmen scheinen“. I když v českých sbírkách je *P.idas* z mnoha lokalit zastoupen (především z nejnovější doby), zdá se, že první konkrétní literární údaj pochází teprve od Kudrny (1994), který uveřejnil mapku rozšíření (i když jen předběžnou) v České republice.

Sterneck (1929) gibt diese Art gar nicht an, am ehesten aus dem Grund, das sie im Rahmen der komplizierten Synonymik mit *P. argyrognomon* identifiziert wurde (siehe noch Bergmann 1952). Schwarz (1949) gibt die habituellen Unterscheidungsmerkmale an, aber bemerkt nur allgemein, daß „die Art bei uns ähnlich als *P. argus* L. verbreitet, aber weniger häufig ist“, wobei man schwierig entnehmen kann, ob man unter der Formulation „bei uns“ auch Böhmen versteht, denn Schwarz hat manche Erkenntnisse auch aus der Slowakei. Forster (1936) gibt in einer Arbeit über die geographische Verbreitung von *P.idas* an: „Außerdem führt Beuret noch an, daß ihm aus Sachsen, Schlesien, Böhmen und Polen Stücke vorliegen, welche eine Zwischenstellung zwischen *pseudoarmoricana* Beuret und *idasoides* Beuret einzunehmen scheinen“. Wenn auch in den tschechischen Sammlungen *P.idas* aus manchen Lokalitäten vertreten ist (vor allem aus der neuesten Zeit), scheint es, daß die erste genauere Literarangabe erst von Kudrna (1994) stammt, der eine Verbreitungskarte der Art in der Tschechischen Republik (wenn auch nur vorläufige) veröffentlichte.

2005. *Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

2006. *Aricia artaxerxes* (Fabricius, 1793)

Spolehlivě je znám z území Čech jen *A. agestis*. Údaje o výskytu *A. artaxerxes* z Čech nemusí být správné, zejména byla-li identifikace opřena jen o výskyt redukovaných či nepřítomnost oranžových skvrn na líci zadních křídel. Imaga těchto dvou druhů nejsou spolehlivě rozlišitelná, jejich taxonomický status není zřejmě dořešen.

Verlässlich ist von Böhmen nur *A. agestis* bekannt. Die Angaben über die Art *A. artaxerxes* aus Böhmen müssen nicht richtig sein, besonders wenn sich die Determination nur auf die Anwesenheit der reduzierten oder Abwesenheit der orangen Flecke auf den Hinterflügeln stützt. Die Imagines dieser zwei Arten sind nicht verlässlich zu unterscheiden, ihr taxonomischer Status ist offensichtlich nicht restlos gelöst.

2050. *Cyclophora pendularia* (Clerck, 1759)

Sterneck (1929) uvádí lokalitu „Karlsbad“, ale sám pochybuje o věrohodnosti tohoto údaje. Nicméně výskyt tohoto druhu byl potvrzen v posledních letech v jižních Čechách (Jaroš & Spitzer 1982) a znovu v severních Čechách (Vávra et al. 1995).

Sterneck (1929) gibt die Lokalität „Karlsbad“ an, aber bezweifelt selbst die Glaubwürdigkeit dieser Angabe. Jedoch, das Vorkommen dieser Art wurde in den letzten Jahren in Südböhmen (Jaroš & Spitzer 1982) und wieder in Nordböhmen (Vávra et al. 1995) bestätigt.

2058. *Timandra comae* A. Schmidt, 1931

Kaila & Albrecht (1994) dokazují ve své práci, že *Timandra griseata* Petersen, 1902 (*T. amata* auct., nec Linnaeus, 1758) je komplexem dvou druhů, jejichž areály se částečně překrývají na území jižního Finska. *T. griseata* obývá severní Evropu, kdežto populace střeoevropské a jihoevropské patří k druhu *Timandra comae* Schmidt, 1931.

Kaila & Albrecht (1994) beweisen in ihrer Arbeit, daß *Timandra griseata* Petersen, 1902 (*T. amata* auct., nec Linnaeus, 1758) ein Komplex von zwei Arten bildet, deren Areale sich auf dem Gebiet von Südfinnland überdecken. *T. griseata* soll nur Nordeuropa bewohnen, während die mitteleuropäischen und südeuropäischen Populationen zur Art *Timandra comae* Schmidt, 1931 gehören.

2063. *Scopula virgulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Starší údaje z Čech nepovažuje Sterneck (1929) za věrohodné, ale na základě nově doložovaného výskytu (Krampl 1973) nelze vyloučit, že alespoň některé z nich byly správné.

Die älteren Angaben aus Böhmen hält Sterneck (1929) nicht für verlässlich, aber auf Grund des neu belegten Vorkommens (Krampl 1973) kann man nicht ausschließen, daß wenigstens einige von ihnen richtig waren.

2107. *Scotopteryx mucronata* (Scopoli, 1763)

2108. *Scotopteryx luridata* (Hufnagel, 1767)

Sterneck (1929) a jiní starší autoři oba druhy nerozlišovali, takže u starších faunistických údajů nelze rozpoznat (pokud se nechoval dokladový materiál), o který druh jde. Problematiku obou druhů zpracoval Krampl (1973).

Sterneck (1929) und andere ältere Autoren trennten diese Arten nicht, sodaß man bei älteren faunistischen Angaben nicht erkennen kann (soweit sich Belege nicht erhalten hatten), um welche Art es sich eigentlich handelt. Die Problematik der beiden Arten bearbeitete Krampl (1973).

2156. *Thera obeliscata* (Hübner, 1787)

Revisi taxonomických kritérií středoevropských druhů rodu *Thera* Stephens, 1831 uveřejnil Krampl (1973). Ve starší literatuře se objevují některé druhy rodu *Thera* jako formy *T. variata* (Denis & Schiffermüller, 1775). Tak je uvedena ve Sterneckovi (1929) *T. obeliscata* jako „*T. variata* Schiff., var. *obeliscata* Hb.“

Eine Revision der taxonomischen Kriterien der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Thera* Stephens, 1831 hat Krampl (1973) veröffentlicht. In der alten Literatur erscheinen einige Arten der Gattung *Thera* als Formen von *T. variata* (Denis & Schiffermüller, 1775). So ist in Sterneck (1929) auch *T. obeliscata* als „*T. variata* Schiff., var. *obeliscata* Hb.“ angeführt.

2159. *Thera vetustata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sterneck (1929) uvádí tento druh jako „*T. variata* Schiff., var. *stragulata* Hb.“ Viz též poznámku u druhu *T. obeliscata*.

Sterneck (1929) gibt diese Art als „*T. variata* Schiff., var. *stragulata* Hb.“ an. Siehe auch die Bemerkung bei der Art *T. obeliscata*.

2180. *Rheumaptera subhastata* (Nolcken, 1870)

Sterneck (1929) uvádí tento druh jako „*Larentia hastata* L., var. *subhastata* Nolck.“

Sterneck (1929) gibt diese Art als „*Larentia hastata* L., var. *subhastata* Nolck.“ an.

2302. *SEMIOTHISA* Hübner, 1818

In Karsholt & Razowski (1996): *CHIASMIA* Hübner, 1823.

2389. *Charissa pullata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

2390. *Charissa glaucinaria* (Hübner, 1799)

2391. *Charissa intermedia* (Wehrli, 1917)

Problematiku tří druhů rodu *Gnophos* Treitschke, 1825, které dnes řadíme do rodu *Charissa* Curtis, 1826, řeší Krampl (1993). Z jeho práce vyplývá, že z Čech pochází jediný dokladovaný nález druhu *C. glaucinaria* z počátku století ze Štěchovic u Prahy (6152) (in coll. NMP), který je v prodromu Sternecka (1929) uveden jako *Gnophos pullatus*. Ostatní údaje, k nimž se zachovaly doklady, patří druhu *C. intermedia* nebo *C. pullata*. Výskyt *C. glaucinaria* v Čechách uvádí také Bembenek (1989).

Krampl (1993) behandelt die Problematik der 3 Arten der Gattung *Gnophos* Treitschke, 1825, welche wir jetzt in die Gattung *Charissa* Curtis, 1826 einreihen. Aus seiner Arbeit geht hervor, daß aus Böhmen eine einzige belegte Angabe der Art *C. glaucinaria* vom Anfang des Jahrhunderts von Štěchovice bei Prag (6152) stammt, die in Sterneck (1929) als *Gnophos pullatus* angeführt ist. Die anderen Angaben, zu den sich die Belegstücke erhalten haben, gehören den Arten *C. intermedia* oder *C. pullata*. Das Vorkommen von *C. glaucinaria* in Böhmen gibt auch Bembenek (1989) an.

2519. *Catocala puerpera* (Giorna, 1791)

Felix (1969) uvádí tento druh z Prahy, ale domnívá se (zřejmě oprávněně), že jde o introdukovaný kus (snad vypuštěný z chovu).

Felix (1969) gibt diese Art aus Prag an, aber behauptet (offenbar berechtigt), daß es sich um ein eingeschlepptes Tier handelt (vielleicht aus der Zucht losgelassen).

2593. *Diachrysia tutti* (Kostrowicki, 1961)

Druh, o jehož validitě se diskutuje prakticky od té doby, co byl popsán. Podle habitu se dá jen s nejistotou odlišit od *D. chrysitis* (Linnaeus, 1758), neboť všechny udávané znaky

jsou pouze „většinou“ a rovněž na kopulačních orgánech nejsou nápadné rozdíly. V současné době se používá k rozlišení obou druhů rozdílný přilet samců k feromonům. Uznáme-li tento přístup, pak jsou součástí české fauny oba druhy a oba jsou běžně rozšířené.

Eine Art, über deren Validität man seit der Zeit diskutiert, als sie beschrieben worden war. Nach dem Habitus ist sie nur schwierig von *D. chrysiis* (Linnaeus, 1758) zu unterscheiden, denn alle Merkmale sind nur sog. „Mehrheitsmerkmale“ und auch auf den Kopulationsorganen gibt es keine auffällige Unterschiede. In der Gegenwart benutzt man zur Unterscheidung beider Arten den Zuflug der Männchen zu Pheromonen. Wenn wir diesen Standpunkt einsehen, sind beide Arten ein Bestandteil der böhmischen Fauna und allgemein verbreitet.

2720. *Meganephria bimaculosa* (Linnaeus, 1767)

Sterneck (1929) uvádí pouze dva údaje a považuje je za nejisté. Jeden pochází z 19. století z Vrchlabí (5359), druhý z r. 1906 z Vápenného Podolu u Chrudimi (6159) (údajně 2 kusy z housenek). Nověji nebyl výskyt potvrzen, což zpochybňuje i věrohodnost starých údajů, kde mohlo jít (podle Sternecka) o záměnu etiket. Na druhé straně přítomnost druhu ve fauně Německa (Bergmann 1954, Heinicke & Naumann 1982) podporuje pravděpodobnost výskytu i v Čechách.

Sterneck (1929) führt nur zwei Angaben an und hält sie für unsicher. Die erste stammt vom 19. Jh. von Vrchlabí (Hohenelbe, 5359), die zweite vom J. 1906 von Vápenný Podol bei Chrudim (6159) (angeblich 2 aus den Raupen gezüchtete Exemplare). Neuerlich wurde das Vorkommen nicht bestätigt, was auch die Glaubwürdigkeit der alten Funde, wo es (nach Sterneck) um eine Verwechslung der Etiketten handeln konnte, bezweifelt. Andererseits, die Anwesenheit der Art in der deutschen Fauna (Bergmann 1954, Heinicke & Naumann 1982) unterstützt die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens auch in Böhmen.

2727. *Polymixis polymita* (L.)

Z Čech jsou známy z poslední doby dva údaje a oba je třeba brát s jistou rezervou. Jeden pochází z Ústí nad Labem (5350) (Vysoký, Klír & Fuksa 1987), druhý z Mimoň (Bouma 1997). Byla-li determinace správná (nebylo revidováno), může jít o jedince zavlečené dopravou. Jinak nebyl tento druh v Čechách pozorován a jeho trvalý výskyt je nepravděpodobný.

Aus Böhmen sind aus der letzten Zeit zwei Angaben bekannt und beide muß man vorsichtig annehmen. Der eine stammt von Ústí nad Labem (Außig a. d. Elbe, 5350) (Vysoký, Klír & Fuksa 1987), der andere von Mimoň (Niemes, 5354) (Bouma 1997). Wenn die Bestimmung richtig war (es wurde nicht überprüft), kann es sich um mit dem Verkehr eingeschleppte Tiere handeln. Sonst wurde diese Art in Böhmen nirgends beobachtet und ihr ständiges Vorkommen ist fraglich.

2732. *Blepharita amica* (Treitschke, 1825)

Jde nejspíše o náhodný nález druhu, rozšířeného v severní Evropě s nejbližším pravidelným výskytem v Polsku.

Es handelt sich am ehesten um einen zufälligen Fund der im Norden verbreiteten Art mit dem nächsten regelmäßigen Vorkommen in Polen.

2752. *PABULATRIX* Sugi, 1982

In Karsholt & Razowski (1996): *EREMOBINA* McDunnough, 1927.

2768. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830)

Údaje o výskytu tohoto běžného druhu najdeme ve starší literatuře u druhu „*Hydroecia nictitans* Bkh.“, od kterého nebyl odlišován. Tak ho uvádí i Sterneck (1929), neboť někte-

ré formy, které jsou zde zmíněny, patří nepochybně druhu *A. fucosa*. Teprve Michel (1935) uvádí tento druh z Čech jednoznačně.

Die Angaben über das Vorkommen dieser häufigen Art können wir in der älteren Literatur unter der Art „*Hydroecia nictitans* Bkh.“ finden, von der sie nicht getrennt wurde. So gibt sie auch Sterneck (1929) an, denn einige Formen, welche er erwähnt, gehören zweifellos zur *A. fucosa*. Erst Michel (1935) führt diese Art aus Böhmen eindeutig an.

2769. *Amphipoea lucens* (Freyer, 1845)

Sterneck (1929) uvádí tento druh jako „*Hydroecia nictitans* Bkh., var. *lucens* Fr.“ Viz též poznámku u předešlého druhu.

Sterneck (1929) führt diese Art als „*Hydroecia nictitans* Bkh., var. *lucens* Fr.“ an. Siehe auch die Bemerkung bei der vorhergehenden Art.

2789. *Sesamia cretica* (Lederer, 1857)

Jde zřejmě o náhodný výskyt nebo příležitostnou introdukci tohoto tropického druhu, který nepatří do naší fauny.

Es handelt sich offensichtlich um eine zufällige oder gelegentliche Introduktion einer tropischen Art, die zur böhmischen ständigen Fauna nicht gehört.

2792. *Discestra microdon* (Guenée, 1852)

Jediný nález z Čech publikoval Tykač (1936), který vychoval motýla z housenky nalezené u Plzně (6245-6). S ohledem na doložený výskyt v sousedních zemích a rovněž na Moravě (Šumpich 1997) zařazujeme tento druh do fauny Čech.

Den einzigen Fund aus Böhmen hat Tykač (1936) veröffentlicht, der einen Falter aus der bei Plzeň (Pilsen, 6245-6) gefundenen Raupe gezüchtet hatte. Mit Rücksicht auf das belegte Vorkommen in den benachbarten Ländern und in Mähren (Šumpich 1997) reihen wir diese Art in die böhmische Fauna ein.

2797. *Lacanobia splendens* (Hübner, 1808)

Jediný nález z Bystřan u Teplic (5349) uvádějí Duchek & Skoupý (1992). Pokud je determinace správná (nebylo revidováno), může jít o zavlečený druh. Trvalý výskyt není v Čechách pravděpodobný.

Der einzige Fund von Bystřany bei Teplice (5349) stammt von Duchek & Skoupý (1992). Soweit die Determination richtig ist (es wurde nicht überprüft), kann es sich um ein verflozenes Tier handeln. Ein ständiges Vorkommen in Böhmen ist fraglich.

2887. *Spaelotis senna* (Freyer, 1829)

Jde zřejmě o zavlečený druh. Také Sterneck (1932) hodnotí svůj nález kriticky v tomto smyslu.

Es handelt sich offensichtlich um eine eingeschleppte Art. Auch Sterneck (1932) bewertet seinen Fund kritisch auf diese Weise.

2918. *Euxoa aquilina* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tento druh byl dlouho považován pouze za aberaci *Euxoa tritici* (Linnaeus, 1761). Tak ho uvádí i Sterneck (1929). Jako samostatný druh ho uvádí z Čech teprve Felix (1969).

Diese Art wurde lange nur für eine Aberration von *Euxoa tritici* (Linnaeus, 1761) gehalten. So gibt sie auch Sterneck (1929) an. Als selbständige Art führt sie aus Böhmen erst Felix (1969) an.

NOVÉ, Z ČECH DOSUD NEUVÁDĚNÉ DRUHY
NEUE, FÜR BÖHMEN BISHER NICHT ANGEGEBENE ARTEN
NEW SPECIES FOR THE BOHEMIAN FAUNA

4. *Micropterix osthelderi* Heath, 1975. Bohemia sept., Vysoká Lípa (5152), 4.V.1990, 1 ♂, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
11. *Eriocrania salopiella* (Stainton, 1854). Bohemia centr., Soběšín (6255), 8.IV.1989, 1 ♂, V. Felix lgt. et coll., R. Sutter det. Neu für die Tschechische Republik.
13. *Eriocrania sangii* (Wood, 1891). Bohemia centr., Milovice (5755), 17.IV.1996, 3 ♂♂, 1 ♀, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
49. *Stigmella crataegella* (Klimesch, 1936). Bohemia sept., Vysoká Lípa (5152), VIII.1989, mehrere Raupen auf *Crataegus oxyacantha*, Imagines I.1990, 1 ♀; Nehasice bei Žatec (5647), 10.X.1992, 1 Raupe auf *Crataegus oxyacantha*, 28.III.1993, 1 ♂. Alles J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
64. *Stigmella zelleriella* (Snellen, 1875). Bohemia centr., Hrabanovské černavy bei Lysá nad Labem (5754), X.1993, 2 Minen auf *Salix cinerea*, 8.III.1994, 1 ♂, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
93. *Trifurcula thymi* (Szöcs, 1965). Bohemia centr., Praha - Jinonice (5952), 10.VI.1993, 1 ♂, 1 ♀, M. Petrů lgt., det. et coll. 7.V.1995, 1 ♂, 27.VII.1995, 1 ♀, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
94. *Trifurcula cryptella* (Stainton, 1856). Bohemia or., Kvasiny (5763), 20.VII.1996, 1 ♂, M. Rotter lgt. et coll., A. Laštůvka det. Neu für Böhmen.
98. *Trifurcula moravica* Z. Laštůvka & A. Laštůvka, 1994. Bohemia centr., Roztoky bei Křivoklát (5949), VII.1995, leere Minen auf *Lembotropis nigricans*, A. Laštůvka lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
149. *Adela mazzeolella* (Hübner, 1796). Bohemia sept., Louny (5547), VI.1967, 1 ♀; Bohemia centr., Praha - Modřany (6052), 30.VI.1985, 13 ♂♂, 27.VI.1987, 1 ♂. Alles J. Vávra lgt., det. et coll. Bohemia centr., Praha - Ruzyně (5951), 16.VI.1969, 10 ♂♂, 2 ♀♀, 9.VI.1996, 5 ♂♂, 1 ♀; Noutonice (5851), 11.VI.1979, 8 ♂♂, 3 ♀♀, 2.VI.1994, 11 ♂♂; Kováry (5851), 1.VI.1995, 11 ♂♂, 1 ♀. Alles I. Novák lgt., det. et coll. Bohemia centr., Praha - Zlíchov (5952), 22.VI.1984, 1 ♂, 1 ♀; Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 16.VI.1988, 1 ♂; Praha - Šalamounka (5952), 5.VI.1990, 1 ♀; Bohemia sept., Charvátce - Šibeník (5548), 29.V.1993, 4 ♂♂, 21.VI.1994, 8 ♂♂; Raná bei Louny (5548), 20.VI.1994, 6 ♂♂. Alles J. Skyva lgt., det. et coll. Bohemia sept., Charvátce - Šibeník (5548), 29.V.1993, 5 ♂♂, 21.VI.1994, 3 ♂♂, 3 ♀♀; Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 20.VI.1994, 1 ♀; Raná bei Louny (5548), 21.VI.1994, 1 ♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
192. *Rebelia herriichiella* Strand, 1912. Bohemia centr., Týnec nad Labem (5958), 21.VI.1944, 1 Raupe, 22.VII.1944, 1 ♀, R. Schwarz lgt. et det., coll. M. Petrů. Hrabanovské černavy bei Lysá nad Labem (5754), V.1992, 1 Raupe, 28.VI.1992, 1 ♀, J. Skyva lgt., J. Vávra det. et coll. Neu für Böhmen.
239. *Neurothaumasia ankerella* (Mann, 1867). Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 13.VII.1978, 1 ♀; Praha - Kbely (5853), 25.VII.1990, 1 ♂, 5.VIII.1991, 1 ♀; Lipník (5755), 1.VII.1995, 1 ♂. Alles G. Elsner lgt., det. et coll. Praha -

- Jinonice (5952), 10.VI.1993, 1 ♂, M. Petrů lgt., det. et coll. Praha - Modřany (6052), 15.VII.1995, 1 ♀; Praha - Hrnčíře (6053), 21.VII.1995, 1 ♀; Praha - Jinonice (5952), 27.VII.1995, 7 ♂♂, 18 ♀♀. Alles J. Vávra lgt., det. et coll. Praha - Šárka (5852), 9.VIII.1988, 2 ♀♀; Stará Boleslav (5754), 21.VIII.1995, 1 ♂, 1 ♀. Alles J. Skyva lgt., det. et coll. Radotín - Cikánka (6051), 21.VIII.1993, 1 ♂, 1 ♀; Praha - Dalejské údolí (Dalejské-Tal) (5952), 11.VII.1994, 1 ♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 293. *Parornix szoecsi*** Gozmány, 1952. Bohemia centr., Karlštejn - Hradby (6050), 24.V.1995, Raupen auf *Prunus fruticosa*, 11.VI.1995, 8 ♂♂, 3 ♀♀, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 299. *Phyllonorycter robiniiellus*** (Clemens, 1859). Bohemia centr., Praha - Ruzyně, 17.X.1993, 1 Mine auf *Robinia pseudoacacia*, I. Novák lgt., det. et coll. Praha - Stromovka (5852), VIII.1994, zahlreiche Minen auf *Robinia pseudoacacia*, M. Petrů lgt. et det., IX.1994, zahlreiche Minen auf *R. pseudoacacia*, Imagines 20.IX.1994, 6 ♂♂, 21 ♀♀, J. Vávra lgt. det. et coll.
- Im J. 1995 schon auf zahlreichen Fundorten festgestellt: Bohemia centr., Praha - Radotín (6052), Praha - Modřany, Praha - Komořany (6052), Kralupy nad Vltavou (5752). Bohemia mer., České Budějovice (7052) u.a. Eingeschleppte, sich schnell verbreitende Art. Neu für Böhmen.
- 318. *Phyllonorycter leucographellus*** (Zeller, 1850). Bohemia centr., Praha - Dejvice (5852), VIII.1995, zahlreiche Minen auf *Pyracantha coccinea*, 10.VIII.1995, 1 ♀, 4.IX.1995, 1 ♂ (die übrigen Pupen überwinterten); Praha - Troja (5852), 20.VIII.1996; Praha - Bohnice (5852), 20.VIII.1996, häufige Raupen auf *P. coccinea*; Praha - Břevnov (5952), VII.-IX.1996. Alles J. Vávra lgt., det. et coll. Praha - Stromovka (5852), 20.VIII.1996; Praha - Troja (5852), XI.1995, zahlreiche Raupen auf *P. coccinea*, M. Petrů lgt. et det. Neu für die Tschechische Republik.
- 329. *Phyllonorycter acaciellus*** (Duponchel, 1843). Bohemia centr., Roudnice nad Labem (5551), IX.1976, 1 ♂, B. Starý lgt., det. et coll., M. Petrů revid. Neu für Böhmen.
- 330. *Phyllonorycter scabiosellus*** (Douglas, 1853). Bohemia centr., Praha - Šárka (5852), 1.VIII.1942, 1 ♂, B. Starý lgt., det. et coll., M. Petrů revid. Neu für die Tschechische Republik.
- 361. *Cameraria ohridella*** Deschka & Dimić, 1986. Bohemia occ., Františkovy Lázně - Soos (5840), VIII.1994, zahlreiche Minen mit Raupen auf *Aesculus hippocastanum*, J. Liška et M. Petrů lgt. et det. Bohemia centr., Praha - Stromovka (5852), IX. 1994, zahlreiche Minen auf *A. hippocastanum*, Imagines 30.I.1995, 13 ♂♂, 8 ♀♀, J. Vávra lgt., det. et coll. Praha - Veleslavin (5952), starkes Vorkommen, Minen VI-VII.1996, Imagines 7.-25.VIII.1996, mehr als 60 ex.; Praha - Sedlec (5852), Minen X.1995, VII.1996, Imagines 30.VII. - 10.VIII.1996, 20 ex.. Alles I. Novák lgt., det. et coll.
- Im J. 1995 auf mehreren Lokalitäten festgestellt, im J. 1996 und 1997 an manchen Orten Massenauftritten beobachtet:
- 1995: Bohemia centr., Koloděje bei Prag (5953), Praha - Kunratic (5952), Praha - Radotín (6052), Praha - Letná (5852), Senohraby (6154). Bohemia or., Herálec bei Humpolec (6458). Bohemia mer., České Budějovice (7052), České Velenice (7255). Bohemia occ., Stříbro (6244).

- 1996: Bohemia centr., Slaný (5750), Řevničov (5848), Lány (5849), Rakovník (5848). Bohemia sept., Terezín (5450), Litoměřice (5450), Roudnice nad Labem (5551), Veltrubský luh (5957) u.a. Eingeschleppte, sich schnell verbreitende Art. Neu für Böhmen.
- 375. *Bucculatrix demaryella*** (Duponchel, 1840). Bohemia or., Červená Voda - Jeřáb (5966), 15.VII.1991, 1 ♀; Bohemia occ., Františkovy Lázně - Soos (5840), 29.V.1995, 1 ♀, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 378. *Bucculatrix ulmifoliae*** Hering, 1931. Bohemia centr., Praha - Stromovka (5852), IX.1990, Raupen auf *Ulmus minor*, II.1991, 3 ♂♂, 3 ♀♀; Praha - Dolní Břežany (6062), IX.1991, Raupen auf *U. minor*, I.1992, 6 ♀♀; Tuhaň bei Všetaty (5753), 24.VI.1992, 1 ♀. Alles J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 382. *Tinagma signatum*** Gaedike, 1991. Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 20.VI.1987, 1 ♀, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 415. *Argyresthia praecocella*** Zeller, 1839. Bohemia centr., Skochovice (6052), 18.VII.1980, 1 ♂, fliegend um *Juniperus communis*, M. Petrů lgt. et coll., J. Vávra det. Neu für Böhmen.
- 416. *Argyresthia trifasciata*** Staudinger, 1871. Bohemia occ., Výhledy bei Klenčí pod Čerchovem (6542), 8.VI.1995, 14 ♂♂, 6 ♀♀, fliegend um *Juniperus chinensis*, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 417. *Argyresthia reticulata*** Staudinger, 1877. Bohemia mer., Nový Dvůr bei Churáňov (6947), 4.VII.1995, 1 ♀, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 419. *Argyresthia thuarella*** (Packard, 1871). Bohemia centr., Praha (Gärtnerei hinter der Parkanlage „Stromovka“) (5852). Bohemia sept., Doksy (5454), Lovosice (5450), Louny (5648). Im J. 1988 Raupen auf *Thuja* und häufige Falter, D. Povolný observ. et det. Eingeschleppte Art. Neu für Böhmen.
- 469. *Acrolepia autumnitella*** Curtis, 1838. Bohemia sept., Hrušovany bei Zatec (5647), 19.IX.1996, zahlreiche Minen auf *Solanum dulcamara*, 20.IX.-4.X.1996, zahlreiche Imagines; Bohemia sept.-or., Teich Broumar bei Opočno (5762), 10.X.1996, zahlreiche Minen auf *S. dulcamara*, 25.X.1996, 1 ♀. Alles J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 504. *Agonopterix quadripunctata*** (Wocke, 1857). Bohemia centr., Srbsko (6050), 18.VIII.1985, 1 ♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 522. *Agonopterix carduella*** (Hübner, 1817). Bohemia centr., Srbsko (6050), 19.IX.1979, 1 ♂, J. Skyva lgt., det. et coll. Bohemia sept., Radobýl Berg bei Litoměřice (5450), VII.1991, Raupen auf *Cirsium eriophorum*, 22.VII.1991, 6 ♂♂, 8 ♀♀, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 539. *Depressaria beckmanni*** Heinemann, 1870. Bohemia sept., Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 20.VII.1994, 1 ♀, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 570. *Batia lambdella*** (Donovan, 1793). Bohemia centr., Praha - Dalejské údolí (Dalejské-Tal) (5952), 11.VII.1994, 1 ♀, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 571. *Batia internella*** Jäckh, 1972. Bohemia sept., Raná bei Louny (5548), 8.VIII.1996, 4 ♀♀; Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 21.VII.1995, 1 ♀, J. Liška lgt. et det., J. Liška et J. Skyva coll. Neu für Böhmen.
- 593. *Pleurota pyropella*** (Denis & Schiffermüller, 1775). Bohemia centr., Kácov (6256), 5.VI.1933, 2 ♂♂, 2 ♀♀, 25.V.1939, 1 ♂, R. Schwarz lgt., M. Petrů det. et coll. Neu für Böhmen.

608. *Elachista tetragonella* (Herrich-Schäffer, 1855). Bohemia sept., Libčevce - Třtěno (5549), 22.VI.1989, 1 ♂, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
609. *Elachista biatomella* (Stainton, 1848). Bohemia centr., Radotín - Cikánka (6051), 5.V.1989, 1 ♂, J. Skyva lgt., J. Liška det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
611. *Elachista poae* Stainton, 1855. Bohemia mer., České Velenice - Naturschutzgebiet Žofinka (7155), 21.VII.1988, 1 ♀; Nová Bystřice - Číměř (6956), 15.VIII.1989, 3 ♂♂; Bohemia occ., Ošelín (6243), 14.VIII.1993, 1 ♂. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
615. *Elachista compsa* Traugott-Olsen, 1974. Bohemia sept., Děčín (Tetschen) (5251), 1 ♂, ohne weitere Angaben, F. Zimmermann lgt., J. Liška det., coll. NMP. Bohemia occ., Černošín - Vlčí hora Berg (6143), 10.V.1997, 1 ♂, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
624. *Elachista orstadii* Palm, 1943. Bohemia centr., Radotín - Cikánka (6051), 28.V.1992, 2 ♂♂; Bohemia sept., Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 28.V.1993, 2 ♂♂, 11.V.1994, 5 ♂♂, 1 ♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
634. *Elachista collitella* (Duponchel, 1843). Bohemia sept., Raná bei Louny (5548), 12.VI.1997, 1 ♂, 9.VII.1997, 2 ♂♂, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
636. *Elachista hedemanni* Rebel, 1899. Bohemia sept., Charvatce - Šibeník (5548), 19.V.1995, 10 ♂♂, 1 ♀; Raná bei Louny (5548), 30.IV.1996, 13 ♂♂, 13.V.1996, 1 ♂, 2 ♀♀; Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 13.V.1996, 5 ♂♂, 3 ♀♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
641. *Elachista gregori* Traugott-Olsen, 1988. Bohemia centr., Dobřichovice - Karlík (6051), 1.VII.1991, 3 ♂♂, 5 ♀♀, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
642. *Elachista svenssoni* Traugott-Olsen, 1988. Bohemia mer., Holubov bei Český Krumlov (7151), 16.V.1983, 2 ♂♂, J. Jaroš lgt., J. Liška det., J. Jaroš et J. Liška coll. Bohemia centr., Hrabanovské černavy bei Lysá nad Labem (5754), 29.VII.1991, 2 ♂♂, J. Vávra lgt., J. Liška det., J. Vávra et J. Liška coll. Bohemia centr., Vranice bei Kácov (6256), 17.V.1992, 1 ♂, P. Šrůtka lgt., J. Liška det. et coll. Neu für Böhmen.
644. *Elachista spumella* Caradja, 1920. Bohemia sept., Radobýl Berg bei Litoměřice (5450), 26.IV.1989, 1 ♀; Charvatce - Šibeník (5548), 19.V.1995, 3 ♂♂, 2 ♀♀; Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 19.IV.1990, 1 ♂, 29.IV.1990, 1 ♀, 1.V.1990, 2 ♀♀, 5.V.1992, 1 ♂, 1 ♀, 7.V.1994, 2 ♂♂, 2 ♀♀, 7.V.1996, 2 ♂♂, 4 ♀♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Praha - Jinonice (5952), 7.V.1995, 2 ♂♂, 2 ♀♀, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
651. *Elachista megerlella* (Hübner, 1810). Bohemia sept., Nepomyšl - Nová Ves (5745), 21.VII.1990, 1 ♂, J. Skyva lgt., J. Liška det. et coll. Neu für Böhmen.
721. *Coleophora vulpecula* Zeller, 1849. Bohemia sept., Raná bei Louny (5548), 8.VIII.1996, 3 ♂♂, 5 ♀♀, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
740. *Coleophora dignella* Toll, 1961. Bohemia sept., Raná bei Louny (5548), 15.VI.1996, 1 ♂, J. Liška lgt. et coll., J. Liška et J. Marek det. Neu für Böhmen.
769. *Coleophora squamosella* Stainton, 1856. Bohemia centr., Karlštejn - Haknová (6051), X.1993, zahlreiche Raupen auf Samen von *Erigeron acris*, V.-VI.1994, etwa 40 Stücke, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
833. *Cosmopterix lienigiella* Liennig & Zeller, 1846. Bohemia centr., Hrabanovské černavy bei Lysá nad Labem (5754), 10.IX.1996, zahlreiche Minen mit Raupen auf *Phragmites australis*, Imagines im II.1997, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.

839. *Vulcaniella pomposella* (Zeller, 1839). Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 10.VIII.1940, 1 ♀, R. Schwarz lgt., M. Petrů det. et coll. Neu für Böhmen.
847. *Scythris potentillella* (Zeller, 1847). Bohemia centr., Stará Boleslav (5754), 11.VI.1996, 1 ♀, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
874. *Metzneria ehikeella* Gozmány, 1954. Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 17.VI.1978, 2 ♂♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 12.VI.1990, 1 ♀; Milovice (5755), 11.VI.1992, 1 ♀; Radotín - Cikánka (6051), 28.VI.1995, 1 ♂. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
889. *Monochroa conspersella* (Herrich-Schäffer, 1854). Bohemia occ., Nevid (6247), 25.VI.1989, 1 ♂; Rokycany (6247), 15.VII.1995, 2 ♂♂, 4 ♀♀; Bohemia centr., Stará Boleslav (5754), 9.VII.1993, 1 ♀. Alles G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia occ., Ošelín - Německý mlýn (6243), 6.VII.1990, 3 ♂♂, J. Liška lgt., det. et coll. Bohemia or., Pálčice bei Čechtice (6356), 8.VII.1993, 1 ♀, J. Vávra lgt. et coll., G. Elsner det. Neu für Böhmen.
891. *Monochroa inflexella* Svensson 1992. Bohemia sept., Raná bei Louny (5548), 12.VII.1997, 1 ♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
895. *Monochroa palustrella* (Douglas, 1850). Bohemia centr., Káraný (5854), 20.VIII.1975, 1 ♀, G. Elsner lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
900. *Monochroa simplicella* (Lienig & Zeller, 1846). Bohemia occ., Rokycany (6247), 29.V.1982, 1 ♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
904. *Ptocheuusa abnormella* (Herrich-Schäffer, 1854). Bohemia sept., Děčín (5152), ohne weitere Angaben, 5 Stücke, K. Hrubý lgt., J. Liška det., coll. SNM. Neu für Böhmen.
909. *Xystophora pulveratella* (Herrich-Schäffer, 1854). Bohemia centr., Srbsko - Pláně (6050), 7.VIII.1993, 1 ♂; Bohemia sept., Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 11.V.1994, 1 ♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
925. *Teleiodes wagaе* (Nowicki, 1860). Bohemia centr., Vranice bei Kácov (6256), 23.V.1993, 1 ♀; Svatý Jan pod Skalou (6050), 13.VI.1994, 1 ♀, J. Liška lgt. et coll., G. Elsner det. Neu für die Tschechische Republik.
926. *Teleiodes aenigma* Sattler, 1983. Bohemia centr., Káraný (5854), 31.V.1974, 1 ♂, 1 ♀, 1.VI.1978, 1 ♀, 21.V.1980, 1 ♂, 7.V.1986, 1 ♀, G. Elsner lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
970. *Neofriseria singula* (Staudinger, 1876). Bohemia centr., Stará Boleslav (5754), 9.VII.1993, 1 ♂, 1 ♀, G. Elsner lgt., det. et coll., 24.VI.1995, 1 ♂, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
990. *Ilseopsis proclivella* (Fuchs, 1886). Bohemia centr., Praha - Kbely (5853), 16.VIII.1979, 1 ♀; Bohemia occ., Rokycany (6247), 23.VII.1983, 1 ♂. Alles G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia centr., Praha - Troja (5852), IX.1987, Raupen auf *Artemisia vulgaris*, II.1988, 3 ♀♀; Praha - Točná (6052), VI.1994, Raupen auf *A. vulgaris*, 12.II.1995, 16 ♂♂, 8 ♀♀. Alles J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
992. *Ilseopsis klimeschi* Povolný, 1967. Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 8.VIII.1975, 1 ♂, 15.VII.1982, 1 ♀, G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia centr., Praha - Hlubočepy (5952), VI.1989, Raupen auf *Centaurea scabiosa*, 9.VII.1989, 2 ♂♂; Praha - Butovice (5952), VI.1989, Raupen auf *C. scabiosa*, 11.VII.1989, 1 ♂, 1 ♀; Praha - Stromovka (5852), IX. 1989, Raupen auf *Cirsium canum*, II.1990, 1 ♂, 1 ♀; Praha - Jinonice (5952), 29.VII.1994, 1 ♀; Milovice (5755), IX.1992, Raupen auf *Cirsium vulga-*

- re, 18.II.1993, 2 ♀♀; Bohemia sept., Bílina - Bořeň Berg (5448), IX.1993, Raupen auf *Cirsium acaule*, I.1994, 2 ♀♀. Alles J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 998. *Gnorimoschema steueri*** Povolný, 1975. Bohemia centr., Český kras (Böhmische Karst), Vysoká stráň Berg und Srbsko (6051), zahlreiche Minen mit jungen Raupen auf Blättern von *Aster amellus* seit Mittel V. bis Ende VI.1995. Die Raupen sind sehr empfindlich zum Mikroklima und daher hat nur 1 Männchen und ein Weibchen geschlüpft: 7. und 9.VIII.1995, 1 ♂, 1 ♀, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 1008. *Caryocolum vicinellum*** (Douglas, 1851). Bohemia sept., Vysoká Lípa (5152), 25.VII.1985, 1 ♀, J. Vávra lgt., det. et coll. Bohemia occ., Rabí - Čepice (6747), 23.VII.1992, 1 ♂; Bohemia centr., Vrané nad Vltavou - Jarov (6052), 3.VIII.1992, 1 ♂, 2 ♀♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1013. *Caryocolum klosi*** (Rebel, 1917). Bohemia mer., Černý les (Schwarzwald) bei Želnavá (7149), 23.VIII.1984, 1 ♂, Z. Tokár lgt. et coll., G. Elsner det. Neu für die Tschechische Republik.
- 1018. *Caryocolum cassellum*** (Walker, 1864). Bohemia occ., Rybničná (5843), 9.VII.1985, 1 ♂, J. Franz lgt. et coll., G. Elsner det. Bohemia mer., Samšín bei Pacov (6556), zahlreiche Raupen auf *Stellaria nemorum*, 23.VI.1992, 2 ♂♂, 5 ♀♀; Bohemia sept., Vysoká Lípa (5152), 15.VII.1993, 2 ♀♀; Bohemia occ., Brdy - Míšov (6348), 1.VI.1994, 1 Raupe auf *S. nemorum*, 22.VI.1994, 1 ♀. Alles J. Vávra lgt., det. et coll. Bohemia mer., Stožec (7148), 4.IX.1987, 2 ♀♀, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 1025. *Sophronia ascalis*** Gozmány, 1951. Bohemia sept., Raná bei Louny (5548), 9.VII.1997, 1 ♂, 12.VII.1997, 1 ♂, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1031. *Stomopteryx hungaricella*** Gozmány, 1957. Bohemia centr., Srbsko (6051), 9.VIII.1985, 1 ♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 1033. *Syncopacma vinella*** (Bankes, 1898). Bohemia centr., Praha - Kbely (5853), 16.VIII.1979, 1 ♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia sept., Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 21.VII.1995, 1 ♂, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1034. *Syncopacma sangiella*** (Stainton, 1863). Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 21.IX.1984, 1 ♂; Praha - Kbely (5853), 12.VIII.1988, 1 ♂; Satalice (5853), 16.VIII.1991, 1 ♂; Milovice (5755), 5.VI.1992, 3 ♂♂, 7.VIII.1992, 5 ♂♂; Stará Boleslav (5754), 2.IX.1993, 2 ♂♂; Bohemia sept., Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 23.VIII.1995, 2 ♂♂. Alles G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia centr., Praha - Jinonice (5952), 10.VIII.1994, 1 ♂; Bohemia sept., Radobýl Berg bei Litoměřice (5450), 24.VI.1991, 1 ♂. Alles J. Vávra lgt., det. et coll. Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 16.VI.1995, 1 ♂; Bohemia sept., Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 12.VIII.1995, 1 ♂, 2 ♀♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1053. *Platyedra subcinerea*** (Haworth, 1828). Bohemia centr., Praha - Kbely (5853), 9.VI.1975, 1 ♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1067. *Dichomeris rasilella*** (Herrich-Schäffer, 1854). Bohemia sept., Oblík Berg bei Louny (5548), 13.VII.1983, 11 ♂♂, 9.VIII.1988, 6 ♂♂, 14.VI.1989 5 ♂♂, I. Novák lgt. det. et coll. Oblík Berg bei Louny (5548), 13.VII.1983, 33 ♂♂, G. Elsner lgt. det. et coll. Oblík Berg bei Louny (5548), 7.VII.1989, 2 ♂♂; Raná bei Louny (5548), 27.V.1993, 5 ♂♂; Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 21.VII.1995, 3 ♂♂, 2 ♀♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.

- 1070. *Helcystogramma lineolellum*** (Zeller, 1839). Bohemia centr., Káraný (5854), 25.V.1977, 10 ♀♀; Stará Boleslav (5754), 28.IV.1993, 3 ♂♂; Milovice (5755), 11.V.1993, 1 ♂, 1 ♀; Nedomice (5753), 11.V.1994, 1 ♀, 17.V.1995, 2 ♂♂. Alles G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia centr., Srbsko (6050), 12.VI.1984, 1 ♂, M. Petrů lgt. et coll., J. Liška det. Bohemia centr., Milovice (5755), 13.V.1992, 1 ♂; Hrabanovské černavy bei Lysá nad Labem (5754), 10.V.1994, 1 ♂, J. Vávra lgt., det. et coll. Bohemia centr., Milovice - Jiřice (5755), 8.V.1993, 30 Stücke, J. Skyva lgt., det. et coll. Bohemia centr., Stará Boleslav (5754), 16.V.1993, 1 ♂, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1102. *Synansphecchia affinis*** (Staudinger, 1856). Bohemia occ., Rabí - Čepice (6747), 25.V.1993, 1 ♂, J. Liška lgt., K. Špatenka & Z. Laštůvka det., in coll. K. Špatenka Rabí - Čepice (6747), 12.V.1996, 1 Raupe auf *Helianthemum* sp., Imago im VI.1996, K. Špatenka lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 1106. *Chamaesphecchia tenthrediniformis*** (Denis & Schiffermüller, 1775). Bohemia or., Rychnov nad Kněžnou (5863), 27.V.1984, 1 ♂, 13.VI.1984, 1 ♀, J. Liška lgt., K. Špatenka det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1133. *Choreutis vinosa*** Diakonoff, 1978. Bohemia centr., Praha - Hloubětín (5853), 18.X.1984, 1 ♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 1211. *Acleris kochiella*** (Goeze, 1783). Bohemia mer., Černý les (Schwarzwald) bei Želnavá (7149), 23.VIII.1973, 1 ♂, K. Spitzer lgt., J. Jaroš det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1260. *Cochylis flaviciliana*** (Westwood, 1854). Bohemia occ., Rybníčná (5843), 3.VII., 12.VII.1988, 2 ♂♂, 22.VI., 4.VII.1989, 2 ♂♂, 28.VI., 29.VI.1990, 3 ♂♂, 2.-24. VII.1991, 2 ♂♂, 3 ♀♀, 16.VI.1992, 1 ♂, 30.VI.1994, 1 ♂, 6.VII.1994, 1 ♂, J. Franz lgt. et coll., J. Jaroš det. Bohemia occ., Černošín - Vlčí hora Berg (6143), 4.VII.1993, 2 ♀♀, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 1331. *Lobesia bicinctana*** (Duponchel, 1844). Bohemia sept., Vysoká Lípa (5152), 13.VII.1996, 1 ♀, 31.VII.1996, 3 ♀♀, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1421. *Pelochrista medullana*** (Staudinger, 1879). Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 6.VI.1970, 1 ♂, 22.VII.1971, 1 ♂, 28.VII.1971, 1 ♂, 26.VI.1973, 2 ♂♂, 6.VII.1977, 1 ♂, 12.VII.1977, 3 ♂♂, 2 ♀♀, 15.VII.1982, 1 ♂, 5.VII.1983, 1 ♂, 24.VI.1986, 1 ♂. Alles G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 5.VI.1992, 1 ♂, 1 ♀; Srbsko - Pláně (6050), 1.VI.1993, 1 ♂. Alles J. Liška lgt., det. et coll., J. Jaroš revid. Neu für Böhmen.
- 1440. *Foveifera torridana*** (Lederer, 1859). Bohemia centr., Počeplice (5552), 2.VIII.1985, 1 ♂, J. Tedla lgt., G. Elsner det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1466. *Pammene agnotana*** Rebel, 1914. Bohemia centr., Loděnice (6050), 12.V.1971, 2 ♂♂, 3 ♀♀, G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia centr., Kladno - Vinařice (5850), 10.V.1977, 1 ♀; Mořina (6051), 19.V.1982, 1 ♂. Alles J. Skyva lgt. et coll., J. Liška det. Bohemia centr., Srbsko (6050), 1.V.1993, 1 ♂, 4 ♀♀; Milovice (5755), 6.V.1994, 1 ♂, J. Vávra lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1485. *Cydia oxytropidis*** (Martini, 1912). Bohemia sept., Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 21.VI.1994, 2 ♂♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Charvátce - Šibeník (5548), 22.VI.1994, 4 ♂♂, 1 ♀; Raná bei Louny (5548), 5.VI.1996, 2 ♂♂, 1 ♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.

- 1503.** *Cydia zebeana* (Ratzeburg, 1840). Bohemia centr., Dobříš (6250), 15.VII.1986, 1 ♂, J. Liška lgt., det. et coll. Bohemia mer., Hradiště bei Kaplice (7253), ex larva auf *Larix decidua*, 10.II.1990, 1 ♀; Jenín bei Rožmberk nad Vltavou (7352), ex larva auf *L. decidua*, 6.IV.1994, 1 ♂. Alles J. Jaroš lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1520.** *Cydia caecana* (Schläger, 1847). Bohemia sept., Raná bei Louny (5548), 5.VI.1996, 8 ♂♂, 15.VI.1996, 2 ♂♂, 2 ♀♀, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1536.** *Dichrorampha agilana* (Tengström, 1848). Bohemia mer., Vysoká Mýt (6947), 27.VII.1978, 6 ♂♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia sept., Nehasice bei Žatec (5647), 2.VI.1989, 1 ♂, 13.VI.1990, 1 ♂, 3.VII.1993, 1 ♂; Břvany - Písečný vrch Berg (5548), 3.VI.1991, 7 ♂♂. Alles J. Vávra lgt., det. et coll. Bohemia sept., Nepomyšl - Nová Ves (5745), 16.VI.1990, 1 ♂; Raná bei Louny (5548), 20.VI.1994, 7 Stücke; Charvátce - Šibeník (5548), 21.VI.1994, 5 Stücke. Alles J. Skyva lgt. et coll., J. Liška det. Bohemia occ., Rybníčná (5843), 26.V.1990, 25.V.1993, 2 ♂♂; Nová Hvězda bei Karlovy Vary (5844), 29.VI.1990, 1 ♂; Dlouhá Lomnice bei Karlovy Vary (5844), 18.VI.1993, 1 ♂. Alles J. Franz lgt. et coll., J. Jaroš det. Bohemia sept., Oblík Berg bei Louny (5548), 7.VII.1989, 8 ♂♂, 6 ♀♀; Bohemia occ., Stříbro (6244), 29.V.1992, 1 ♂, 1 ♀; Černošín - Vlčí hora Berg (6143), 4.VII.1993, 1 ♂, 1 ♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 1552.** *Epermenia falciformis* (Haworth, 1828). Bohemia occ., Ošelín - Německý mlýn (6243), 14.IX.1991, 1 ♂, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 1563.** *Oxyptilus ericetorum* (Stainton, 1851). Bohemia mer., Nová Bystřice - Kačer (6956), 15.VIII.1991, 4 ♂♂, J. Liška lgt., J. Skyva det., J. Liška et J. Skyva coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 1612.** *Corcyra cephalonica* (Stainton, 1866). Bohemia centr., Praha - Modřany (6052), VII.1987, Massenaufreten in der Schokoladenfabrik, zweifellos mit den Kakaobohnen eingeschleppt, K. Špatenka und M. Barták observ. et det. In verschiedenen Privatsammlungen gibt es zahlreiches Material der Falter aus den Züchten dieser Herkunft, z.B.: VIII.-XI.1995, mehr als 60 Ex., I. Novák educ. et det., in coll. I. Novák et VÚRV. Neu für die Tschechische Republik.
- 1624.** *Salebriopsis albicilla* (Herrich-Schäffer, 1849). Bohemia centr., Káraný (5854), 8.VII.1970, 1 ♂, 26.VI.1984, 1 ♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia mer., Stará řeka (Alter Fluß) bei Třeboň (7055), 11.VII.1984, 2 ♂♂, J. Jaroš lgt., det. et coll. Bohemia sept., Vysoká Lípa (5152), 22.VII.1987, 1 ♂, J. Vávra lgt., det. et coll. Bohemia centr., Káraný (5854), 18.VI.1986, 1 ♂; Bohemia sept., Bílina - Bořeň Berg (5448), 20.VI.1994, 1 ♂. Alles J. Skyva lgt., det. et coll. Bílina - Bořeň Berg (5448), 29.VI.1994, 1 ♂, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1652.** *Acrobasis glaucella* Staudinger, 1859. Káraný (5854), 12.VIII.1972, 1 ♂, 1 ♀, 18.VIII.1977, 1 ♀, G. Elsner lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1671.** *Eccopisa effractella* Zeller, 1848. Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 23.VII.1977, 2 ♂♂, 30.VI.1981, 1 ♂, 15.VII.1982, 1 ♂, 5.VII.1983, 1 ♂; Srbsko (6050), 4.VIII.1984, 1 ♀. Alles G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia centr., Praha - Bubeneč (5852), 16.VI.1986, 1 ♂, J. Vávra lgt. et coll., G. Elsner det. Bohemia centr., Skochovice (6052), 8.VI.1995, 1 ♀, M. Petrů lgt., det. et coll. Bohemia centr., Zlosyň (5752), 24.VII.1993, 1 ♀; Bohemia sept., Bílina - Bořeň Berg (5448), 29.V.1993, 1 ♂, alles J. Skyva lgt., det. et coll. Bílina - Bořeň Berg (5448), 26.V.1993, 1 ♂, J. Liška lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.

- 1686.** *Phycitodes maritimus* (Tengström, 1848). Bohemia sept., Velemín - Hrušovka (5449), 29.VI.1990, 1 ♂; Bohemia centr., Milovice (5755), 5.VI.1992, 1 ♂, 1 ♀. Alles G. Elsner lgt., det. et coll. Neu für die Tschechische Republik.
- 1711.** *Euchromius ocellus* (Haworth, 1811). Bohemia centr., Praha - Kunratic (5953), 25.IX.1989, 1 ♂, V. Felix lgt. et coll., J. Liška et J. Skyva det. Praha - Řeporyje (5951), 3.IX.1996, 1 ex., J. Skyva lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1740.** *Catoptria verella* (Zincken, 1817). Bohemia centr., Kácov (6256), 10. und 12.VII.1967, 2 ♂♂, R. Schwarz lgt. et det., coll. M. Petrů. Bohemia mer., Stará řeka (Alter Fluß) bei Třeboň (7055), 28.VII.1983, 11.VII.1984, 2 ♂♂, J. Jaroš lgt., det. et coll., 13.VII.1987, 19 ♂♂, I. Novák lgt. det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1743.** *Chrysocrambus craterellus* (Scopoli, 1763). Bohemia mer., Haklovy Dvory bei České Budějovice (7052), 7.VII.1985, J. Jaroš lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 1928.** *Argynnis laodice* (Pallas, 1771). Bohemia centr., Jílové u Prahy (6152), 6.VIII.1995, 1 ♀, D. Ričl lgt., det. et coll. Vereinzelter Fund eines Weibchens, wahrscheinlich ein eingeschlepptes Stück. Neu für die Tschechische Republik.
- 2093.** *Idaea nitidata* (Herrich-Schäffer, 1861). Bohemia centr., Praha - Ruzyně (5951), 4.-6.VII.1994, 1 ♂ mit Lichtfalle gefangen, I. Novák lgt., det. et coll. Neu für Böhmen.
- 2652.** *Athetis furvula* (Hübner, 1808). Bohemia centr., Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5853), 24.VII.1969, 1 ♂, G. Elsner lgt. det. et coll. Neu für Böhmen.

NOVĚ POTVRZENÉ A OVĚŘENÉ NÁLEZY DRUHŮ
NEU BESTÄTIGTE UND ÜBERPRÜFTE ARTENANGABEN
RECENTLY CONFIRMED AND VERIFIED RECORDS

Zde jsou uvedeny recentní údaje o druzích, u nichž dosud existovaly spolehlivé nálezy pouze ze starší doby a dále o druzích, které byly sice z Čech v literatuře uvedeny, ale údaje o nich nejsou příliš přesné (obvykle pouze „Čechy“) nebo nejsou považovány za dostatečně spolehlivé. Navíc je připojeno několik nepublikovaných údajů o nedávno nových nebo vzácných druzích české fauny.

An dieser Stelle werden rezente Angaben über die Arten angeführt, bei denen verlässliche Funde nur aus älterer Zeit stammen und weiter über diejenigen, die zwar von Böhmen in der Literatur angeführt sind, aber die Angaben nicht genau genug sind (gewöhnlich nur „Böhmen“) oder nicht für verlässlich genug gelten. Noch dazu werden einige nicht publizierte Angaben über unlängst neue oder seltene Arten der böhmischen Fauna beigelegt.

53. *Stigmella pyri* (Glitz, 1865). Bohemia centr., Praha - Baba (5852), 30.IX.1994, Raupen auf *Pyrus pyrastrer*, 25.II.1995, 1 ♂, J. Vávra lgt. det et coll.
126. *Ectoedemia minimella* (Zetterstedt, 1839). Bohemia occ., Františkovy Lázně - Soos (5840), 27.VII.1996, Minen mit Raupen auf *Betula pubescens*, M. Petrů lgt., det. et coll.
397. *Kessleria alpicella* (Stainton, 1851). Bohemia centr., Svatý Jan pod Skalou (6050), 10.X.1997, mehrere Raupen auf *Saxifraga paniculata*, J. Vávra lgt. et det.
449. *Ypsolopha persicella* (Fabricius, 1787). Bohemia sept., Brná nad Labem (5350), 5.IX.1964, 1 ♂, 6.X.1975, 1 ♂, 18.VI.1977, 1 ♀, 13.X.1979, 4 ♂♂, 5 ♀♀, 26.VII.1985, 1 ♀, 30.VIII.1985, 2 ♂♂, 1.VII.1989, 2 ♀♀, 25.IX.1993, 2 ♂♂, 5.VII.1994, 1 ♀, 16.VII.1994, 1 ♀, 20.VII.1994, 1 ♀, regelmäßig in 2 Generationen, I. Novák lgt., det. et coll.
479. *Paraleucoptera sinuella* (Reutti, 1853). Bohemia centr., Tišice (5752), 6.IX.1996, zahlreiche Minen mit Raupen auf *Populus alba*; Praha - Troja (5852), 20.IX.1996, Minen auf *P. nigra*; Bohemia sept., Hrušovany bei Zatec (5647), 7.VIII.1996, 1 ♂. Alles J. Vávra lgt., det. et coll.
509. *Agonopterix parilella* (Treitschke, 1835). Bohemia occ., Poběžovice (6542), VI.1990, 1 Raupe auf *Selinum carvifolia*, Imago 10.VII.1990, 1 ♂; Bohemia sept., Červený Újezd (5549), VI.1991, Raupen auf *S. carvifolia*, Imagines 22.VII.1991, 1 ♂, 3 ♀♀. Alles J. Vávra lgt., det. et coll.
576. *Telechrysis tripuncta* (Haworth, 1828). Bohemia or., Běstvína (6159), 15.VI.1995, 1 ♀; Bohemia sept., Vysoká Lípa (5152), 30.VI.1996, 1 ♂. Alles J. Vávra lgt. det. et coll.
612. *Elachista atricomella* Stainton, 1849. Bohemia sept., Vysoká Lípa (5152), 15.VII.1993, 2 ♂♂; Bohemia occ., Brdy - Míšov (6348), 7.VI.1993, 1 ♀. Alles J. Vávra lgt., det. et coll.
745. *Coleophora ditella* Zeller, 1849. Bohemia centr., Praha - Jinonice (5952), 20.V.1991, 3 Säcke auf den Blättern von *Artemisia campestris*, Imagines 8.VI.1991, 1 ♂, 1 ♀, J. Vávra lgt., det. et coll.
784. *Coleophora ramosella* Zeller, 1849. Bohemia centr., Milovice (5755), 15.V.1996, Raupen auf *Solidago virgaurea*, 6.-21.VI.1996, 4 ♂♂, 7 ♀♀, J. Vávra lgt., det. et coll.
892. *Monochroa lutulentella* (Zeller, 1839). Bohemia centr., Ovčáry (5753), 27.VIII.1983, 2 ♂♂, 6 ♀♀; Káraný (5854), 17.VIII.1991; Bohemia occ., Rokycany (6247), 15.VIII.1976, 1 ♀, 23.VII.1983, 1 ♀, 8.VII.1988, 1 ♀, 6.VIII.1993, 1 ♀; Bor (7154), 4.VII.1993, 1 ♀. Alles G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia centr., Milovice (5755), 5.VIII.1992, 1 ♀; Bohemia occ., Ošelín - Německý mlýn (6243), 11.VII.1990, 1 ♀, 12.VII.1992, 1 ♂, 27.VII.1992, 3 ♀♀, 10.IX.1993, 1 ♀; Bohemia sept., Mimoň - Hradčanské rybníky (Hradčanské Teiche) (5354), 18.VIII.1993, 1 ♀. Alles J. Liška lgt., det. et coll.

898. *Monochroa sepicolella* (Herrich-Schäffer, 1854). Bohemia centr., Velenka bei Kersko (5855), 13.VIII.1991, 2 ♀♀, J. Vávra lgt., det. et coll. Vrané nad Vltavou - Jarov (6052), 14.V.1993, 1 ♀, J. Liška lgt., det. et coll.
945. *Bryotropha similis* (Stainton, 1854). Bohemia mer., Šumava, Vysoká Mýt (6947), 27.VII.1978, 2 ♂♂; Bohemia occ., Rokycany (6247), 5.VII.1991, 1 ♂, 19.VII.1990, 1 ♂, 5.VII.1994, 2 ♂♂; Bohemia sept., Velemín (5449), 12.V.1990, 1 ♀. Alles G. Elsner lgt., det. et coll.
955. *Chionodes luctuellus* (Hübner, 1793). Bohemia centr., Radvanice (6155), 24.VII.1975, 1 ♂; Praha - Kbely (5853), 8.VII.1970, 2 ♂♂, 1 ♀; Bohemia occ., Rokycany (6247), 28.VI.1986, 1 ♂, 25.VI.1982, 1 ♂, 5.VII.1991, 2 ♂♂; Dobřív (6248), 10.VII.1980, 1 ♂, 18.VII.1980, 2 ♂♂; Štáhlavice (6347), 11.VII.1982, 1 ♂, 1 ♀; Nevid (6347), 3.VII.1976, 1 ♀; Bohemia mer., Horská Kvilda (6947), 18.VII.1976, 1 ♂; Vysoká Mýt (6847), 27.VII.1978, 3 ♂♂. Alles G. Elsner lgt., det. et coll.
986. *Gelechia sestertiella* Herrich-Schäffer, 1854. Bohemia centr., Srbsko (6050), 4.VIII.1984, 1 ♀, 24.VIII.1984, 1 ♀; Praha - Zlíchov (5952), 29.VIII.1984, 1 ♂, 6 ♀♀; Praha - Bohnice (5852), 13.VIII.1985, 1 ♀; Bohemia sept., Lovoš Berg bei Lovosice (5450), 18.VII.1992, 1 ♀. Alles G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia centr., Vrané nad Vltavou - Jarov (6052), 30.VI.1992, 1 ♀; Medník Berg bei Pikovice (6152), 31.VII.1993, 1 ♀; Radotín - Cikánka (6051), 20.VII.1995, 1 ♂. Alles J. Liška lgt., det. et coll.
1007. *Caryocolum alsinellum* (Zeller, 1868). Bohemia sept., Dětaň (5844), 10.VIII.1989, 1 ♂, G. Elsner lgt., det. et coll.
1056. *Anarsia spartiella* (Schränk, 1802). Bohemia centr., Praha - Kbely (5952), 13.VII.1996, 1 ♂, G. Elsner lgt. det. et coll.
1061. *Dichomeris marginella* (Fabricius, 1781). Bohemia mer., Radhostice bei Vlachovo Březí (6949), 1.VIII.1975, 1 ♂, I. Novák lgt. et coll., G. Elsner det.
1152. *Aphelia viburnana* (D. & Sch., 1775). Bohemia or., Bartošovice (5665), 30.VII.1970, 2 ♂♂, G. Elsner lgt., det. et coll. Bohemia centr., Praha - Komořany (6052), 24.VI.1980, 1 ♀, J. Vávra, lgt., det. et coll. Bohemia occ., Pila bei Karlovy Vary (5843), 11. VII.1988, 1 ♂; Rybníčná (5843), 4.VII., 22.VI.1989, 2 ♂♂; Horní Tašovice (5843), 28.VII.1989, 1 ♀; Nejda bei Karlovy Vary (5743), 2.VII.1994, 1 ♂; Abertamy (5642), 6.VII.1994, 1 ♂. Alles J. Franz lgt. et coll., J. Jaroš det.
1227. *Phtheochroa rugosana* (Hübner, 1799). Bohemia sept., Raná bei Louny (5548), 2.VI.1997, 1 ♀, J. Skyva lgt. et coll., J. Liška det.
1242. *Prochlidonia amiantana* (Hübner, 1799). Bohemia centr., Praha - Radotín (6052), 18.VI.1996, 1 ♂, J. Vávra lgt., det. et coll.
1250. *Aethes margarotana* (Duponchel, 1836). Bohemia centr., Praha - Zlíchov (5952), 6.VI.1970, 3 ♂♂, 5 ♀♀, G. Elsner lgt., det. et coll. Praha - Prokopské údolí (Prokop-Tal) (5952), 13.VII.1939, 1 ♀, R. Schwarz lgt., J. Liška det., in coll. M. Petrů.
1337. *Aterpia corticana* (Denis & Schiffermüller, 1775). Bohemia mer., Kamenná Lhota bei Vimperk (6948), 12.VII.1995, 1 ♂, J. Vávra lgt., det. et coll.
1386. *Epinotia subsequana* (Haworth, 1799). Bohemia occ., Černošín - Vlčí hora Berg (6143), 10.V.1997, 2 ♂♂, J. Liška lgt. det. et coll.
1453. *Barbara herrichiana* Obraztsov, 1960. Bohemia centr., Soběšín (6155), XI.1993, mehrere Raupen in den Zapfen von *Abies alba*, II.1994, 3 ♂♂, 4♀, P. Šrůtka lgt., J. Liška det. et coll.

- 1526.** *Dichrorampha flavidorsana* Knaggs, 1867. Bohemia centr., Nehasice bei Žatec (5647), 3.VII.1993, 2 ♂♂, J. Vávra lgt., det. et coll.
- 1609.** *Carposina scirrhosella* Herrich-Schäffer, 1854. Bohemia sept., Raná bei Louny (5548), 8.VIII.1996, 2 ♂♂, 3 ♀♀, J. Liška lgt., det. et coll.
- 2021.** *Drepana curvatula* (Borkhausen, 1790). Bohemia centr., Káraný (5854), 23.VIII.1984, 1 ♂, M. Petrů lgt., det. et coll. 22.VIII.1996, 1 ♂, G. Elsner lgt. det. et coll.
- 2921.** *Euxoa crypta* (Dadd, 1927). Bohemia centr., Káraný (5854), 12.VIII.1997, 2 ♂♂, M. Petrů lgt., det. (Genitalien überprüft) et coll.
- 2926.** *Yigoga signifera* (Denis & Schiffermüller, 1775). Bohemia sept., Lovoš Berg bei Lovosice (5450), 21.VII.1988, 1 ♀, G. Elsner lgt. det. et coll.

NEAKCEPTOVANÉ ÚDAJE O VÝSKYTU DRUHŮ
NICHT AKZEPTIERTE ANGABEN ÜBER DAS VORKOMMEN DER ARTEN
NON ACCEPTED FAUNISTIC DATA

Zde jsou uvedeny literární údaje o druzích, jejichž výskyt je na území Čech nepravděpodobný nebo vyloučený a dokladový materiál byl zničen nebo není dostupný, dále o druzích, u nichž byla při revizi zjištěna chybná determinace [správná je uvedena v hranatých závorkách].

An dieser Stelle werden literarische Angaben über die Arten angeführt, deren Vorkommen in Böhmen unwahrscheinlich oder ausgeschlossen ist und Belegmaterial vernichtet oder verloren ist, weiter über die Arten, wo bei der Revision falsche Determination festgestellt wurde [die richtige ist in eckigen Klammern angeführt].

<i>Micropterix osthelderi</i> Heath, 1975	540
[<i>M. schaefferi</i> Heath, 1975, J. Liška revid.]	
<i>Adela raddella</i> (Hübner, 1793)	695
[<i>A. mazzolella</i> (Hübner, 1796), I. Novák revid.], navíc byl dokladový kus zničen (B. Starý, ústní sdělení).	
[<i>A. mazzolella</i> (Hübner, 1796), I. Novák revid.], noch dazu wurde das Belegstück vernichtet (pers. Mitteilung von B. Starý).	
<i>Praesolenobia clathrella</i> (Fischer v. R., 1837)	2
<i>Dahlica wockei</i> (Heinemann, 1870)	2
<i>Epichnopterix sieboldi</i> (Reutti, 1853)	1
<i>Ochsenheimeria taurella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	695
<i>Phyllonorycter distentellus</i> (Zeller, 1846)	695
<i>Phyllonorycter delitellus</i> (Duponchel, 1844)	986
<i>Argyresthia amiantella</i> (Zeller, 1847)	587
<i>Glyphipterix schoenicolella</i> Boyd, 1859	587
<i>Lyonetia mariae</i> Záruba, 1994	991
Druhová příslušnost nejasná.	
Die Artzugehörigkeit ist unklar.	
<i>Elachista griseella</i> (Duponchel, 1843)	2
[<i>E. orstadii</i> Palm, 1943, J. Liška revid.]	
<i>Elachista collitella</i> (Duponchel, 1843)	988
<i>Elachista triatomea</i> (Haworth, 1828)	540
[<i>E. pollinariella</i> Zeller, 1839, J. Liška revid.]	
<i>Elachista hedemanni</i> Rebel, 1899	2
[<i>E. gregori</i> Traugott-Olsen, 1988, J. Liška revid.]	
<i>Elachista triseriatella</i> Stainton, 1854	690
<i>Biselachista freyi</i> (Staudinger, 1871)	896
[<i>E. occidentalis</i> (Frey, 1882)]	
<i>Coleophora adjunctella</i> Hodgkinson, 1882	396
<i>Coleophora asteris</i> Mühlig, 1864	929
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	
<i>Coleophora meridonella</i> Rebel, 1912	923
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	
<i>Coleophora astragalella</i> Zeller, 1849	988
Pravděpodobně chybná determinace, materiál se údajně ztratil, nelze revidovat.	
Wahrscheinlich falsche Determination, das Material ist angeblich verloren, Revision unmöglich.	
<i>Scythris seliniella</i> (Zeller, 1839)	2, 509, 695
[<i>S. clavella</i> (Zeller, 1855), J. Liška revid.]	

<i>Scythris subseliniella</i> (Heinemann, 1876)	2
<i>Scythris fallacella</i> (Schläger, 1847)	695
<i>Scythris aerariella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	2
<i>Scythris flaviventrella</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	988
<i>Blastobasis roscidella</i> (Zeller, 1847)	587
[<i>Pseudatemelia</i> sp., J. Liška revid.]	
<i>Pleurota marginella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	2
Pouze nespolehlivé údaje z minulého století.	
Nur unverlässliche Angaben aus dem vergangenen Jahrhundert.	
<i>Monochroa servella</i> (Zeller, 1839)	316
[<i>Bryotropa senectella</i> (Zeller, 1839), G. Elsner revid.]	
<i>Megacraspedus imparellus</i> (Fischer von Rösslerstamm, 1843)	316
[<i>Uncustriodonta trinotella</i> (Herrich-Schäffer, 1856), G. Elsner revid.]	
<i>Bryotropa dryadella</i> (Zeller, 1850)	695
[<i>B. basaltinella</i> , (Zeller, 1839), G. Elsner revid.]	
<i>Gelechia basipunctella</i> Herrich-Schäffer, 1854	352
[<i>G. nigra</i> (Haworth, 1828), G. Elsner revid.]	
<i>Sophronia marginella</i> Toll, 1936	384
[<i>S. consanguinella</i> Herrich-Schäffer, 1854, J. Liška revid.]	
<i>Brachmia dimidiella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	215
[<i>B. blandella</i> (Fabricius, 1798), J. Jaroš revid.]	
<i>Chamaesphecia bibioniformis</i> (Esper, 1800)	633
[<i>C. dumonti</i> Le Cerf, 1922, K. Špatenka revid.]	
<i>Synanthedon affinis</i> Staudinger, 1856	627
[<i>Chamaesphecia empiformis</i> (Esper, 1783), K. Špatenka revid.]	
<i>Hysterophora maculosana</i> (Haworth, 1811)	2
<i>Aethes decimana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	2
<i>Cnephasia chrysanthæana</i> (Duponchel, 1843)	587a
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	
<i>Falseuncaria degreyana</i> (McLachlan, 1869)	2
<i>Olethreutes metallicanus</i> (Hübner, 1799)	2
<i>Lobesia euphorbiana</i> (Freyer, 1842)	2
<i>Bactra robustana</i> (Christoph, 1872)	370
<i>Epiblema confusana</i> (Herrich-Schäffer, 1856)	695
[<i>E. sticticanum</i> (Fabricius, 1794), J. Jaroš & J. Liška revid.]	
<i>Cydia pyrivora</i> (Danilevsky, 1947)	988
Nevěrohodné. - Unglaubwürdig.	
<i>Dichrorampha sylvicolana</i> (Heinemann, 1863)	2
[<i>D. heegerana</i> (Duponchel, 1843), V. Vlach (1950) revid.]	
<i>Wockia asperipunctella</i> (Bruand, 1851)	587
[<i>Luquetia lobella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775), J. Liška revid.]	
<i>Calyciphora xanthodactyla</i> (Treitschke, 1833)	2
[<i>C. albodactyla</i> (Fabricius, 1794), J. Skyva revid.]	
<i>Oxyptilus ericetorum</i> (Stainton, 1851)	936
[<i>O. parvidactylus</i> (Haworth, 1811), J. Marek revid.]	
<i>Stenoptilia stigmatodactyla</i> (Zeller, 1852)	953
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	
<i>Synaphe connectalis</i> (Hübner, 1796)	coll. SNM
1 ex. lokalizovaný pouze „Bohemia, Neumann“. Nevěrohodné!	
1 Ex. mit der bloßen Lokalität „Böhmen, Neumann“. Unglaubwürdig!	

<i>Haimbachia cicatricella</i> (Hübner, 1824)	151
<i>Catoptria myella</i> (Hübner, 1796)	2
<i>Catoptria pyramidella</i> (Treitschke, 1832)	2
<i>Catoptria petrificella</i> (Hübner, 1796)	670
Z Čech uveden omylem. - Aus Böhmen irrtümlich angegeben.	
<i>Pyrausta falcatalis</i> Guenée, 1854	988, 670
Nevěrohodné. - Unglaubwürdig.	
<i>Anania funebris</i> (Ström, 1768)	coll. SNM
1 ex. lokalizovaný pouze „Bohemia, Neumann“. Nevěrohodné!	
1 Ex. mit der bloßen Lokalität „Böhmen, Neumann“. Unglaubwürdig!	
<i>Mecyna trinalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	953
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	
<i>Eupithecia conterminata</i> (Lienig & Zeller, 1846)	26
[<i>E. indigata</i> (Hübner, 1813), F. Krامل (1989) revid.]	
<i>Nebula nebulata</i> (Treitschke, 1828)	414
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	
<i>Nebula tophaceata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	26
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	
<i>Ennomos quercaria</i> (Hübner, 1813)	414
Uveden omylem [<i>E. quercinarius</i> Hufnagel, 1767, I. Novák revid.].	
Irrtümlich angegeben [<i>E. quercinarius</i> Hufnagel, 1767, I. Novák revid.].	
<i>Synopsia sociaria</i> (Hübner, 1799)	1
<i>Elophos serotinarius</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	1
<i>Diachrysia zosimi</i> (Hübner, 1822)	414
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	
<i>Photedes captiuncula</i> (Treitschke, 1825)	953
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	
<i>Apamea aquila</i> Donzel, 1837	953
Z Čech uveden omylem. - Aus Böhmen irrtümlich angegeben.	
<i>Oxicesta geographica</i> (Fabricius, 1787)	414
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	
<i>Hyssia cavernosa</i> (Eversmann, 1842)	414
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	
<i>Perigrapha i-cinctum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	414
Nepravděpodobné. - Unwahrscheinlich.	

U nepravděpodobných údajů „414 (= Matouš 1994)“ je uvedeno jako pramen muzeum v Nymburce. Jde zřejmě o naprosto nespolehlivou sbírku, původní majitel sbírky není uveden.

Bei den unwahrscheinlichen Angaben „414 (= Matouš 1994)“ ist als Quelle das Regionalmuseum in Nymburk angegeben. Es handelt sich offensichtlich um eine unverlässliche Sammlung, der ursprüngliche Besitzer ist nicht angeführt.

SOUPIŠ PRACÍ O FAUNĚ MOTÝLŮ ČECH
LITERATURQUELLEN ÜBER DIE BÖHMISCHE SCHMETTERLINGSFAUNA
LITERATURE RESOURCES DEALING WITH THE BOHEMIAN FAUNA OF LEPIDOPTERA

1. STERNECK J. 1929: *Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens*. Selbstverlag, Karlsbad, 297 pp.
2. STERNECK J. & ZIMMERMANN F. 1933: *Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens II. (Microlepidoptera)*. Selbstverlag, Karlsbad, 168 pp.
3. ADÁMEK A. 1940: Parasiti u lepidopter. *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 36: 95 (in Czech).
4. ALBRECHT H. 1914: *Lemonia taraxaci* V.W. *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 11: 34-37 (in Czech).
5. ANKERT H. 1936: Totenkopfschwärmer. *Natur und Heimat*, 7: 15.
6. ANONYM (S.M.) 1938: Šťastný i vzácný lov. *Naši Přírodou*, 1: 656 (in Czech).
7. BALATÝ J. & TYKAČ J. 1945: *Araschnia levana* L. *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 42: 148 (in Czech).
8. BARTEK M. 1994: Zajímavé nálezy aberací druhů *Limnitis populi* (L.) a *Polygonia c-album* (L.) (Lepidoptera: Nymphalidae). *Práce Muz. v Kolině - Ser. Natur*, 1: 93-96 (in Czech, English summ.).
9. BAŤA L. 1929: Zpráva o jihočeských Lepidopterech nově zjištěných nebo jinak zajímavých. *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 26: 30-32 (in Czech).
10. BAŤA L. 1929: Zpráva o zajímavějších Lepidopterech jihočeských za r. 1929. *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 26: 95-96 (in Czech).
11. BAŤA L. 1929-1931: Versuch einiger faunistischen Bearbeitung der Macrolepidopteren des südlichsten Böhmens. *Ztschr. Öster. Entomol. Ver.*, 14: 49-51, 62-64, 82-83, 91-92, 127-128, 15: 73-76, 83-84, 90-92, 122-123, 16: 6-7, 14-16.
12. BAŤA L. 1930: Fauna motýlí a flora jižních Čech s hlediska biocenoty. *Roč. Vlastivěd. Společ. Jihočes.*, 1929: 92-110 (in Czech).
13. BAŤA L. 1933: *Dosavadní výsledky zoologického výzkumu J-Čech*. Vlastivěd. společ. jihočeská, Čes. Budějovice, 67 pp. (in Czech).
14. BAŤA L. 1935: Dodatky k zoologickému výzkumu jižních Čech. *Roč. Vlastivěd. Společ. Jihočes.*, 1934: 56-58 (in Czech).
15. BAŤA L. 1940: Entomologické paběrky z jižních Čech (Lep.). *Entomol. Listy*, 3: 37-38 (in Czech).
16. BEMBENEK H. 1989: Zur Faunistik und Ökologie der Geometridae der Sächsischen Schweiz (Insecta, Lepidoptera). *Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden*, 16: 135-167.
17. BENETKA M. 1973: K poznání motýlů okolí Sokolova v Čechách (Lep.). *Zpr. Čes. Společ. Entomol. ČSAV*, 9: 77-79 (in Czech, German summ.).
18. BENGTTSSON B.A., KRAMPL F., LIŠKA F., PATOČKA J. & TURČANI M. 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Gracillariidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Cosmopterigidae, Scythrididae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Geometridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 88: 75-79.
19. BERÁNKOVÁ J. & NOVÁK I. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Noctuidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 83: 474.
20. BERÁNKOVÁ J. & NOVÁK I. 1990: Zajímavé nálezy můrovitých (Lep., Noctuidae) v západních Čechách. (Interesting finds of moths (Lep., Noctuidae) in Western Bohemia). *Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Příroda, Plzeň*, 40: 79-92 (in Czech, English summ.).
21. BEURET H. 1934: Contribution à l'étude de la variation géographique de *Lycaeides argyrognomon* Brgrstr. *Lambillionea*, 34.
22. BEYR J. 1940: *Aporia crataegi* a Litomyšlsku. *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 37: 125 (in Czech).
23. BINDER A. 1994: Beitrag zur Schmetterlingsfauna Böhmens (Insecta, Lepidoptera). *Neue Entomol. Nachr.*, 32: 1-150.
24. BLATTNÝ E. 1923: Hromadné tahy babočky bodlákové. *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 20: 107, 132 (in Czech).
25. BLESZYNSKI S. 1965: *Crambinae*. In: AMSEL G., GREGOR F. & REISSER H. (eds.): *Microlepidoptera Palaearctica*, Bd. I. G. Fromme & Co., Wien, 553 pp.
26. BOUMA M. 1983: Zajímavější nálezy motýlů Mimoně a jejího okolí (Lepidoptera). *Zpr. Čes. Společ. Entomol. ČSAV*, 19: 33-40 (in Czech, English summ.).
27. BOUMA M. 1988: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Notodontidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 85: 74.
28. BOUMA M. 1997: Entomologický průzkum Lepidopter bývalého VVP Ralsko. (Bericht über die entomologische Erkundung der Lepidopteren des ehemaligen Truppenübungsplatzes Ralsko). *Bezděz, Vlastivěd. Sbor. Českolipska*, 5: 363-377 (in Czech, German and English summ.).
29. BOUŠA J. 1944: K nálezu *Zygaena purpuralis* Brünnich f. *grossmanni* Rühl. v Čechách. *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 41: 152 (in Czech).
30. BRČÁK J. 1942: Význační motýlové jihočeských Blat. *Vesmír*, 21: 54 (in Czech).
31. BRČÁK J. 1946: Příspěvek k faunistice Lepidopter jižních Čech. *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 43: 75-76 (in Czech).
32. BRČÁK J. 1948: Biocenologická studie Macrolepidopter na rašelině SZ od Veselí n. Luž. v již. Čechách. *Entomol. Listy*, 11: 92-111 (in Czech).
33. BRČÁK J. 1948: Poznámky k ekologii a fenologii píďalky *Poecilopsis isabellae* Harr. (Lep. Geometr.) *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 45: 77 (in Czech).

34. BRČÁK J. 1950: Motýli našich rašelinišť. *Ochrana Přírody*, 5(4): 77-80 (in Czech).
35. BRČÁK J. 1950: *Hepiulus lupulinus* L. (Hrotnokřídlec běloskvrný) škůdce konvalínek v pražských zahrádkách. *Ochrana Rostlin*, 23: 236-238 (in Czech).
36. BRČÁK J. 1953: Nový škodlivý výskyt vakonoše ovocného. *Ovocnářství a Zelinářství*, 1: 248-249 (in Czech).
37. BREWER J.W., KRAMPL F. & SKUHRÁVÝ V., 1985: Forest Lepidoptera attracted to six synthetic pheromones in Czechoslovakia. *Zschr. Angew. Entomol.*, 100: 372-381.
38. BRŮČKOVÁ B. 1945: Studie o českých druzích rodu *Boarmia* Treitschke. *Sbor. Entomol. Odd. Nár. Mus.*, 23: 89-150 (in Czech).
39. BRŮČKOVÁ B. 1951: Variabilita druhu *Amphidasis betularia* L. v Čechách. *Sbor. Entomol. Odd. Nár. Mus.*, 26(1948-1950) (356): 1-4 (in Czech).
40. BRŮČKOVÁ B. 1951: O českých druzích rodu *Poecilopsis* Harrison. *Sbor. Entomol. Odd. Nár. Mus.*, 26 (365): 1-5 (in Czech).
41. BRŮČKOVÁ B. 1952: Study of the Bohemian species of the genus *Erannis* Hübner (Lep.). *Sbor. Entomol. Odd. Nár. Mus.*, 27(1951): 213-221.
42. BŘEZINA O. 1935: Seznam motýlů velkých (Macrolepidoptera) okresu humpoleckého. *Zálesí - Vlastivěd. Sbor. Okr. Humpoleckého*, 17(8): 123-127 (in Czech).
43. BUGENT J. 1934: Zitronenfalter (*Gonepteryx rhamni* L.). *Natur und Heimat*, 5: 122.
44. BUGENT J. 1935: Die Bläulinge (*Lycaninen*) im Aussiger Bezirke. *Natur und Heimat*, 6: 78-80.
45. CÍFKA J. 1932: Úlovky motýlů na Žbáně u Rakovníka v r. 1931. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 29: 63 (in Czech).
46. ČAPEK M., HLADIL L. & ŠEDIVÝ J. 1984: Zoznam blanokřídlých parazitů (Hymenoptera) dochovaných hostitelů. *Entomol. Probl.*, 17: 325-370 (in Slovak).
47. ČERMÁK K. 1952: Hmyzí škůdci semen našich lesních dřevin. *Práce Výzk. Úst. Lesn. (Praha)* 1: 5-87 (in Czech).
48. ČERNÝ J. 1996: Příspěvek k faunistice čeledi Nepticulidae Děčínska (Lepidoptera). *Klapalekiana*, 32: 1-10 (in Czech, German summ.).
49. ČERNÝ Z., GOTTWALD Z., HARTL J., ZEDNÍK L. & ZELENÝ J. 1993: Motýli (Lepidoptera) z Podblanicka - CHKO Blaník. *Sbor. Vlastivěd. Prací z Podblanicka*, 33: 49-56 (in Czech).
50. ČÍLA P. & SKYVA J. 1993: Výsledek průzkumu vybraných čeledí motýlů v hl. m. Praze. *Natura Pragensis, Studie o Přírodě Prahy*, 10: 3-51 (in Czech).
51. ČÍLA P. & SKYVA J. 1993: Výsledky faunistického průzkumu motýlů (Lepidoptera) na území Prahy - 1. část. *Klapalekiana*, 29: 71-86 (in Czech, English summ.).
52. ČÍLA P. & ŠPATENKA K. 1989: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Sesiidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 86: 78.
53. DOBROVSKÝ T. 1988: Motýli z čeledi Noctuidae (můrovití) na území pražské zoologické zahrady. *Gazella*, 15: 141-148 (in Czech).
54. DOBROVSKÝ T. & HRONÍK J. 1987: Denní motýli (Rhopalocera) zoologické zahrady v Praze a jejího okolí. *Gazella*, 14: 117-136 (in Czech).
55. DOSKOČIL J. 1940: Nesytka maliníková (*Bembecia hylaeiformis* Lasp.). *Vesmír*, 18: 183 (in Czech).
56. DOSKOČIL J. 1940: O bourovci ovocném (*Gastropacha quercifolia* L.). *Vesmír*, 18: 259 (in Czech).
57. DRÁBEK K. & DRÁBEK T. 1994: Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) okolí Třemošnice. *Práce Muz. v Kolíně - Ser. Natur*, 1: 127-130 (in Czech, English summ.).
58. DUFAY C. 1959: Les Abrostola O. (*Unca* auct.) de la collection du Museum National de Prague (Lepidoptera: Noctuidae). (Contribution à l'étude des Noctuidae „Quadrifinae“ 12.) *Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 5: 43-47.
59. DUCHEK K. & SKOUPÝ J. 1991: Zajímavý výskyt motýla *Pontia daplidice* (L.) v severních Čechách. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 27: 64-65 (in Czech, English summ.).
60. DUCHEK K. & SKOUPÝ J. 1992: Motýli okresu Teplice. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 28: 87-104 (in Czech).
61. EBENHÖH J. 1965: Příspěvek k poznání jihočeské fauny Rhopalocer. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 5: 84-87 (in Czech).
62. EBENHÖH J. 1972: Rozšíření perletovce mokřadního (*Proclissiana eunomia* Esp.) na Šumavě. *Zprav. CHKO Šumava*, 14: 38-40 (in Czech).
63. EIDKUM F. 1952: Nový motýl pro Čechy - vakonoš *Psychidea pectinella* Den. et Schiff. (Lep., Psych.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 49: 235-236 (in Czech).
64. ELSNER G. 1995: A new West-Palaearctic genus and species, externally similar to *Stenolechia gemmella*, with taxonomical notes on related genera (Lepidoptera: Gelechiidae). *Klapalekiana*, 31: 73-90.
65. ELSNER G. & ELSNER V. 1985: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Tineidae, Oecophoridae, Cochyliidae, Tortricidae, Pyralidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 82: 395-397.
66. ELSNER G., JAROŠ J. & SPITZER K. 1988: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Gelechiidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 85: 74.
67. ELSNER G., KRAMPL F., NOVÁK I. & SPITZER K. 1981: K poznání Microlepidopter Šumavských rašelinišť. (Microlepidoptera of the Šumava Mountains peat bog). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 21: 73-88 (in Czech, English summ.).

68. ELSNER G. & SPITZER K. 1975: Múra *Anomogyna sincera* H.S. (Noctuidae, Lepidoptera) - nová pro faunu Československa. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 15: 210 (in Czech).
69. ELSNER V. & ELSNER G. 1985: Nové a významné nálezy mikrolepidopter (Lepidoptera) z ČSSR. *Zbor. Slov. Nár. Múz., Přír. Vedy (Bratislava)*, 31: 123-143 (in Czech).
70. ELSNER V., LIŠKA J. & LAŠTŮVKA Z. 1996: Faunistic records from the Czech Republic - 42. Lepidoptera: Oecophoridae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Noctuidae. *Klapalekiana*, 32: 131-133.
71. FAJČÍK J. & SLAMKA F. 1996: *Motýle střední Evropy I. - Die Schmetterlinge Mitteleuropas I*. F. Slamka, Bratislava, 113 pp. (in Slovak and German).
72. FEIK V. & KONEČNÝ K. 1990: Perleťovec severní, *Boloria aquilonaris* (Stichel 1908) - nová populace z jižních Čech (Nymphalidae, Lepidoptera). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 30: 36 (in Czech).
73. FELIX V. 1942-1943: Druhá generace vlnočárníků. *Vesmír*, 21: 118 (in Czech).
74. FELIX V. 1969: Motýlové v centru Prahy. (Schmetterlinge im Stadtzentrum von Prag). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 5: 63-75 (in Czech, German summ.).
75. FELIX V. 1971: Pozorování tažných motýlů v Československu v letech 1965-1969. (Wanderfalterbeobachtungen in der Tschechoslowakei in den Jahren 1965-1969). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 7: 7-26, 29-54 (in Czech, German summ.).
76. FELIX V., PIPEK P. & SOLDÁT M. 1978: Zpráva o pozorování tažných motýlů v Československu v letech 1972-1974, 1975, 1976. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 14: 41-92 (in Czech, German summ.).
77. FELIX V. & SOLDÁT M. 1972: Zpráva o pozorování tažných motýlů v Československu v letech 1970-1971. *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 8: 125-150 (in Czech, German summ.).
78. FRANZ J. 1982: Zur Flüssigkeitsaufnahme bei Peribatodes secundaria Esper (Lep.: Geometridae). *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a. M.)*, 92: 48.
79. FRANZ J. 1983: Zum Verhalten des Dickkopffalters *Ochlodes venatus* (Lep.: Hesperidae). *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a. M.)* 93: 79-80.
80. FRANZ J. 1983: Příspěvek k motýlí fauně Tepelské plošiny: můrovití. *Arnika, Zprav. CHKO Slavkovský Les*, 24 (4): 153-155 (in Czech).
81. FRANZ J. 1985: Příspěvek k motýlí fauně Tepelské vrchoviny. Denní motýli. *Arnika, Zprav. CHKO Slavkovský Les*, 31(11): 24-26 (in Czech).
82. FRANZ J. 1986: Příspěvek k motýlí fauně Tepelské vrchoviny: hřbetozubci (Lepidoptera, Notodontidae). *Arnika, Zprav. CHKO Slavkovský Les*, 34(14): 133-135 (in Czech).
83. FRANZ J. 1987: Příspěvek k fauně můrovitých z širšího okolí Karlových Varů (Lepidoptera, Noctuidae). *Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Příroda, Plzeň*, 34-35: 55-56 (in Czech).
84. FRANZ J. 1994: Entomologův den ve Slavkovském lese. *Arnika, Zprav. CHKO Slavkovský Les*, 36: 3-5 (in Czech).
85. FRIESE G. 1960: Revision der paläarktischen Yponomeutidae unter besonderer Berücksichtigung der Genitalien (Lepidoptera). *Beitr. Entomol.*, 10: 1-131.
86. FRK A. 1980: Obaleč modřínový v Krušných Horách, Jizerských horách a Krkonoších. *Lesnická Práce*, 59: 150-156 (in Czech).
87. FUHR J. 1935: Etwas über Variabilität der Schmetterlinge. *Natur und Heimat*, 6: 12-13.
88. FUKSA M. 1984: Pět nových nanismů u motýlů v ČSSR (Lepidoptera). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 20: 97-100 (in Czech).
89. GAEDIKE R. 1968: Beitrag zur Epermeniidae - Fauna der Tschechoslowakei (Lepidoptera: Epermeniidae). *Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 13: 149-153.
90. GAEDIKE R. 1974: Revision der paläarktischen Douglesiidae (Lepidoptera). *Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 15: 79-101.
91. GAEDIKE R. 1980: Beitrag zur Kenntnis der Mikrolepidopterenfauna der Tschechoslowakei und Ungarns. *Acta Faun. Entomol. Mus. Natur. Pragae*, 16: 23-32.
92. GOATER B. & SKINNER B. 1995: A new subspecies of *Luperina nickerlii* Frey, 1845 from South-East England, with notes on the other subspecies found in Britain, Ireland and mainland Europe. *Entomologist's Rec.*, 107: 127-132.
93. GOTTFELD A. & JANOVSKEJ M. 1978: Pozoruhodné nálezy Lepidopter pro ČSSR. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 14: 119-123 (in Czech, German summ.).
94. GOTTFELD A. & JANOVSKEJ M. 1985: Pozoruhodné nálezy Lepidopter pro ČSSR (5). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 21: 109-116 (in Czech, German summ.).
95. GREGOR F. 1952: Moli rodu *Lithocolletis* Hb. na dubech v ČSR. *Zool. a Entomol. Listy*, 1: 24-55 (in Czech).
96. GREGOR F. 1956: *Obaleč dubový a boj proti němu*. SZN, Praha, 30 pp. (in Czech).
97. GREGOR F. 1957: Studie o populační dynamice obaleče dubového (*Tortrix viridana* L.). *Zool. Listy*, 20: 301-314 (in Czech).
98. GREGOR F. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Nepticulidae, Tischeriidae, Gracillariidae, Cosmopterigidae, Tortricidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 83: 229-230.
99. GREGOR F. & LAŠTŮVKA A. 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Gracillariidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 88: 222.

100. GREGOR F., LAŠTŮVKA A., LAŠTŮVKA Z. & MAREK J. 1984: Zur Verbreitung der Coleophora-Arten in der Tschechoslowakei (Lepidoptera, Coleophoridae). *Biológia (Bratislava)*, 39: 1023-1032.
101. GREGOR F., LAŠTŮVKA A., LAŠTŮVKA Z. & MAREK J. 1986: Doplňky k faunistice druhů rodu Coleophora v Československu (Lep., Coleophoridae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 22: 33-46 (in Czech, German summ.).
102. GREGOR F. & POVOLNÝ D. 1950: Zajímavé nálezy některých motýlů v ČSR. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 47: 166-167 (in Czech).
103. GREGOR F. & POVOLNÝ D. 1950: Naši příslušníci rodu Lithocolletis Hb. na Acer a Alnus. *Entomol. Listy*, 13: 129-151 (in Czech).
104. GREGOR F. & POVOLNÝ D. 1951: Další příspěvek k faunistice motýlů ČSR. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 74-80 (in Czech).
105. GREGOR F. & POVOLNÝ D. 1955: Československé vřetenušky (Zygaena Fabr.). *Acta Entomol. Mus. Natur. Pragae*, 30: 253-277 (in Czech).
106. GREGOR F. & POVOLNÝ D. 1955: Nové a významné nálezy Lepidopter z Československa. *Čas. Morav. Mus.*, 40: 114-129 (in Czech).
107. GREGOR F. & POVOLNÝ D. 1960: Bemerkungen zu einer Revision der an den Papilionaceae lebenden Lithocolletis - Arten. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 57: 84-90.
108. GROSSE G. 1936: Všem sběratelům motýlů. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 33: 132-133 (in Czech).
109. GROSSE G. 1936-1937: Naš největší motýl se rodí. *Naši Přírodou*, 1: 250-253 (in Czech).
110. GROSSE G. 1937: Kritický rozbor skupiny Acronicta psi L., tridens Schiff. a cuspid Hb. (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 34: 25-29, 84-87 (in Czech).
111. GROSSE G. 1937: Kritische Analyse der Gruppe Acronicta psi L., tridens Schiff. und cuspid Hb. (Lep.). *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 50: 219-224, 229-233.
112. GROSSE G. 1938: Nové druhy fauny českých Lepidopter. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 35: 50-51 (in Czech).
113. GROSSE G. 1938: Argynnis Selene Schiff., ab. Thalia Hb. (oprava determinace). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 35: 51 (in Czech).
114. GROSSE G. 1938: Nové formy palaearktických Lepidopter. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 35: 83-88 (in Czech).
115. GROSSE G. 1939: Nový druh fauny českých motýlů. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 36: 29 (in Czech).
116. HAASE J. 1930: Bemerkungen zu Dr. Sterneck Prodrömus der Schmetterlingsfauna Böhmens, das Riesengebirge und sein Vorgelände betreffend. *Internat. Entomol. Ztschr.*, 23: 453-457.
117. HAASE J. 1937: Ein Album für Naturforscher in der Wiesenbaude im Riesengebirge. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 51: 91-94, 101-103.
118. HAASE J. 1942: Minenfunde aus der Umgebung von Trautenau, Sudetenland. *Mitt. Münch. Entomol. Ges.*, 32: 226-236.
119. HANČ Z. 1993: Denní motýli (Rhopalocera, Lepidoptera) nejbližšího okolí Českých Budějovic. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 33: 47-54 (in Czech).
120. HAŠEK J. 1952: Píďalka Poecilopsis isabellae Harr. původce žíru na modříněch (Lep. Geom.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 49: 239-240 (in Czech).
121. HAVEL L. 1967: Rhopalocera šumavského podhůří (Vacovska) a centrální Šumavy. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 7: 14-19 (in Czech).
122. HAVEL L. 1970: Příspěvek k bionomii Colias palaeno Linné (1761) ssp. europae Esper (1777). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 10: 80-84 (in Czech).
123. HAVEL L. 1970: Z bionomie perleťovce mokřadního (Proclissiana eunomia Esper 1797). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 10: 114-117 (in Czech).
124. HERING M. 1932: Die Schmetterlinge nach ihren Arten dargestellt. *Ergänzungsband I*. In: BROHMER P., EHRMANN P. & ULMER G. (eds.): *Die Tierwelt Mitteleuropas*. Quelle & Meyer, Leipzig, 545 pp.
125. HERING M. 1937: Coleophora linosyris sp. nov. *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, 22: 280-281.
126. HERING M. 1942: Eine neue Nepticula der subbimaculella-Gruppe. Nepticula zimmermanni spec. nov. von Quercus pubescens Willd. *Mitt. Dtsch. Entomol. Ges.*, 11: 26-29.
127. HERING M. 1942: Coleophora-Arten an Aster linosyris (L.) Bernh. *Ztschr. Pflkrk. Pflsch.*, 52: 29-40.
128. HERYCH J. 1942: Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna der Umgebung Karlsteins. Bohemia centralis. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 55: 239-240.
129. HILLER R. 1937: Sammeltege auf den Hochmooren des Erzgebirges. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 50: 481-484.
130. HOCHMUT R. 1959: Příspěvek k poznání morfologie, bionomie a populační dynamiky obaleče hlohového - Cacoecia crataegana Hb. *Práce Výzk. Úst. Lesn. ČSR*, 16: 25-58 (in Czech).
131. HOCHMUT R. 1960: Nový škůdce v našich dubinách - Acrobasis zelleri Rag. *Lesnická Práce*, 39: 381-382 (in Czech).
132. HOCHMUT R. 1964: Populační dynamika obaleče hlohového (Archips crataegana Hb.) v dubinách ČSSR v letech 1957-61. *Práce Výzk. Úst. Lesn., Praha*, 28: 37-80 (in Czech).
133. HOCHMUT R. 1966: Nový kalamitní výskyt obaleče modřínového (Zeiraphera diniana Guén.) v oblasti Krušných hor. *Lesnická Práce*, 45: 314-317 (in Czech).

134. HOCHMUT R. 1968: Výskyt některých méně známých škůdců na lesních dřevinách v ČSSR. *Lesnická Práce*, 47: 80-84 (in Czech).
135. HOCHMUT R. 1968: Obaleč modřínový - *Zeiraphera diniana* Gn. *Lesnická Práce*, 47: 572 (in Czech).
136. HOCHMUT R. 1984: Využití feromonových pastí ke kontrole a prognóze výskytu obaleče modřínového (*Zeiraphera diniana* Gn.). *Lesnictví*, 30: 617-628 (in Czech).
137. HOCHMUT R. & LIŠKA J. 1987: Výsledky monitoringu mnišky feromonovými pastmi v roce 1986. *Lesnická Práce*, 66: 175-177 (in Czech).
138. HOCHMUT R. & NOVÁK V. 1968: Některé poznatky o vývoji vajíček obaleče dubového a jejich využití v kontrole početních stavů škůdce. *Lesnický Čas.*, 14: 339-352 (in Czech).
139. HOCHMUT R. & SKUHRAVÝ V. 1977: The flight period of the nun moth, *Lymantria monacha*, investigated by pheromone traps. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 74: 65-68.
140. HOCHMUT R. & SKUHRAVÝ V. 1982: Rozšíření obaleče modřínového v ČSR v roce 1981. *Lesnická Práce*, 61: 158-162 (in Czech).
141. HOCHMUT R. & SKUHRAVÝ V. 1983: Současná problematika výskytu bekyně mnišky. *Lesnická Práce*, 62: 116-121 (in Czech).
142. HOCHMUT R. & SKUHRAVÝ V. 1983: Kontrola výskytu obaleče modřínového v ČSR v roce 1982. *Lesnická Práce*, 62: 163-166 (in Czech).
143. HOCHMUT R., SKUHRAVÝ V. & ŠVESTKA M. 1977: Kontrola bekyně mnišky (*Lymantria monacha* L.) feromonovými pastmi v období latence. *Lesnictví*, 23: 265-286 (in Czech).
144. HOCHMUT R., SKUHRAVÝ V., ŽDÁREK J. & VRKOČ J. 1981: Rozšíření obaleče modřínového v ČSR v roce 1980. *Lesnická Práce*, 60: 166-169 (in Czech).
145. HOLIK O. 1930: Úplný albinismus u českých Satyridů (Lepidopt.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 27: 70-72, 73-74 (in Czech).
146. HOLIK O. 1935: *Zygaena laeta* Hb. a její výskyt v Čechách. *Acta Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 13 (113): 55-66 (in Czech).
147. HOLLAS F. 1934: Etwas über *Abrostola triplasia* L. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 47: 112.
148. HOLUB O. 1974: Příspěvek k poznání motýlů Podblanicka. *Sbor. Vlastivěd. Prací z Podblanicka*, 15: 59-80 (in Czech).
149. HOLUB O. 1977: Příspěvek k poznání motýlů Podblanicka II. *Sbor. Vlastivěd. Prací z Podblanicka*, 18: 37-54 (in Czech).
150. HOLUB O. 1978: *Elachista monosemiella* Rössler z čeledi Elachistidae - nový druh drobných motýlů (Microlepidoptera) pro ČSSR, chycený na Podblanicku. *Sbor. Vlastivěd. Prací z Podblanicka*, 19: 87-88 (in Czech).
151. HOLUB O. 1978: Příspěvek k poznání některých zajímavých druhů microlepidopter Orlických hor a jejich podhůří. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 14: 147-154 (in Czech, German summ.).
152. HOLUB O. 1979: Příspěvek k poznání motýlů Podblanicka III. *Sbor. Vlastivěd. Prací z Podblanicka*, 20: 71-84 (in Czech).
153. HOLUB O. 1980: *Elachista monosemiella* Rössler z čeledi Elachistidae - nový druh microlepidopter pro ČSSR. *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 16: 33-34 (in Czech, German summ.).
154. HOLUB O. 1981: Příspěvek k poznání motýlů Podblanicka - IV. *Sbor. Vlastivěd. Prací z Podblanicka*, 22: 49-59 (in Czech).
155. HOLUB O. 1982: Některé změny v zařazení a výskytu drobných motýlů Podblanicka. *Sbor. Vlastivěd. Prací z Podblanicka*, 23: 109-110 (in Czech).
156. HOLUB O. 1984: Příspěvek k poznání motýlů Podblanicka. V. *Sbor. Vlastivěd. Prací z Podblanicka*, 25: 37-43 (in Czech).
157. HOLUB O. 1987: Příspěvek k poznání motýlů Podblanicka. VI. *Sbor. Vlastivěd. Prací z Podblanicka*, 28: 69-77 (in Czech).
158. HOLUB O. 1988: Ohrožené motýlí druhy na Podblanicku. *Sbor. Vlastivěd. Prací z Podblanicka*, 29: 35-40 (in Czech).
159. HOLUBEC F. 1953: Nový okáč v Podkrkonoší. *Přírodovědecké Zprávy z Krkonoš (Vrchlabí)*, 1: 7 (in Czech).
160. HOLYOAK M., JAROSIK V. & NOVÁK I. 1997: Weather-induced changes in moth activity bias measurement of long-term population dynamics from light trap samples. *Entomol. Exp. Applic.*, 83: 329-335.
161. HORÁK A. & HRDÝ I. 1988: Attractiveness of (E)-10-dodecen-1-yl acetate for the pea moth, *Cydia nigricana*: modification by codlemone, codlemone acetate and dodecyl acetate. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 85: 174-181.
162. HORÁK A., HRDÝ I., KRAMPL F. & KALVODA L. 1980: Polní zkoušky feromonových lapáků pro monitorování obaleče hrachového, *Cydia nigricana*. *Ochrana Rostlin*, 16: 213-225 (in Czech).
163. HOUR M. 1988: Denní motýli. *Lázeňský časopis (Karlovy Vary)*, 1988 (8): 17 (in Czech).
164. HOUR M. 1989: Žlutásek borůvkový ve Slavkovském lese. *Arnika, Zprav. CHKO Slavkovský Les*, 42(22): 48 (in Czech).
165. HOUR M. 1989: Z Karlovarska. *Naší Přírodou*, 9: 95 (in Czech).
166. HRABÁK R. 1960: O pražském lišaji. *Živa*, 8: 99-100 (in Czech).
167. HRABÁK R. 1982: Nejen otakárek ovocný... *Naší Přírodou*, 2(8): 14-15 (in Czech).
168. HRABÁK R. 1985: *Kapesní atlas našich množlů*. SZN + SPN, Praha, 352 pp. (in Czech).
169. HRABÁK R. & POVOLNÝ D. 1976: O způsobu života pabourovce jestřábníkového (*Lemonia dumi* Linnaeus, 1761) v předhůří Českomoravské vysočiny. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 16: 77-92 (in Czech).
170. HRBEK J. 1948: První příspěvek k poznání motýlí fauny Žďárska a Žďárských vrchů. *Čas. Vlasteneckého Spolku Mus. v Olomouci*, 57: 142-150 (in Czech).
171. HRDÝ I., HRDÁ J., HOCHMUT R., LIŠKA J. & VRKOČ J. 1992: Standardizace feromonových odpárníků a lapáků pro kontrolu výskytu obaleče prýtového, *Rhyacionia buoliana* (D. & S.). *Lesnictví-Forestry*, 38: 839-852 (in Czech).

172. HRDÝ I. & KRAMPL F. 1977: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Tortricidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 74: 286.
173. HRDÝ I. & KRAMPL F. 1982: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Tortricidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 79: 238.
174. HRDÝ I., KRAMPL F., KULDOVÁ J. & KALINOVÁ B. 1997: Výskyt potenciálních škůdců sadů, obaleče slivoňového, *Cydia lobarzewskii* a obaleče trnkového, *C. janthinana* (Lepidoptera: Tortricidae) v České republice a poznámky k dalším druhům podle úlovků do feromonových lapáků. (Occurrence of potential orchard pests *Cydia lobarzewskii* and *C. janthinana* [Lepidoptera: Tortricidae] in the Czech Republic with notes on some other species according to pheromone trapping). *Klapalekiana*, 33: 155-172 (in Czech, English summ.).
175. HRDÝ I., KRAMPL F., KULDOVÁ J., MAREK J. & ŠIMKO K. 1979: Mapování obaleče východního (*Cydia molesta*) feromonovými lapáky. *Ochrana Rostlin*, 15: 259-269 (in Czech).
176. HRDÝ I., LIŠKA J., VRKOČ J. & HOCHMUT R. 1989: New records on sex attractants for males and faunistic comments on moths (Lepidoptera) from Czechoslovakia. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 86: 252-268.
177. HRDÝ I., MAREK J. & KRAMPL F. 1979: Sexual pheromone activity of 8-dodecenyl and 1,1-tetradecenyl acetates for males of several lepidopteran species in field trials. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 76: 65-84.
178. HRDÝ I., MAREK J., KRAMPL F., KULDOVÁ J. & BARABÁS L. 1993: Distribution of the fruit tree pests *Cydia molesta*, *Cydia funebrana* and *Anarsia lineatella* (Lepidoptera: Tortricidae, Gelechiidae) in former Czechoslovakia as recorded by pheromone traps. *Acta Soc. Zool. Bohem.*, 58: 53-60.
179. HRUBÝ K. 1941: Hranostajník vrbový. *Vesmír*, 19: 187-188 (in Czech).
180. HRUBÝ K. 1941: Štětconoš ořechový. *Vesmír*, 19: 188 (in Czech).
181. HRUBÝ K. 1943: Lepidopterologické zajímavosti Královédvorská. *Věda Přírodní (Brno)*, 21: 188-189, 221-222, 252-254 (in Czech).
182. HRUBÝ K. 1945: Pozoruhodní motýlové Královédvorská. *Věda Přírodní (Brno)*, 23: 157-159, 186-188 (in Czech).
183. HRUBÝ K. 1945: Motýl minující tabák. *Vesmír*, 23: 128-129 (in Czech).
184. HRUBÝ K. 1951: Noví a vzácní motýlové v severovýchodních Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 80-85 (in Czech).
185. HRUBÝ K. 1951: Barevná variabilita bourovce *Dendrolimus pini* L. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 127-131 (in Czech).
186. HRUBÝ K. 1952: Tři nálezy vzácnějších motýlů ve středních Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 49: 87-88 (in Czech).
187. HRUBÝ K. 1952: Rozlišování našich druhů *Oporinia* Hübn. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 49: 135-145 (in Czech).
188. HRUBÝ K. 1953: Další zpráva o významnějších nálezech motýlů v severovýchodních Čechách. *Roč. Čs. Společ. Entomol.*, 50: 56-61 (in Czech).
189. HRUBÝ K. 1953: Zajímavější motýlové ve vnitřní Praze. *Roč. Čs. Společ. Entomol.*, 50: 62-64 (in Czech).
190. HRUBÝ K. 1954: Sezónní dimorfismus motýlů. *Živa*, 2: 140-142 (in Czech).
191. HRUBÝ K. 1954: *Glyphodes unionalis* Hb. a *Hydroecia petasitis* Dbld. v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 51: 183-187 (in Czech).
192. HRUBÝ K. 1956: *Araschnia levana* L. v Československu. *Ochrana Přírody*, 11: 257-264 (in Czech).
193. HRUBÝ K. 1958: Caterpillar colour inheritance in *Biston betularius* L., pp. 125-126. In: *Proc. 10th Intern. Congr. Genet., Montreal*, part 2.
194. HRUBÝ K. 1958: Dědičnost zbarvení housenek *Biston betularius* L. *Acta Univ. Carolinae, Biologica*, 1958: 121-126 (in Czech).
195. HRUBÝ K. 1959: Motýlí fauna Dvora Králové nad Labem a nejbližšího okolí. *Práce Kraj. Muz. v Hradci Králové, Ser. A.*, 3: 217-294 (in Czech, German summ.).
196. HRUBÝ K. 1963: Významnější Lepidoptera Wünschovy sbírky v Severočeském muzeu. *Sbor. Severočes. Muz. (Liberec), Přír. Vědy*, 2: 145-158 (in Czech).
197. HRUŠKA J. 1994: Lepidopterologické vzpomínky. *Práce Muzea v Kolíně, Řada Přír.*, 1: 73-74 (in Czech, English summ.).
- 197a. HUDEC K., HUSÁK Š., JANDA J. & PELANTOVÁ J. (eds.) 1993: *Survey of Aquatic and Wetland Biotopes of the Czech Republic (Summary Report)*. Czech Ramsar Committee, Třeboň, 32 pp.
198. HUDOUSEK L. 1985: Dvě nové lokality otakárka feniklového v jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 21: 106 (in Czech).
199. CHRISTOPH A. 1988: Lepidoptera Kadaňska. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 24: 83-86 (in Czech, French summ.).
200. JANÍK J. 1937-1938: Na lovu motýlů a housenek. *Vesmír*, 16: 109-110 (in Czech).
201. JANOVSÝ M. & GOTTWALD A. 1979: Pozoruhodné nálezy Lepidopter pro ČSSR - 2. (Bemerkenswerte Lepidopterenfunde für ČSSR). 15: 97-103 (in Czech, German summ.).
202. JANOVSÝ M. & GOTTWALD A. 1983: Pozoruhodné nálezy Lepidopter pro ČSSR - 3. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 19: 21-25 (in Czech, German summ.).
203. JANOVSÝ M. & GOTTWALD A. 1984: Pozoruhodné nálezy Lepidopter pro ČSSR - 4. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 20: 101-106 (in Czech, German summ.).
- 203a. JANOVSÝ M. & GOTTWALD A. 1990: Pozoruhodné nálezy Lepidopter pro ČSSR - 6. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 26: 112-118 (in Czech, German summ.).

204. JANOVSÝ M. & GOTTWALD A. 1991: Pozoruhodné nálezy Lepidopter pro ČSFR - 7. Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV, 27: 58-63 (in Czech, German summ.).
205. JARKA J. 1936-1937: Housenky hranostajníka vrbového (*Dicranura vinula*). *Vesmír*, 15: 86 (in Czech).
206. JAROŠ J. 1983: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Tortricidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 80: 479-480.
207. JAROŠ J. 1984: *Motýlí fauna (Lepidoptera) okolí Kaplice a Slepčích hor*. Jihočes. muzeum, České Budějovice, 63 pp (in Czech, English summ.).
208. JAROŠ J. 1986: Příspěvek k poznání obalečů (Lepidoptera, Tortricidae) jižních Čech. *Sbor. Jihoč. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 26: 1-10 (in Czech).
209. JAROŠ J. & PATOČKA J. 1988: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Tortricidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 85: 317-318.
210. JAROŠ J., PULTAR O. & SPITZER K. 1986: Monitorování letové aktivity nesytka jabloňové (*Synanthedon myopaeformis* Bkh.) pomocí potravních lapačů, pp. 155-156. In: *Proc. X. Czechoslovak Plant Protec. Conf. Brno, 1986*, VÚRV Ruzyně, Praha, 406 pp. (in Czech, English summ.).
211. JAROŠ J. & SPITZER K. 1982: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Geometridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 79: 396.
212. JAROŠ J. & SPITZER K. 1983: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Geometridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 80: 237.
213. JAROŠ J. & SPITZER K. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Noctuidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 83: 156.
214. JAROŠ J. & SPITZER K. 1986: Reliktní populace motýlů mokřadu Černiš v minulosti a přítomnosti. *Památky a Příroda*, 11: 44-46 (in Czech, English summ.).
215. JAROŠ J. & SPITZER K. 1987: *Motýlí fauna (Lepidoptera) mokřadu Černiš v jižních Čechách. (The Lepidoptera of Černiš wetland in South Bohemia)*. Jihočeské muzeum, České Budějovice, 42 pp. (in Czech, English summ.).
216. JAROŠ J. & SPITZER K. 1989: SPR Vyšenské kopce: ochrana lesostepní fauny motýlů v jižních Čechách. *Památky a Příroda*, 14: 367-368 (in Czech).
217. JAROŠ J., SPITZER K. & MUŠKA J. 1986: Monitorování letu škodlivých motýlů (Lepidoptera) v jabloňových sadech pomocí světelných lapačů, pp. 138-141. In: HRDÝ I. & HRDLÍČKOVÁ H. (eds.): *Sbor. Symp. Integr. Produkce Ovoce, 1984*. EU ČSAV, České Budějovice, 183 pp. (in Czech).
218. JAROŠ J., SPITZER K. & VANĚK J. 1995: Faunistic records from the Czech Republic - 23. Lepidoptera: Geometridae. *Klapalekiana*, 31: 52.
219. JAROŠ J. & SPITZER K. 1995: Motýlí fauna (Lepidoptera) Luzenské (Hraniční) slatě na Šumavě. *Sbor. Jihoč. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 35: 51-55 (in Czech).
220. JEŠÁTKO K. 1944: Nová zajímavá forma českého denního motýle (Lep.). *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 41: 145-146 (in Czech).
221. JORDÁN K. 1972: *Callogonia virgo* (Treitschke, 1825) - nový druh pro Čechy (Lep.). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 8: 35-36 (in Czech, German summ.).
222. KAČÍREK A. 1984: Vymřelá a ohrožené druhy denních motýlů Orlických hor a Podorlicka. *Orlické Hory (Rychnov n. Kn.)*, 1984: 20-24 (in Czech).
223. KAČÍREK A. 1989: Denní motýli zátopové oblasti vodního díla Pěčín. *Orlické Hory (Rychnov n. Kn.)*, 1989: 12-14 (in Czech).
224. KAČÍREK A. 1993: Nové a zajímavé nálezy můr (Lepidoptera, Noctuidae) v Orlických horách a Podorlicku. *Panorama (Dobré)*, 1: 65-68 (in Czech).
225. KAČÍREK A. 1994: Stuzkonosky rodů *Catocala* Schr. a *Ephesia* Hb. v Orlických horách a Podorlicku. *Orlické Hory a Podorlicko (Rychnov n. Kn.)*, 7: 13-22 (in Czech).
226. KAILA L. & ALBRECHT A. 1994: The classification on the *Timandra griseata* group (Lepidoptera: Geometridae, Sterrhinae). *Entomol. Scand.*, 25: 461-479.
227. KALANDRA A. 1941: Erfahrungen über das epidemische Auftreten des Fichtenwicklers *Epiblema tedella* Cl. in den Jahren 1939-1941. *Centralbl. f. d. Ges. Forstwesen*, 69: 18-27.
228. KALÍK Z. 1944-1945: Housenka hřbetozubce bukového (*Stauropus fagi* L.). *Vesmír*, 23: 77-78 (in Czech).
229. KALINA J., SKUHRÁVÝ V., ŽDÁREK J., ŠROT M., VRKOČ J. & HOCHMUT R. 1985: *Obaleč modřínový*. Státní zemědělské nakl., Praha, 133 pp. (in Czech).
230. KASALICKÝ I. 1982: Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. *Naši Přírodou*, 2(11): 20-21 (in Czech).
231. KEILA L. 1932: Mniška v našich lesích. *Vlastivěd. Sbor. Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínkem*, 2: 23-25 (in Czech).
232. KLEMENT O. 1941-1942: Höhlenzauber im Malkauer Silberstollen. *Natur und Heimat*, 12: 40-46.
233. KLETEČKA Z. 1989: Predvariteľnyje issledovanija na atraktyvnost' feromonnyh primanok dlja zimujuščego pobegovyona *Rhyacionia buoliana* (Den. et Schiff.), pp. 198-205. In: *Intern. Org. for Biol. Contr. of Noxious Animals and Plants. East Palaearct. Sect. USSR State Forest Committ., Boržomi, 3.-8.9.1989* (in Russian).

234. KLETEČKA Z. 1992: Distribution of damage by Rhyacionia, Blastesthia and Retinia tip moths (Lep., Tortricidae) depending on the exposure of planted and naturally seeded pine stands. *J. Appl. Entomol.*, 113: 334-341.
235. KLIMESCH J. 1974: Zur Kenntnis der Microlepidopteren (Lepidoptera) aus der Gegend von Vyšší Brod (Hohenfurth). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 14: 207-214.
236. KLIMESCH J. 1990: *Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge) I*. In: KUSDAS K. & REICHL E. R. (eds.): *Die Schmetterlinge Österreichs, Teil 6*. Landesmuseum zu Linz, Linz, 332 pp.
237. KLIMESCH J. 1991: *Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge) II*. In: KUSDAS K. & REICHL E. R. (eds.): *Die Schmetterlinge Österreichs, Teil 7*. Landesmuseum zu Linz, Linz, 301 pp.
238. KNĚŽOUREK K. 1906: Na entomologické exkursi. *Vesmír*, 35: 123-126 (in Czech).
239. KNÍŽE A. 1939-1940: Nesytky tiplicové (*Sesia tipuliformis*) v našich zahradách. *Vesmír*, 18: 111 (in Czech).
240. KOCOUREK F., BERÁNKOVÁ J. & HRDÝ I. 1995: A temperature-driven model to simulate the population development of the Plum Fruit Moth, *Cydia funebrana* (Treit.). *Anz. Schädlingkunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz*, 68: 64-68.
241. KODYS F. 1967: Poznámky k výskytu makadlovek z rodu *Blastodacna* na jabloních. *Ochrana Rostlin*, 3: 235-238 (in Czech, Russian and English summ.).
242. KOHN F.G. 1937: Merkwürdige Tiervorkommen der Karlsbader Gegend. *Natur und Heimat*, 8: 38-41.
243. KOCH M. 1934: Fangtage in Böhmen. *Int. Entomol. Ztschr.*, 28: 236-241.
244. KOLEŠKA Z. 1973: Entomologická historie Poděbradska. *Vlastivěd. Zprav. Polabí*, 13(3-4): 45-48 (in Czech).
245. KOLEŠKA Z. 1975: Historie entomologického průzkumu Krkonoš. *Opera Corcontica*, 12: 137-151 (in Czech).
246. KOLEŠKA Z. 1975: Historie entomologického průzkumu Křivoklátska. *Bohemia Centralis*, 4: 96-103 (in Czech).
247. KOLEŠKA Z. 1978: Závist u Zbraslavi - klasická lokalita českých entomologů. *Bohemia Centralis*, 7: 83-104 (in Czech).
248. KOLEŠKA Z. 1978: Příspěvek k historii entomologického zkoumání Českého středohoří. *Fauna Bohem. Septentrionalis*, 3: 83-96 (in Czech).
249. KOLEŠKA Z. 1987: Příspěvek k entomologické historii Děčínska. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 23: 47-55 (in Czech).
250. KOLEŠKA Z. 1993-94: Historie entomologické činnosti a výzkumu entomofauny v severozápadním regionu severních Čech. - I. část. *Sbor. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír.*, 15-16: 15-25 (in Czech, German summ.).
251. KOLEŠKA Z. 1994: Příroda, její zajímavosti, ochrana a výzkum v obvodu Prahy 9. *Rokytky, Vlastivěd. Zprav. (Praha 9)*, 32: 28-32 (in Czech).
252. KOLEŠKA Z. 1994: Entomologie v činnosti regionálních německých přírodovědeckých spolků v Čechách v období rakouské monarchie a předmnichovské ČSR. *Dějiny Věd a Techniky*, 27: 81-97 (in Czech, German summ.).
253. KOLEŠKA Z. 1995: Historie entomologické činnosti a výzkumu entomofauny v severozápadním regionu severních Čech. - II. část (1945-1990). *Sbor. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír.*, 17: 27-37 (in Czech, German summ.).
254. KOLEŠKA Z. 1996: Historie entomologické činnosti a výzkumu entomofauny v severozápadním regionu severních Čech - III. část. *Sbor. Okres. Muz. v Mostě, Řada Přír.*, 18: 53-60 (in Czech, German summ.).
255. KOLEŠKA Z. 1996: Historie entomologické činnosti v přírodovědeckém výzkumu Kolínska. *Práce Muz. v Kolíně, Řada Přír.*, 2: 57-88 (in Czech, English summ.).
256. KOLUBAJIV S. 1948: Příspěvek k poznání přírodních nepřátel obaleče dubového (*Tortrix viridana* L.). *Zprávy Výzk. Úst. Lesn. ČSR*, 1: 157-176 (in Czech).
257. KOLUBAJIV S. 1962: Výsledky chovů entomofágů (cizopasníků a dravců) hmyzích škůdců - hlavně lesních - získané v období 1934-1958. *Rozpravy ČSAV, Řada Matem. a Přír. Věd*, 72(6): 1-73 (in Czech).
258. KOLUBAJIV S. 1962: Seznam cizopasného hmyzu, vychovaného J. Müllerem z housenek různých motýlů v období 1873 až 1884. *Zool. Listy*, 25: 155-160 (in Czech).
259. KOLUBAJIV S. 1968: Příspěvek k populační dynamice hmyzích lesních škůdců, především bekyně mnišky (*Lymantria monacha* L.). *Lesnický Čas.*, 14: 353-362 (in Czech).
260. KOMÁREK J. 1935: Mol modřínový v Krkonoších. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 142-143 (in Czech).
261. KOMÁREK J. 1948: *Česká zvířena*. Melantrich, Praha, 348 pp. (in Czech).
262. KOMÁREK J. & KOLUBAJIV S. 1941: Einige Beobachtungen über den Kiefernspinner. *Centralbl. f. d. Ges. Forstw.*, 67: 245-251.
263. KOMÁREK J. & TYKAČ J. 1949: *Atlas motýlů*. Melantrich, Praha, 109 pp. (in Czech).
264. KOMÁREK O. 1949: Několik zajímavějších nálezů denních motýlů v okolí Králíckého Sněžníku. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 46: 77 (in Czech).
265. KOMÁREK O. 1950: Příspěvek k motýlí fauně severovýchodních Čech s popisem dvou nových odchylek. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 47: 41-45 (in Czech).
266. KOMÁREK O. 1950: Ekologické poznatky o bělopásku *Limenitis populi* L. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 47: 168-177 (in Czech).
267. KOMÁREK O. 1951: Zajímavé nálezy mikrolepidopter v horním povodí Labe. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 86-89. (in Czech)
268. KOMÁREK O. 1951: *Zygaena laeta* a její rozšíření v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 179-181 (in Czech).
269. KOMÁREK O. 1952: Příspěvek k poznání vřetenušky *Zygaena carniolica* Scop. v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 49: 146-153 (in Czech).

270. KOMÁREK O. 1952: Měnlivost vřetenušky *Zygaena carniolica* Scop. v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 49: 200-212 (in Czech).
271. KOMÁREK O. 1953: Několik nových a pozoruhodných nálezů Lepidopter z ČSR. *Biológia (Bratislava)*, 8: 527-532 (in Czech, Russian and German summ.).
272. KOMÁREK O. 1954: Charakteristika populací *Zygaena carniolica* Scop. v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 51: 197-218 (in Czech).
273. KOMÁREK O. 1955: Vliv počasí na proměnlivost morfologických znaků druhu *Zygaena carniolica* Scop. v ČSR. *Biológia (Bratislava)*, 10: 718-735 (in Czech).
274. KOMÁREK O. 1955: K biologii a ekologii *Calligenia (Miltchrista) miniata* (Forst.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 52: 195-200 (in Czech).
275. KOMÁREK O. 1957: Vliv povětrnosti na hmyz. *Vesmír*, 36: 36 (in Czech).
276. KOMÁREK O. 1981: Obalečovití (Tortricioidea) střední Evropy I. Část systematická. *Fontes Mus. Reginaehradensis, Sci. Natur.*, 12: 1-149 (in Czech).
277. KOMÁREK S. 1977: Motýlí fauna okolí Kardašovy Řečice. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 17: 11-23 (in Czech).
278. KOMÁREK S. 1986: Quantitative Studie der Familie Noctuidae im Siedlungsbereich einer südböhmischen Ortschaft. *Ann. Naturhist. Mus. Wien, Ser. B*, 88/89: 351-356.
279. KOMÁREK S. 1987: Studie über das Artenspektrum und die Populationsdynamik der Familie Tortricidae in einigen Obstanlagen in Südböhmen unter Verwendung von Pheromonfallen. *Pflanzenschutzberichte*, 48: 2-23.
280. KOMÁREK S. & LIŠKA J. 1979: Faunisticky zajímavé nálezy Lepidopter z okolí Českých Velenic. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 19: 107-112 (in Czech).
281. KOUPILOV S. 1975: Příspěvek k výskytu píďalek (Geometridae) ve Východočeském kraji. *Acta Mus. Reginaehradensis, Ser. A, Sci. Natur.*, 13(1972): 123-132 (in Czech).
282. KRÁLÍČEK M. 1975: Zur Bionomie und Verbreitung einiger Glasflügerarten aus der ČSSR (Lep. Sesiidae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 72: 115-120.
283. KRÁLÍČEK M. 1976: Některé pozoruhodnější nálezy lepidopter z našeho území, zvláště Moravy a Slovenska. *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. Bratislava*. 22: 93-109 (in Czech).
284. KRÁLÍČEK M. & LAŠTŮVKA Z. 1989: Nesytky - málo známí škodliví činitelé našich dřevin (Lepidoptera, Sesiidae). *Acta Univ. Agric., Brno, Fac. Agron.*, A, 37: 133-140 (in Czech).
285. KRÁLÍČEK M. & POVOLNÝ D. 1956: *Polyommatus eros* eroides (Frivaldsky) 1837 v Československu. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 53: 193-201 (in Czech).
286. KRÁLÍČEK M. & POVOLNÝ D. 1974: *Pennisetia bohemia* sp. n. - a new species of clear wing moths (Lepidoptera, Sesiidae) from Bohemia. *Čas. Morav. Mus.*, 59: 165-182.
287. KRÁLÍČEK M. & POVOLNÝ D. 1978: Versuch einer Charakteristik der Lepidopterensynusien als primärer Konsumenten in den Vegetationsstufen der Tschechoslowakei. *Věst. Čs. Společ. Zool.*, 42: 273-288.
288. KRAMPL F. 1973: Píďalky jižních Čech. (Die Spinner Südböhmens). *Přírodověd. Čas. Jihočes.*, 13(Suppl. 1): 1-74 (in Czech, German summ.).
289. KRAMPL F. 1973: Taxonomische Kriterien für die Arten *Thera variata* (Den. et Schiff.), *T. stragulata* (Hb.) und *T. albionigrata* (Höfer) (Lepidoptera, Geometridae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 70: 272-281.
290. KRAMPL F. 1978: Výsledky sběru Lepidopter během Entomologických dnů v Sněžníku u Děčína v roce 1974. *Sbor. Severočes. Mus., Ser. Natur. (Liberec)*, 10: 59-66 (in Czech).
291. KRAMPL F. 1981: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Tineidae, Yponomeutidae, Cochylidae, Tortricidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 78: 63-64.
292. KRAMPL F. 1984: Three Geometrid species new to Czechoslovakia, with remarks on their identification (Lepidoptera, Geometridae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 81: 280-291.
293. KRAMPL F. 1985: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Tortricidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 82: 153.
294. KRAMPL F. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Noctuidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 83: 400.
295. KRAMPL F. 1989: K rozšíření několika druhů rodu *Eupithecia* Curtis v Československu (Lepidoptera, Geometridae). (Distribution of several species of the genus *Eupithecia* Curtis in Czechoslovakia (Lepidoptera, Geometridae)). *Čas. Slez. Muz. Opava (A)*, 38: 231-143 (in Czech, English and Russian summ.).
296. KRAMPL F. 1991: Relict occurrence of the boreal species *Chloroclysta infusca* in central Europe (Lepidoptera, Geometridae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 88: 381-389.
297. KRAMPL F. 1991: Nové nálezy pěti druhů rodu *Eupithecia* Curtis v Československu s poznámkami k jejich biologii a rozšíření (Lepidoptera, Geometridae). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 31: 5-19 (in Czech, English summ.).
298. KRAMPL F. 1992: Boreal macro-moths in central Europe (Czechoslovakia) and their eco-geographical characteristics (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae, Notodontidae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 89: 237-262.
299. KRAMPL F. 1993: Analýza a revize historických nálezů *Gnophos glaucinarius* (Hübner) v Československu (Lepidoptera, Geometridae). (An analysis and revision of historical records of *Gnophos glaucinarius* (Hübner) from Czechoslovakia (Lepidoptera, Geometridae)). *Čas. Slez. Muz. Opava (A)*, 42: 1-12 (in Czech, English abstr.).

300. KRAMPL F. & KRUŠEK K. 1974: *Apamea talosi* Kovács & Varga, 1969, nový pro ČSSR (Lep., Noctuidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 11: 23-25 (in Czech, German summ.).
301. KRAMPL F. & LEHEČKA E. 1977: *Photedes extrema* Hb. a *Chrysoptera c-aureum* Knoch v Čechách (Lep., Noctuidae). *Sbor. Jihočes. Mus. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 15: 211-215 (in Czech).
302. KRAMPL F. & LEVÝ J. 1974: Příspěvek k poznání fauny čeledi Noctuidae (Lepidoptera) jižních Čech. *Sbor. Jihočes. Mus. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 14: 113-127 (in Czech).
303. KRAMPL F. & LIŠKA J. 1987: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Oecophoridae, Gelechiidae, Tortricidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 85: 313-317.
304. KRAMPL F., LIŠKA J. & PATOČKA J. 1988: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Tineidae, Lyonetiidae, Yponomeutidae, Oecophoridae, Coleophoridae, Cosmopterigidae, Scythrididae, Blastobasidae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 85: 313-317.
305. KRAMPL F. & MAREK J. 1977: Neue und bedeutende Funde der Eupithecia-Arten in der Tschechoslowakei (Lepidoptera, Geometridae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 74: 103-114.
306. KRAMPL F. & MAREK J. 1981: *Selidosema plumaria* and *S. brunnea* in Czechoslovakia and their developmental stages (Lepidoptera, Geometridae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 78: 397-411.
307. KRAMPL F. & MAREK J. 1992: Motýli našich hor I, II. *Živa*, 40: 25-28, 73-77 (in Czech).
308. KRAMPL F., MAREK J. & NOVÁK Z. 1980: Beitrag zur Lepidopterenfaunistik der Tschechoslowakei. *Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 16: 89-105.
309. KRAMPL F. & NOVÁK I. 1979: Eggs of the Central European species of *Thera* (Lepidoptera, Geometridae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 76: 231-243.
310. KRAMPL F. & SCHREIBER I. 1981: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Pyralidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 78: 32.
311. KRAUS B. 1942: *Araschnia levana* L. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 144 (in Czech).
312. KRAUS B. 1944: Ještě *Araschnia levana*. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 41: 152 (in Czech).
313. KREJČÍK P. & NOVÁK V. 1996: Z přírodovědných sbírek muzea I. - Motýli (Lepidoptera) 1 - Collectio V. B. Poláček - první část. *Studie a Zpr. Okres. Mus. Praha - východ*, 12: 34-60 (in Czech, English abstr.).
314. KROPÁČEK F. 1969: Notodontidae - Hřbetozubci okresu Mladá Boleslav. *Labores Mus. Benátek n. Jiz.*, 5: 63-66 (in Czech, German summ.).
- 314a. KROPÁČEK F. 1975: Velký výskyt lišaje smrtihlava na okrese Mladá Boleslav (*Acherontia atropos* L.). *Labores Mus. Benátek n. Jiz.*, 11: 54-57, 88, 89 (in Czech).
315. KROUPA M., SPITZER K. & NOVÁK I. 1990: The heavy metals content in melanica and typical forms of *Biston betularia* (Lepidoptera, Geometridae) and its bioindicator significance. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 87: 249-252.
316. KRUŠEK K. & SOLDÁT M. 1980: Motýlí fauna Karlštejnska - 2. část. *Bohemia Centralis*, 9: 109-161 (in Czech).
317. KUDELA M. 1946: Hmyzové kalamity v ČSR na jehličnatých dřevinách v letech 1918 - 1945. *Sbor. Čs. Akad. Zeměděl.*, 19: 330-340, 347-354 (in Czech).
318. KUDLA M. 1965: Weiteres zum Vordringen der *Cucullia fraudatrix* nach Mitteleuropa. *Entomol. Ztschr. (Stuttgart)*, 75: 199-201.
319. KUDLER J. 1955: Mniška (*Lymantria monacha* L.) opět ohrožuje naše lesy. *Lesnická Práce*, 34: 165-170 (in Czech).
320. KUDLER J. & HOCHMUT R. 1958: Obaleč hlohový - nový kalamitní škůdce v našich dubinách. *Lesnická Práce*, 37: 128-133 (in Czech).
321. KUDRNA O. 1957: K poznání motýlů jižních Čech. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 54: 401 (in Czech).
322. KUDRNA O. 1958: Zajímavá forma šupinek druhu *Lycaena virgaureae* L. *Čas. Slez. Mus. Opava (A)*, 7: 90-92 (in Czech).
323. KUDRNA O. 1959: Fauna Rhopalocera okolí Netolic. *Sbor. Kraj. Vlastivěd. Mus. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 2: 133-138 (in Czech).
324. KUDRNA O. 1968: Denní motýli v okolí Vimperka. *Sbor. Jihočes. Mus. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 8: 18-23 (in Czech).
325. KUDRNA O. 1968: Žlutásek *Colias australis* Verity, 1911 v jižních Čechách. *Sbor. Jihočes. Mus. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 8: 58-64 (in Czech).
326. KUDRNA O. 1969: Významné druhy denních motýlů (Lep., Rhopalocera) na Šumavě. *Zprav. CHKO Šumava*, 9: 22-31 (in Czech).
327. KUDRNA O. 1970, 1971: Butterflies of South Bohemia. *Entomol. Rec. J. Var.*, 82: 323-330, 83: 53-67.
328. KUDRNA O. 1974: A distribution list of the butterflies of Czechoslovakia. *Entomol. Gazette*, 25: 161-177.
329. KUDRNA O. 1986: *Aspects of the Conservation of Butterflies in Europe. Butterflies of Europe*. AULA Verlag, Wiesbaden, 323 pp.
330. KUDRNA O. 1994: Kommentierter Verbreitungsatlas der Tagfalter Tschechiens. *Oedippus*, 8: 1-137.
331. KUDRNA O. & KRÁLÍČEK M. 1991: Schutz der Tagfalterfauna in Böhmen und Mähren (Tschechoslowakei). *Oedippus*, 3: 37-74.
332. KUDRNA O., LUKÁŠEK J. & SLAVÍK B. 1994: Zur erfolgreichen Wiederansiedlung von *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758) in Tschechien. *Oedippus*, 9: 1-37.

333. KULA E. & KRÁLÍČEK M. 1995: Výskyt melanismů u motýlů v imisní oblasti Děčínského Sněžníku. *Lesnictví-Forestry*, 41: 257-264 (in Czech).
334. KULA E. & KRÁLÍČEK M. 1995: Imisní prostředí a melanismy u motýlů. *Lesnická Práce*, 74(3-4): 18-20 (in Czech).
335. KULA E. & VACA D. 1995: Pouzdrovníček stromový - *Coleophora serratella* L., škůdce břízy v imisních oblastech. *Lesnická Práce*, 74(10): 12-13 (in Czech).
336. KURAS T. & BENEŠ J. 1994: Výskyt soumračníka *Carterocephalus silvicolus* Meigen, 1829 (Hesperiidae, Lepidoptera) v České republice a na Slovensku. (Occurrence of the skipper *Carterocephalus silvicolus* Meigen, 1829 (Hesperiidae, Lepidoptera) in the Czech Republic and Slovakia.) *Čas. Slez. Muz. Opava (A)*, 43: 277-279 (in Czech, English abstr.).
337. LAŠTŮVKA A. & LAŠTŮVKA Z. 1990: Zur Faunistik der Nepticulidae-Arten in der Tschechoslowakei (Lepidoptera). *Acta Mus. Moraviae, Sci. Natur.*, 75: 185-192.
338. LAŠTŮVKA A. & LAŠTŮVKA Z. 1991: Weiterer Beitrag zur Erkenntnis der Nepticulidae-Arten der Tschechoslowakei (Lepidoptera). *Acta Mus. Moraviae, Sci. Natur.*, 76: 269-275.
339. LAŠTŮVKA A. & LAŠTŮVKA Z. 1992: Zur Kenntnis der tschechoslowakischen Trifurcula-Arten (Lepidoptera, Nepticulidae). *Acta Univ. Agric. Brno, Fac. Agron.*, 40: 197-220.
340. LAŠTŮVKA A. & LAŠTŮVKA Z. 1997: *Nepticulidae Mitteleuropas. Ein illustrierter Begleiter. (Lepidoptera)*. Konvoj, Brno, 230 pp.
341. LAŠTŮVKA Z. 1982: Příspěvek k faunistice nesýtek Československa (Lepidoptera, Sesiidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 18: 129-135 (in Czech).
342. LAŠTŮVKA Z. 1983: Zajímavá nesytka. *Živa*, 31: 102 (in Czech).
343. LAŠTŮVKA Z. 1986: Zajímavější faunistické nálezy Lepidopter z ČSSR. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 22: 2-8 (in Czech, German summ.).
344. LAŠTŮVKA Z. 1988: Příspěvek k faunistice nesýtek Československa II. (Lepidoptera, Sesiidae). (Beitrag zur Faunistik der Glasflügler der ČSSR II.). *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 24: 93-98 (in Czech, German summ.).
345. LAŠTŮVKA Z. 1989: Zur Taxonomie von *Synansphecchia triannuliformis* (Freyer, 1845) (Lepidoptera, Sesiidae). *Acta Univ. Agric. Brno, Fac. Agron.*, 37: 128-131.
346. LAŠTŮVKA Z. 1990: Der Katalog der europäischen Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae). *Scripta, J. Fac. Sci. Masaryk Univ. Brno*, 20: 461-476.
347. LAŠTŮVKA Z. & DVOŘÁK M. 1990: Výsledky synekologického studia některých čeledí řádu Lepidoptera na experimentální ploše Kameničky. Přehled zjištěných druhů. *Acta Univ. Agric. Brno, Fac. Agron.*, 38: 205-216 (in Czech).
348. LAŠTŮVKA Z. & LAŠTŮVKA A. 1994: Drei neue Arten der *Trifurcula pallidella*-Gruppe aus Mitteleuropa (Lepidoptera: Nepticulidae). *Entomol. Generalis*, 18: 201-212.
349. LAŠTŮVKA Z. & LAŠTŮVKA A. 1995: *An illustrated key to European Sesiidae (Lepidoptera)*. Mendel Univ. of Agric. and Forestry, Brno, 173 pp.
350. LAŠTŮVKA Z., LAŠTŮVKA A. & BĚLÍN V. 1982: Zajímavé nálezy motýlů z území Československa. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 18: 121-128 (in Czech).
351. LAŠTŮVKA Z., LAŠTŮVKA A., LIŠKA J., MAREK J., SKYVA J. & VÁVRA J. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Opostegidae, Nepticulidae, Adelidae, Tineidae, Gracillariidae, Bucculatricidae, Plutellidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Momphidae, Cosmopterigidae, Scythrididae, Gelechiidae, Sesiidae, Tortricidae, Epermeniidae, Pterophoridae, Pyralidae, Geometridae, Arctiidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 89: 466-472.
352. LAŠTŮVKA Z., LIŠKA J., VÁVRA J., ELSNER V., LAŠTŮVKA A., MAREK J., DUFEK T., DVOŘÁK M., KOPEČEK F., PETRŮ M., SKYVA J. & VÍTEK P. 1994: Faunistic records from the Czech Republic-18. Lepidoptera: Opostegidae, Nepticulidae, Adelidae, Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Scythrididae, Blastobasidae, Gelechiidae, Choreutidae, Tortricidae, Pyralidae, Noctuidae. *Klapalekiana*, 30: 197-206.
353. LEDERER G. 1941: Biotope. Flugplatz von C. palaeno europome Esp. im Sudetenland. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 54: 292-293.
354. LEHEČKA E. 1966: *Dasypolia templi* (Thnbg.) (Lep., Noctuidae) na Šumavě. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 2: 53-55 (in Czech, German summ.).
355. LEKEŠ V. 1966: Okáči v Polabí (Satyridae). *Polabí, Vlastivěd. Zprav. Oblast. Muz. v Poděbradech*, 1966(3-4): 54-56 (in Czech).
356. LEKEŠ V. 1967: Babočky (Nymphalidae) v Polabí. *Polabí, Vlastivěd. Zprav. Oblast. Muz. v Poděbradech*, 1967(3-4): 50-54 (in Czech).
357. LEKEŠ V. 1987: Naši otakárkové (Papilionidae). *Polabská Příroda, Sbor. Přísp. Aktiv. SOP a ČSOP Okr. Nymburk*, 1987(1): 8-14 (in Czech).
358. LEKEŠ V. 1989: Vřetenušky v Polabí (Zygaenidae). *Polabská Příroda, Sbor. Přísp. Aktiv. SOP a ČSOP Okr. Nymburk*, 1989(2): 16-23 (in Czech).
359. LEKEŠ V. 1990: Denní motýli (Rhopalocera) ve středním Polabí v minulosti a v současnosti. *Polabská Příroda, Sbor. Přísp. Aktiv. SOP a ČSOP Okr. Nymburk*, 1990(3): 14-55 (in Czech).
360. LEKEŠ V. 1990: Naši srpkřídlecí (Drepanidae). *Polabská Příroda, Sbor. Přísp. Aktiv. SOP a ČSOP Okr. Nymburk*, 1990(3): 56-60 (in Czech).

361. LEKEŠ V. 1991: Rožďalovice a motýli, pp. 31-34. In: *Sbor. k 650. Výr. Zal. Města Rožďalovic*. MNV Rožďalovice (in Czech).
362. LEKEŠ V. 1993: Macrolepidoptera ve středním Polabí. *Polabská Příroda, Region. Přír. Sbor. při Přír. Klubu Polabí při Polab. Muz. Poděbrady*, 1993(4): 19-20 (in Czech).
363. LEKEŠ V. 1993: Motýli a horké léto 1992. *Polabská Příroda, Region. Přír. Sbor. při Přír. Klubu Polabí při Polab. Muz. Poděbrady*, 1993(4): 26-27 (in Czech).
364. LEKEŠ V. 1994: Naši hřbetozubci (Notodontidae). *Polabská Příroda, Region. Přír. Sbor. při Přír. Klubu Polabí při Polab. Muz. Poděbrady*, 1994(5): 4-11 (in Czech).
365. LEKEŠ V. 1994: Blýskavka plicníková (*Atypha pulmonaris* Esp.) v Libickém luhu. *Polabská Příroda, Region. Přír. Sbor. při Přír. Klubu Polabí při Polab. Muz. Poděbrady*, 1994(5): 24 (in Czech).
366. LEKEŠ V. 1994: Hřbetozubci (Lepidoptera: Notodontidae) v českém Středním Polabí. *Práce Muzea v Kolíně - Ser. Natur*, 1: 75-92 (in Czech, English summ.).
367. LEKEŠ V. 1995: Melanismus u motýlů (Lepidoptera) a jeho vývoj v českém Středním Polabí. *Polabská Příroda, Region. Přír. Sbor. při Přír. Klubu Polabí při Polab. Muz. Poděbrady*, 1995(6): 16-26 (in Czech, German summ.).
368. LEVÝ J. 1948: Příspěvek k motýlí fauně jihočeské. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 45: 78-89, 156-161 (in Czech).
369. LEVÝ J. 1967: Vzácný nález motýla *Prodotis stolida* (F.) v Čechách (Lep., Noctuidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol.* ČSAV, 3: 28-29 (in Czech, German summ.).
370. LEVÝ J. 1971: Předběžný seznam motýlů (Lepidoptera), zjištěných v Novohradských horách. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 11(Suppl.): 67-72 (in Czech).
371. LEVÝ J. 1972: *Sesamia cretica* Ld., náhodně zjištěná v Čechách (Lep., Noctuidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol.* ČSAV, 8: 97-98 (in Czech).
372. LEVÝ J., LEHEČKA E., KRAMPL F. & SAMEC M. 1969: Další příspěvek k poznání motýlí fauny jižních Čech. *Zprávy Čs. Společ. Entomol.* ČSAV, 5: 3-23 (in Czech, German summ.).
373. LIŠKA J. 1986: Výskyt píďalky *Epirrita autumnata* na smrku. *Lesnická Práce*, 65: 228 (in Czech).
374. LIŠKA J. 1990: Příspěvek k poznání fauny píďalek a můr v okolí Českých Velenic (Lep., Geometridae, Noctuidae). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 30: 67-72 (in Czech, German summ.).
375. LIŠKA J. 1991: Jak dál v kontrole výskytu bekyně mnišky a obaleče modřínového feromonovými pastmi. *Lesnická Práce*, 71: 152-154 (in Czech).
376. LIŠKA J. 1992: K rozšíření *Scythris clavella* (Zell.) a *S. seliniella* (Zell.) (Lepidoptera, Scythrididae) v České a Slovenské federativní republice. *Biologie (Bratislava)*, 47: 123-127 (in Czech, English abstr.).
377. LIŠKA J. 1992: Testování feromonových pastí v průběhu gradace píďalky podzimní (Operophtera brumata L.) ve středních Čechách. *Zprávy Lesn. Výzkumu*, 37(4): 42-45 (in Czech).
378. LIŠKA J. 1993: Výskyt melanismu u bekyně mnišky a některých dalších lesnických významných druhů motýlů. *Zprávy Lesn. Výzkumu*, 38(4): 12-16 (in Czech, English abstr.).
379. LIŠKA J. 1993: Druhové spektrum motýlů (Lepidoptera) ve feromonových pastích s atraktanty na bázi E9-12:Ac a poznámky k odchytům dalších skupin hmyzu. *Práce VÚLHM*, 78: 83-89 (in Czech, English summ.).
380. LIŠKA J. & HOCHMUT R. 1987: Kontrola výskytu obaleče modřínového feromonovými pastmi. *Lesnická Práce*, 66: 178-179 (in Czech).
381. LIŠKA J. & HOCHMUT R. 1988: Současné možnosti ochrany dubových porostů před píďalkou podzimní. *Lesnická Práce*, 67: 218-221 (in Czech).
382. LIŠKA J. & HOCHMUT R. 1988: Výsledky kontroly výskytu bekyně mnišky a obaleče modřínového feromonovými pastmi v roce 1987. *Lesnická Práce*, 67: 260-262 (in Czech).
383. LIŠKA J. & KAPITOLA P. 1989: Výsledky kontroly výskytu bekyně mnišky a obaleče modřínového feromonovými pastmi. *Lesnická Práce*, 68: 221-224 (in Czech).
384. LIŠKA J., PATOČKA J., SKYVA J. & TURČANI M. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Tineidae, Ochsenheimeriidae, Oecophoridae, Agonoxenidae, Cosmopterigidae, Scythrididae, Gelechiidae, Tortricidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 89: 73-74.
385. LIŠKA J., PÍCHOVÁ V., KNÍŽEK M. & HOCHMUT R. 1991: Přehled výskytu lesních hmyzích škůdců v Českých zemích. *Lesnický Průvodce*, 3: 1-37 (in Czech, English summ.).
386. LIŠKA J., SKUHRAVÝ V. & HOCHMUT R. 1986: Kontrola výskytu bekyně mnišky a obaleče modřínového feromonovými pastmi. *Lesnická Práce*, 65: 221-226 (in Czech).
387. LIŠKA J. & SKYVA J. 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Prodoxidae, Tineidae, Gelechiidae, Pyralidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 88: 272.
388. LIŠKA J. & SKYVA J. 1997: Historical and recent occurrence of Lepidoptera in mountain sites of the Giant Mountains (Czech Republic). *Biologie (Bratislava)*, 52: 163-165.
389. LIŠKA J. & ŠRÚTKA P. 1994: Příspěvek ke kontrole bekyně mnišky (*Lymantria monacha* L.). *Zprávy Lesn. Výzkumu*, 39(4): 26-28 (in Czech, English abstr.).
390. LIŠKA J. & ŠRÚTKA P. 1994: Přemnožení bekyně velkohlavé. *Lesnická Práce*, 73(5): 11 (in Czech).

391. LIŠKA J. & ŠRÚTKA P. 1995: Výskyt primárních druhů škodlivého lesního hmyzu. *Lesnická Práce*, 74(12): 11-12 (in Czech).
392. LIŠKA J. & ŠRÚTKA P. 1995: Cameraria ohridella - klíněnka poškozující listy jirovce maďalu. *Lesnická Práce*, 74(12): 12-13 (in Czech).
393. MACAL J. 1922: Sosnokaz borový. *Ochrana Rostlin*, 2(5-6): 62-63 (in Czech).
394. MALICKY H. 1966: Vorläufige Mitteilung über Biologie und Verbreitung von Sorhagenia Spuler (Lep., Momphidae). *Entomol. Nachrbl.*, 13(3): 37-42.
395. MAREK J. & KRAMPL F. 1990: Coleophora svenssoni in central Europe, with notes on its biology (Lepidoptera, Coleophoridae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 87: 290-297.
396. MAREK J., LAŠTŮVKA A. & VÁVRA J. 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Gracillariidae, Bucculatricidae, Lyonetiidae, Coleophoridae, Cosmopterigidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 88: 217-222.
397. MAREK J., LAŠTŮVKA Z., VÁVRA J. & VAN DER WOLF H. W. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Prodoxidae, Gracillariidae, Bucculatricidae, Lyonetiidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Cosmopterigidae, Pterophoridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 89: 473-476.
398. MAREK J. & SKYVA J. 1985: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Pterophoridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 82: 394-395.
399. MAREK J. & SKYVA J. 1989: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Pterophoridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 86: 478.
400. MAREK J. & SKYVA J. (in prep.): Příspěvek k poznání a rozšíření druhu Calyciphora albobactylus (Fabricius, 1794) a Calyciphora xanthodactyla (Treitschke, 1833) v České a Slovenské republice. (In Czech, English abstr.).
401. MAREK J., SPITZER K. & STARÝ J. 1964: Noctua interposita Hübner, 1789 v Československu (Lep., Noctuidae). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 61: 190-193 (in Czech).
402. MAREŠ S. 1983: Dlouhodobý průzkum motýlí fauny lokality u Lysé nad Labem (Lepidoptera). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 19: 27-31 (in Czech).
403. MAREŠ S. & SKYVA J. 1993: Fauna motýlů Prokopského údolí v Praze. Lepidoptera. *Natura Pragensis, Studie o Přírodě Prahy*, 10: 52-85 (in Czech).
404. MARSCHNER H. 1932-1934: Die Gross-Schmetterlinge des Riesengebirges. Separat-Abdruck. *Entomol. Rundschau*, 49, 50, 51. Alfred Kernen Verl., Stuttgart, 75 pp.
405. MARŠÁKOVÁ-NĚMEJCOVÁ M. & MIHÁLIK Š. (eds.) 1977: Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu. Academia, Praha, 474 pp. (in Czech).
406. MARŠÍK L. & MIKÁT M. 1997: K výskytu můry Callopietria juvenina (Stoll, 1782) ve východních Čechách (Lepidoptera: Noctuidae). (On the occurrence of Callopietria juvenina (Stoll, 1782) in Eastern Bohemia (Lepidoptera: Noctuidae). *Acta Mus. Reginaehradecensis (Ser. A)*, 25: 193-196 (in Czech, English abstr.).
407. MARTINEK V. 1980: Přemnožení obaleče modřínového v ČR. *Lesnická Práce*, 59: 504-507 (in Czech).
408. MARTINEK V. 1984: Parasitoids of the European pine shoot moth (Rhyacionia buoliana Schiff.) in Bohemia and Moravia. *Studie ČSAV*, 14, Academia, Praha, 113 pp.
409. MARÍK M. 1982: Tři zajímavé formy motýlů ze Srbska u Berouna. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 18: 45-46. (in Czech, English summ.).
410. MAŠEK J. 1987: Poznatky z ekologie Euphydryas aurinia Rott. (Lepidoptera, Nymphalidae). *Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír. (Plzeň)*, 34-35: 53-54 (in Czech).
411. MATĚJKA R. 1957: Rozšíření babočky sítkované v Čechách. *Ochrana Přírody*, 12: 220 (in Czech).
412. MATĚJKOVÁ V. 1942: *Denní motýli*. Vesmír, Praha, 98 pp. (in Czech).
413. MATĚJKOVÁ V. 1945: O modráscích z rodu Lycaena. *Chvilky v Přírodě*, 4: 70-73 (in Czech).
414. MATOUŠ J. 1994: Motýli bývalého VVP Mladá. (Butterflies and moths (Lepidoptera) of the former military area VVP Mladá). *Práce Muz. v Kolíně - Ser. Natur.*, 1: 97-126 (in Czech, English abstr.).
415. MICHEL J. 1931: Ueber das Vorkommen von Vanessa L-album im nördlichen Böhmen. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 45: 132-135.
416. MICHEL J. 1932: Ein Beitrag zur Lebensweise von Cymatophora or F. und ihren Formenreichtum. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 46: 128-131.
417. MICHEL J. 1934: Die Erblichkeit von Cymatophora or F. v. marginata Warnecke. Ein Zuchtbericht, nebst neuen Beiträgen zur Ausbreitung des Melanismus. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 47: 65-69.
418. MICHEL J. 1934: Wie sammelt man Tephroclystien. *Natur und Heimat*, 5: 110-114.
419. MICHEL J. 1935: Zwei für Böhmen neue Schmetterlinge. *Natur und Heimat*, 6: 53-54.
420. MICHEL J. 1936: Eine merkwürdige Eiablage von Papilio machaon L. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 50: 7-9.
421. MICHEL J. 1936: Jahresbericht des Entomologenbundes für die Tschechoslowakische Republik für das Jahr 1935. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 50: 153-157.
422. MICHEL J. 1936: Die zweite Generation von Gonepteryx rhamni L. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 50: 113-117.
423. MICHEL J. 1936: Ein neuer Beitrag zur Schmetterlingsfauna. *Natur und Heimat*, 7: 100-102.

424. MICHEL J. 1936: Einige bemerkenswerte Zwitter. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 49: 546-548.
425. MICHEL J. 1936: Ein neuer Beitrag zur Fauna Böhmens. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 49: 140-143, 435-438, 449-452, 471-473, 490-491.
426. MICHEL J. 1937: Bericht über den Herbsttauschtag und die Hauptversammlung des Entomologenbundes für die Tschechoslowakische Republik. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 51: 297-299.
427. MICHEL J. 1938: Jahresbericht des Entomologenbundes für die Tschechoslowakische Republik für das Jahr 1936. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 51: 349-351, 360-362, 366-368.
428. MICHEL J. 1938: *Lycæna ismenias* Meig. in Böhmen. *Ztschr. Wien. Entomol. Ges.*, 32: 91-103.
429. MICHEL J. 1939: Jahresbericht des Entomologenbundes für die Tschechoslowakische Republik für das Jahr 1937. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 52: 293-298, 302-306.
430. MICHEL J. 1940: Bericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes über die Jahre 1938 und 1939. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 54: 77-80, 81-84, 89-92.
431. MICHEL J. 1940: Ein neuer *Lycaeniden*hybrid. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 54: 67-70.
432. MICHEL J. 1941: Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1940 nebst wichtigeren Nachträgen aus den vorhergehenden Jahren. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 55: 187-192, 196-200, 201-204, 229-232, 241-245.
433. MICHEL J. 1941: Über das Vorkommen von *Hesperia armoricanus* Obth. in Böhmen. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 55: 67-72.
434. MICHEL J. 1943: Überraschendes Ergebnis einer Zucht von *Dendrolimus pini* L. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 57: 141-144.
435. MICHEL J. 1943: Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1941. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 56: 237-240, 243-248, 253-256.
436. MICHEL J. 1944: Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1942. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 57: 105-111, 114-115.
437. MICHEL J. 1944: Ein Beitrag zum Vorkommen und zur Lebensweise von *Codonia quercimontaria* Bastelb. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 57: 154-160.
438. MIKÁT M. & MARŠÍK L. 1997: Příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) navrhovaného chráněného území „Na Plachtě“ v Hradci Králové. (Contribution to the knowledge of fauna of butterflies (Lepidoptera) of protected area "Na Plachtě" (Hradec Králové, Czech Republic)). *Acta Mus. Reginaehradecensis (Ser. A)*, 25: 163-192 (in Czech, English abstr.).
439. MIKKOLA K. SPITZER K., 1983: Lepidoptera associated with peatlands in central and northern Europe: a synthesis. *Nota Lepidopt.*, 6: 216-229.
440. MILES P. 1988: K výskytu baboček v Krkonoších. *Živa*, 36: 24-25 (in Czech).
441. MOUCHA J. 1951: Drobnosti k poznání našich motýlů. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 38: 238-240 (in Czech).
442. MOUCHA J. 1952: The distribution of *Pandoriana maja* Cr. in Central Europe (Lep., Nymphalidae). *Acta Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 27 (386): 69-88.
443. MOUCHA J. 1954: Eine Bemerkung zu der Massenvermehrung von *Minucia lunaris*. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 64: 151-152.
444. MOUCHA J. 1955: Poznámky o vakonoších (Lep., Psychidae) v Československu. *Čas. Nár. Mus., Odd. Přírodověd.*, 124: 93-95 (in Czech).
445. MOUCHA J. 1957: Příspěvek k poznání zvířeny údolí Klíčavy. *Čas. Slez. Mus. Opava (A)*, 6: 44-47 (in Czech).
446. MOUCHA J. 1957: K poznání vlivu potravy na vývoj bekyně velkohlavé (*Lymantria dispar* L.) *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 54: 73-80 (in Czech).
447. MOUCHA J. 1959: K rozšíření rodu *Euphydryas* Scudd. (Nymphal.) v Československu. *Čas. Nár. Musea, Odd. Přírodověd.*, 128: 92 (in Czech).
448. MOUCHA J. 1959: Neueste Forschungsergebnisse über unsere Lepidopteren-Fauna und deren Bedeutung für die Lösung zoogeographischer Fragen in der Tschechoslowakei (Lepidoptera). *Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 4: 1-81 (in German, English, Russian and Czech summ.).
449. MOUCHA J. 1959: Naše pernatušky. *Živa*, 7: 104 (in Czech).
450. MOUCHA J. 1965: Zpráva o výsledcích pozorování tažných motýlů v Československu za rok 1964. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 1(5-6): 10-15 (in Czech, German summ.).
451. MOUCHA J. 1969: *Autographa putnami* ssp. *gracilis* Lempke v Čechách (Lepidoptera, Noctuidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 5: 77-79 (in Czech, German summ.).
452. MOUCHA J. 1972: *Sbíráme motýly*. Práce, Praha, 240 pp (in Czech).
453. MOUCHA J. & CHOC V. 1972: *Naši denní motýli*. Albatros, Praha, 232 pp (in Czech).
454. MOUCHA J. & CHVÁLA M. 1957: *Pamphilus silvius* Knoch in Mittelböhmen. *Nachtbl. Bayer. Entomol.*, 4: 44-45.
455. MOUCHA J. & NOVÁK I. 1953: Zpráva o entomologické exkursi do oblasti Králíčského Sněžníku. *Přír. Sbor. Ostrav. Kraje*, 14: 249-251 (in Czech).
456. MOUCHA J. & POLÁČEK V. B. 1971: Zum Gedenken an prof. Dr. Ottokar Nickerl (1838-1920). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 68: 60-62.

457. MOUCHA J. & POVOLNÝ D. 1953: Československé druhy rodu *Ophiura* (Lep. Phalaenidae) Ochs. *Acta Entomol. Mus. Natur. Pragae*, 29: 25-40 (in Czech).
458. MOUCHA J. & POVOLNÝ D. 1957: Zur kritischen Revision der Gattung *Narraga* Wkr. (Lepidoptera, Geometridae). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 54: 217-234.
459. MOUCHA J. & VARIN G. 1959: Contribution à l'étude des satyridae *Chazara briseis panonica* ssp. n. de la Tchécoslovaquie. *Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 43: 57-62.
460. MOUCHA J. & WEISS D. 1954: Zur Lebensweise von *Clostera* (*Pygaera*) *anastomosis* L. *Nachrbl. Bayer. Entomol.*, 3: 68-69.
461. MOUCHA J., ZAHRADNÍK J. & VANCURA B. 1975: *Naši noční motýli*. Albatros, Praha, 369 pp. (in Czech).
462. MOUCHA P. 1982: Chráněná krajinná oblast Český kras. *Naši Přírodou*, 2(4): 20-21 (in Czech).
463. NĚMEC F. 1985: Soupis sbírek Západočeského muzea v Plzni. Lepidoptera, 1. část. (Sbírka Skalova a Tykačova). *Sbor. Západočes. Muz. v Plzni - Příroda*, 54: 1-77 (in Czech).
464. NĚMEC J. & LOŽEK V. (eds.) 1996: *Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy*. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 319 pp. (in Czech).
465. NĚMEC J. & LOŽEK V. (eds.) 1997: *Chráněná území ČR 2 - Praha*. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR in Consult, Praha, 154 pp. (in Czech).
466. NENADAL S. 1987: Některé vzácnější druhy hmyzu SPR Velké Dářko v CHKO Žďárské vrchy. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 23: 57-58 (in Czech).
467. NEUMANN F. 1971: Zpráva o průzkumu motýlů (Lepidoptera) v okolí obcí Dobrá Voda a Hojná Voda v Novohradských horách. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 11(Suppl.): 53-62 (in Czech).
468. NICKERL O. 1894: *Catalogus insectorum faunae bohemicae. III. Motýlové drobní (Microlepidoptera)*. Spol. pro fysiokracii v Čechách, Praha, 70 pp. (in Czech).
469. NICKERL O. 1908: *Beiträge zur Insekten-Fauna Böhmens, VI. Die Motten Böhmens (Tineen)*. Gesellschaft für Physiokratie, Prag, 161 pp.
470. NOSEK J. & POVOLNÝ D. 1954: Významný škůdce modřínu *Poecilopsis isabellae* Harr. *Zool. a Entomol. Listy (Brno)*, 3: 13-36 (in Czech).
471. NOVÁK I. 1960: Příspěvek k bionomii můry gamma (*Plusia gamma* L.). *Zool. Listy (Brno)*, 9: 19-33 (in Czech, German summ.).
472. NOVÁK I. 1966: Výskyt šedavky *Chloridea maritima* Grasl. (Lepidoptera, Noctuidae) jako škůdce vojtek v Československu. *Ochrana Rostlin*, 2: 275-282 (in Czech).
473. NOVÁK I. 1971: The hibernation of the silver y-moth (*Autographa gamma* L.) (Lepidoptera, Noctuidae) under the climatic conditions of central Europe, p. 533. In: GURCZEVA E. L. & KRIZHANOVSKIY O. L. (eds.): *Proc. XIIIth Intern. Congr. of Entomol., Moscow, 2.-9.8.1968. Vol. I*. Nauka, Leningrad, 581 pp.
474. NOVÁK I. 1972: Problematika škodlivosti můry gama (*Autographa gamma* L., Lep., Noctuidae) v podhorských polohách. *Sbor. Vys. Školy Zeměd. v Čes. Budějovicích*. 1970 A, (397): 339-346 (in Czech).
475. NOVÁK I. 1972: Přezimování můry gama (*Autographa gamma* L., Lep., Noctuidae) ve střední Evropě. *Ochrana Rostlin*, 8: 305-312 (in Czech).
476. NOVÁK I. 1974: Sexualindex bei Lepidopteren in den Lichtfallen. *Fol. Entomol. Hung.*, 27(Suppl.): 143-152.
477. NOVÁK I. 1974: Přilet samců a samic Lepidopter do světelných lapačů v závislosti na různých faktorech, pp 487-490. In: *Sbor. Věd. Prací z V. Celost. Konf. o Ochr. Rostlin, Brno 1974*. Ústav ochr. rostlin VÚRV Praha-Ruzyně v SZN Praha, Praha, 645 pp. (in Czech).
478. NOVÁK I. 1976: Quelques relations existant entre diapause et migration chez *Autographa gamma* L. et quelques autres especes de noctuelles. *Ann. Zool.-Écol. Anim.*, 8: 389-391.
479. NOVÁK I. 1977: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Noctuidae, Geometridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 74: 426-427.
480. NOVÁK I. 1981: Analiz danych o přiletě *Agrotis segetum* Schiff. v svetolovušku v Prage-Ruzyně i možnosti ispolzovaniya danych dlja prognoza pojavleniya etoj sovki, pp. 58-64. In: *Materialy Simpoziuma SEV I-8, Dunajská Streda, 1980*. SAV, Bratislava, 97 pp (in Russian).
481. NOVÁK I. 1985: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Geometridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 82: 154.
482. NOVÁK I. 1992: Příspěvek k poznání fauny motýlů dolního Povltaví. (Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna vom Niedermoldaugebiet). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 28: 70-86 (in Czech, German summ.).
483. NOVÁK I. & SPITZER K. 1971: Některé zajímavější nálezy nočních motýlů ze Šumavy (Lepidoptera, Heterocera). *Zprav. CHKO Šumava*, 12: 15-24 (in Czech).
484. NOVÁK I. & SPITZER K. 1972: Výsledky faunisticko-ekologického studia Lepidopter (Noctuidae a Geometridae) rašeliníště Mrtvý luh u Volar a okolí. *Sbor. Jihočes. Muzea v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 12 (Suppl.1): 1-63 (in Czech, German summ.).
485. NOVÁK I. & SPITZER K. 1972: The relationship between migration and diapause during phylogeny and ontogeny of some Lepidoptera. *J. Res. Lep.*, 10: 181-184.
486. NOVÁK I. & SPITZER K. 1973: Drei Arten aus der Familie Noctuidae (Lepidoptera) neu für die Tschechoslowakei. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 70: 408-414.

487. NOVÁK I. & SPITZER K. 1975: Adult dormancy in some species of the genus *Noctua* (Lepidoptera, Noctuidae) in Central Europe. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 72: 215-221.
488. NOVÁK I. & SPITZER K. 1980: Potřebujeme ochranu hmyzu? *Vesmír*, 59: 202-205 (in Czech).
489. NOVÁK I. & SPITZER K. 1982: *Ohrožený svět hmyzu*. Academia, Praha, 140 pp (in Czech).
490. NOVÁK I. & SPITZER K. 1986: Industrial melanism in *Biston betularia* (Lepidoptera, Geometridae) in Czechoslovakia. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 83: 185-191.
491. NOVÁK I. & SPITZER K. 1988: Múra *Idia* (=Epizeuxis) *calvaria* (Denis et Schiffermüller 1775) v jižních Čechách (Noctuidae, Lepidoptera) *Sbor. Jihočes. Mus. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 28: 35-36 (in Czech).
492. NOVÁK I. & SPITZER K. 1989: Melanism in Lepidoptera as indicator of landscape changes, pp. 138-141. In: BOHÁČ J. & RŮŽIČKA V. (eds.): *Proc. Vth Intern. Conf. "Bioindicators Deterioration of the Region"*. Entomol. ústav ČSAV, Čes. Budějovice, 432 pp.
493. NOVÁK I. & SPITZER K. 1992: *Lepidoptera*, pp. 105, 108-110, 113-115, 117-118, 120. In: ŠKAPEČ L. (ed.): *Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3. Bezobratlí*. Příroda, Bratislava, 155 pp. (in Czech).
494. NOVÁK I. & SYCHROVÁ E. 1993: Faunistic records from the Czech Republic - 2. Lepidoptera: Tortricidae. *Klapalekiana*, 29: 24.
495. NOVÁK I. & ZAKOPAL J. 1969: Obaleč zimolezový jako škůdce meruněk. *Zahrad. Listy*, 62: 136-137 (in Czech).
496. NOVÁK J. 1975: Příspěvek k poznání motýlů (Lepidoptera) severních Čech. *Sbor. Severočes. Mus., Ser. Natur. (Liberec)*, 7: 91-94 (in Czech).
497. NOVÁK K. & HRDÝ I. 1986: Monitorování letu obaleče švestkového, *Cydia funebrana*, pomocí feromonových lapáků, pp. 154-159. In: HRDÝ I. & HRDLÍČKOVÁ H. (eds.): *Sbor. Symp. Integr. Produkce Ovoce, 1984*. EU ČSAV, České Budějovice, 183 pp (in Czech).
498. OBENBERGER J. 1952: *Krkonosé a jejich zvířena*. Přírodovědecké vydavatelství, Praha, 290 pp. (in Czech).
499. OSVALD V. 1944: Heuriges Massenaufreten von *Acidalia trilineata* Scop. und *Zygaena purpurata* Br. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 57: 168.
500. OSVALD V. 1945: *Tischeria heinemanni* Wck., nový druh pro Čechy a miny ostatních u nás žijících zástupců rodu *Tischeria* Zell. (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 42: 89-91 (in Czech).
501. PACLT J. 1945: *Melanargia galathea* (L.) f. *fulvata* Lowe v Čechách (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 42: 149 (in Czech).
502. PACLT J. 1949: Fragmenta entomologica. *Entomol. Listy*, 12: 61-65 (in Czech).
503. PACLT J. & ŠMELHAUS J. 1948: Revízie československých súmračníkov. *Prír. Sbor., Čas. Prír. Odb. Matice Slov. Prievdza*, 3: 201-221 (in Slovak).
504. PACLT J. & ŠMELHAUS J. 1950: O zástupci rodu *Philotes* Scudd. v ČSR. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 47: 45-47 (in Czech).
505. PARENTI U. & VARALDA P. G. 1991: *Elachista littorcola* Le Marchand ed *Elachista sicula* Pareuti: note biologiche. (Lepidoptera, Elachistidae). *Boll. Mus. Veg. Sci. Natur. Torino*, 9: 427-435.
506. PATOČKA J. 1942: O několika nových nebo zajímavějších Lepidopterách z okolí Budějovic. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 143 (in Czech).
507. PATOČKA J. 1942-1943: O housenkách našich hřbetozubců. *Vesmír*, 21: 118-119 (in Czech).
508. PATOČKA J. 1943: Příspěvek k české faunistice Lepidopter. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 40: 125 (in Czech).
509. PATOČKA J. 1945: Další příspěvek k lepidopterologickému výzkumu jižních Čech. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 42: 73-82 (in Czech).
510. PATOČKA J. 1946: Další zajímavé nálezy Lepidopter z okolí Českých Budějovic. *Entomol. Listy*, 9: 101-105 (in Czech).
511. PATOČKA J. 1947: Příspěvek k poznání pražských minujících Lepidopter. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 44: 67 (in Czech).
512. PATOČKA J. 1948: Několik předběžných údajů o obaleči *Epiblema proximana* H.S. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 45: 89-94 (in Czech).
513. PATOČKA J. 1950: The fir budworm *Epiblema nigricana* and its ecology. *Věst. Čs. Společ. Zool.*, 14: 77-96.
514. PATOČKA J. 1958: Beitrag zur Kenntnis des Tannenwicklers *Epinotia pusillana* (Peyerimhoff). *Beitr. Entomol.*, 8: 325-333.
515. PATOČKA J. 1958: Beitrag zur Morphologie der Puppen und Bionomie der Wickler aus der Tribus Archipini (Lepidoptera, Tortricidae). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 55: 185-197.
516. PATOČKA J. 1977: Beitrag zur Kenntnis der Morphologie und Bionomie der mitteleuropäischen Vertreter der Gattung *Stenolechia* s.l. (Lepidoptera, Gelechiidae). *Ztschr. Angew. Entomol.*, 83: 303-311.
517. PATOČKA J. 1986: Zur Kenntnis der Puppen der Tribus Boarmiini (Lepidoptera, Geometridae) von Mitteleuropa. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 83: 301-315.
518. PECINA P. 1974: Jasoň dyminivkový. *Ochrana Přírody*, 29: 149 (in Czech).
519. PECINA P. 1980: Příspěvek k poznání zvířeny navrhované Státní přírodní rezervace Zvolská Homole. *Bohemia Centr.*, 10: 215-237 (in Czech).
520. PECINA P. 1978: *Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů I*. SPN, Praha, 224 pp. (in Czech).
521. PEKING F. 1935: Lebensweise und Vorkommen der Schädeleule, *Epizeuxis calvaria* F. *Natur und Heimat*, 6: 119-120.
522. PEKING F. 1936: Zur Fauna Böhmens. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 50: 316.
523. PEKING F. 1937: Über das Ei und das Vorkommen von *Eubolia murinaria* F. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 50: 391-392.
524. PEREGRIN K. 1930: Příspěvek k fauně českých Lepidopter. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 27: 69 (in Czech).

525. PETERSEN G. 1965: Beitrag zur Kenntnis der Tineiden der Tschechoslowakei (Lepidoptera, Tineidae). *Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 11: 165-194.
526. PETERSEN G. 1969: Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera - Tineidae. *Beitr. Entomol.*, 19: 311-388.
527. PETR G. 1948: Eupithecia sinuosaria Eversm. v Čechách. *Věda Přírodní*, 24: 25-26 (in Czech).
528. PETROVSKÝ V. 1935: Rhyacia sigma Schiff., ab. nubila Esp., nová aberace pro Čechy a příspěvek k oekologii můry Rhyacia sigma Schiff. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 135-136 (in Czech).
529. PETROVSKÝ V. 1935: Vnadění v lednu. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 218 (in Czech).
530. PETRŮ M. 1995: K výskytu soumračníka Heteropterus morpheus v Čechách (Lepidoptera, Hesperidae). *Klapalekiana*, 31: 53-54 (in Czech).
531. PFEFFER A. 1930: Zavíječ modřínový - Enarmonia (Epinotia, Steganoptycha) diniana Gn. (pinicolana Z.). *Lesnická Práce*, 9: 429-452 (in Czech).
532. PFEFFER A. 1950: Bibliografie entomologického písemnictví Čech, Moravy a Slezska od roku 1800-1940. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 47: 231-356 (in Czech).
533. PFEFFER A. & SKUHRÁVÝ V. 1996: Bekyně mniška a její problematika. *Lesnická Práce*, 75: 168-170 (in Czech).
534. PFEFFER A. & SKUHRÁVÝ V. 1996: Kontrola výskytu a hubení bekyně mnišky. *Lesnická Práce*, 75: 396-397 (in Czech).
535. PIPEK P. 1976: Motýlí fauna ve Státní přírodní rezervaci Medník. *Bohemia Centralis*, 5: 187-189 (in Czech).
536. PIPEK P. 1981: Paranemapogon fungivorellus (Ben.) - nový druh pro ČSSR. (Lepidoptera, Tineidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 17: 141 (in Czech).
537. PIPEK P. 1981: Nemapogon picarellus (Clerck, 1759) v Čechách (Lepidoptera, Tineidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 17: 117-118 (in Czech).
538. PIPEK P. 1982: Lepidopterologické poměry okolí Davle IV. *Bohemia Centralis*, 11: 117-121 (in Czech).
539. PIPEK P. 1983: Lepidopterologické poměry okolí Davle V. *Bohemia Centralis*, 12: 218-223 (in Czech).
540. PIPEK P. 1985: Lepidopterologické poměry okolí Davle VI. *Bohemia Centralis*, 14: 275-282 (in Czech).
541. PIPEK P. 1986: Naš největší mol. *Živa*, 34: 220 (in Czech).
542. PIPEK P. & SOLDÁT M. 1979: Zpráva o pozorování tažných motýlů v Československu v roce 1977. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 15: 65-73 (in Czech, German summ.).
543. PIPEK P. & SOLDÁT M. 1980: Zpráva o pozorování tažných motýlů v Československu v r. 1978. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 16: 35-41 (in Czech).
544. PIPEK P. & ŠTĚPÁNEK M. 1978: Lepidopterologické poměry okolí Davle. *Bohemia Centralis*, 7: 151-161 (in Czech).
545. PIPEK P. & ŠTĚPÁNEK M. 1979: Lepidopterologické poměry okolí Davle II. *Bohemia Centralis*, 8: 167-174 (in Czech).
546. PIPEK P. & ŠTĚPÁNEK M. 1981: Lepidopterologické poměry okolí Davle III. *Bohemia Centralis*, 10: 239-256 (in Czech).
547. POKORNÝ F. 1929: Doplnky k motýlové fauně Poděbradska. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 26: 58 (in Czech).
548. POKORNÝ F. 1931: Doplnky motýlové fauny Poděbradska. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 28: 32 (in Czech).
549. POKORNÝ F. 1933: Palimpsestis or ab. albingensis zdomácnělá v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 30: 92 (in Czech).
550. POKORNÝ F. 1934: Agrotis lucipeta F. ab. monochroma, aberr. nova. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 31: 181 (in Czech).
551. POLÁČEK V. 1943: Nová naleziště některých motýlů. *Entomol. Listy*, 6: 62 (in Czech).
552. POLÁČEK V. 1943: Stoupající výskyt motýlů škůdců. *Entomol. Listy*, 6: 62 (in Czech).
553. POLÁČEK V. 1943: Nová naleziště českých Lepidopter. *Entomol. Listy*, 6: 91 (in Czech).
554. PORSCHE A. 1936: Seltene Gäste. *Natur und Heimat*, 7: 15-16.
555. POSPÍŠIL M. 1982: Výskyt Rhopalocer na lokalitě Bohostice. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 18: 53-59 (in Czech, English summ.).
556. POVOLNÝ D. 1949: Podkopěnkovi moli rodu Lithocolletis Hb. na ovocných stromech. *Sbor. VŠZ Brno*, 45: 1-55 (in Czech).
557. POVOLNÝ D. 1951: Příspěvek k poznání našich drvopleňů (Lep. Cossidae). *Sbor. VŠZ Brno*, 47: 75-93 (in Czech).
558. POVOLNÝ D. & GREGOR F. 1950: Příspěvky k poznání rodu Lithocolletis Hb. *Entomol. Listy (Brno)*, 13: 33-36 (in Czech).
559. POVOLNÝ D. & GREGOR F. 1952: Pátý příspěvek k fauně motýlů ČSR. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 49: 237-239 (in Czech).
560. POVOLNÝ D. & KRÁLÍČEK M. 1984: On Brachodes pumila (Ochsenheimer, 1808) and Synanthedon danubicus (Králíček, 1975) in Czechoslovakia (Lepidoptera, Sesioidea). *Acta Univ. Agric. Brno, Fac. Agron.*, 32: 93-104.
561. POVOLNÝ D. & MOUCHA J. 1955: Vysokohorské píďalky rodu Psodos Tr. (huňatec) Tatranského a Krkonošského národního parku (Insecta - Lepidoptera). *Ochrana Přírody*, 5: 148-151 (in Czech).
562. POVOLNÝ D. & MOUCHA J. 1956: Studie o vysokohorských píďalkách rodu Psodos Treitschke 1828 se zřetelem k druhům v pohoří Československa a k otázkám vzniku druhu v horských oblastech. *Acta Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 30(449): 143-176 (in Czech).
563. POVOLNÝ D., SPITZER K. & MAREK J. 1965: Versuch einer zoözoologischen Auswertung der Noctuidenfauna des südböhmischen Hochmoores bei Libořez. *Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 11(105): 245-264.
564. POVOLNÝ D., SPITZER K. & MAREK J. 1968: Nachtrag zur Noctuidenfauna des südböhmischen Hochmoores bei Libořez nebst Bemerkungen zu einigen Noctuidenfunden auf Hochmooren in Südböhmen. *Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 13: 119-122.

565. POVOLNÝ D. & ŠMELHAUS J. 1951: Československé druhy rodu *Procris* Fabr. *Entomol. Listy (Brno)*, 14: 180-188 (in Czech and English).
566. POVOLNÝ D. & ŠMELHAUS J. 1951: Nový příspěvek k poznání rodu *Procris* Fabr. *Věst. Čs. Zool. Společ.*, 15: 147-188 (in Czech and English).
567. POVOLNÝ D. & ŠMELHAUS J. 1951: *Colias palaeno* (L.) ssp. *europome* (Esp.) ve Slezsku. *Přír. Sbor. Ostrav. Kraje*, 12: 402-410 (in Czech and German).
568. POVOLNÝ D. & ŠMELHAUS J. 1955: Fragmenty o rodu *Procris* Fabr. (Lep., Zyg.). *Čas. Morav. Mus., Vědy Přír.*, 40: 130-137 (in Czech).
569. PRIESNER E. & ŠPATENKA K. 1990: Pheromonfänge zum Verbreitungsbild von *Pennisetia bohémica* Králíček and Povolný 1974 (Lepidoptera: Sesiidae) in Mitteleuropa. *Mitt. Schweiz. Entomol. Ges.*, 63: 87-98.
570. PROCHÁZKA J. 1995: Faunistic records from the Czech Republic - 32. Lepidoptera: Noctuidae. *Klapalekiana*, 31: 140.
- 570a. PŘÍHODA A. 1950: *Trichoptilus paludum* Zell. - vzácný motýlek žijící na rosníčce (*Drosera*). *Ochrana přírody*, 5 (2): 34-36 (in Czech)
571. PUJMAN D. 1952: Nejsevernější naleziště vřetenušky *Zygaena laeta* Hbn. v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 49: 212-213 (in Czech).
572. PULPÁN J. 1939-1940: Kukléřka lociková (*Cucullia lactucae* D.Sch.). *Vesmír*, 18: 206 (in Czech).
573. RAUTSCHKA K. 1936: Auftreten der „Spanischen Flagge“. *Natur und Heimat*, 7: 150.
574. REINHARTOVÁ J. & HRDÝ I. 1986: Rozbor pětiletých výsledků pozorování letové aktivity obaleče jablečného v závislosti na počasí, pp. 142-148. In: HRDÝ I. & HRDLÍČKOVÁ H. (eds.): *Sbor. Symp. Integr. Produkce Ovoce, 1984*. EU ČSAV, České Budějovice, 183 pp. (in Czech).
575. REIPRICH A. 1981: Revízia niektorých habituálne ťažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR. II. *Oporinia dilutata* Den. et Schiff., *O. christyi* Prout a *O. autumnata* Borkh. (Lep., Geometridae). *Biológia (Bratislava)*, 36: 153-166 (in Slovak).
576. REIPRICH A. 1981: Revízia niektorých habituálne ťažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR. 6. *Abrostola trigemina* Wrbng., *A. triplasia* L. a *A. asclepiadis* Den. et Schiff. (Lep. Noctuidae). *Biológia (Bratislava)*, 36: 1003-1013 (in Slovak).
577. REIPRICH A. 1982: Revízia niektorých habituálne ťažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR. Časť 8. *Rhyacionia buoliana* Den. et Schiff. a *Rh. pinicolana* Doubl. (Lepidoptera, Tortricidae). *Biológia (Bratislava)*, 37: 987-997 (in Slovak).
578. REIPRICH A. 1983: Revízia niektorých habituálne ťažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR. Časť 9. *Ocnero-stoma piniariellum* Zell. a *O. friesei* Svensson. (Lepidoptera, Yponomeutidae). *Biológia (Bratislava)*, 38: 133-138 (in Slovak).
579. REIPRICH A. 1984: Revízia niektorých habituálne ťažko rozlíšiteľných druhov motýľov z územia ČSSR. Časť 11. *Chloridea viriplaca* (Hufn.) a *Chl. maritima* (Grasl.) ssp. *bulgarica* Draudt. (Lepidoptera, Noctuidae). *Biológia (Bratislava)*, 39: 185-196 (in Slovak).
580. REIPRICH A. 1984: Poznámky k variabilite obalovača *Acleris ferrugana* (Den. et Schiff.) (Lepidoptera, Tortricidae). *Biológia (Bratislava)*, 39: 1003-1013 (in Slovak).
581. REJMANEK M. & SPITZER K. 1982: Bionomic strategies and long-term fluctuations in abundance of Noctuidae (Lepidoptera). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 79: 81-96.
582. RIEDL T. 1969: Matériaux pour la connaissance des Momphidae Paléarctiques (Lepidoptera). Partie IX. Revue des Momphidae européennes, y compris quelques espèces d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. *Pol. Pismo Entomol.*, 39: 635-919.
583. ROESLER U. 1973: *Phyticinae*. In: AMSEL G., GREGOR F. & REISSER H. (eds.): *Microlepidoptera Palaearctica*, Bd. 4. G. Fromme & Co., Wien, 752 pp.
584. ROTTER M. 1983: Chránění motýli Orlických hor a Podorlicka, pp. 3-4. In: *Orlické Hory - Jaro - Léto 1983*. Okresní výbor Českého svazu ochránců přírody Rychnov nad Kněžnou. (In Czech).
585. ROTTER M. 1994: Ze zápisníku entomologa (Jak ničíme přírodu). *Orlické Hory a Podorlicko*, 7: 199-202 (in Czech).
586. ROTTER M. 1994: Někteří běžní a vzácní obaleči Orlických hor a Podorlicka. *Panorama (Dobré)*, 2: 77-79 (in Czech).
587. ROTTER M. 1995: Motýli Orlických hor a Podorlicka (IV). *Práce a Studie (Pardubice)*, 1995(3): 65-80 (in Czech).
- 587a. ROTTER M. 1996: Motýli Orlických hor a Podorlicka - V. *Práce a Studie (Pardubice)*, nová série 4: 85-96 (in Czech, English summ.).
588. ROTTER M. & KAČÍREK A. 1984: Motýli orlických hor - I. *Práce a Studie (Pardubice)* 1984(15): 101-116 (in Czech).
589. ROTTER M. & KAČÍREK A. 1988: Noctuidae (Lepidoptera) Orlických hor a Podorlicka. *Acta Mus. Reginaehradecensis, Ser. A, Sci. Natur.*, 21: 69-75 (in Czech).
590. ROTTER M. & KAČÍREK A. 1993: Motýli Orlických hor a Podorlicka III. *Práce a Studie (Pardubice)*, nová série 1: 34-48 (in Czech).
591. ROUBAL J. 1918: Kuchyňka na Hlubošsku, starý slovanský háj? *Krása Našeho Domova*, 3: 38-39 (in Czech).
592. ROUBAL J. & ŠTORKÁN J. 1924: *Brdy po stránce zoologické*. Nákl. Měst. Mus. v Rokycanech, Rokycany, 4 pp (in Czech).
593. RYBÁŘ P. & PROCHÁZKA F. (eds.) 1979: Chráněné druhy rostlin a živočichů Východočeského kraje. *Práce a Studie (Pardubice)*, 9(Suppl. 1): 1-174 (in Czech).
594. SAN N. V. & SPITZER K. 1993: Isolated populations of the winter moth, *Operophtera brumata* (Lepidoptera: Geometridae), their heavy metal content and parasitism. *Eur. J. Entomol.*, 90: 311-321.

595. SAN N. V. & ŠULA J. 1993: Allozyme variation in the winter moth, *Operophtera brumata* (Lepidoptera: Geometridae), in isolated populations. *Eur. J. Entomol.*, 90: 303-310.
596. SEDLÁČEK J. 1987: Příspěvek k výskytu denních motýlů v okrese Chomutov. *Památky, Příroda, Život, Vlastivěd. Čtvrtletník Chomutovska*, 19: 105-110 (in Czech).
597. SCHACK E. 1936: Mein erster *Argynnis pandora* Schiff. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 50: 125-128.
598. SCHACK E. 1938: Zum Vorkommen des *Neptis lucilla* F. in Südböhmen. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 51: 157-160.
599. SCHACK E. 1939: Entomologische Ergebnisse. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 52: 173-177.
600. SCHMÖGER K., DVOŘÁK M., DVOŘÁK O., HŘEBEN F., KOLÁŘ Z. & TALPA V. 1990: Příspěvek k faunistice měřových Českomoravské vrchoviny (Lepidoptera, Noctuidae). *Přir. Sbor. Západočes. Mus. v Třebíči*, 17: 93-103 (in Czech).
601. SCHÖNFELDER J. 1933: *Nonagria sparganii* Esp. eine für Böhmen neue Art und einiges über *Nonagria typhae*. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 46: 248-249.
602. SCHÖNFELDER J. 1941: *Hadena illyria* Frr., in den Sudetengrenzgebirgen von Schluckenau bis Reichenberg beheimatet. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 54: 2-4.
603. SCHWARZ R. 1934: *Erastria venustula* Hb. (Lepidoptera) v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 31: 26-27 (in Czech).
604. SCHWARZ R. 1934: K rozšíření některých Geometrid. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 31: 121-123 (in Czech).
605. SCHWARZ R. 1937: Příspěvek k poznání československých mikrolepidopter. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 34: 4-5 (in Czech).
606. SCHWARZ R. 1939: Některé zajímavé nálezy mikrolepidopter. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 36: 32-33 (in Czech).
607. SCHWARZ R. 1941: Zajímavé nálezy Mikrolepidopter v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 38: 4-5 (in Czech).
608. SCHWARZ R. 1947: Příspěvek k lepidopterologii Československa. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 44: 67-70 (in Czech).
609. SCHWARZ R. 1948: *Motýli 1. Vesmír*, Praha, 14 + 42 pp (in Czech).
610. SCHWARZ R. 1949: *Motýli 2. Vesmír*, Praha, 10 + 69 pp (in Czech).
611. SCHWARZ R. 1952: O molech v domácnosti. *Vesmír*, 31: 8-11 (in Czech).
612. SCHWARZ R. 1953: *Motýli 3. ČSAV*, Praha, 7 + 156 pp (in Czech).
613. SCHWARZ R. 1956: Motýli československých jeskyň. *Čas. Slez. Muz. Opava*, 5: 19-30 (in Czech).
614. SCHWARZ R. & NICULESCU E. V. 1962: Morphologische und systematische Beiträge zur Kenntnis der Aegeriidae. *Ztschr. Arbeitsgem. Österr. Entomol.*, 14: 42-48.
615. SCHWARZ R. & TOLMAN V. 1961: *Bembecia pectinata* Stgr. et ses premiers états (Lepidoptera, Sesiidae). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 58: 284-287.
616. SILBERNAGEL A. 1930: Beitrag zur Biologie und zum Vorkommen von *Apamea nickerlii* Frr. in der Umgebung Prag. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a. M.)*, 44: 114-119.
617. SILBERNAGEL A. 1936: *Jaspidea (Calotaenia) celsia* L. - nová lokalita této můry v Čechách na vápenci. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 33: 137-138 (in Czech).
618. SILBERNAGEL A. 1937: Nová forma druhu *Zygaena laeta* Hb. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 34: 10-13 (in Czech).
619. SILBERNAGEL A. 1939: *Hadena (Mamestra) texturata* Alph. - nový druh v Čechách (Macrolep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 36: 20-24 (in Czech).
620. SILBERNAGEL A. 1940: *Argynnis paphia* ab. *cifkai* n. ab. (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 77 (in Czech).
621. SILBERNAGEL A. 1940: Další nový druh čeledi Zygaenidae, *Procris (Ino) subsolana* Stgr. v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 79-80 (in Czech).
622. SILBERNAGEL A. 1940: Nová žlutá odrůda rodu *Zygaena* F. v Čechách (Macrolep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 99 (in Czech).
623. SILBERNAGEL A. 1940: *Procris (Ino) geryon* Hübm. v Čechách. (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 104-106 (in Czech).
624. SILBERNAGEL A. 1940: Nová forma druhu *Phytometra (Plusia) bractea* F. z Čech. (Macrolep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 112-113 (in Czech).
625. SILBERNAGEL A. 1940: Nové odrůdy rodu *Lycena* F. (Macrolep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 116-119 (in Czech).
626. SILBERNAGEL A. 1940: *Catocala hymenaea* Schiff. v Čechách (Macrolep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 125 (in Czech).
627. SILBERNAGEL A. 1942: Nová nesytka z Čech (*Chamaesphesia affinis* Stgr.) *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 45 (in Czech).
628. SILBERNAGEL A. 1942: *Hypenodes taenialis* Hbn. - nový druh v Čechách (Macrolep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 86 (in Czech).
629. SILBERNAGEL A. 1942: *Lithostegia farinata* Hufn. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 144 (in Czech).
630. SILBERNAGEL A. 1943: Několik nových forem Macrolepidopter z Čech. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 40: 1-7 (in Czech).
631. SILBERNAGEL A. 1943: Die ostasiatische Art *Bembecia pectinata* Stgr. hat auch in Europa das Heimatrecht. *Ztschr. Wien. Entomol. Ges.*, 28: 145-148.
632. SILBERNAGEL A. 1944: Další nové formy Macrolepidopter z Čech. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 41: 12-17 (in Czech).
633. SILBERNAGEL A. 1944: Další nová nesytka z Čech - *Chamaesphesia bibioniformis* Esp. (Macrolepidoptera). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 41: 40-42 (in Czech).
634. SITEK J. 1994: Faunistic records from the Czech Republic - 19. Lepidoptera: Tineidae, Gelechiidae, Pyralidae. *Klapalekiana*, 30: 207-208.

635. SKALA H. 1913: Die Lepidopterenfauna Mährens. II. *Verh. Naturforsch. Ver. in Brünn*, 51: 115-377.
636. SKALA H. 1929: Federmotten in der ehem. öst.-ung. Monarchie. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 43: 197-198.
637. SKALA H. 1930: Zur Verbreitung der Gracillariidae im früheren Österr.-Ungarn. *Soc. Entomol.*, 45: 6.
638. SKALA H. 1930: Zum Prodnomus der Schmetterlingsfauna Böhmens von Dr. Jakob Sterneck (der Wahrheit zur Ehre). *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 44: 98.
639. SKALA H. 1932: Die wichtigsten Neuentdeckungen an Grossschmetterlingen aus dem Gebiet der ehemal. österr.-ungar. Monarchie. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 45: 97-100, 114-119.
640. SKALA H. 1936-1937: Minen aus Mittel- und Südeuropa. *Ztschr. Österr. Entomol. Ver.*, 21: 78-79, 22: 10-11, 19-20.
641. SKALA H. 1939: Miner in deutschen Landen. *Ztschr. Österr. Entomol. Ver.*, 24: 27-30, 43-45, 62-64, 91-95, 111-112, 125-128, 138-144, 149-152.
642. SKUHRAVÝ V. 1976: Bionomie und Schädlichkeit der Eule *Archana geminipuncta* (Lepidoptera, Noctuidae) an Schilf *Phragmites communis*. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 73: 209-215.
643. SKUHRAVÝ V. 1979: Gradace obaleče modřínového v Jizerských horách a Krkonoších. *Památky a Příroda*, 14: 358-360 (in Czech).
644. SKUHRAVÝ V. 1980: Gradation der Fichtenform des Grauen Lärchenwicklers *Zeiraphera diniana* Gn. in Nordostböhmen (Lep., Tortricidae). *Acta Mus. Reginaehradecensis*, 8(Suppl.): 111-113.
645. SKUHRAVÝ V. 1981: Obaleč modřínový a jeho současná problematika. *Památky a Příroda*, 16: 36-40 (in Czech).
646. SKUHRAVÝ V. 1983: Obaleč modřínový a životní prostředí. *Naši Přírodou*, 3(7): 4-6 (in Czech).
647. SKUHRAVÝ V. 1983: Hroží přemnožení mnišky? *Naši Přírodou*, 3(6): 18-20 (in Czech).
648. SKUHRAVÝ V. & HOCHMUT R. 1979: Výskyt bekyně mnišky v ČSR sledovaný pomocí feromonových pastí. *Lesnická Práce*, 58: 459-462 (in Czech).
649. SKUHRAVÝ V. & HOCHMUT R. 1980: Monitoring of the nun moth, *Lymantria monacha*, in Czechoslovakia using pheromone traps (Lepidoptera, Lymantriidae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 77: 426-429.
650. SKUHRAVÝ V. & HOCHMUT R. 1984: Výskyt bekyně mnišky a obaleče modřínového v ČSR v roce 1983. *Lesnická Práce*, 63: 153-156 (in Czech).
651. SKUHRAVÝ V. & NOVÁK K. 1993: *Dichelonia* (Parasynthemis) *histrionana* (Lepidoptera: Tortricidae) ve feromonových pastech v šumavské klimaxové smrčíně. *Klapalekiana*, 29: 49-50 (in Czech, English summ.).
652. SKUHRAVÝ V., NOVÁK K. & STARÝ P. 1959: Entomofauna jetele (*Trifolium pratense* L.) a její vývoj. *Rozpravy ČSAV, Řada Matem. a Přír. Věd*, 69(7): 1-82 (in Czech).
653. SKUHRAVÝ V. & ZUMR V. 1978: Zur Migration der Nonnenmännchen (*Lymantria monacha* L.) untersucht durch Markierung und Fang an Pheromon-Lockfallen. *Anzeiger Schädlingsk. Pfl.-Umweltschutz*, 51: 39-42.
654. SKUHRAVÝ V., & ZUMR V. 1981: Nocturnal and seasonal flight activity of the nun moth *Lymantria monacha* L. (Lepidoptera, Lymantriidae) as determined by pheromone and light traps. *Ztschr. Angew. Entomol.*, 92: 315-319.
655. SKUHRAVÝ V., ŽDÁREK J. & VRKOČ J. 1981: Obaleč modřínový po stošestnácté. *Vesmír*, 60: 99-102 (in Czech).
656. SKUPINA PRAŽSKÝCH LEPIDOPTEROLOGŮ 1935: Příspěvek k poznání fauny Lepidopter Československa. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 63-65 (in Czech).
657. SKUPINA PRAŽSKÝCH LEPIDOPTEROLOGŮ 1937: II. příspěvek k poznání fauny Lepidopter Československa. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 34: 39-40 (in Czech).
658. SKYVA J. 1987: Koridor Záběhlce - Hostivař. Lepidoptera, pp. 97-112. In: *Sbor. Přírodověd. Produktů. Arch. Materiálů a Informací*, Praha (in Czech).
659. SKYVA J. & MAREK J. 1989: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Pterophoridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 86: 478.
660. SLABÝ O. 1944: Některé zajímavosti z kladenských sbírek (Macrolepidoptera). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 41: 107-109 (in Czech).
661. SLABÝ O. 1948: Jak tráví celulosu housenky dřvopleňů a některých našich nesetek. *Věst. Čs. Zool. Společ.*, 12: 184-209 (in Czech).
662. SLABÝ O. 1948: O několika zajímavějších Rhopalocerách z Orlických hor. (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 45: 94-98 (in Czech).
663. SLABÝ O. 1949: Faunistické papěrky z Čech. (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 46: 65-72 (in Czech).
664. SLABÝ O. 1951: Píďalka *Poecilopsis isabellae* Harr. a otázky spojené s jejím výskytem. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 90-94 (in Czech).
665. SLABÝ O. 1951: O pohlavním dimorfismu druhu *Xylomania conspiciatilis* L. a o výskytu jeho typické formy v západních Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 187-190 (in Czech).
666. SLABÝ O. 1951: O vlivu klimatických cyklů na migraci motýlů a na motýlí zvířenu Čech. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 242-253 (in Czech, English summ.).
667. SLABÝ O. 1954: *Parastichtis illyria* Fr. v západních Čechách a problém jejího výskytu a původu. (Lep., Noctuidae). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 51: 193-196 (in Czech).
668. SLABÝ O. 1963: Über analoge Verhältnisse des verschiedenen Ursprungs der Fauna der Art *Parnassius apollo* (L.) in Nord- und Mitteleuropa. *Entomol. Tidskrift*, 84: 5-8.

669. SLABÝ O. 1987: *Zygaena ephialtes* L. v západních Čechách a její vztah k její celkové fauně (Lepidoptera, Zygaenidae). *Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň*, 34-35: 23-26 (in Czech).
670. SLAMKA F. 1995: *Die Zünslerfalter (Pyraloidea) Mitteleuropas*. Selbstverlag in Prunella Poprad-Tatry, Bratislava, 112 pp.
671. SLAMKA F. & SVOBODA V. 1993: Revision der Dickkopffalter *Spialia sertorius* (Hoffmansegg, 1804) und *Spialia orbifer* (Hubner, 1813) (Lep. Hesperidae). *Biologie (Bratislava)*, 48: 561-566.
672. SLÍPKA J. 1942-1943: Vakonoši - Psychidae. *Vesmír*, 21: 187 (in Czech).
673. SLÍPKA J. 1944: Massenaufreten von *Venilia macularia* L., *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 57: 48.
674. SLÍPKA J. 1946: Lepidoptera z okolí Kladna. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 43: 76-78 (in Czech).
675. SMOLÁK J. 1922: Housenčí hnízda bekyně zlatofitné na ovocných stromech. *Ochrana Rostlin*, 2(1): 11-12 (in Czech).
676. SOFFNER J. 1925: *Crambus truncatellus* im Böhmerwalde. *D. Entomol. Ztschr. Iris (Dresden)*, 33: 209-210.
677. SOFFNER J. 1928: O *Tephroclystis* okolí sušického. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 25: 33-40 (in Czech).
678. SOFFNER J. 1930: Zur Schmetterlingsfauna des mittleren Böhmerwaldes. *Mitt. Münch. Entomol. Ges.*, 20: 115-132.
679. SOFFNER J. 1938: O motýlech sušického okresu, pp. 45-46. In: *Sbor. Sušicka. Vlastivědné Dílo*. Okresní osvětový sbor v Sušici, Sušice, 450 pp. (in Czech).
680. SOFFNER J. 1939: Ein „neuer“ Schmetterling Grossdeutschlands. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 52: 343-344.
681. SOFFNER J. 1956: Die mitteleuropäischen Phycitinae (Microlepidoptera). *Mitt. Münch. Entomol. Ges.*, 46: 61-81.
682. SOFFNER J. 1960: Schmetterlinge aus dem Riesengebirge. *Ztschr. Wien. Entomol. Ges.*, 45: 70-91.
683. SOFFNER J. 1967: *Erebia epiphron silesiana* im Riesengebirge. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a. M.)*, 77: 125-128.
684. SOFFNER J. 1974: K výskytu chladnomilných motýlů (Lepidoptera) na Šumavě. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 14: 129-131 (in Czech).
685. SOLDÁT M. 1968: Přezimování kukly lišaje svlačcového (*Herse convolvuli* L.). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 4: 2-3 (in Czech).
686. SOLDÁT M. 1969: Výsledky sledování tahů lišajů *Herse convolvuli* (L.), *Acherontia atropos* (L.) a *Daphnis nerii* (L.) na území Československa v r. 1967. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 5: 31-33 (in Czech, German summ.).
687. SOLDÁT M. 1971: Výsledek sledování tažných lišajů *Herse convolvuli* L., *Acherontia atropos* L. a *Daphnis nerii* L. na území Československa v roce 1970. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 7: 61-63 (in Czech).
688. SOLDÁT M. 1978: Fauna denních motýlů (Rhopalocera) Karlštejska. *Bohemia Centralis*, 7: 163-169 (in Czech).
689. SOLDÁT M. 1980: Motýlí fauna Týnce nad Sázavou a jeho okolí. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 16: 65-96 (in Czech).
690. SOLDÁT M. 1982: Motýlí fauna Týnce nad Sázavou a jeho okolí. První dodatek. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 18: 83-86 (in Czech).
691. SOLDÁT M. 1983: Motýlí fauna Týnce nad Sázavou a jeho okolí (Lepidoptera) - Druhý dodatek. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 19: 13-14 (in Czech).
692. SOLDÁT M. 1984: Motýlí fauna Týnce nad Sázavou a jeho okolí (Lepidoptera). Třetí dodatek. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 20: 133-134 (in Czech).
693. SOLDÁT M. 1987: Červená kniha ČSR, Motýli - Lepidoptera. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 23: 1-36 (in Czech).
694. SOLDÁT M., FELIX V. & PIPEK P. 1978: Zpráva o pozorování tažných motýlů v Československu v letech 1972-74, 1975 a 1976. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 14: 41-92 (in Czech).
695. SOLDÁT M. & STARÝ B. 1978: Fauna drobných motýlů Karlštejska. *Bohemia Centralis*, 7: 105-149 (in Czech).
696. SPITZER K. 1958: K výskytu a bionomii *Neptis coenobita* Stoll. subsp. *innominata* Lewis v jižních Čechách (Lep., Nymphalidae). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 55: 298-299 (in Czech).
697. SPITZER K. 1960: K výskytu motýlů v jihovýchodních Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 57: 91-92 (in Czech).
698. SPITZER K. 1962: Příspěvek k poznání můrovitých okolí Jindřichova Hradce (Lep., Noctuidae). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 59: 285-289 (in Czech).
699. SPITZER K. 1964: Rhopalocera na Jindřichohradecku. (Rhopalocera in der Umgebung von Jindřichův Hradec). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 4: 133-138 (in Czech, German summ.).
700. SPITZER K. 1966: Předběžná entomogeografická charakteristika fauny lepidopter jižních Čech, pp. 327-335. In: TESÁŘ Z. (ed.): *II. Entomol. Symposium - Opava*. Slezské Museum, Opava, 310 pp. (in Czech).
701. SPITZER K. 1966: Zpráva o zahájení entomologického výzkumu rašeliníště Mrtvý luh. *Zprav. CHKO Šumava*, 4: 23-25 (in Czech).
702. SPITZER K. 1967: Doplňky k výzkumu fauny Noctuid jižních Čech. (Nachtrag zur Erforschung der Noctuidenfauna Südböhmens). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 7: 1-7 (in Czech, German summ.).
703. SPITZER K. 1967: Zavřec *Palpita unionalis* Hb. (Pyraustidae) v jižních Čechách. (Lepidoptera). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 1: 68 (in Czech).
704. SPITZER K. 1968: Zur Auffassung der sibirischen Faunenelemente und des Ursprungs tyrphobionter Lepidopteren der mitteleuropäischen Hochmoore. *Abh. Ber. Naturkde. Mus. Görlitz*, 44: 55-58.
705. SPITZER K. 1969: Motýlí fauna našich rašeliníšť. *Živa*, 17: 101-103 (in Czech).
706. SPITZER K. 1970: Příspěvek k poznání imaginální aktivity osenice ypsilonové - *Scotia ipsilon* Hufnagel (Noctuidae, Lepidoptera). *Sbor. VŠZ v Praze, Provozně Ekonom. Fakulty v Čes. Budějovicích*, 396: 329-338 (in Czech).

707. SPITZER K. 1972: Seasonal adult activity of *Scotia ipsilon* Hfn. (Lepidoptera, Noctuidae) in Bohemia. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 69: 396-400.
708. SPITZER K. 1974: K výzkumu fauny motýlů (Lepidoptera) státní přírodní rezervace Jezerní sláť. *Šumava (Vimperk)*, 4: 6-8 (in Czech).
709. SPITZER K. 1974: Chemizační vlivy na ekosystémy a evoluce industriálního melanismu u Lepidopter. *Acta Univ. Palackianae Olomouensis Fac. Rer. Natur., Ser. Biol.* 47: 297-301 (in Czech).
710. SPITZER K. 1975: Zum zoogeographisch - ökologischen Begriff der südböhmischen Hochmoore, pp. 293-298. In: MALICKY H. (ed.): *Verh. des VI. Intern. Symp. über Entomofaunistik in Mitteleuropa 1975, Lunz a. S. V.* Junk, The Hague, 380 pp.
711. SPITZER K. 1976: K zoogeograficko - ekologickému pojetí jihočeských rašeliníšť. *Zpr. Čs. Společ. Zool. ČSAV*, 7-9: 25-28 (in Czech).
712. SPITZER K. 1976: Doplnky k výzkumu fauny čeledi Noctuidae (Lepidoptera) v jižních Čechách. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích - Přír. Vědy*, 16: 31-39 (in Czech).
713. SPITZER K. 1976: Můra *Scoliopteryx libatrix* (L.) (Lepidoptera, Noctuidae) nabobádávající plody bezu černého (*Sambucus nigra* L.). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 12: 111-113 (in Czech).
714. SPITZER K. 1977: Severská fauna našich rašeliníšť. *Vesmír*, 56: 138-143 (in Czech).
715. SPITZER K. 1978: Rašeliníště jako ostrovní ekosystémy Třeboňská, pp. 257-262. In: JENÍK J. & PŘIBIL S. (eds.): *Ekologie a ekonomika Třeboňská*. Botanický ústav ČSAV, Třeboň, 470 pp (in Czech).
716. SPITZER K. 1978: Příspěvek k synekologii motýlů (Lepidoptera) lučních společenstev v jižních Čechách. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 18: 37-47 (in Czech).
717. SPITZER K. 1979: Neobvyklé poškození zahradních plodin housenkami můrovitých (Noctuidae). *Sbor. ÚVTIZ - Ochrana Rostlin*, 15: 155-156 (in Czech).
718. SPITZER K. 1979: Využití světelných lapačů při studiu motýlů (Lepidoptera) v biocenózách ovocných sadů, pp. 69-71. In: HRDÝ I. & HRDLÍČKOVÁ H. (eds.): *Sbor. Symp. „Integr. Ochrana Ovoc. Sadů“, Vodňany*. Entomol. ústav ČSAV, České Budějovice, 125 pp (in Czech).
719. SPITZER K. 1980: Jak přežívá borealpinní fauna motýlů na Šumavě. *Šumava (Vimperk)*, 13: 3-4 (in Czech).
720. SPITZER K. 1980: The Šumava Mountains as an environment for montane and alpine Lepidoptera. *Acta Musei Reginae-hradecensis*, 8(Suppl.): 114-118.
721. SPITZER K. 1981: Ökologie und Biogeographie der bedrohten Schmetterlinge der südböhmischen Hochmoore. *Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.*, 21: 125-131.
722. SPITZER K. 1988: The ecology and distribution of *Pediasia truncatella* (Zett.) (Pyralidae, Lepidoptera) in the Bohemian forest mountains. *Stapfia*, 16: 301-307.
723. SPITZER K. 1989: Bionomic strategies of Lepidoptera and their bioindicator value, pp. 147-148. In: BOHÁČ J. & RŮŽIČKA V. (eds.): *Proc. Vth Intern. Conf. „Bioindicators Deteriorisationis Regionis“*. Entomol. ústav ČSAV, Čes. Budějovice, 432 pp.
724. SPITZER K. 1992: Biogeographical and ecological features of Central European peat bogs: the habitat island approach, pp. 17-18. In: FINLAYSON M. (ed.): *Integrated management and conservation of wetlands in agricultural and forested landscapes*, 22. *Proceedings of workshop Třeboň, Czechoslovakia, 25-31 March 1992*. The International Waterflow and Wetlands Research Bureau Slimbridge, Gloucester (UK), 104 pp.
725. SPITZER K. & EBENHÖH J. 1967: Glaciální relikt z čeledi Noctuidae (Lepidoptera) nové pro faunu Šumavy. *Zprav. CHKO Šumava*, 5: 10-16 (in Czech).
726. SPITZER K. & HAVEL L. 1985: Erbe der Eiszeit, Hochmoor-Insekten im Böhmerwald. *National Park (Grafenau)*, 47(2): 40-42.
727. SPITZER K. & JAROŠ J. 1983: K výskytu pídalky *Eupithecia gelidata* Möschl. ssp. *hyperboreata* Stgr. (Lepidoptera) na rašeliníšti Červené blato v jižních Čechách. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 23: 95-98 (in Czech).
728. SPITZER K. & JAROŠ J. 1985: SPR Červené blato: ochrana rašeliníštní entomofauny. *Památky a Příroda*, 10: 42-44 (in Czech).
729. SPITZER K. & JAROŠ J. 1985: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Pyralidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 82: 153.
730. SPITZER K. & JAROŠ J. 1986: Zur Lebensweise von *Eupithecia gelidata* Möschler, 1860 (Lep.: Geometridae) - ein Relikt-Vorkommen in einem Hochmoor in Südböhmen. *Neue Entomol. Nachr.*, 19: 25-30.
731. SPITZER K. & JAROŠ J. 1986: Historický posun ve škodlivosti motýlů (Lepidoptera) na ovocných dřevinách v jižních Čechách, pp. 136-137. In: HRDÝ I. & HRDLÍČKOVÁ H. (eds.): *Sbor. Symp. „Integr. Produkce Ovoce, 1984“*. Entomol. ústav ČSAV, České Budějovice, 183 pp. (in Czech).
732. SPITZER K. & JAROŠ J. 1988: Rašeliníštní populace drobnušky *Nola aerugula* (Hübner, 1793) (Nolidae, Lepidoptera) v jižních Čechách. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 28: 41-43 (in Czech).
733. SPITZER K. & JAROŠ J. 1990: Borealpinní můra *Xestia alpicola* (Zetterstedt, 1839) na Šumavě (Noctuidae, Lepidoptera). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 30: 13-14 (in Czech).

734. SPITZER K. & JAROŠ J. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Noctuidae: Autographa buraetica (Staudinger, 1892). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 89: 315.
735. SPITZER K. & JAROŠ J. 1993: Lepidoptera associated with the Červené Blato bog (Central Europe): Conservation implications. *Eur. J. Entomol.*, 90: 323-336.
736. -
737. SPITZER K. & JAROŠ J. 1997: Biodiversität der Schmetterlinge der Šumava/Böhmerwald-Berge: böhmischer Teil (CZ) (Insecta: Lepidoptera). *Beitr. zur Bayer. Entomofaun.*, 2: 119-124.
738. SPITZER K., JAROŠ J., LICHTENBERGER F. & MALICKY H. 1996: Die Biodiversität der Schmetterlingsfauna des Pürgschachenmoores im steirischen Ennstal und ihr Schutzwert. *Ztschr. Arb. Gem. Österr. Entomol.*, 48: 87-97.
739. SPITZER K., JAROŠ J. & SVENSSON I. 1991: Geographical variation in food plant selection of Eupithecia gelidata Möschler, 1860 (Lepidoptera, Geometridae). *Entomol. Fennica*, 2: 33-36.
740. SPITZER K. & LEPS J. 1988: Determinants of temporal variation in moth abundance. *Oikos*, 53: 31-36.
741. SPITZER K. & LEPS J. 1992: Bionomic strategies in Lepidoptera, risk of extinction and nature conservation projects. *Nota Lepidopt.*, 4: 81-85.
742. SPITZER K. & NOVÁK I. 1969: Eugraphe subrosea Steph. (Lep., Noctuidae) in Böhmen und zoogeographische Bemerkungen über den Ursprung ihrer gegenwärtigen Verbreitung in Europa. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 66: 109-114.
743. SPITZER K., NOVÁK I. & ELSNER G. 1983: K výskytu borealpinní můry Xestia (Anomogyna) rhaetica (Stgr) na Šumavě (Lep., Noctuidae). *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 23: 66 (in Czech).
744. SPITZER K. & REJMÁNEK M. 1980: Hospodářsky významné druhy čeledi Noctuidae z hlediska r a K selekční strategie. (Noctuidae (Lepidoptera) associated with agro-ecosystems: r- and K-selection strategy), pp. 241-242. In: ŠEBESTA J. (ed.): *VIII. Čs. Konf. Ochr. Rostlin, Praha. VÚRV, Praha*, 394 + 466 pp. (in Czech and English).
745. SPITZER K., REJMÁNEK M. & SOLDÁN T. 1984: The fecundity and long-term variability in abundance of noctuid moths (Lepidoptera, Noctuidae). *Oecologia*, 62: 91-93.
746. SPITZER K. & ZUMR V. 1982: K evoluci rašeliništní entomofauny s úzkou vazbou na borovici blatku (Pinus rotundata Link.) v jižních Čechách. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 22: 93-96 (in Czech).
747. STARÝ B. 1933: Vzácné úlovky motýlů na Vlašsku. *Příroda*, 1933: 91 (in Czech).
748. STARÝ B. 1939-1940: Škůdce pražských černých topolů. *Naši Přírodou*, 3: 43-44 (in Czech).
749. STARÝ B. 1940-1941: Tahy bělácka zelného. *Vesmír*, 19: 52-53 (in Czech).
750. STARÝ J. & MAREK J. 1966: Příspěvek k faunistice můrovitých Československa (Lepidoptera, Noctuidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 2: 77-92 (in Czech).
751. STEPPAN R. 1934: Gibt es bei uns eine zweite Generation des Zitronenfalters (Gonepteryx rhamni)? *Natur und Heimat*, 5: 61.
752. STERNECK J. 1932: Agrotis senna Hb. in Böhmen aufgefunden. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 46: 10-11.
753. STERNECK J. 1934: Palimpsestis or ab. albingensis Warnecke zdomácnělá v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 31: 24-25 (in Czech).
754. STERNECK J. 1937: České druhy rodu Toxocampa Guen. (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 34: 74-77 (in Czech).
755. STERNECK J. 1931: Zum Prodomus der Schmetterlingsfauna Böhmens von Dr. J. Sterneck. Der Wahrheit zur Ehre von Hugo Skala. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 44: 138-139, 200.
756. STERNECK J. 1940: Bemerkungen über Vanessa urticae ssp. ichnusa Bon. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 53: 83-85.
757. STIOVA L. 1984: Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) na území Čech a Moravy (Lepidoptera, Papilionidae). (Parnassius mnemosyne im Gebiet der ČSR (Lepidoptera, Papilionidae). *Čas. Slez. Muz. Opava (A)*, 33: 73-85 (in Czech, German and Russian summ.).
758. STRANSKY F. 1936: Aus dem Riesengebirge. *Natur und Heimat*, 7: 107.
759. STREJČEK J. 1985: Hmyz skalních stepí a lesostepí v Praze, pp. 121-150. In: KUBÍKOVÁ J. & PODZEMSKÝ O. (eds.): *Staletá Praha XV. Přírodovědný význam Prahy. Sbor. Pražského Střediska SPPOP. Panorama, Praha*, 304 pp. (in Czech).
760. SÜSSNER L. 1943: Caradrina pulmonaris Esp., ein Neufund aus Böhmen. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 56: 28-30.
761. SÜSSNER L. 1944: Ein Lycaena ismenias Meig. Zwitter. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 57: 153-154.
762. SUTTER R. 1988: Stenoptilia annadactyla sp. n. Lepidoptera. Pterophoridae. *Reichenbachia (Dresden)*, 25(37): 181-184.
763. SVOBODOVÁ Z., STAŇKOVÁ T. & SVOBODA O. 1987: Motýli (Lepidoptera) státní přírodní rezervace Soos. *Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír. (Plzeň)*, 34-35: 37-52 (in Czech).
764. SYROVÁTKA O. 1988: Proč se stal obaleč modřínový škůdcem? *Vesmír*, 67: 547-550 (in Czech).
765. ŠACHL J. 1979: Euphydryas maturna (L.) opět v Čechách. *Čas. Nár. Muz. Řada Přírodověd.*, 148(2): 102-103 (in Czech).
766. ŠACHL J. 1989: Martináč hrušňový na Poděbradsku. *Vlastivěd. Zprav. Polabí (Poděbrady)*, 29: 75-77 (in Czech).
767. ŠACHLOVÁ R. & ŠACHL J. 1969: Příspěvek k poznání denních motýlů Poděbradska. *Acta Mus. Reginaehradecensis, Ser. A, Sci. Natur.*, 10: 63-76 (in Czech).
768. ŠÁMAL J. 1930: Dva zajímaví škůdce našich poživatin. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 27: 100-101 (in Czech).
769. ŠÁMAL J. 1938: Zvířena Sušicka, pp. 36-44. In: *Sbor. Sušicka. Vlastivědné Dílo. Okresní osvětový sbor v Sušici, Sušice*, 450 pp (in Czech).

770. ŠEDIVÝ J. 1958: Boj proti můře luční (*Charaearas graminis* L.) v botanických rezervacích. *Ochrana Přírody*, 13: 23 (in Czech).
771. ŠEDIVÝ J. 1959: Einfluß der chemischen Bekämpfung auf die Entomophagen in der Zeit der Graseulen-Kalamität (*Charaearas graminis*), pp. 503-509. In: WEISER J. (ed.): *Trans. I. Int. Conf. Insect Path. and Biol. Control, Praha*. SAV, Bratislava, 656 pp.
772. ŠEDIVÝ J. 1959: Přemnožení můry luční na horských loukách v Čechách. *Za Vysokou Úrodu*, 7: 151-152 (in Czech).
773. ŠEDIVÝ J. 1961: Přirození nepřátelé housenek nesytiky rybízové (*Aegeria tipuliformis* Clerck). *Zool. Listy*, 10: 345-350 (in Czech).
774. ŠEDIVÝ J. 1965: Příspěvek k poznání hostitelů lumků I. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 1: 6-12 (in Czech).
775. ŠEDIVÝ J. 1967: Příspěvek k poznání hostitelů lumků (Hym. Ichn.) II. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 3: 5-11 (in Czech, English summ.).
- 775a. ŠEDIVÝ J. 1969: Druhy podčeledi Cremastinae v Československu (Hym. Ichneumonidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 5: 34-46 (in Czech, German summ.).
776. ŠEDIVÝ J. 1969: Die Ursachen von Massenvermehrungen der Graseule (*Cerapteryx graminis* Linné) im Erzgebirge, pp. 355-363. In: FANKHÄNEL H. & MORGE G.: *Bericht über die 10. Wanderversammlung Dtsch. Entomologen 15.-19.9.1965 in Dresden. Tagungsber. Nr. 80. Teil I.-III.* Dtsch. Akad. Landw. Wiss., Berlin, 622 pp.
777. ŠEDIVÝ J. 1972: Výskyt obaleče jablečného (*Carpocapsa pomonella* L.) v jabloňovém sadu a hodnocení ochranných opatření, pp. 193-201. In: DIRLBEK J. (ed.): *Sbor. Věd. Prací ze IV. Celostát. Konf. o Ochr. Rostlin, Bratislava*. Ústav věd. tech. inf., Praha, 503 pp (in Czech).
778. ŠEDIVÝ J. 1975: Wachstum der Raupen des Ringelspinners (*Malacosoma neustria* L.) auf verschiedenen Wirtspflanzen. *Věd. Práce VÚRV*, 20: 121-127.
779. ŠEDIVÝ J. 1978: Skupinový efekt u housenek bourovce prstěncivého (*Malacosoma neustria* L.). *Sbor. ÚVTIZ - Ochrana Rostlin*, 14: 139-144 (in Czech).
780. ŠEDIVÝ J. 1986: The hosts of ichneumon flies in Europe (Hymenoptera, Ichneumonidae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 83: 10-23.
781. ŠEDIVÝ J. & KODYS F. 1959: K bionomii a škodlivosti nesytiky rybízové (*Aegeria tipuliformis* Clerck). *Zool. Listy (Brno)*, 8: 97-104 (in Czech).
782. ŠEDIVÝ J. & KODYS F. 1962: Prognóza a signalizace - základ boje proti obaleči jablečnému. *Věd. Práce ÚVÚRV v Praze-Ruzyni*, 1962: 197-220 (in Czech).
783. ŠEDIVÝ J., KODYS F. & HOSTOUNSKÝ Z. 1958: Příspěvek k poznání, škodlivosti a ochraně proti obaleči jablečnému (*Ernarmonia pomonella* L.). *Rostl. Výroba*, 31: 411-420 (in Czech).
784. ŠEDIVÝ J. & SUCHÁNEK A. 1978: Škodlivost obaleče hrachového (*Laspeyresia nigricana* F.) na čočce jedlé. *Sbor. ÚVTIZ - Ochrana Rostlin*, 14: 191-196 (in Czech).
785. ŠEDÝ E. 1894: Údolí Vůznice. *Vesmír*, 23: 185-187 (in Czech).
786. ŠIFNER F. 1980: Skladištní škůdci čeledi zavjetečovitých (Pyralidae) a jejich rozšíření v potravinářském průmyslu. *Potravinářské aktuality, příloha „VÚPP Informuje“*, 5: 1-9 (in Czech).
787. ŠIFNER F. 1982: Feromony v boji proti skladištním škůdcům - zavjetečům. *Hospodářský Zprav.*, 14(8): 7 (in Czech).
788. ŠIFNER F. & ŽDÁREK J. 1982: Monitoring of stored food moth (Lepidoptera, Pyralidae) in Czechoslovakia by means of pheromone traps. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 79: 112-122.
789. ŠIFNER F. & ŽDÁREK J. 1982: Použití syntetického feromonu k signalizaci, výskytu a boji proti škodlivým druhům zavjetečů, pp. 57-59. In: VANEKOVÁ Z. (ed.): *Sbor. Ref. XXV. Dňov Novej Techniky, Chémia Soc. Polnohospodárstvu. Príroda*, Bratislava, 90 pp (in Czech).
790. ŠIFNER F., ŽDÁREK J., HRDÝ I. & KALVODA L. 1983: Pheromone traps for the pest management of phycitid moths. *Crop Protection*, 2: 463-472.
791. ŠKAPEC L. (ed.) 1992: *Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR*, 3. Bezobratlí. Příroda, Bratislava, 160 pp (in Czech).
792. ŠKODA A. & FRANK P. 1996: Bekyně mniška v brdských lesích neuspěla. *Lesnická Práce*, 75: 397-399 (in Czech).
793. ŠMELHAUS J. 1943: *Zygaena purpuralis* Brünnich f. *grossmanni* Rühl. v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 40: 59 (in Czech).
794. ŠMELHAUS J. 1946: *Apatura ilia* Schiff. (Rhopaloc., Lepidopt.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 43: 91 (in Czech).
795. ŠMELHAUS J. 1947: *Polyommatus meleager* Esp. X *P. coridon* Poda (Lep., Lyc.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 44: 44-47 (in Czech).
796. ŠMELHAUS J. 1948: K poznání nesytiky Čech (Lepidoptera, Sesiidae). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 45: 127-128 (in Czech).
797. ŠMELHAUS J. 1949: *Cupido decoloratus* (Stgr.) a *C. alcetas* Hffsg. v Československu. *Entomol. Listy (Brno)*, 12: 41-43 (in Czech).
798. ŠMELHAUS J. 1965: *Eupithecia impurata* (Hb.) zjištěna v Čechách a další poznámky o rodu *Eupithecia* (Geometridae, Lep.). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 1(1): 7-10 (in Czech).
799. ŠMELHAUS J. 1965: *Cucullia fraudatrix* Ev. v Čechách a na Moravě. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 1(4): 17 (in Czech).

800. ŠMELHAUS J. 1965: Zjišťování výskytu smrtihlava (*Acherontia atropos* L.) u nás. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 1(2): 16 (in Czech).
801. ŠPAČEK K. 1930: Entomologische Beobachtungen aus dem Riesengebirge im Jahre 1929. *Int. Entomol. Ztschr.*, 23: 337-338.
802. ŠPAČEK K. 1933: Nálezy nesytke v okolí Trutnovském. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 30: 43 (in Czech).
803. ŠPATENKA K. 1983: *Synanthedon soffneri* sp. n. (Lepidoptera, Sesiidae) aus der Tschechoslowakei. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 80: 297-303.
804. ŠPATENKA K. 1984: Nový druh motýla ze Šumavy - nesytka Soffnerova. *Živa*, 32: 142-143 (in Czech).
805. ŠPATENKA K. & LAŠTŮVKA Z. 1990: Zur Taxonomie von *Bembecia scopigera* (Scopoli, 1763), *B. ichneumoniformis* (Denis et Schiffermüller, 1775) und *B. albanensis* (Rebel, 1918), (Lepidoptera, Sesiidae). *Entomofauna (Bratislava)*, 11: 109-121.
806. ŠPATENKA K. & TESÁŘ F. 1980: Nesytkovití (Sesiidae, Lepidoptera) jižních Čech. *Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy*, 20: 83-90 (in Czech).
807. ŠROT M. 1963: Škodlivé rozšíření nesytky ovádové (*Paranthrene tabaniformis* Rott) a nesytky včelové (*Aegeria apiforme* Cl.) na topolech v ČSSR. *Lesnický Čas.*, 36: 145-158 (in Czech).
808. ŠROT M. 1966: Některé poznatky z bionomie nesytky ovádové *Paranthrene tabaniformis* Rott.) v ČSSR a možnosti boje proti ní. *Práce VÚLHM*, 32: 17-41 (in Czech).
809. ŠROT M. 1969: Některé nové poznatky z bionomie nesytky včelové (*Aegeria apiformis* Cl.) v ČSSR a možnosti boje proti ní. *Práce VÚLHM*, 38: 7-24 (in Czech).
810. ŠROT M. 1969: Upozornění na nová ohniska škůdců. *Lesnická Práce*, 48: 577 (in Czech).
811. ŠROT M. 1970: Přirození nepřátelé obaleče smrkového (*Epiblema tedella* Cl.) v ČR v letech 1964-1965. *Lesnictví*, 16: 931-940 (in Czech).
812. ŠROT M. 1971: Přemnožení obaleče modřínového (*Zeiraphera diniana* Gn.) v Jizerských horách. *Lesnická Práce*, 56: 488-490 (in Czech).
813. ŠROT M. 1974: Kalamitní výskyt obaleče modřínového (*Zeiraphera diniana* Guen.) v ČR v letech 1964-1969. *Lesnictví*, 20: 241-258 (in Czech).
814. ŠROT M. 1980: Kalamitní výskyt obaleče modřínového (*Zeiraphera diniana* Gn.) v Krkonoších a v Jizerských horách. *Opera Corontica*, 17: 69-88 (in Czech).
815. ŠROT M. 1980: Bionomie obaleče modřínového. *Lesnická Práce*, 59: 508-511 (in Czech).
816. ŠROT M. & SKUHRAVÝ V. 1988: Noví hmyzí škůdci náhradních dřevin v imisních oblastech. *Lesnická Práce*, 67: 368-371 (in Czech).
817. ŠTRÁBERGER F. 1933: Některé poznatky motýlí fauny ve Veselí nad Luž. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 30: 188 (in Czech).
818. ŠTRÁBERGER F. 1946: *Endromis versicolora* L. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 43: 91 (in Czech, English summ.).
819. ŠUMPICH J. 1988: Modrásci rodu *Maculinea* van Eecke, 1915 na Českomoravské vrchovině. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 24: 61-63 (in Czech).
820. ŠUMPICH J. 1993: Některé nálezy motýlů (Lepidoptera) v severní části Českomoravské vrchoviny s ohledem na jejich ekologickou valenci I. *Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Oddíl Věd Přír. (Jihlava)*, 11: 261-272 (in Czech).
821. ŠUMPICH J. 1994: Některé poznámky k revizi sbírky motýlů p. Peška z okolí Chotěboře. *Havlíčkovobrodsko, Vlastivěd. Sbor.*, 9: 60-63 (in Czech).
822. ŠUMPICH J. 1994: Historie a současnost poznání fauny motýlů Havlíčkovobrodského regionu. *Havlíčkovobrodsko, Vlastivěd. Sbor.*, 9: 59-60 (in Czech).
823. ŠUMPICH J. 1995: Synekologické hodnocení synuzie motýlů podmáčených luk u Hlinska na Českomoravské vrchovině (Lepidoptera). (Synecological evaluation of synusia of Lepidoptera on moist meadows near Hlinsko on Czechomoravian Highlands /Lepidoptera/). *Acta Mus. Reginaehradensis, Ser. A*, 24: 71-134 (in Czech).
824. ŠUMPICH J. 1997: Faunistic records from the Czech Republic - 68. Lepidoptera: Gelechiidae, Noctuidae. *Klapalekiana*, 33: 121-122.
825. ŠUMPICH J. & DVOŘÁK M. 1995: Příspěvek k rozšíření bělásky *Leptidea reali* a žlutásky *Colias erate* na Českomoravské vrchovině (Lepidoptera, Pieridae). *Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Oddíl Věd Přír. (Jihlava)*, 12: 250-252 (in Czech).
826. ŠVESTKA M. 1969: Zkušenosti s ochranou a chemickou obranou proti mnišce v Československu v letech 1964-1968. *Lesnická Práce*, 48: 667-673 (in Czech).
827. ŠVESTKA M. 1972: Přemnožení mnišky v závislosti na prostředí vyjádřeném typologickými jednotkami. *Lesnictví*, 18: 845-854 (in Czech).
828. ŠVESTKA M. 1977: Historický výskyt jasoně *Parnassius apollo marcomanus* Kammel, 1909 v Podyjí (Lep., Papilionidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 13: 33-42 (in Czech, German summ.).
829. ŠVESTKA M. 1993: Gradace škodlivých motýlů z čeledi bekyňovitých. *Lesnická Práce*, 72: 145-147 (in Czech).
830. ŠVESTKA M. & MENTBERGER J. 1967: Kontrola a výskyt mnišky. *Lesnická Práce*, 46: 124-128 (in Czech).
831. TÁBORSKÝ I. 1986: Žlutásek borůvkový v Krušných horách. *Památky, Příroda, Život, Vlastivěd. Čtvrtletník Chomutovska*, 18: 20-21 (in Czech).

832. TÁBORSKÝ I. 1993-94: Zpráva o nových lokalitách *Colias palaeno* (L.) v Krušných horách (Lepidoptera). *Sbor. Okres. Muzea v Mostě, Řada Přírodověd.*, 15-16: 27-28 (in Czech).
833. TICHÝ O. 1936: O záchranu našich motýlů. Ochrana přírody ze stanoviska lepidopterologického. *Krása Našeho Domova*, 28: 100-102 (in Czech).
834. TITZ A. 1983: Příspěvek k poznání fauny píďalek z rodů *Eupithecia*, *Gymnoscelis*, *Chloroclystis* a *Anticollix* na území Československa. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 19: 45-55 (in Czech).
835. TOLL S. 1953: Rodzina Eupistidae Polski. *Mater. Fizjogr. Kraju*, 32: 1-293.
836. TOLMAN V. 1952: Pestrokrídlec podražcový v Čechách. *Vesmír*, 31: 237 (in Czech).
837. TRAUGOTT-OLSEN E. 1990: The *Elachista dispilella* Zeller-complex, with descriptions of ten new species (Lepidoptera: Elachistidae). *Entomol. Gaz.*, 41: 35-68.
838. TRAUGOTT-OLSEN E. 1994: Identity of *Biselachista freyi* (Staudinger, 1870) and *Biselachista occidentalis* (Frey, 1882), description of five new species (Lepidoptera: Elachistidae). *SHILAP, Revista Lepidopt.*, 22: 323-348.
839. TRAXLER L. 1990: *Amphipyra berbera* Rungs. - příspěvek k poznání bionomie druhu (Lep., Noctuidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 26: 132-134 (in Czech).
840. TREFIL B. 1967: Výskyt denních motýlů v našem okrese. (Lepidoptera - Rhopalocera) (Die Tagfalter im Kreise Mladá Boleslav). *Labor. Mus. Benátek nad Jizerou*, 3: 16-20 (in Czech, German summ.).
841. TROJAN V. 1957: Múra travní - nový velmi nebezpečný škůdce našich luk. *Za Vysokou Úrodu*, 5: 327-328 (in Czech).
842. TRONÍČEK E. 1929: O některých motýlech z Harrachova a Nového Světa. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 26: 25-29 (in Czech).
843. TRONÍČEK E. 1929: *Apamea nickerlii* Frr., trávarka Nickerlova. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 26: 93-94 (in Czech).
844. TRONÍČEK E. 1931: *Heliothis scutosa* Schiff. opět v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 28: 42-44 (in Czech).
845. TRONÍČEK E. 1931: Poznámky k *Sterneckově „Prodomu“* (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 28: 64-69 (in Czech).
846. TRONÍČEK E. 1931: *Housenka Drymonia chaonia* Hb. před kuklením. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 28: 117 (in Czech).
847. TRONÍČEK E. 1932: Další poznámky k *Sterneckově „Prodomu“*. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 29: 23-24 (in Czech).
848. TRONÍČEK E. 1934: Příspěvek k motýlí fauně severovýchodních Čech. *Věda Přírodní*, 15: 149 (in Czech).
849. TRONÍČEK E. 1934: *Oviposice Agrotis occulta* L. a *Mamestra genistae* Bkh. (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 31: 130-131 (in Czech).
850. TRONÍČEK E. 1934: Hostitelské květy sluncemilovných motýlů v horském pásmu střední Šumavy. *Věda Přírodní*, 15: 270-274, 295-299 (in Czech).
851. TRONÍČEK E. 1935: *Palimpsestis* or ab. *flavistigmata* Tutt, ab. *unimaculata* Aur. a ab. *confluens* Closs. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 124-125 (in Czech).
852. TRONÍČEK E. 1935: *Xanthia citrigo* L. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 141 (in Czech).
853. TRONÍČEK E. 1935: *Anisopteryx aceraria* Schiff. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 141 (in Czech).
854. TRONÍČEK E. 1935: *Zygaena filipendulae* L., *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 141 (in Czech).
855. TRONÍČEK E. 1935: K poznání motýlích stanovišť (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 172-178 (in Czech).
856. TRONÍČEK E. 1935: Příspěvek k motýlí fauně Šumavy. *Věda Přírodní*, 16: 200-201 (in Czech).
857. TRONÍČEK E. 1935: Drobné zprávy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 218 (in Czech).
858. TRONÍČEK E. 1935: Společnosti motýlí na *Senecio Fuchsii*. *Věda Přírodní*, 16: 253-256 (in Czech).
859. TRONÍČEK E. 1936: Drobné zprávy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 33: 93 (in Czech).
860. TRONÍČEK E. 1936: Příspěvek k poznání druhu *Coenonympha iphis* Schiff. (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 33: 58-63 (in Czech).
861. TRONÍČEK E. 1937: Poznámky o *Zygaenách*. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 34: 31 (in Czech).
862. TRONÍČEK E. 1937: *Coleophora virgaureae* Stt. (Poznámky k stanovišti nového druhu pro Čechy). *Věda Přírodní*, 18: 203 (in Czech).
863. TRONÍČEK E. 1938: Drobné zprávy: *Crocallis elinguaris* L., *Syntomis phegea* L. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 35: 62 (in Czech).
864. TRONÍČEK E. 1938: *Macroglossa stellatarum* L. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 35: 125 (in Czech).
865. TRONÍČEK E. 1939: Mravencomilné housenky našich motýlů. *Věda Přírodní*, 19: 281-282 (in Czech).
866. TRONÍČEK E. 1947: Příspěvek k poznání vakonoše *Sterrhopteryx standfussi* H. Schäf. (Lep. Psych.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 44: 135-143 (in Czech).
867. TRONÍČEK E. 1947: O příčinách výskytu housenek *Simyra nervosa* F. na zakrslých rostlinách *Euphorbia cyparissias* L. (Lep.). (Příspěvek k ekologii druhu). *Čas. Nár. Mus., Odd. Přír.*, 116: 196-199 (in Czech).
868. TRONÍČEK E. 1948: Příspěvek k ekologii soumráčníka *Carcharodus alceae* Esp. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 45: 98-100 (in Czech).
869. TRONÍČEK E. 1949: Příspěvek k poznání motýlů Československa. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 46: 50-51 (in Czech).
870. TRONÍČEK E. 1950: O pohybech vylíhlých motýlů, zvláště *Brachionycha nubeculosa* Esp. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 47: 186-192 (in Czech).
871. TRONÍČEK E. 1951: Motýli z Polabí, noví pro Čechy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 191-197 (in Czech).
872. TRONÍČEK E. 1952: Vakonoš *Bacotia sepium* Spr. v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 49: 90-92 (in Czech).

873. TRONÍČEK E. 1952: Poznámky k výskytu motýlů východních Čech. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 49: 183 (in Czech).
874. TRONÍČEK E. 1952: K společenstvu *Solenobium triquetrellae* - *Bacotia sepium* Tčk. a k ekologii *B. sepium* Spr. (Lep., Psych.). *Acta Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 28: 181-184 (in Czech).
875. TRONÍČEK E. 1953: K době trvání vajíčkového stadia motýlů. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 50: 29-52 (in Czech).
876. TRONÍČEK E. 1953: Příspěvek k ekologii motýlů. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 50: 65-66 (in Czech).
877. TRONÍČEK E. 1955: K poznání motýlů středočeského polního biotopu. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 52: 189-193 (in Czech).
878. TRONÍČEK E. 1957: Doba trvání stadia vajíčka motýlů v chovech v podmínkách v místnosti a volně venku. *Zool. Listy (Brno)*, 6: 163-168 (in Czech).
879. TYKAČ J. 1936: *Scotogramma marmorosa* Bkh. v. *microdon* Gn. v. Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 33: 16-17 (in Czech).
880. TYKAČ J. 1936: *Arctia caia* L. (Dvě zajímavé formy z Čech). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 33: 178-183 (in Czech).
881. TYKAČ J. 1938: *Rhyacia alpicola* ab. *hyperborea* Zett. v. Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 35: 94 (in Czech).
882. TYKAČ J. 1940: *Limenitis camilla* L., *Phytometra* (*Plusia*) *modesta* Hbn. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 77 (in Czech).
883. TYKAČ J. 1940: *Hadena texturata* Alph. ab. *silbernageli*. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 122-124 (in Czech).
884. TYKAČ J. 1941: *Biston betularia* L. f. *vlachi* a f. *soffneri* m.n. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 38: 53-55, 39: 124-125 (in Czech).
885. TYKAČ J. 1941: Srovnání středo- a západočeských xerofitních (stepních) útvarů. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 38: 85-96 (in Czech).
886. TYKAČ J. 1942: *Cucullia asteris* Schiffm. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 72 (in Czech).
887. TYKAČ J. 1942: *Mesotype virgata* Hufn. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 76 (in Czech).
888. TYKAČ J. 1942: *Biston betularia* L. (dodatek). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 124-125 (in Czech).
889. TYKAČ J. 1943: *Hadena texturata* Alph. subsp. *Silbernageli* (nec ab.) m.n. (dodatek). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 40: 61-64 (in Czech).
890. TYKAČ J. 1951: *Sphragis* či *sphragidoid* u motýlů. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 94-98 (in Czech).
891. URBACHN E. 1944: *Scutosa Funde* 1942 (Lep., Noct.). *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 57: 9-14.
892. URBAN J. & ŠEDIVÝ J. 1997: Faktory regulující přemnožení štětconoše ořechového (*Calliteara pudibunda*) (Lepidoptera, Lymantriidae). *Lesnictví (Forestry)*, 43: 67-78 (in Czech).
893. VÁCHA J. & POVOLNÝ D. 1983: Phenological discrimination of Central European populations of adults in sibling species *Colias hyale* and *C. australis* (Lepidoptera, Pieridae). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 80: 96-113.
894. VANĚK J. 1980: Der Abriss der Entomofauna im Riesengebirge. *Acta Mus. Reginaehradecensis*, 8(Suppl.): 136-141.
895. VÁVRA J. 1989: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera, Tineidae, Gracillariidae, Coleophoridae, Oecophoridae, Tortricidae, Geometridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 86: 312-313.
896. VÁVRA J. 1993: Nové nálezy drobných motýlů (Microlepidoptera) v CHKO Český Kras. *Bohemia Centralis*, 22: 35-49 (in Czech).
897. VÁVRA J., NOVÁK I., LIŠKA J. & SKYVA J. 1996: Motýlí fauna přírodní rezervace „Hradčanské rybníky“ u Mimoně (Lepidoptera). *Klapalekiana*, 32: 89-121 (in Czech, English summ.).
898. VÁVRA J., NOVÁK I., LIŠKA J. & SKYVA J. 1997: Motýlí fauna přírodní rezervace „Hradčanské rybníky“ v bývalém vojenském újezdu Ralsko (Lepidoptera). (Die Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) des Naturschutzgebietes „Hradčanské rybníky (Hradčany - Teiche)“ im ehemaligen Truppenübungsplatz Ralsko.) *Bezděž, Vlastivěd. Sbor. Českolipska*, 5: 379-407 (in Czech, German and English summ.).
899. VEIT A. 1937: Etwas über den Fensterfang. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 50: 97-99.
900. VIMMER A. 1928: Muži parasiti českých motýlů. III. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 25: 48-50 (in Czech).
901. VIMMER A. 1929: Další parasiti muší českých motýlů (IV.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 26: 46-47 (in Czech).
902. VIMMER A. 1930: Muži parasiti československých motýlů. V. část. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 27: 54 (in Czech).
903. VLACH V. 1933: Několik nových motýlů české fauny. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 30: 153-154 (in Czech).
904. VLACH V. 1934: Které barvy lákají hmyz? - *Laspeyresia zebeana* Rtzbg. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 31: 142 (in Czech).
905. VLACH V. 1934: *Laspeyresia woerberiana* Schiff. - *Oenophthra pilleriana* Schiff. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 31: 189 (in Czech).
906. VLACH V. 1935: K ontogenesi našich Lepidopter. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 13-14 (in Czech).
907. VLACH V. 1935: Několik pro Čechy nových Mikrolepidopter. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 22 (in Czech).
908. VLACH V. 1935: *Pamene fraxinana* Peyer, samostatný druh, u Prahy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 80-81 (in Czech).
909. VLACH V. 1935: *Gracillaria azaleella* Brands. (= *azaleae* Busck), Lep. Japonský škůdce v Praze. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 210-211 (in Czech).
910. VLACH V. 1935: Hromadný výskyt *Cacoecia murinana* Hb. v. Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 48 (in Czech).
911. VLACH V. 1935: *Oxyptilus distans* Z. - *Acalla hastiana* L. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 94-95 (in Czech).
912. VLACH V. 1935: *Sesia conopiformis* Esp., *Epicnaptera tremulifolia* Hb. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 218 (in Czech).
913. VLACH V. 1936: Mikrolepidoptera pro Čechy nová nebo pochybná. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 33: 18-19 (in Czech).
914. VLACH V. 1936: Podezřaný škůdce v Praze. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 33: 47 (in Czech).
915. VLACH V. 1936: *Carpocosa berberidella* Hd. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 33: 143 (in Czech).

916. VLACH V. 1936: *Plodia interpunctella* Hb. ve vlašských ořeších (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 33: 184-185 (in Czech, French summ.).
917. VLACH V. 1936: Drobné zprávy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 33: 93-95 (in Czech).
918. VLACH V. 1938: Příspěvek k soupisu českých Microlepidopter. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 35: 29-30 (in Czech).
919. VLACH V. 1938: Drobné zprávy: *Pyrameis cardui* L. - *Carpocapsa pomonella* L. - *Agdistis adactyla* Hb. - *Orneodes grammodactyla* L. - *Adela rufifrontella*. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 35: 61 (in Czech).
920. VLACH V. 1939: Microlepidoptera nová pro Čechy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 36: 49-50 (in Czech).
921. VLACH V. 1940: *Coleophora spiraeella* Rbl. v pražských sadech. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 36-37 (in Czech).
922. VLACH V. 1940: Příspěvek k ekologii našich Microlepidopter. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 90 (in Czech).
923. VLACH V. 1940: Nové druhy Microlepidopter pro Čechy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 94-95 (in Czech).
924. VLACH V. 1942: *Coleophora klimeschi* spec. n. (Lep., Coleophoridae). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 18-21 (in Czech).
925. VLACH V. 1942: Nové druhy Microlepidopter pro Čechy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 70-72 (in Czech).
926. VLACH V. 1942: *Tortrix viridana* L. f. *pfliegeriana*, f. nova (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 125 (in Czech).
927. VLACH V. 1942: Jak sbírat a podle vaků určovat druhy Coleophor. *Entomol. Listy (Brno)*, 5: 30-40 (in Czech).
928. VLACH V. 1942: Výskyt *Araschnia levana* L. v Čechách. *Entomol. Listy (Brno)*, 5: 126 (in Czech).
929. VLACH V. 1943: Nové druhy Mikrolepidopter pro Čechy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 40: 111-112 (in Czech).
930. VLACH V. 1947: Východoasijský druh *Bembecia pectinata* Stgr. má též v Evropě své domovské právo. (Lep. Aeger.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 44: 71-72 (in Czech).
931. VLACH V. 1949: K ekologii *Coleophora linosyris* Hering. Mikrolep. *Entomol. Listy (Brno)*, 12: 26-27 (in Czech).
932. VLACH V. 1950: K bionomii *Crobyllophora inguinatana* Hb. *Entomol. Listy (Brno)*, 13: 126-127 (in Czech).
933. VLACH V. 1950: Příspěvek k poznání našich motýlů. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 47: 60-61 (in Czech).
934. VLACH V. 1950: Další zástupci drobných motýlů, nových pro Čechy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 47: 192-193 (in Czech).
935. VLACH V. 1951: Několik vzácných drobných motýlů z okolí Prahy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 137-139 (in Czech).
936. VLACH V. 1952: Další zástupci microlepidopter nově zjištění pro Čechy. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 49: 181-183 (in Czech).
937. VOGEL A. 1937: *Lycena optileta* Kn. aus Aupa im Riesengebirge. *Ztschr. f. Entomol.*, 19: 2.
938. VOLDŘICH M. 1942: Poznámka k prodromu Čech (Caradrina/Athetis/ pulmonaris Esp. a Larentia cognata Thbg. v Čechách). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 39: 16 (in Czech).
939. VOLDŘICH M. 1963: La faune des papillons des montagnes de Šumava centrale. *Acta Faun. Entomol. Mus. Natur. Pragae*, 9: 5-55.
940. VOPRŠAL F. 1935: Obnovený nález druhu *Epizeuxis calvaria* F. v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 32: 91-93 (in Czech).
941. VOPRŠAL F. 1940: Další zajímavosti z Karlštejnska (Lep.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 37: 5-15 (in Czech).
942. VRABEC V. 1993: Lepidoptera okolí obce Zásmyky (okres Kolín) - předběžný seznam. *Polabská Příroda (Poděbrady)*, 4: 22-25 (in Czech).
943. VRABEC V. 1993: Lišajovití motýli (Sphingidae) kolínského okresu. *Muzeum a Současnost - Ser. Natur. (Roztoky u Prahy)*, 7: 79-90 (in Czech, English summ.).
944. VRABEC V. 1994: Nález aberantního jedince babočky *Polygonia c-album* (Linné, 1758) (Lepidoptera: Nymphalidae) v Libickém luhu. *Muzeum a Současnost - Ser. Natur. (Roztoky u Prahy)*, 8: 25-26 (in Czech, English summ.).
945. VRABEC V. 1994: Martináčovití motýli (Lepidoptera - Saturniidae) Kolínského okresu. *Muzeum a Současnost, Ser. Natur. (Roztoky u Prahy)*, 8: 15-24 (in Czech, English summ.).
946. VRABEC V. 1994: Příspěvek k poznání rozšíření druhu *Euphydryas maturna* (L.) (Lepidoptera Nymphalidae) v Čechách. *Muzeum a Současnost, Ser. Natur. (Roztoky u Prahy)*, 8: 7-14 (in Czech, English summ.).
947. VRABEC V. 1995: Sprpkřídlecovití motýli kolínského okresu. *Muzeum a Současnost, Ser. Natur. (Roztoky u Prahy)*, 9: 39-54 (in Czech, English summ.).
948. VRABEC V. 1996: Přástevníkovití motýli kolínského okresu a přilehlé části středního Polabí. *Muzeum a Současnost, Ser. Natur. (Roztoky u Prahy)*, 10: 15-32 (in Czech, English summ.).
949. VRABEC V. 1996: Dva nálezy kresebných aberací motýlů na území okresu Kolín. *Studie a Zprávy Okres. Mus. Praha-Východ (Brandýs n.L. - Stará Boleslav)*, 12: 176-178 (in Czech, English summ.).
950. VRABEC V. & FIALA R. 1996: Nález druhu *Colias erate* (Lepidoptera: Pieridae) na území okresů Kolín, Kutná Hora a Benešov. *Práce Mus. v Kolíně, Řada Přír.*, 2: 89-93 (in Czech, English summ.).
951. VRABEC V. & HULA S. 1994: Dva nálezy *Aglais urticae* (Lepidoptera: Nymphalidae) s výraznou kresebnou odchylkou. *Klapálekiana*, 30: 191-193 (in Czech, English summ.).
952. VRKOČ J., KALVODA L., SKUHRÁVÝ V., HOCHMUT R. & ŽDÁREK J. 1981: (Male confusion by pheromones in *Zeiraphera diniana* Gn. and *Lymantria monacha* L. in Czechoslovakia.) *Chemoreceptia Nasekomych*, 6: 130-133 (in Russian).
953. VYSOKÝ V., KLÍR J. & FUKSA M. 1987: Motýli okresu Ústí nad Labem. (Lepidoptera of the district Ústí nad Labem in North Bohemia). *Přírodovědecký Sbor. (Ústí n.L.)*, 1986(1): 1-93 (in Czech).
954. WARNECKE G. 1943: Über die Verbreitung von *Oedeia atrata* L. (Lep. Geom.) in Mitteleuropa. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a. M.)*, 56: 161-164.

955. WARNECKE G. 1944: Über die bis jetzt bekannte Verbreitung der *Ocneria detrita* Esp. (Lep. Bom.). *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 57: 121-124.
956. WARREN B. C. S. 1936: *Monograph of the Genus Erebia*. Brit. Museum (Natur. Hist.), London, 407 pp., 104 plates.
957. WEIDENHOFFER Z. 1966: Druhá generace u okáče *Hipparchia aelia* (Hffsg.) (Lep., Satyridae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 2: 61-63 (in Czech, German summ.).
958. WEISS D. 1954: Otakárek ovocný. *Živa*, 2: 100-102 (in Czech).
959. WARREN B. C. S. 1936: Paví oko hruškové (*Saturnia pyri* v ČSR. *Živa*, 2: 181-182 (in Czech).
960. WEISS D. 1955: Na pomoc mladým entomologům. *Klub, Praha*, 4: 23 (in Czech).
961. WEISS D. 1955: Ze života lyšajů. *Živa*, 3: 20-21 (in Czech).
962. WEISS D. 1955: Srovnání přástevníčka amerického s některými našimi motýlími škůdci. *Živa*, 3: 62-64 (in Czech).
963. WEISS D. 1955: Smrtihlav (*Acherontia atropos*). *Živa*, 3: 105-107 (in Czech).
964. WEISS D. 1955: Perleťovci. *Živa*, 3: 184-185 (in Czech).
965. WEISS D. 1959: Otakárek fenyklový (*Papilio machaon*). *Živa*, 7: 144-146 (in Czech).
966. WEISS D. 1960: Pestrokrídlec podražcový (*Zerynthia hysipyle*). *Živa*, 8: 24-25 (in Czech).
967. WEISS D. 1966: Zpráva o výskytu perleťovce mokřadního (*Clossiana aphiirape* (Hbn.) na Šumavě (*Rhopalocera*, *Nymphalidae*). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 2: 103-104 (in Czech, German summ.).
968. WEISS D. 1966: Příspěvek k poznání motýlů Slánska. *Čas. Nár. Mus.*, 11: 149-155 (in Czech).
969. WEISS D. 1966: Jarní lepidopterologické postřehy ze Šluknovska (*Rhopalocera*). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 2: 57-60 (in Czech, German summ.).
970. WEISS D. 1967: Perleťovec *Proclossiana eunomia* Esper, 1797 (*C. aphiirape* Hübner, 1799) v Československu (*Lepidoptera*, *Nymphalidae*). *Čas. Nár. Mus., Odd. Přír.*, 136: 195-200 (in Czech).
971. WEISS D. 1972: Perleťovec severský (*Boloria aquilonaris* Stichel, 1908) a jeho rozšíření v Československu (*Lepidoptera*, *Nymphalidae*). *Čas. Nár. Mus., Odd. Přírodověd.*, 141: 33-37 (in Czech).
972. WENZEL G. 1938: Massenvermehrung und Wanderzüge von Faltern im Jahre 1937. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 51: 281-284, 295-296, 299-301, 323-325.
973. WIHAN R. 1934-35: *Hadena maillardi* (subsp. nova?) im Riesengebirge. *Int. Entomol. Ztschr.*, 28: 194-195.
974. WICHRA J. 1944: Poznámka k prodromu Čech (*Macrolep.*). *Larentia* (*Hydrelia*) *testacea* Don. a *Calocampa* (*Cloantha*) *solidaginis* Hb. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 41: 62 (in Czech).
975. WICHRA J. 1949: Hojný výskyt vakonoše *Sterrhopteryx standfussi* H.Schäf. v Krkonoších (Lep., Psych.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 46: 73-74 (in Czech).
976. WICHRA J. 1949: Nová naleziště vzácnějších druhů motýlů v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 46: 173-180 (in Czech).
977. WICHRA J. 1965: Další nálezy vzácných *Lepidopter* v Československu. (Doplňky prodromů Čech a Slovenska, seznamu Moravy). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 1(2): 5-11 (in Czech).
978. WICHRA J. 1966: Rozšíření nesytke *Bembecia pectinata* Stgr. *Aegeria stomoxyformis* (Hb.) (Lep., Sesiidae) v okolí Prahy a bionomické poznámky. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 2: 28-31 (in Czech, German summ.).
979. WICHRA J. 1968: *Eupithecia orphnata* Bohatsch a *Eupithecia egenaria* (Hs.) (Lep., Geometridae) v Československu. *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 4: 65-66 (in Czech, German summ.).
980. WICHRA J. 1968: *Euxoa vitta* (Esp.), vzácná můra pražského okolí a *Euxoa hastifera* (Donz.), nový druh pro Československo (Lep., Noctuidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 5: 81-82 (in Czech, German summ.).
981. WOLDA H., SPITZER K. & LEPŠ J. 1992: Stability of environment and of insect populations. *Res. Popul. Ecol. (Tokyo)*, 34: 213-225.
982. WOLDA H., MAREK J., SPITZER K. & NOVÁK I. 1994: Diversity and variability of *Lepidoptera* populations in urban Brno, Czech Republic. *Eur. J. Entomol.*, 91: 213-226.
- 982a. ZAGULAJEV A. K. 1979: *Nastojaščie moli (Tineidae)*. In: STRELKOV A. A.: *Fauna SSSR, Nasekomye češuekrylye, Tom 4, Vyp. 6*. Nauka, Leningrad, 408 pp. (in Russian)
983. ZACHA V. 1972: Hrozí kalamitní výskyt bekyně zlatotřítné. *Zahrad. Listy*, 65: 48 (in Czech).
984. ZÁRUBA P. 1984: Motýlí fauna - Mnichovice u Prahy (*Lepidoptera*). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 20: 71-74 (in Czech).
985. ZÁRUBA P. 1985: Motýlí fauna jezera v Mnichovicích-Božkově. *Bohemia Centralis*, 14: 283-287 (in Czech).
986. ZÁRUBA P. 1988: *Lepidoptera* SPR Kulivá hora. *Bohemia Centr.*, 17: 249-251 (in Czech).
987. ZÁRUBA P. 1989: Vliv zbytků historických památek v chráněných územích na složení entomofauny. *Památky a Příroda*, 14: 381 (in Czech).
988. ZÁRUBA P. 1991: *Lepidoptera* navrhovaného CHÚ Tisovnice. *Bohemia Centralis*, 20: 43-49 (in Czech).
989. ZÁRUBA P. 1992: *Lepidoptero*fauna Mnichovic I. *Bohemia Centr.*, 21: 133-139 (in Czech).
990. ZÁRUBA P. 1993: Červený seznam ohrožených druhů motýlů České republiky. *Ochrana Přírody*, 48: 42-46, 84-88 (in Czech).
991. ZÁRUBA P. 1994: Zpráva o nálezu nového druhu motýla - *Lyonetia mariae* sp. n. *Bohemia Centralis*, 23: 147-150 (in Czech, German summ.).
992. ZELENÝ J. 1977: Přemnožení běláška ovocného (*Aporia crataegi*) v Čechách. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 13: 97-99 (in Czech, German summ.).

993. ZEMAN J. 1949: *Pieris napi* L. hermaphrod. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 46: 184-185 (in Czech).
994. ZEMAN J. 1951: Výskyt některých mūr v Čechách. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 48: 139-140 (in Czech).
995. ZIMMERMANN F. 1934: Interessante Kleinschmetterlinge aus dem Habsteiner Moor. *Natur und Heimat*, 5: 34-36.
996. ZIMMERMANN F. 1935: Ein interessanter Kaisermantel. *Natur und Heimat*, 6: 20.
997. ZIMMERMANN F. 1940: Eine neue Nepticulidae aus Deutschland (Lep.) *Ectoedemia liebwerdella* spec. nov. (Lep.). *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, 24: 264-265.
998. ZIMMERMANN F. 1943: Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1941 - Microlepidoptera. *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 56: 253-256.
999. ZIMMERMANN F. 1944: Zur Nepticulidenfauna des böhmischen Raumes (Lep.). *Entomol. Ztschr. (Frankfurt a.M.)*, 57: 11-14, 20-24.
1000. ZOUHAR V. 1945: *Zygaena laeta* Hb. v Praze. *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 42: 149 (in Czech).
1001. ZOUHAR V. 1947: *Colias palaeno europome* Esp. (Lepidopt.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 44: 75 (in Czech).
1002. ŽDÁREK J., VRKOČ J. & KALVODA L. 1981: (The use of pheromones in the study of seasonal and daily dynamics of the larch bud moth /*Zeiraphera diniana* Gn./). *Chemorecepcija Nasekomych*, 6: 195-208 (in Russian).
1003. ŽDÁREK J., VRKOČ J. & SKUHRAVÝ V. 1985: Outbreak of the spruce form of the larch bud moth (*Zeiraphera diniana* Guen.) in Czechoslovakia, pp. 56-60. In: BEVAN D. & STOAKLEY J. T. (eds.): *Proc. IUFRO Conf. Donnoch.*

KOLEKTIV 1953-1997: Přehled výskytu lesních hmyzích škůdců. [Übersicht des Vorkommens der Insektenschädlinge in Wäldern]. *Lesnická práce* (in Czech).

[Poznámka: Každoroční periodická zpráva o výskytu škůdců na území České republiky.

Bemerkung: Alljährliche periodische Nachricht über das Vorkommen der forstwirtschaftlichen Schädlinge auf dem Gebiet der Tschechischen Republik.]

KOLEKTIV 1955-1990: Přehled výskytu některých škodlivých činitelů rostlin na území ČSSR v roce 19.. (Übersicht über das Auftreten einiger Krankheiten und Schädlinge der Kulturpflanzen in der Tschechoslowakischen (Sozialistischen) Republik im J. 19..). ÚKZÚZ Praha, Odbor karantény a ochrany rostlin Brno, (in Czech, German and Russian descriptions in maps).

[Poznámka: Periodická publikace s mapkami výskytu zemědělských škůdců.

Bemerkung: Alljährliche periodische Publikation mit den Landkarten des Vorkommens der landwirtschaftlichen Schädlinge.]

SBÍRKOVÉ PRAMENY - SAMMLUNGSQUELLEN - COLLECTIONS

G. Elsner, Praha

V. Felix, Praha

J. Franz, Rybníčná

K. Hrubý, (†), (in SNM)

J. Jaroš, České Budějovice

Z. Laštůvka, Brno

J. Liška, Praha

I. Novák, Roztoky u Prahy

M. Petrů, Praha

J. Skyva, Praha

B. Starý, (†), Praha (Ve vlastnictví rodiny. - Im Besitz der Familie.)

K. Špatenka, Praha

J. Šumpich, Havlíčkův Brod

J. Vávra, Praha

NMP (Národní muzeum v Praze. - Nationalmuseum in Prag.)

SNM (Slovenské národné múzeum v Bratislave. - Slovakisches Nationalmuseum in Bratislava.)

VÚRV (Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze-Ruzyni.

- Forschungsinstitut für Pflanzenproduktion in Prag-Ruzyně.)

LITERATURA - LITERATUR - REFERENCES

- BALDIZZONE G. 1994: *Coleophoridae dell'area Irano-Anatolica e regioni limitrofe (Lepidoptera)*. Associazione Naturalistica Piemontese, 424 pp.
- BENGTTSSON B. A. 1997: *Scythrididae*. In: HUEMER P., KARSHOLT O. & LYNEBORG L. (eds.): *Microlepidoptera of Europe* 2. Apollo Books, Stenstrup, 301 pp.
- BERGMANN A. 1951-1955: *Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Bd. I-5*. Urania Verl., Leipzig-Jena, 631 + 495 + 552 + 1060 + 1267 pp.
- BRADLEY J. D. & FLETCHER D. S. 1986: *An indexed list of British butterflies and moths*. Kedleston Press, London, 119 pp.
- DANILEVSKIJ A. S. & KUZNETZOV V. I. 1968: *Fauna SSSR. Nasekomyje češuekrylyje, V, I. Listovertki (Tortricidae). Triba plodožorki (Laspeyresini)*. Nauka, Leningrad, 635 pp (in Russian).
- DANILEVSKIJ A. S. & KUZNETZOV V. I. 1981: *Choreutidae - Mole - Listovertki*, pp. 103-136. In: MEDVEDEV G. S. (ed.): *Opredelitel nasekomych evropejskoj časti SSSR. Tom IV. Češuekrylyje. Vtoraja časť*. Nauka, Leningrad, 788 pp (in Russian).
- ELSNER V., GOTTWALD A., JANOVSÝ M. & KOPEČEK F. 1997: *Motýli jihovýchodní Moravy IV. (The Lepidoptera of Southeastern Moravia, IVth part). Sbor. Přírodověd. Klubu v Uherském Hradišti*, 1997(Suppl.): 1-62 (in Czech, English abstr.).
- FIBIGER M. & HACKER H. 1991: Systematic list of the Noctuidae of Europe. *Esperiana (Schwanfeld)*, 2: 1-109.
- FIBIGER M. & HACKER H. 1992: Systematic list of the Noctuidae of Europe. Corrigenda et addenda. *Esperiana (Schwanfeld)*, 3: 1-2.
- GOZMÁNY L. A. 1957: Notes on the generic group Stomopteryx Hein., and the description of some new Microlepidoptera. *Acta Zool. Acad. Sci. Hung.*, 3: 107-135.
- HEINICKE W. & NAUMANN C. 1982: *Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera - Noctuidae. Sonderdrucksammlung aus der Zeitschrift „Beiträge zur Entomologie“*, 30(1980): 385-448, 31(1981): 83-174, 341-448, 32(1982): 39-188. Akademie-Verlag, Berlin, 63 + 87 + 107 + 149 pp.
- HORÁK A. 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Pieridae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 88: 292.
- HOUŠA V. & ŠTYS P. (transl.) 1988: *Mezinárodní pravidla zoologické literatury, 3. vydání. (International Code of Zoological Nomenclature, third edition)*. Academia, Praha, 188 pp (in Czech).
- HRUBÝ K. 1964. *Prodromus lepidopter Slovenska. Prodromus lepidopterorum Slovaciae*. SAV, Bratislava, 962 pp (in Slovak and Latin).
- HUEMER P. & TARMANN G. 1993: *Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera)*. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, 224 pp.
- ITÄMIES J. & TABELL J. 1997: Variation in male genitalia of Coleophora vacciniella H.-S. (Lepidoptera, Coleophoridae). *Entomol. Fenn.*, 8: 145-150.
- KARSHOLT O. & HUEMER P. 1995: Additions and corrections to the Gelechiidae fauna of Italy (Lepidoptera). *Boll. Zool. Agr. Bachic.*, Ser. II, 27: 1-17.
- KARSHOLT O. 1995: Kommentiertes Verzeichnis der Symmocidae, Blastobasidae und Gelechiidae Ostdeutschlands (Lepidoptera). *Beitr. Entomol.*, 45: 137-154.
- KARSHOLT O. & RAZOWSKI J. (eds.) 1996: *The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist*. Apollo Books, Stenstrup, 380 pp.
- KUDRNA O. 1995: On the identity and status of Melitaea neglecta Pfau, 1962 (Lepidoptera: Nymphalidae). *Entomologist's Gazette*, 46: 125-129.
- LAŠTŮVKA Z., ELSNER V., GOTTWALD A., JANOVSÝ M., LIŠKA J., MAREK J. & POVOLNÝ D. 1993: *Katalog motýlů moravskoslezského regionu (Katalog von Faltern der mährisch-schlesischen Region)*. Agron. fakulta VŠZ v Brně, Brno, 130 pp (in Czech and German).
- LAŠTŮVKA Z. & LAŠTŮVKA A. 1995: *An illustrated key to European Sesiidae (Lepidoptera)*. Faculty of agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Konvoj publ., Brno, 173 pp.
- LERAUT P. 1980: Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. *Alexanor, Bull. Soc. Entomol. France*, 1980(Suppl.): 1-334.
- NOVÁK I. 1989: Seznam lokalit a jejich kódů pro síťové mapování entomofauny Československa. [List of localities and their codes for faunistic grid mapping of Czechoslovakia]. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 25(1-2): 1-84 (in Czech).
- OBERBERGER J. 1964: *Entomologie V. ČSAV, Praha*, 775 pp (in Czech).
- PASTORÁLIS G. & REIPRICH A. 1995: *Zoznam motýľov vyskytujúcich sa na území Slovenska (Verzeichnis der Falterarten die in der Slowakei vorkommen)*. Slovenský zväz ochr. prír. a krajiny, Komárno, Spišská Nová Ves, 54 pp (in Slovak, German and English).
- PATOČKA J., REIPRICH A. & PASTORÁLIS G. 1989: *Zoznam motýľov (Lepidoptera) zistených alebo očakávaných na Slovensku. (Verzeichnis der in der Slowakei festgestellten oder erwarteten Lepidopteren). Iuxta Danubium, Spravodaj Oblast. Podun. Muz., Komárno*, 8: 1-100 (in Slovak).
- PETRŮ M. & BÖHM S. 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Pieridae: Colias erate (Esper, 1804). *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 88: 110.

- PFEFFER A. 1950: Bibliografie entomologického písemnictví Čech, Moravy a Slezska od roku 1800 - 1940. (Bibliographie entomologique de la Bohême, de la Moravie et de la Silesie pour les années 1800 - 1940.) *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 47: 231-356 (in Czech and French).
- PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system.) *Klapalekiana*, 32(Suppl.): 1-115 (in Czech, English abstr.).
- REIPRICH A. 1985: *Anthophila abhasica* Danil. (Lepidoptera, Choreutidae) - neue Schmetterlingsart für Europa. *Biológia (Bratislava)*, 40: 1055-1060.
- REIPRICH A. & OKÁLI I. 1988,1989,1990: *Dodatky k Prodlomu Lepidopter Slovenska 1-3* [Complements to the Prodlomus of the Slovak Lepidoptera 1-3]. SAV, Bratislava, 140 + 112 + 144 pp (in Slovak).
- SCHNACK K. (ed.) 1985: Catalogue of the Lepidoptera of Denmark. *Entomol. Meddel.*, 52(2-3): 1-163.
- SMETANA O. 1969: *Entomologická bibliografie Československa 1951 - 1960*. [Entomological bibliography of Czechoslovakia 1951 - 1960]. Academia, Praha, 329 pp (in Czech).
- STIOVA L. 1991: Příspěvek k výskytu žlutáka *Colias erate* Esp. (Lepidoptera, Pieridae) na území ČSFR. (A contribution to the occurrence of *Colias erate* Esp. (Lepidoptera) in Czechoslovakia). *Čas. Slez. Muz. Opava*, 40: 45-51 (in Czech, English and German summ.).
- TOKÁR Z., SLAMKA F. & PASTORÁLIS G. 1996: New and remarkable records of Lepidoptera from Slovakia in 1994. *Entomofauna Carpathica*, 8: 88-107.
- TRAUGOTT-OLSEN E. 1992: The *Elachista dispunctella* (Duponchel, 1843) complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae). *SHILAP, Revista Lepidopt.*, 20: 197-316.
- VIVES MORENO A. 1994: *Catalogo sistematico y sinonimico de los Lepidopteros de la peninsula Iberica y Baleares (Insecta: Lepidoptera)*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 775 pp.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK JMEN AUTORŮ TAXONŮ
ÜBERSICHT DER BENUTZTEN ABKÜRZUNGEN DER AUTORENNAMEN
REVIEW OF THE USED ABBREVIATIONS OF THE AUTHORS NAMES

Ag.	- Agenjo	DeG.	- De Geer	Grg.	- Gregor
Alph.	- Alphéraky	Diak.	- Diakonoff	Grosch.	- Groschke
Ams.	- Amsel	Don.	- Donovan	Gz.	- Goeze
Assm.	- Assman	Donz.	- Donzel		
Auriv.	- Aurivillius	Drfm.	- Dorfmeister	Hann.	- Hannemann
		Dbl.	- Doubleday	Harr.	- Harrison
Bank.	- Bankes	Dgl.	- Douglas	Hart.	- Hartig
Bald.	- Baldizzone	D. & Sch.	- Denis & Schiffermüller	Hb.	- Hübner
Bart.	- Bartel	Dr.	- Drury	Hbst.	- Herbst
Bast.	- Bastelberg	Dum.	- Duméril	Her.	- M. Hering
Bech.	- Bechstein	Dup.	- Duponchel	Hfm.	- Hoffmann
Ben.	- Benander			Hfmsg.	- Hoffmannsegg
Bent.	- Bentinck	Esp.	- Esper	Hfn.	- Hufnagel
Bht.	- Bohatsch	Ev.	- Eversmann	Hein.	- Heinemann
Billb.	- Billberg			Herb.	- Herbulot
Bjerk.	- Bjerkander	F.	- Fabricius	Heyd.	- Heyden
Bkh.	- Borkhausen	Flet.	- Fletcher	Heyl.	- Heylaerts
Blesz.	- Bleszynski	Forst.	- Forster	Hmphr.	- Humphries
Bork.	- Borkowski	F.v.R.	- Fischer von Röslerstamm	Hmps.	- Hampson
Br.	- Bremer			Hodg.	- Hodgkinson
Brad.	- Bradley	Francf.	- Franclemont	Höf.	- Höfner
Brd.	- Bruand	Frh.	- Fruhstorfer	Hpn.	- Heppner
Brgstr.	- Bergsträsser	Friv.	- Frivaldszky	H.-S.	- Herrich-Schäffer
Brn.	- Brünnich	Frl.	- Frölich	Hw.	- Haworth
Brs.	- Boursin	Frr.	- Freyer		
Bsd.	- Boisduval	Fssl.	- Fuessly	Ill.	- Illiger
Btl.	- Butler				
Buck.	- Buckler	G.	- Geyer	Joan.	- de Joannis
		Gaed.	- Gaedicke	Jon.	- Jonasson
Can.	- Cantener	Germ.	- Germar		
Cap.	- Capuse	Gern.	- Gerning	Kan.	- Kanerva
Car.	- Caradja	Gf.	- Geoffroy	Kars.	- Karsholt
Chrét.	- Chrétien	Gib.	- Gibeaux	Kf.	- Kaulfuss
Chr.	- Christoph	Gilm.	- Gilmer	Kir.	- Kiriakoff
Cl.	- Clerck	Gm.	- Germar	Klem.	- Klemensiewicz
Clem.	- Clemens	Gn.	- Guenée	Klim.	- Klimesch
Cr.	- Cramer	Gozm.	- Gozmány	Kn.	- Knoch
Curt.	- Curtis	G.Pet.	- G. Petersen	Koll.	- Kollar
		Gr.	- Grote	Kostr.	- Kostrowicki
Dalm.	- Dalman	Grasl.	- Graslin	Kov.	- Kovács
Dan.	- Danilevskij	Gregs.	- Gregson	Kr.	- Králíček
Datt.	- Dattin			Krem.	- Kremky

Krm.	- Kretschmar	Osب.	- Osbeck	Sodoff.	- Sodoffsky
Krul.	- Krulikowsky	Osth.	- Osthelder	Sorh.	- Sorhagen
Kuzn.	- Kuznetsov			Sp.	- Spuler
		Pack.	- Packard	Spr.	- Speyer
L.	- Linnaeus	Pall.	- Pallas	Stdfs.	- Standfuss
LaH.	- de la Harpe	Palm.	- Palmer	Stgr.	- Staudinger
Laich.	- Laicharting	Panz.	- Panzer	Stng.	- Stange
Lam.	- Lamarck	Patz.	- Patzak	Stph.	- Stephens
Lasp.	- Laspeyres	Payk.	- Paykull	Stt.	- Stainton
Lašt.	- Laštůvka	Peyer.	- Peyerimhoff	Sukh.	- Sukhareva
Latr.	- Latreille	Pier.	- Pierce	Sulz.	- Sulzer
Ld.	- Lederer	Pill.	- Piller	Svens.	- Svensson
Lef.	- Lefebvre	Pink.	- Pinker		
Lew.	- Lewin	Pop.	- Popescu-Gorj	Tausch.	- Tauscher
Ln.	- Lienig	Pov.	- Povolný	Tgstr.	- Tengström
Log.	- Logan	Püng.	- Püngeler	Thbg.	- Thunberg
Lüd.	- Lüders			Tom.	- Tomala
		Rag.	- Ragonot	Toš.	- Toševski
Mab.	- Mabile	Ratz.	- Ratzeburg	T.-O.	- Traugott-Olsen
Mart.	- Martini	Raz.	- Razowski	Tr.	- Treitschke
Masl.	- Maslowski	Rbl.	- Rebel	Trti.	- Turati
Mats.	- Matsumura	Rbr.	- Rambur		
McD.	- McDunnough	Reiss.	- Reissinger	Vgh.	- Vaughan
McLach.	- McLachlan	Retz.	- Retzius	View.	- Vieweg
Mén.	- Ménétriès	Rg.	- Rogenhofer	Vill.	- de Villers
Meyr.	- Meyrick	Rch.	- Reichenbach		
Mg.	- Meigen	Rott.	- Rottemburg	Wall.	- Wallengren
Mill.	- Millière	Roug.	- Rougemont	Warr.	- Warren
Möschl.	- Möschler	Röm.	- Römer	Wck.	- Wocke
M.-R.	- Müller-Rutz	Rössl.	- Rössler	Web.	- Weber
Mtc.	- Metcalfe			Wern.	- Werneburg
Mtz.	- Metzner	Sam.	- Samouelle	Wlk.	- Walker
Muhl.	- Muhling	Sax.	- Saxesen	Wls.	- Walsingham
Müll.	- Müller	Sc.	- Scopoli	W.Pet.	- W. Petersen
		Scud.	- Scudder	Ww.	- Westwood
Nic.	- Nicelli	Scharf.	- Scharfenberg		
Nick.	- Nickerl	Schaw.	- Schawerda	Z.	- Zeller
Niels.	- Nielssen	Schev.	- Scheven	Zag.	- Zagulajev
Nlck.	- Nolcken	Schn.	- Schneider	Zett.	- Zetterstedt
Nwm.	- Newman	Schr.	- Schrank	Zimm.	- Zimmermann
Nyl.	- Nylander	Schreb.	- Schreber	Zinck.	- Zincken
		Schz.	- Schulze		
O.	- Ochsenheimer	Sieb.	- Siebert		
Obr.	- Obratsov	Sirc.	- Sircom		
Obth.	- Oberthür	Sk.	- Skala		
Oliv.	- Olivier	Snell.	- Snellen		

REJSTRÍK RODŮ A VYŠŠÍCH SYSTEMATICKÝCH JEDNOTEK INDEX DER GATTUNGEN UND HÖHEREN SYSTEMATISCHEN EINHEITEN INDEX OF GENERA AND HIGHER SYSTEMATIC CATEGORIES

V rejstříku je uvedeno číslo nejbližšího druhu v seznamu. Jména, u nichž je uvedeno písmeno „K“, je třeba hledat v komentáři k příslušnému druhu. U druhů nečíslovaných (neakceptované údaje): „p.“ = strana katalogu.

Im Index ist die Nummer der nächsten Art in Verzeichnis angeführt. Die Namen, die mit dem Buchstaben „K“ bezeichnet sind, sind im Kommentar zur jeweiligen Art zu finden. Bei den unbezifferten Arten (nicht akzeptierte Angaben): „p.“ = Seite im Katalog.

Abraxas 2297	Agonoxenidae 806	Antispila 128	Aricia 2005
Abrostola 2602	Agriopis 2348	Antitype 2725	Aristotelia 905
Acanthophila 1043	Agriphila 1724	Apamea 2734, p. 98	Aristoteliinae 872
Acanthopsyche 195	Agrius 1852	Apatura 1910	Aroga 964
Acasis 2295	Agrochola 2688	Apaturinae 1910	Artiora 2333
Acentria 1703	Agrotera 1829	Apeira 2331	Ascotis 2369
Acherontia 1853	Agrotis 2927	Aphantopus 1962	Aspilapteryx 274
Achlya 2031	Alcis 2358	Aphelia 1152	Aspitates 2398
Achroia 1611	Aleimma 1193	Aphomia 1613	Assara 1672
Acleris 1199	Allophytes 2721	Aplasta 2038	Asthena 2287
Acompsia 1045	Alsophila 2036	Aplocera 2276	Atemelia 408
Acontia 2576	Alucita 1555	Aplota 592	Aterpia 1337
Acontiinae 2575	Alucitidae 1555	Apoda 1125	Atethmia 2680
Acosmetia 2638	Alucitoidea 1555	Apodia 881	Athetis 2652
Acrobasis 1650	Amata 2487	Apocheima 2340	Athrips 938
Acrocercops 283	Amblyptilia 1575	Apomyeloides 1667	Atolmis 2453
Acrolepia 469	Ammobiota 2473	Aporia 1896	Atralata 1775
Acrolepiinae 464	Ammoconia 2726	Aporodes 1778	Atypha 2649
Acrolepiopsis 467	Amphipoea 2767	Aporophyla 2710	Augasma 668
Acronicta 2554	Amphipyra 2622	Apotomis 1313	Auchmis 2663
Acronictinae 2553	Amphisbatis 552	Aproaerema 1032	Autographa 2595
Actebia 2914	Anacampsinae 1024	Apteron 204	Axylia 2858
Actinotia 2664	Anacampsis 1047	Araschnia 1925	
Adaina 1597	Anania 1808, p. 98	Archanara 2780	Bacotia 186
Adela 136, p. 96	Anaplectoides 2910	Archiearinae 2033	Bactra 1334, p. 97
Adelidae 130	Anarsia 1055	Archiearis 2033	Barbara 1453
Adoxophyes 1161	Anarta 2793	Archinemapogon 234	Batia 569
Adscita 1108	Anchinia 493	Archips 1143	Batrachedra 812
Aethalura 2370	Ancylis 1340	Arctia 2471	Batrachedridae 812
Aetheria 2803	Ancylosis 1678	Arctiidae 2447	Bedellia 478
Aethes 1243, p. 97	Anemallota 212	Arctiinae 2465	Bedelliidae 478
Agapeta 1237	Anemapogon 233	Arctornis 2443	Bembecia 1098
Agdistinae 1560	Anerastia 1617	Argolamprotes 887	Bena 2548
Agdistis 1560	Angerona 2339	Argynninae 1926	Bijugis 190
Aglais 1921	Antequerinae 828	Argynnis 1926	Biselachista 658, p. 96
Aglia 1870	Anthocharis 1901	Argyresthia 411, p. 96	Bisigna 580
Aglossa 1701	Anthophila 1127	Argyresthiinae 411	Biston 2346
Agnathosia 223	Anticlea 2133	Argyrotaenia 1139	Blastesthia 1443
Agonopterix 499	Anticollis 2272	Arichanna 2365	Blastobasidae 865

- Blastobasinae 868
 Blastobasis 868, p.97
 Blastodacna 810
 Blepharita 2731
 Bohemannia 101
 Boloria 1934
 Bombycoidea 1849
 Borkhausenia 573
 Brachionycha 2706
 Brachmia 1068
 Brachodes 1076
 Brachodidae 1076
 Brachylomia 2709
 Brenthis 1933
 Brintesia 1954
 Bryotropha 942, p.97
 Bucculatricidae 367
 Bucculatrix 367
 Buckleria 1568
 Bupalus 2374

 Cabera 2375
 Cadra 1692
 Calamia 2774
 Calamotropha 1713
 Callierges 2621
 Callimorpha 2484
 Callistege 2532
 Callisto 296
 Calliteara 2438
 Callophrys 1988
 Callopietria 2666
 Calophasia 2619
 Caloptilia 258
 Calybites 276
 Calyciphora 1594, p.97
 Calyptra 2513
 Cameraria 361
 Campaea 2381
 Campptogramma 2128
 Canephora 196
 Capperia 1569
 Capua 1167
 Caradrina 2639
 Carcharodus 1874
 Carcina 588
 Carposina 1608
 Carposinidae 1608

 Carsia 2275
 Carterocephalus 1881
 Caryocolum 1005
 Cataclysmes 2102
 Cataclysta 1705
 Cataplectica 1549
 Catarhoe 2119
 Catastia 1636
 Catephia 2530
 Catocala 2514
 Catocalinae 2512
 Catoptria 1731, p.98
 Cauchas 151
 Cedestis 404
 Celaena 2776
 Celastrina 1992
 Celypha 1273
 Cemistominae 479
 Cephalispheira 584 K
 Cephimallota 213
 Cepphis 2322
 Cerapteryx 2852
 Cerastis 2907
 Cerura 2401
 Chamaesphexia 1103, p.97
 Charanyca 2790
 Charissa 2389
 Chazara 1952
 Cheimophila 598
 Chelariinae 1052
 Chelis 2482
 Chersotis 2877
 Chesias 2273
 Chiasmia 2302 K
 Chilo 1712
 Chilodes 2651
 Chimabachinae 596
 Chionodes 951
 Chlidanotinae 1270
 Chloantha 2665
 Chloephorinae 2546
 Chlorissa 2044
 Chloroclysta 2148
 Chloroclystis 2268
 Choreutidae 1127
 Choreutis 1131
 Choreutoidea 1127

 Choristoneura 1140
 Chortodes 2784
 Chrysoclista 806
 Chrysocrambus 1743
 Chrysoesthia 901
 Chrysopeliinae 842
 Chrysoteuchia 1714
 Cidaria 2153
 Cilix 2018
 Clavigesta 1446
 Cleora 2356
 Cleorodes 2364
 Clepsis 1155
 Clostera 2429
 Cnaemidophorus 1574
 Cnephasia 1173, p.97
 Cochylidia 1256
 Cochylimorpha 1228
 Cochylis 1259
 Coenocalpe 2170
 Coenonympha 1963
 Coenonymphinae 1963
 Coleophora 670, p.96
 Coleophoridae 668
 Coliadinae 1902
 Colias 1902
 Collicularia 1458
 Colobochyla 2503
 Colocasia 2552
 Colostygia 2164
 Colotois 2338
 Comibaena 2041
 Conistra 2700
 Conobathra 1654
 Copromorphoidea 1608
 Corcyra 1612
 Coscinia 2466
 Cosmardia 1003
 Cosmia 2676
 Cosmiotes 664
 Cosmopterigidae 828
 Cosmopteriginae 830
 Cosmopterix 830
 Cosmorhoe 2139
 Cosmotriche 1843
 Cossidae 1073
 Cossinae 1074
 Cossioidea 1073

 Cossus 1074
 Costaconvexa 2127
 Crambidae 1703
 Crambinae 1711
 Crambus 1715
 Craniophora 2566
 Crassa 568 K
 Crocallis 2335
 Croesia 1196
 Crombruggia 1565
 Crossobela 1059 K
 Cryphia 2569
 Cryptoblades 1618
 Cucullia 2605
 Cuculliinae 2605
 Cupido 1990
 Cyaniris 2009
 Cybosia 2454
 Cyclophora 2050
 Cydia 1482, p.97
 Cymolomia 1310
 Cynaeda 1774

 Dacnonypha 7
 Dahlica 181, p.96
 Daphnis 1863
 Dasypolia 2708
 Dasytoma 598 K
 Decantha 577
 Deilephila 1867
 Deileptenia 2357
 Deltote 2578
 Dendrolimus 1841
 Denisia 562
 Depressaria 534
 Depressariinae 489
 Deuterogonia 595
 Diachrysia 2592, p.98
 Diacrisia 2474
 Diaphora 2479
 Diarsia 2862
 Diasemia 1826
 Dichagyris 2924
 Dichelia 1150
 Dichomeridinae 1058
 Dichomeris 1061
 Dichonia 2722

Dichrorampha 1524, p.97	Emmelia 2575	Etiella 1645	Falseuncaria 1267, p.97
Dicycla 2675	Emmelina 1607	Eublemma 2582	Filatima 968
Digitivalva 464	Enargia 2670	Eucalybites 277	Foveifera 1440
Diloba 2934	Enarmonia 1454	Eucarta 2667	Furcula 2403
Dioryctria 1632	Endothenia 1322	Euchalcia 2588	
Dipleurina 1758	Endotricha 1702	Eucharia 2483	Galleria 1610
Diplodoma 177	Endromidae 1851	Euchoeca 2286	Galleriinae 1610
Discestra 2791	Endromis 1851	Euchromius 1711	Gastropacha 1846
Dismorphiinae 1894	Endrosis 589	Euclidia 2533	Geina 1567
Ditrysa 177	Ennominae 2297	Eucosma 1425	Gelechia 976, p.97
Diurnea 596	Ennomos 2323, p.98	Eucosmomorpha 1456	Gelechiidae 872
Dolicharthria 1825	Entephria 2129	Eudemis 1338	Gelechiinae 914
Doloploca 1191	Enteucha 23	Eudonia 1759	Gelechioidea 489
Donacaula 1710	Eosolenobia 180	Eugnorisma 2890	Geometra 2040
Douglassiidae 382	Epagoge 1166	Eugraphe 2905	Geometridae 2033
Drepana 2020	Epermenia 1550	Euhypnometeuta 396	Geometrinae 2038
Drepanidae 2018	Epermeniidae 1546	Eulamprotes 882	Geometroidea 2033
Drepaninae 2018	Epermenioidea 1546	Eulia 1172	Gesneria 1751
Drepanoidea 2018	Ephestia 1689	Eulithis 2141	Gibberifera 1401
Drymonia 2411	Ephysteris 1004	Eumasia 205	Gillmeria 1587
Dryobotodes 2724	Epiblema 1402, p.97	Eumedonia 2007	Glaphyriinae 1779
Dypterygia 2654	Epicallima 572	Euphydryas 1945	Glaucopsyche 1996
Dysauxes 2488	Epichnopteryx 194, p.96	Euphyia 2186	Glossata 7
Dyseriocrania 7	Epilecta 2874	Eupithecia 2209, p.98	Gluphisia 2428
Dyspessa 1075	Epinotia 1356	Euplexia 2659	Glyphipterigidae 470
	Epione 2320	Euplocaminae 209	Glyphipteriginae 471
	Epipsilia 2883	Euplocamus 209	Glyphipterix 471, p.96
Eana 1185	Epirranthis 2332	Eupoecilia 1239	Glyptoteles 1663
Earias 2546	Epirrhoe 2121	Euproctis 2440	Gnophos 2386
Ebulea 1810	Epirrita 2189	Eupsilia 2698	Gnorimoschema 998
Eccopisa 1671	Epischnia 1637	Eurhodope 1660	Gonepteryx 1909
Ecliptopera 2146	Episema 2705	Eurois 2885	Gortyna 2773
Ecpyrrhorhoe 1794	Erannis 2352	Eurrhpara 1802	Gracillariidae 258
Ectoedemia 102	Erebia 1955	Eurrhysis 1777	Gracillariinae 258
Ectomyelois 1666	Eremobia 2762	Eustroma 2162	Gracillarioidea 258
Ectropis 2366	Eremobina 2752 K	Euthrix 1842	Graphiphora 2889
Egira 2851	Eremodrina 2643	Euxoa 2915	Gymnancyla 1668
Eidophasia 463	Eriocrania 8	Euzophera 1673	Gymnoscelis 2267
Eilema 2456	Eriocraniidae 7	Evergestinae 1766	Gynaephora 2437
Elachista 604, p.96	Eriocranioidae 7	Evergestis 1766	Gypsonoma 1395
Elachistidae 600	Eriogaster 1833	Exaeretia 496	
Elaphria 2636	Eriopsela 1424	Exapate 1183	Habrosyne 2026
Electrophaes 2163	Eriopygodes 2856	Exoporia 15	Hada 2802
Elegia 1641	Erynnis 1873	Exoteleia 919	Hadena 2805
Eligmodonta 2425	Esperia 581		Hadeninae 2791
Elophila 1704	Eteobalea 834	Fabiola 578	Haimbachia p.98
Elophos 2392, p.98	Ethmia 556	Fagivorina 2363	Hamearis 1972
Ematurga 2371	Ethmiinae 556	Falcaria 2019	Haplotinea 210

Harpella 583	Hypenodes 2506	Larentiinae 2100	Lyonetiinae 485
Harpyia 2417	Hypenodinae 2504	Lasiocampa 1838	Lypusa 217
Hedya 1303	Hypercallia 587	Lasiocampidae 1831	Lythria 2100
Heinemannia 807	Hyphoraia 2469	Lasiocampoidea 1831	
Helcystogramma 1070	Hypochalcia 1638	Lasiommata 1969	Macdunnoughia 2584
Helicoverpa 2632	Hypomecis 2361	Lasionycta 2857	Macroglossinae 1859
Heliodines 477	Hyponephele 1961	Laspeyria 2534	Macroglossum 1861
Heliodinidae 477	Hyppa 2662	Lathronympha 1457	Macrochilo 2493
Heliophobus 2816	Hypsopygia 1695	Lemonia 1849	Macrothylacia 1840
Heliothela 1780	Hyssia p.98	Lemoniidae 1849	Maculinea 1997
Heliolithinae 1780	Hysterophora p.97	Leptidea 1894	Malacosoma 1836
Heliolithinae 2628		Leucania 2826	Mamestra 2820
Heliolithis 2628	Idaea 2075	Leucodonta 2424	Maniola 1960
Heliozela 127	Idia 2489	Leucoma 2442	Marasmarcha 1573
Heliozelidae 127	Ilseopsis 988	Leucoptera 480	Mecyna 1823, p.98
Hellinsia 1598	Inachis 1920	Leucospilapteryx 282	Meessiinae 218
Hellula 1779	Incurvaria 156	Levipalpus 551	Megacraspedus 911, p.97
Hemaris 1859	Incurvariidae 155	Ligdia 2300	Megalophanes 200
Hemistola 2047	Incurvarioidea 127	Limacodidae 1125	Meganephria 2720
Hemithea 2043	Infurcitinea 219	Limenitinae 1912	Meganola 2535
Hepialidae 15	Iphiclides 1892	Limenitis 1912	Megasis 1628 K
Hepialoidea 15	Ipimorpha 2668	Limnaecia 841	Melanargia 1947
Hepialus 15	Ipimorphinae 2636	Lithocolletinae 299	Melanargiinae 1947
Herminia 2494	Isauria 1628 K	Lithomoia 2711	Melanchra 2818
Herminiinae 2489	Ischnoscia 218	Lithophane 2712	Melanthia 2176
Hesperia 1887	Isidiella 838	Lithosia 2464	Meleageria 2017
Hesperidae 1873	Isophrictis 879	Lithosiinae 2447	Melissoblaptēs 1614
Hesperioidea 1873	Isotrias 1271	Lithostege 2280	Melitaea 1939
Heterogenea 1126	Issoria 1932	Lixodessa 1041	Melitaeinae 1939
Heteroneura 20	Iwaruna 1042	Lobesia 1330, p.97	Mendesia 600
Heteropterus 1883		Lobophora 2290	Merrifieldia 1589
Hieroxestinae 257	Jodia 2699	Lomaspilis 2299	Mesapamea 2759
Hipparchia 1948	Jodis 2048	Lomographa 2377	Mesogona 2673
Hippotion 1869		Lopinga 1971	Mesoleuca 2135
Hofmannophila 590	Kessleria 397	Loxostege 1791	Mesologia 2757
Holoscolia 591	Khorassania 1644	Lozotaenia 1163	Mesophleps 1058
Homoeosoma 1680	Klimeschia 386	Luperina 2763	Metalampra 579
Hoplodrina 2644	Klimeschiopsis 1002	Luquetia 495, p.97	Metriostola 1642
Horisme 2171		Lycaena 1973	Metriotes 669
Hydraecia 2770	Lacanobia 2795	Lycaenidae 1973	Metzneria 873
Hydrelia 2283	Lamoria 1616	Lycaeninae 1973	Micropterigidae 1
Hydriomena 2167	Lampides 1989	Lycia 2342	Micropterigoidea 1
Hylaea 2383	Lampronia 161	Lycophotia 2875	Micropteryx 1, p.96
Hyles 1864	Lampropteryx 2137	Lygephila 2526	Microstega 1798
Hypatima 1057	Lamprotes 2586	Lymantria 2444	Micrurapteryx 279
Hypatopa 869	Laodamia 1620	Lymantriidae 2434	Miltochrista 2450
Hypena 2507	Laothoe 1858	Lyonetia 485, p.96	Mimas 1856
Hypeninae 2507	Larentia 2132	Lyonetiidae 479	Minoa 2289

Minois 1953	Notodontidae 2400	Ornixola 278	Paraswammerdamia 402
Minucia 2524	Notodontinae 2400	Orophia 584	Paratalanta 1798 K
Mirificarma 971	Nudaria 2451	Ortholepis 1642 K	Parectopa 280
Mniotype 2733	Nyctegretis 1677	Orthonama 2109	Pareulype 2177
Moma 2553	Nycteola 2543	Orthopygia 1697	Parexarnis 2913
Mompha 814	Nymphalidae 1910	Orthosia 2841	Parnassiinae 1889
Momphidae 814	Nymphalinae 1916	Orthotaelia 470	Parnassius 1890
Monochroa 888, p.97	Nymphalis 1916	Orthotaeliinae 470	Parornix 285
Monopis 240	Nymphula 1707	Orthotaenia 1311	Pediasia 1745
Monotrysis 20	Nymphulinae 1703	Ostrinia 1800	Pelochrista 1420
Mormo 2656		Ourapteryx 2337	Pelosia 2455
Morphaga 206	Ochlodes 1888	Oxicesta p.	Pelurga 2136
Mutuaia 1807	Ochromolopis 1546	Oxyptilus 1561, p.97	Pempelia 1621
Myelois 1664	Ochropacha 2030		Pempeliella 1647
Myelopsis 1665	Ochropleura 2859	Pabulatrix 2752	Pennisetia 1077
Myrmecozelinae 210	Ochsenheimeria	Pachetra 2855	Penthophera 2434
Mythimna 2828	455, p.96	Pachycnemia 2317	Perconia 2399
	Ochsenheimeriinae 455	Pachythelia 197	Peribatodes 2354
Naenia 2909	Ocneria 2446	Paidia 2452	Pericallia 2470
Narraga 2311	Ocnerostoma 406	Palpita 1828	Periclepsis 1165
Narycia 178	Odezia 2279	Pammene 1461	Peridea 2407
Naryciinae 177	Odonestis 1848	Pancalia 828	Peridroma 2912
Nebula 2140, p.98	Odontiinae 1774	Pandemis 1134	Perigrapha p.98
Nemapogon 224	Odontognophos 2385	Panemeria 2637	Perinephela 1803
Nemapogoninae 224	Odontopera 2334	Panolis 2850	Periphanes 2635
Nematopogon 130	Odontesia 2426	Panthea 2550	Perittia 601
Nemaxera 236	Oecophora 582	Pantheinae 2550	Perizoma 2194
Neofaculta 966	Oecophoridae 489	Papestra 2821	Petrophora 2318
Neofriseria 969	Oecophorinae 561	Papilio 1893	Pexicopia 1054
Neosphaleroptera 1184	Oegoconia 865	Papilionidae 1889	Phalacropteryx 201
Neozephyrus 1982 K	Oenochrominae 2036	Papilioninae 1892	Phalera 2400
Nephopterix 1662	Oidaematophorus 1605	Papilionoidea 1889	Phalonidia 1231
Nepticulidae 23	Oiketicinae 195	Parachronistis 916	Phaulernis 1547
Nepticuloidea 20	Oinophila 257	Paracolax 2492	Pheosia 2418
Neptis 1914	Olethreutes 1281, p.97	Paracorsia 1797	Phibalapteryx 2103
Neurothaumasia 239	Olethreutinae 1273	Paradarisa 2367	Philedone 1168
Niditinea 247	Oligia 2753	Paradiarsia 2884	Philedonides 1169
Noctua 2867	Olindia 1270	Paradrina 2641	Philereme 2184
Noctuidae 2489	Omphalophana 2620	Parafomoria 100	Photedes p.
Noctuinae 2858	Oncocera 1619	Paraleucoptera 479	Phlogophora 2660
Noctuoidea 2400	Operophtera 2192	Paramesia 1164	Phlyctaenia 1804
Nola 2538	Opigena 2888	Paranthrene 1082	Photedes p.98
Nolinae 2535	Opisthograptis 2319	Parapoxyn 1706	Phragmatiphila 2779
Nomophila 1824	Opostega 20	Pararge 1968	Phragmatobia 2480
Nonagria 2778	Opostegidae 20	Pararginae 1968	Phtheochroa 1227
Nothocasis 2293	Opsibotys 1811	Parascotia 2502	Phycita 1631
Nothris 1021	Orgyia 2435	Parasemia 2468	Phycitinae 1617
Notodonta 2409	Oria 2788	Parastichtis 2671	Phycitodes 1683

Phyllocnistinae 362	Protodeltote 2577	Pyrausta 1781, p.98	Schreckensteiniidae
Phyllocnistis 362	Protolampra 2911	Pyraustinae 1781	1545
Phyllodesma 1844	Protoschinia 2633	Pyrgus 1876	Schreckensteinoidea
Phyllonorycter 299, p.96	Proutia 187	Pyrrhia 2634	1545
Phylloporia 155	Psammotis 1809		Sciota 1625
Phytometra 2511	Pselnophorus 1596	Quercusia 1982	Scoliopteryx 2512
Pieridae 1894	Pseudaletia 2840		Scolitantides 1995
Pierinae 1896	Pseudargyrotoza 1171	Rebelia 192	Scoparia 1752
Pieris 1897	Pseudatemelia 553, p.97	Recurvaria 917	Scopariinae 1751
Plagodis 2315	Pseudeustrotia 2581	Reisserita 215	Scopula 2059
Platyedra 1053	Pseudohermenias 1302	Retinia 1452	Scotopteryx 2104
Platyperigea 2640	Pseudoips 2549	Reuttia 1023	Scrobipalopsis 1001
Platyptilia 1583	Pseudopanthera 2314	Rhagades 1107	Scrobipalpula 999
Platyptiliinae 1561	Pseudophilotes 1993	Rheumaptera 2179	Scythrididae 845
Platytes 1749	Pseudopostega 21	Rhigognostis 460	Scythris 845, p.96, 97
Plebejus 2002	Pseudosciaphila 1312	Rhinoprora 2269	Scythropia 387
Plemyria 2154	Pseudoswammerdamia	Rhizedra 2766	Scythropiinae 387
Pleuroptya 1827	398	Rhodometra 2099	Selagia 1629
Pleurota 593, p.97	Pseudotelphusa 920	Rhodostrophia 2098	Selenia 2328
Plodia 1688	Pseudoterpna 2039	Rhopobota 1387	Selenodes 1455
Plusia 2590	Psodos 2395	Rhyacia 2881	Selidosema 2372
Plusiinae 2584	Psoricoptera 987	Rhyacionia 1447	Semioscopis 489
Plutella 458	Psyche 188	Rhyparia 2475	Semiothisa 2302
Plutellidae 458	Psychidae 177	Riodinidae 1972	Sesamia 2789
Plutellinae 458	Psychidea 193	Rivula 2501	Sesia 1079
Poecilocampa 1831	Psychinae 186	Rivulinae 2501	Sesiidae 1077
Polia 2822	Psychoides 216	Roeslerstammia 365	Sesiinae 1079
Polychrysis 2587	Pterapherapteryx 2294	Roeslerstammiidae 365	Sesioidea 1076
Polygonia 1924	Pterophoridae 1560	Rusina 2655	Setina 2448
Polymixis 2727	Pterophorinae 1589		Sideridis 2814
Polyommatae 1989	Pterophoroidea 1560	Sabra 2022	Siederia 183
Polyommatus 2010	Pterophorus 1592	Salebriopsis 1624	Simplicia 2490
Polyploca 2032	Pterostoma 2421	Sarothripinae 2543	Simyra 2567
Polypogon 2497	Pteropteryx 1559	Saturnia 1871	Siona 2397
Pontia 1900	Ptilocephala 198	Saturniidae 1870	Sitochroa 1795
Porritia 1593	Ptilodon 2422	Satyridae 1947	Sitotroga 1052
Povolnya 273	Ptilodontella 2423	Satyrinae 1948	Smerinthus 1857
Praesolenobia p.96	Ptilophora 2420	Satyrium 1983	Sophronia 1024, p.97
Praydinae 408	Ptocheuusa 904	Sauterina 284	Sorhagenia 842
Prays 409	Ptycholoma 1162	Scardia 207	Spaelotis 2886
Prieterognatha 1300	Ptycholomoides 1151	Scardiinae 206	Spargania 2178
Prochlidonia 1242	Puengeleria 2384	Schiffermuelleria 561	Sparganotus 1268
Prochoreutis 1128	Pyla 1643	Schiffermuellerina 567	Spatalia 2408
Proclissiana 1938	Pyncostola 872	Schoenobiinae 1708	Spatalistis 1195
Procridae 1107	Pyrallidae 1610	Schoenobius 1708	Sphingidae 1852
Prodotis 2525	Pyrallinae 1695	Schrankia 2504	Sphinginae 1852
Prolita 962	Pyalis 1698	Schreckensteinia 1545	Sphinx 1854
Proserpinus 1862	Pyraloidea 1610		Spialia 1875

Spilonota 1441	Thecla 1981	Tyria 2486
Spilosoma 2476	Theclinae 1981	Tyta 2531
Spiris 2465	Thera 2155	
Spodoptera 2650	Theria 2380	Udea 1812
Spudaea 2697	Thetidia 2042	Uncustriodonta
Spuleria 809	Thiodia 1439	1059, p.97
Stathmopoda 599	Thiotricha 1023 K	Uresiphita 1793
Stathmopodinae 599	Thisanotia 1744	Utetheisa 2467
Staurophora 2775	Tholera 2853	
Stauropus 2406	Thumatha 2447	Vacciniina 2008
Stegania 2301	Thyatira 2025	Vanessa 1922
Stenolechia 914	Thyatirinae 2025	Venusia 2282
Stenolechiodes 915	Thymelicus 1884	Vitula 1687
Stenoptilia 1577, p.97	Thyrididae 1830	Vulcaniella 839
Stenoptinea 222	Thyridoidea 1830	
Stephensia 602	Thyris 1830	Watsonalla 2023
Sterrhinae 2050	Tichonia 568	Wockia p.97
Sterrhopterix 202	Timandra 2058	
Stigmella 24	Tinagma 382	Xanthia 2681
Stomopteryx 1030	Tinea 249	Xanthocrambus 1742
Strophedra 1459	Tineidae 206	Xanthorhoe 2111
Swammerdamia 399	Tineinae 240	Xerocnephiasia 1192
Symmocinae 865	Tineoidea 177	Xestia 2891
Synansphecchia 1100	Tineola 246	Xylena 2718
Synanthedon 1084, p.97	Tinithiinae 1077	Xystophora 909
Synaphe 1696, p.97	Tischeria 170	
Syncopacma 1033	Tischeriidae 170	Yigoga 2925
Syndemis 1149	Tischerioidea 170	Yponomeuta 388
Syngnatha 2600	Titanio 1776	Yponomeutidae 387
Synopsis p.98	Tortricidae 1134	Yponomeutinae 388
Syntominae 2487	Tortricinae 1134	Yponomeutoidea 387
	Tortricodes 1182	Ypsolopha 439
	Tortricoidea 1134	Ypsolophidae 439
	Tortrix 1194	Ypsolophinae 439
Taleporia 184	Trachea 2658	
Taleporiinae 184	Trachonitis 1646	Zeiraphera 1391
Tebenna 1130	Trachycera 1656	Zerynthia 1889
Teichobiinae 216	Trachysmia 1224	Zeugloptera 1
Telechrysis 576	Triaxomera 237	Zeuzera 1073
Teleiodes 922	Trichiura 1832	Zeuserinae 1073
Teleiopsis 937	Trichophaga 245	Zophodia 1670
Telephila 1060	Trichoplusia 2585	Zygaena 1113
Tephрина 2312	Trichopteryx 2291	Zygaenidae 1107
Tephronia 2353	Trichosca 2551	Zygacninae 1113
Tethea 2027	Trifurcula 92	Zygaenoidea 1107
Tetheella 2029	Triphosa 2183	
Thalera 2046	Trisateles 2491	
Thalpophila 2657	Tritophia 2416	
Thaumetopoea 2433		
Thaumetopoeinae 2433		

REJSTŘÍK DRUHOVÝCH JMEN INDEX DER ARTENNAMEN INDEX OF SPECIES NAMES

V rejstříku je uvedeno číslo druhu v seznamu. U druhů nečíslovaných (neakceptované údaje): „p.“ = strana v katalogu. Synonyma a homonyma jsou vyznačena kurzívou.

Im Index ist die Nummer der Art im Verzeichnis angeführt. Bei den unbezifferten Arten (nicht akzeptierte Angaben): „p.“ bedeutet Seite im Katalog. Die Synonymen und Homonymen sind mit Kursiv gedruckt.

abbreviana 1362	adscitella 656	albersana 1456	alcyone 1949
abbreviata 2219	adpersella 797	albiapicella 834	<i>alcyonipennella</i> 706
abbreviatella 603	adusta 2733	albicapitella 402	alcyonipennella 707
abdominalis 420	adustata 2300	albiceps 916	<i>aleella</i> 1249
abietana 1220, 1302	<i>advena</i> 2822	albicilla 1624	alexis 1996
abietaria 2210	advenaria 2322	albicillata 2135	<i>alexis</i> 2005
abietella 1632	advenella 1657	albicolon 2815	alfacariensis 1904
abietis 2439	aegeria 1968	albicomella 220	algae 2569, 2783
<i>abjecta</i> 2744	aemulana 1435	<i>albicornis</i> 784	aliena 2796
abnormella 904	aenealis 1767	albicostella 718	alienellus 1719
abscisana 1332	<i>aeneella</i> 40, 52, 1638	<i>albidalis</i> 1819	alimana 1235
absinthiata 2250	aeneofasciella 77	albidella 663, 726	allisella 497
absinthii 370, 2605	aenigma 926	albidulana 1430	<i>allous</i> 2006
acaciae 1987	aerariella p.97	albifasciella 116	alnetella 33
acaciellus 329	aerata 1544	<i>albifasciellum</i> 1018	alni 2555
acanthadactyla 1575	aerattellum 668	albifrontella 618	alniarius 2325
aceraria 2037	aeriferanus 1151	albimacula 2807	<i>alniellus</i> 313
aceriana 1396	aerugula 2540	albiocellaria 2051	alnfoliae 678
acerifoliellus 352	aescularia 2036	albipalpella 1040	<i>alnifoliellus</i> 313
<i>aceris</i> 1914	aestivaria 2043	albipuncta 2831	alpella 447
aceris 36, 2559	<i>aestivata</i> 1101	albipunctata 2053	<i>alpestrana</i> 1534
<i>acernellus</i> 354	aestivella 876	<i>albipunctata</i> 2222	alpicella 397
acetosae 23	aethiops 1958	albipunctella 536	alpicola 2894
acetosellae 2673	affinis 944, 1102, 2676, p.97	albistria 437	alpinalis 1818
achatana 1352		albitarsella 693	alpinana 1525
<i>achatinella</i> 1677	affinitatum 2195	albodactyla 1594, p.97	alpinatus 2396
<i>achilleae</i> 1115	agestis 2005	albofascialis 1775	alpinella 614
achine 1971	agilana 1536	<i>albonigrata</i> 2158	alpinellus 1750
actaeata 2231	agilellus 327	albovenosa 2568	alpinus 314
acteon 1886	aglaja 1929	albuginana 1469	alpium 2553
acuminatana 1531	agnotana 1465	albula 2536	alsinellum 1007
acuminatella 988	<i>agramella</i> 755	albulata 2287	<i>alsines</i> 2644
adactyla 1560	agrimonie 119	albulatum 2202	alstromeriana 503
<i>adaequata</i> 2201	ahenella 704, 1638	alburnellus 930	alternana 1230
adansoniiellus 132	ain 2600	alceae 1874	<i>alternaria</i> 2303
adelogrammella 775	alacella 1043	alciphron 1978	alternata 2123, 2303
adelphella 1627	albanensis 1099	alchemillatum 2196	<i>alternella</i> 1174
adippe 1930	albatellus 1685	alchimiella 265	alternellus 1182
adjectella 676	albedinella 374	alchymista 2530	alticolana 1177
adjunctella p.96	albella 670	alcon 1997	alticolella 759

alveus 1878	<i>annulata</i> 2052	argentina 2408	astrella 179
amandus 2012	annulatella 461	<i>argentipedella</i> 125	atalanta 1922
amani 110	<i>annulatella</i> 766	argentula 794	<i>aterrima</i> 121
<i>amata</i> 2058	anomaella 40	<i>argentula</i> 2578	athalia 1943
ambigua 2648	anonymella 836	<i>argester</i> 2011	atomaria 2371
ambigualis 1754	anseraria 2288	argiades 1991	atomella 529
ambiguatus 2388	anserinella 628	argiolus 1992	atra 195, 811
ambiguella 1240	anthemidella 880	argus 2002	<i>atralis</i> 1780
ambusta 2680	anthracinalis 209	argyrana 1468	atrata 2279
amellivora 783	anthyllidella 1032	argyrella 1629	atrella 886
amiantana 1242	antiopa 1919	argyrognomon 2004	atricapitana 1263
amiantella p.96	antiqua 2436	argyropeza 115	atricapitella 88
amica 2732	<i>antiquana</i> 1328	<i>ariella</i> 57	atricollis 121
<i>ammanella</i> 3, 5	antirrhini 2620	arion 1999	atricomella 612
<i>amphidamas</i> 1973	<i>aphirape</i> 1938	armigera 2632	atrifrontella 107
amplana 1493	apicella 1355	armoricanus 1877	atriplicella 995
amygdalana 1466	<i>apiciana</i> 1217	arnicella 464	atriplicis 2658
<i>amygdalella</i> 293	<i>apiciaria</i> 2320	<i>arsilache</i> 1937	atropos 1853
<i>amyntas</i> 1966	apicipunctella 621	artaxerxes 2006	atropunctana 1309
<i>amyotellus</i> 307	apiformis 1079	artemisae 549, 2607	<i>aucupariae</i> 51
anachoreta 2430	apollo 1890	<i>artemisiae</i> 371, 796	augur 2889
<i>anapheles</i> 2814	apparellus 344	artemisicoella 773	augustella 563
anastomosis 2431	appendiculatus 1076	artemisiella 371, 793, 991	aulica 2469
anatipennella 725	appensata 2296	artesiaria 2308	aurago 2682
anceps 2407, 2748	<i>applana</i> 505	aruncella 6	aurana 1461
ancilla 2488	aprilina 2722	<i>arundinata</i> 1756	<i>aurantiana</i> 1461, 1475
ancipitella 1755	aptata 2164	ascalis 1025	aurantiaria 2350
andereggii 2839	<i>aquanum</i> 1406	asclepiadis 2603	aurata 1781
anderidae 321	aquata 2171	asella 1126	aureatella 3
<i>anderschella</i> 5	aquila p.98	ashworthii 2898	aurelia 1944
andrenaeformis 1090	aquilina 2918	asiatica 2545	aurella 73
anella 1616	aquilonaris 1937	asinella 982	aureolaria 2077
<i>anella</i> 491	<i>arbusculae</i> 61	asperella 443	auricella 738
angelicae 1118	arbutellus 1282	asperipunctella p.97	auricoma 2563
angelicella 516	arcania 1966	aspersana 1204	<i>aurifrontella</i> 809
anglicella 286	<i>arcas</i> 2001	aspidiscana 1436	aurinia 1946
<i>angularia</i> 2363	<i>arcellus</i> 230	asseclana 1178	aurita 1475
angulifasciella 120	arceuthina 418	<i>asseclanum</i> 1417	auritella 22
anguliferella 288	arcuatella 122	assectella 467	<i>auritella</i> 61
<i>angustalis</i> 1696	<i>arcuatellus</i> 234	assimilata 2245	aurofascianus 1298
angustana 1239	arcuellus 1281	assimilella 68, 530	auroguttellus 277
angustella 1662	<i>arcuosa</i> 2784	<i>associata</i> 2144	aurulentella 421
angusticollella 176	arenacearia 2312	associatella 142	<i>australis</i> 1904
angusticostella 213	arenaria 2363	asteris 2614, p.96	<i>autumnalis</i> 2168
ankerella 239	arenella 523	astragalella p.96	autumnarius 2323
annadactyla 1581	argentana 1185	astrantiae 515	autumnata 2191
<i>annickiana</i> 1581	argentella 631	<i>astrarche</i> 2005	autumnitella 469
annularia 2052	argentimaculella 219		<i>avelanella</i> 289

- avellanella 492
aversata 2094
azaleella 264
- badiana* 1244
badiana 1353
badiata 2133
badiella 541
badiipennella 679
baja 2899
bajaria 2349
bajularia 2041
balatonana 1427
baliodyctyla 1591
ballotella 724
balteolellum 385
bankiana 2578
barbalis 2498
barbella 1066
basalella 82
basaltinella 942, p.97
basiguttella 85
basilinea 2749
basipunctella p.97
basistrigalis 1753
bastelbergeri 2359
batis 2025
baton 1993
bechsteinella 376
beckmanni 539
bedellella 647
bellargus 2016
bembeciformis 1080
benanderi 766, 781
berbera 2623
berberata 2177
berberidella 1608
bergiella 414
bergmanniana 1196
bergstraesserella 476
bernoulliella 725
bertrami 1588
betulae 291, 1642, 1981
betulae 317, 967
betulaenanae 691
betulanus 1145
betularius 2347
betulella 468, 729
- betuletana 1318
betulicola 29, 262
betulina 187
betulinella 236
betulinella 1048
biangulata 2186
biarcuana 1347
biatomella 609
bibioniformis p.97
bicinctana 1331
bicolorana 2548
bicolorata 2154
bicolorata 2803
bicoloria 2424
bicoloria 2757
bicostella 594
bicruris 2805
bicuspis 2403
bidentata 2334
bifaciatum 2199
bifasciana 1195
bifascianus 1285
bifasciella 619
bifida 2405
bifissella 851
biformella 1033
bifractella 881
bigella 1674
biguttella 1042
bilineatella 716
bilineatum 2128
biliosata 2047
bilunana 1364
bilunaria 2328
bilunulata 2211
bimaculata 2377
bimaculosa 2720
binaevellus 1683
binaria 2023
binderella 701
binotapennella 803
binotella 869
binotellus 912
bipunctanus 1295
bipunctanus 1614
bipunctaria 2105
bipunctella 560
bipunctidactyla 1580
- birdella* 455
biren 2821
birivia 2916
biriviata 2111
biselata 2089
bisetata 2089
bisselliella 246
bistortata 2366
bistriatella 1667
bistriga 1618
bistrigella 155
bisulcella 657
biviella 1687
bjerkandrella 1130
blancardellus 334
blanda 2645
blandella 1068, p.97
blandellum 1014
blandiatum 2201
blattariella 1048
blomeri 2285
boeticus 1989
bohémica 1078
bohemiella 872
boletella 208
bolli 75
bombycella 190
bombycina 2822
bonnetella 436
boreata 2193
boreella 947
borkhausenii 577
borreonella 218
boscana 1211
botrana 1333
boyerella 374
bractea 2599
bractella 582
brahmiella 989
brachydactylus 1596
branderiana 1312
brassicae 1897, 2820
bremiellus 359
brevipalpella 733
briseis 1952
britannica 2158
britanniodactyla 1569
brizella 908
- brockeella 422
brongniardellus 283
brumata 2192
brunnea 2864
brunnearium 2373
brunneata 2310
brunnichana 1359
brunnichella 602
brunnichianum 1413
bucephala 2400
buoliana 1447
buraetica 2597
- c-album 1924
c-aureum 2586
c-nigrum 2895
cacaleana 1541
caecana 1520
caecimacula 2726
caecimaculana 1420
caelebipennella 746
caeruleocephala 2934
caesarea 2481
caesiata 2131
caesiella 399
caespititiella 755
caespititiella 759
cagnagellus 391
caja 2471
calcariella 783
calidella 1693
caliginosa 2638
callunae 2251
calodactyla 1584
calthella 1
calvaria 2489
cambrica 2282
camelina 2422
camilla 1913
campanulae 2612
campestriphaga 778
campoliliana 1438
cana 1425
cana 1428
canapennella 627
candelarum 2898
candelisequa 2898
candelisequa 2924

<i>candidata</i> 2287	<i>celerio</i> 1869	<i>chrysanthæana</i> 1174	<i>clavella</i> 853, p.96
<i>candidula</i> 2581	<i>celeusi</i> 1570	<i>chrysitis</i> 2592	<i>clavipalpis</i> 2642
<i>canella</i> 1669	<i>celsia</i> 2775	<i>chrysocornæ</i> 774	<i>clavis</i> 2931
<i>canescana</i> 1187	<i>cembrella</i> 1752	<i>chrysodactylus</i> 1562	<i>clematellus</i> 230
<i>cannæ</i> 2783	<i>centaureata</i> 2241	<i>chrysodesmella</i> 650	<i>clerkella</i> 486
<i>capitata</i> 2147	<i>centifoliella</i> 41	<i>chrysolepidella</i> 8	<i>cloacellus</i> 225
<i>capitella</i> 162	<i>centonalis</i> 2540	<i>chryson</i> 2594	<i>clorana</i> 2546
<i>caprana</i> 1361	<i>centuriella</i> 1751	<i>chrysonuchella</i> 1744	<i>cloraria</i> 2045
<i>capreana</i> 1317	<i>cephalonica</i> 1612	<i>chrysoprasaria</i> 2047	<i>clypeiferella</i> 802
<i>capreolana</i> 1279	<i>cephiformis</i> 1096	<i>chrysorrhoea</i> 2440	<i>cnicana</i> 1243
<i>capreolaria</i> 2384	<i>cerasana</i> 1135	<i>chrysotheme</i> 1905	<i>cnicella</i> 511
<i>capreolella</i> 512	<i>cerasi</i> 2847	<i>chrysozona</i> 2804	<i>coenobita</i> 1915
<i>capsincola</i> 2805	<i>cerasicolellus</i> 332	<i>cicatricalis</i> 2542	<i>coenobita</i> 2550
<i>captiuncula</i> p.98	<i>cerasivorella</i> 685	<i>cicatricella</i> 12, p.98	<i>coerulata</i> 2168
<i>capucina</i> 2422	<i>ceratoniae</i> 1666	<i>cidarella</i> 379	<i>coffeella</i> 297
<i>capucina</i> 2513	<i>cerealella</i> 1052	<i>ciliatella</i> 946	<i>cognata</i> 2160
<i>caradjai</i> 867	<i>cereana</i> 1610	<i>ciliella</i> 506	<i>cognatana</i> 1488
<i>carbonana</i> 1325	<i>cerricolella</i> 85	<i>ciliella</i> 1267	<i>cognatellus</i> 391
<i>carchariella</i> 910	<i>cerrutiellus</i> 343	<i>cinctana</i> 1165	<i>collina</i> 2902
<i>cardamines</i> 1901	<i>certata</i> 2181	<i>cinctaria</i> 2356	<i>collitella</i> 634, p.96
<i>carduella</i> 522	<i>certella</i> 414	<i>cinctella</i> 1036	<i>colonella</i> 1613
<i>cardui</i> 1923	<i>cerusella</i> 630	<i>cincticulella</i> 1037	<i>columbariella</i> 249
<i>cariosella</i> 465	<i>cerussellus</i> 1749	<i>cinerea</i> 2933	<i>colutella</i> 713
<i>carlinella</i> 876	<i>cervicella</i> 544	<i>cinereana</i> 1369	<i>comæ</i> 2058
<i>carlinellus</i> 1686	<i>cervinalis</i> 2181	<i>cinerella</i> 1045	<i>comari</i> 78
<i>carmelita</i> 2426	<i>cervinata</i> 2132, 2181	<i>cinerosella</i> 1675	<i>comariana</i> 1199
<i>carnella</i> 1619	<i>cespitalis</i> 1787	<i>cingillella</i> 652	<i>combinella</i> 398
<i>carniolica</i> 1113	<i>cespitana</i> 1280	<i>cingulalis</i> 1789	<i>comes</i> 2870
<i>carphodactyla</i> 1600	<i>cespitis</i> 2854	<i>cingulata</i> 1790	<i>comitata</i> 2136
<i>carpinata</i> 2292	<i>chaerophyllella</i> 1553	<i>ciniflonella</i> 496	<i>comma</i> 1887, 2827
<i>carpinella</i> 59, 287	<i>chaerophylli</i> 547	<i>cinnamomea</i> 579	<i>comma</i> 2663
<i>carpinicolellus</i> 316	<i>chalcogrammella</i> 720	<i>cinnamomeana</i> 1136	<i>communana</i> 1173
<i>carpophaga</i> 2812	<i>chamaedriella</i> 736	<i>cinnamomella</i> 1678	<i>comparana</i> 1200
<i>carthami</i> 1880	<i>chamaedryella</i> 736	<i>cinxia</i> 1939	<i>comparellus</i> 343
<i>cassellum</i> 1018	<i>chamomillæ</i> 2608	<i>circe</i> 1954	<i>complanella</i> 170
<i>casta</i> 188, 2483	<i>chaonia</i> 2412	<i>circellaris</i> 2689	<i>complanum</i> 2461
<i>castalis</i> 1786	<i>characteræa</i> 2739	<i>circumvoluta</i> 1664	<i>compositella</i> 1521, 1644
<i>castanea</i> 2901	<i>charpentierana</i> 1337	<i>cirrigerella</i> 1661	<i>compsa</i> 615
<i>castigata</i> 2262	<i>chenopodiata</i> 2106	<i>cirsianum</i> 1415	<i>compta</i> 2808
<i>castrense</i> 1837	<i>chenopodiella</i> 848	<i>citrato</i> 2687	<i>comptana</i> 1341
<i>catax</i> 1834	<i>chi</i> 2725	<i>citrana</i> 1439	<i>compunctella</i> 401
<i>catharticella</i> 39	<i>chilonella</i> 1027	<i>citrata</i> 2150	<i>concomitellus</i> 334
<i>cauchiata</i> 2248	<i>chiron</i> 2007	<i>citrinalis</i> 587	<i>confusa</i> 2584, 2809
<i>caudulatella</i> 278	<i>chloerata</i> 2270	<i>clathrata</i> 2306	<i>confusalis</i> 2539
<i>cauligenellum</i> 1009	<i>chlorosata</i> 2318	<i>clathrella</i> p.96	<i>confusana</i> p.97
<i>cautella</i> 1692	<i>choragella</i> 206	<i>clausethaliana</i> 1302	<i>confusella</i> 26, 1739
<i>cavellus</i> 319	<i>christyi</i> 2190	<i>claustrilla</i> 186	<i>congelatella</i> 1183
<i>cavernosa</i> p.98	<i>chrysanthæana</i> p.97	<i>clavaria</i> 2132	<i>congruella</i> 144

- conicolana 1495
coniferana 1499
conigera 2829
conjugella 432
connectalis p.97
connexellus 345
conopiformis 1094
consanguinella 1029, p.97
consimilana 1159
consocia 2716
consociella 1651
consona 2588
consonaria 2367
consortana 1532
consortaria 2362
consortella 667
conspersella 889
conspicillaris 2851
conspicuella 743
constanti 1606
contaminana 1202
contaminella 1748
conterminana 1437
conterminata 2225, p.98
conterminella 500
contigua 2799
contiguaria 2078
continuella 72
continuellus 960
contubernella 1621
conturbatella 820
convergens 2723
conversa 2522
convolutella 1670
convolvuli 1852
conwagana 1171
conyzae 708
copiosellum 406
coprodactyla 1578
coracipennella 683
cordigera 2794
coriacella 452
coridon 2015
cornella 428
cornuta 688
cornutella 688
corollana 1504
coronata 1804
coronata 2268
coronillae 741
coronillana 1522
coronillella 1035
corrivalaria 2070
corticana 1316, 1393
corticana 1337
corticata 2175
corticea 2930
corticella 167
corticella 236
corvimontana 48
corylana 1134
corylata 2163
coryli 315, 2552
corylifoliellus 317
cosmodactyla 1576
cosmophorana 1497
cossus 1074
costaestrigalis 2505
costalis 1695
costana 1158, 1164
costella 997
costipunctanum 1412
costosa 531
cotoneastrella 69
cotoneastri 52
crabroniformis 1080
cracca 2529
cramerellus 301
crassa 2927
crassalis 2507
crassiflavella 214
crassiorella 189
crassiuscula 862
crataeganus 1146
crataegella 1758
crataegella 49, 387
crataegi 1832, 1896
crataegi 376
craterellus 1743
crenana 1382, 2428, 2738
crenulella 204
crepuscularia 2366
crepusculella 205
crepusculella 21
cretica 2789
cribraria 2466
cribrella 1664
cribrum 2466
cribrumalis 2493
cristalis 1646
cristalis 494
cristana 1214
cristatella 367
cristatula 2541
cristella 1646
crocea 1907
croceago 2699
crocealis 1810
crocina 713
croesella 146
cruciana 1379
cruda 2843
cruentaria 2101
crypta 2921
cryptella 94
cryptica 1097
cucubali 2811
cuculata 2120
cuculipennella 258
cuculla 2423
cucullatella 2538
cucullina 2423
culcitella 498
culciformis 1087
culmella 1714
culmella 1729
cultraria 2024
cuneatella 980
cuprariella 707
cuprea 2880
cuprella 150
cupriacella 137
cuprifulgella 707
currucipennella 731
curtisellus 409
curtula 2429
curvatula 2021
curvella 428
curvipunctosa 510
curvistrigana 1232
cuspidella 846
cuspis 2556
cyaneimarmorella 222
cydoniellus 337
cygnipennella 631
cyllarus 1996
cynosbatellum 1402
cysisella 899, 975
dahlii 2863
dalecarlianus 1284
damon 2010
danicana 1427
daphnella 493
daphnis 2017
daplidice 1900
daucella 545
dealbana 1395
deauratella 722, 866
debiliata 2271
decentella 104
deceptoria 2580
decidua 172
deciduana 1502
decimalis 2853
decimana p.97
decolorata 2203
decora 2917
decorata 2065
decorella 1640
decorella 824
decorellus 933
decrepidella 949
decrepitis 1817
decrepitanus 1285
decretanus 1145
decurtella 905
defoliaria 2352
degeerella 143
degenerana 2544
degreyana p.97
deliella 1724
delitellus p.96
delphinii 2635
demarniana 1366
demaryella 375
denigratella 860
denisella 585
denotata 2234
dentalis 1774

dentaria 2328	diminutana 1348	dromedarius 2409	<i>ephippella</i> 435
dentella 441, 1547	<i>diniana</i> 1394	drurella 901	<i>epilobiella</i> 814
denticulella 296	<i>dipoltella</i> 1245	dryadella p.97	<i>epilobiella</i> 827
<i>dentina</i> 2802	<i>dipsacea</i> 2628	dryas 1953	epiphron 1957
<i>deplana</i> 2463	directella 788	dubiella 252	epomidion 2739
depressana 548	discordella 719	<i>dubitalis</i> 1756	eppelsheimi 902
<i>depressella</i> 548	discretana 1517	dubitana 1262	equitella 472
depressum 2463	<i>disertella</i> 638	dubitata 2183	erate 1908
depuncta 2890	dispar 1975, 2445	dubitellus 346	eremita 2724
<i>derasa</i> 2026	dispilella 639	dumerilella 141	erepricula 2572
<i>derasana</i> 1342	dispunctella 643	dumetana 1138	ericellus 1718
derasella 1065	<i>disquei</i> 1049	dumetatus 2385	ericetana 1327
<i>derivialis</i> 2492	dissimilella 864	<i>dumetellus</i> 1720	<i>ericetana</i> 1400
derivana 1190	<i>dissimilis</i> 2801	dumi 1850	<i>ericetaria</i> 2373
derivata 2134	dissoluta 2781	dumonti 1103, p.97	ericetella 967
<i>deserta</i> 2483	dissolutanus 1289	duplana 1450	ericetorum 1563, p.97
desertella 949	distans 1565	duplaris 2030	ericinella 907
designata 2112	distentellus p.96	duplicana 1487	<i>erigerana</i> 1257
desmodactylla 1558	<i>distigmatella</i> 639	duplicella 178	<i>erigerella</i> 769
desperatella 55	distincta 1599	dysodea 2804	erminea 2402
despicata 1787	distinctana 1537		<i>erosalis</i> 1829
detersa 2663	distinctaria 2239	eberhardi 91	erosarius 2326
detrita 2446	distinctata 2379	<i>eburnata</i> 2078	<i>eruta</i> 2920
deversaria 2096	distinctellus 959	<i>ectypanum</i> 1193	erxlebella 365
devoniella 289	<i>distinguenda</i> 30, 32	<i>edusa</i> 1907	erythrocephala 2703
dia 1936	ditella 211, 745	efformata 2277	esperellus 316
diamina 1942	ditrapezium 2896	effractella 1671	eumedon 2007
diana 1132	diversana 1140	egenaria 2229	eunomia 1938
<i>dictaeoides</i> 2418	diversata 2332	ehikeella 874	<i>euphemus</i> 2000
<i>dictynna</i> 1942	<i>divisa</i> 2573	ekebladella 170	euphorbiae 1864, 2564
didactyla 1567	divisella 824	electa 2518	euphorbiana p.97
didactylites 1598	dodecadactyla 1559	electellus 953	<i>euphrasia</i> 1934
didyma 1941, 2760	dodecea 556	elegans 616	<i>euphrasiata</i> 2233
didymatum 2204	dodecella 919	elinguaria 2336	euphrosyne 1935
diffinis 937, 2677	dodonea 171, 2411	elocata 2517	eurema 95
dignella 740	dodoneata 2220	elongella 261, 890	europaea 2211
dilectaria 2301	<i>dohrniana</i> 1156	elpenor 1867	euryale 1956
dilucidarius 2392	dolabraria 2316	elutalis 1819	<i>evidens</i> 2814
dilucidella 1628	dolosellus 913	elutella 1690	evonymaria 2333
<i>diluta</i> 1647	domestica 2574	emargana 1223	evonymellus 388
dilutaria 2083	dominula 2485	emarginata 2091	exactella 665
dilutata 2189	doronicella 526	emberizaepennellus 330	exanthemata 2376
dilutella 1647	<i>dorsana</i> 1518, 1524	emeritella 534	exclamationis 2929
dimidiana 1306	dorsiguttella 86	emortualis 2491	exigua 2650
<i>dimidiana</i> 1309	<i>dorylas</i> 1977	<i>emortuella</i> 236	exiguata 2263
dimidiata 2076	dorylas 2011	empiformis 1105, p.97	<i>eximia</i> 830
dimidiella p.97	<i>dotata</i> 2143, 2145	ephemerella 1703	<i>expallidana</i> 1429
<i>dimidioalba</i> 1304	douglasella 538	ephialtes 1117	expallidata 2252

expressella 789	ferruginea 2655	flaviventris 1089	<i>frischella</i> 705
exsoleta 2719	<i>ferruginella</i> 242	flavofasciatum 2203	frischella 706
<i>extersaria</i> 2368	festaliella 1545	<i>fletcheri</i> 40	<i>fritillarius</i> 1880
extimalis 1773	festiva 2473	<i>flexana</i> 1459, 1460	froelichiellus 324
extraversaria 2242	<i>festiva</i> 2862	flexula 2534	frumentalis 1768
extrema 2785	festivella 808	floralis 1778	frustata 2188
extremella 840	festucae 2590	florida 2866	fuciformis 1860
	fibulella 153	floslactata 2073	fucosa 2768
fabriciana 1127	fidella 271	floslactella 58	fugacellus 932
faecella 1620	figulilella 1694	fluctuata 2117	fugax 2913
<i>faganus</i> 2549	filigrama 2810	fluctuosa 2029	fugitivellus 931
fagata 2193	filipendulae 1119	<i>fluviata</i> 2110	fulgidella 1737
fagella 596	<i>fimbrialis</i> 1695	fluxa 2786	fuligana 1301
fagi 1948, 2406	fimbrialis 2046	foedellus 1615	<i>fuligana</i> 1325, 1332
fagiglandana 1491	<i>fimbriana</i> 1467	foenellum 1411	fuliginaria 2502
<i>faginellus</i> 305	fimbriata 2871	follicularis 795	fuliginosa 2480
fagivora 285	finitimella 294	<i>fontis</i> 2507	fuliginosella 1676
falcatalis p.98	firmata 2155	forcipula 2925	fulminea 2523
falcataria 2020	<i>fischerella</i> 471	forficalis 1770	<i>fulminea</i> 2855
falcella 442	fischerellum 1005	forficella 583	<i>fulva</i> 2787
falciformis 1552	fissana 1516	<i>forficella</i> 591	<i>fulvago</i> 2684
falconipennella 268	<i>fissipuncta</i> 2672	forficellus 1709	fulvalis 1814
fallacella p.97	flaccidaria 2068	formicaeformis 1088	fulvana 1426
<i>fallouella</i> 1652	flagellana 1253	formosa 1623	<i>fulvana</i> 1427
falsella 1738	flammatra 2859	formosana 1454	<i>fulvaria</i> 2310
<i>farfarae</i> 1413	flammea 2850	formosella 572	fulvata 2153
farinalis 1698	flammealis 1702	forsskaleana 1197	<i>fulvescens</i> 827
farinata 2281	flammeolaria 2283	forsterana 1163	fulviguttella 1548
<i>farinatella</i> 405	<i>flavaginella</i> 766, 768	forsterella 473	fulvimitrella 237
farinella 600	<i>flavago</i> 2681	<i>fractifasciana</i> 1389	<i>fumata</i> 2072
fascelina 2437	flavago 2773	<i>fragariae</i> 286	fumatellus 954
fascelinella 1745	flavalis 1823	<i>fragariella</i> 73	fundella 430
fasciana 1478	<i>flavella</i> 519	francillana 1254	funebrana 1510
<i>fasciana</i> 2577	flavicaput 809	<i>frangulella</i> 381	funebri p.98
fasciaria 2383	flaviciliana 1260	frangutella 381	<i>funerella</i> 557
fasciella 139	<i>flaviciliella</i> 1636	frankii 786	fungivorellus 232
<i>fasciella</i> 1065	flavicincta 2729	fraternana 1374	furcata 2167
fasciolaria 2311	flavicinctata 2129	fraudatricula 2571	furcifera 2715
fasciuncula 2756	flavicomella 965	fraudatrix 2606	furcula 2404
<i>fastuosella</i> 7	flavicornis 2031	<i>fraxinana</i> 1472	furfurana 1336
<i>favillaceana</i> 1167	flavidorsana 1526	<i>fraxinata</i> 2238	furuncula 2757
fenestrella 1830	flavifrontella 554	fraxinellus 358, 409	furva 2741
ferrago 2830	flavimaculellus 935	fraxini 2515	<i>furvalis</i> 1767
ferrugalis 1822	flavimitrella 163	<i>frequentella</i> 1764	furvatus 2386
ferrugana 1205	flavipalpana 1278	freyella 27	furvella 532
<i>ferrugana</i> 1206	flavipennella 675	freyerella 664	furvula 2652
ferrugata 2114	<i>flavirena</i> 2641	freyi p.96	fusca 202, 1643
ferrugella 584	flaviventrella p.97	friesei 407	fuscalis 1811

<i>fuscantarius</i> 2327	<i>geyeriana</i> 1234	<i>graphanum</i> 1416	<i>hebe</i> 2473
<i>fuscatella</i> 166	<i>gibbosella</i> 987	<i>graslinella</i> 201	<i>hebenstreitella</i> 1142
<i>fuscedinella</i> 684	<i>gigantellus</i> 1708	<i>gratiosella</i> 56	<i>hecta</i> 17
<i>fuscella</i> 247	<i>gilva</i> 2643	<i>gregori</i> 641, p.96	<i>hedemanni</i> 636, p.96
<i>fuscescens</i> 573	<i>gilvago</i> 2685	<i>gregori</i> 337	<i>heegerana</i> 1528, p.97
<i>fuscipunctella</i> 247	<i>gilvaria</i> 2398	<i>gregsoni</i> 664	<i>heegeriellus</i> 308
<i>fuscoanea</i> 863	<i>gilvata</i> 1793	<i>grisealis</i> 2496	<i>heinemannii</i> 174
<i>fusocuprella</i> 689	<i>gilvicomana</i> 1231	<i>griseana</i> 1394	<i>helianthemella</i> 100
<i>fuscolimbata</i> 1590	<i>gimmerthaliana</i> 1380	<i>griseata</i> 2058	<i>helianthemellus</i> 300
<i>fusconebulosus</i> 19	<i>glabratella</i> 413	<i>griseata</i> 2280	<i>helicoidella</i> 204
<i>fuscovenosa</i> 2084	<i>glarearia</i> 2307	<i>grisella</i> 1611	<i>helle</i> 1973
<i>fuscula</i> 2577	<i>glareosa</i> 2884	<i>griseella</i> p.96	<i>hellerella</i> 810
	<i>glauca</i> 2821	<i>griseolum</i> 2457	<i>hellmanni</i> 2786
<i>galactodactyla</i> 1593	<i>glaucatus</i> 2018	<i>griseovariegata</i> 2850	<i>helveticaria</i> 2249
<i>galatellae</i> 779	<i>glaucella</i> 1652	<i>groenlieni</i> 348	<i>helvola</i> 2693
<i>galathea</i> 1947	<i>glaucicolella</i> 757	<i>gronoviella</i> 837	<i>helvolana</i> 1155
<i>galbanella</i> 950	<i>glaucina</i> 2705	<i>grossana</i> 1491	<i>hemargyrella</i> 82
<i>galbulipennella</i> 777	<i>glaucinalis</i> 1697	<i>grossulariatus</i> 2297	<i>hemerobiella</i> 711
<i>galiata</i> 2126	<i>glaucinalis</i> 2492	<i>grossulariella</i> 1670	<i>hemidactylella</i> 270
<i>gallicana</i> 1492	<i>glaucinararia</i> 2390	<i>grotiana</i> 1166	<i>heparana</i> 1137
<i>gallicollana</i> 1471	<i>glaucinella</i> 426	<i>gruneriana</i> 1538	<i>hepatariana</i> 1423
<i>gallii</i> 1865	<i>gleichenella</i> 605	<i>grunertiana</i> 1486	<i>hepatariellus</i> 551
<i>gallipennella</i> 739	<i>glitzella</i> 697	<i>gryphipennella</i> 674	<i>hepatica</i> 2713, 2739
<i>gamma</i> 2595	<i>globulariae</i> 1109	<i>gudmanni</i> 540	<i>hepatica</i> 2823
<i>gangabella</i> 654	<i>glutinosae</i> 32	<i>gueneana</i> 1535	<i>hepaticanum</i> 1418
<i>gaunacella</i> 175	<i>glycerion</i> 1967	<i>guttea</i> 296	<i>hera</i> 2484
<i>gei</i> 73	<i>glyphica</i> 2533	<i>gysseleniella</i> 404	<i>heracliana</i> 505
<i>gelidata</i> 2236	<i>gnaphaliella</i> 369		<i>heracliana</i> 543
<i>gemina</i> 2745	<i>gnoma</i> 2418	<i>halterata</i> 2290	<i>herbariata</i> 2086
<i>geminana</i> 1347	<i>gnomana</i> 1164	<i>hamalis</i> 1821	<i>hercyniae</i> 1731
<i>geminana</i> 1388	<i>goedartella</i> 424	<i>hamana</i> 1237	<i>hercyniana</i> 1302
<i>geminipuncta</i> 2780	<i>gonodactyla</i> 1585	<i>hamellus</i> 1722	<i>heringi</i> 118, 635
<i>gemmea</i> 2730	<i>gonostigma</i> 2435	<i>hannoverella</i> 112	<i>hermanella</i> 901
<i>gemma</i> 914	<i>goossensiata</i> 2251	<i>harpagula</i> 2022	<i>hermelina</i> 2405
<i>gemmiferana</i> 1507	<i>gothica</i> 2842	<i>harrisellus</i> 301	<i>herminatum</i> 177
<i>geniculea</i> 1730	<i>gozmanyana</i> 1335	<i>hartigiana</i> 1310	<i>hermione</i> 1948
<i>geniculellus</i> 354	<i>gracilis</i> 2848	<i>hartmanniana</i> 1252	<i>hero</i> 1965
<i>genistae</i> 715	<i>gracilivora</i> 43	<i>hasarorum</i> 213	<i>heroldella</i> 399
<i>genistae</i> 2795	<i>graminicolella</i> 800	<i>hastana</i> 1440	<i>herrichiana</i> 1453
<i>genitalana</i> 1180	<i>graminis</i> 2852	<i>hastata</i> 2179	<i>herrichiana</i> 1478
<i>gentiana</i> 1322	<i>grammodactyla</i> 1556	<i>hastiana</i> 1213	<i>herrichiella</i> 192, 601
<i>gentianaeana</i> 1322	<i>grandaevanum</i> 1409	<i>hastulata</i> 2121	<i>herrichii</i> 623
<i>gentianana</i> 1322	<i>grandis</i> 567	<i>hauderiellus</i> 314	<i>heterodactylus</i> 1596
<i>geographica</i> p.98	<i>granellus</i> 224	<i>haworthana</i> 474	<i>hexadactyla</i> 1555
<i>germmana</i> 1479	<i>granitana</i> 1377	<i>haworthi</i> 12	<i>heydeni</i> 228
<i>germingana</i> 1168	<i>granitella</i> 466	<i>haworthiata</i> 2209	<i>heydeniana</i> 1257
<i>geronella</i> 1068	<i>granulatella</i> 778	<i>haworthii</i> 2777	<i>hieracii</i> 1562
<i>geryon</i> 1111	<i>granulatella</i> 796	<i>headleyella</i> 92	<i>hilarana</i> 1228

hilarellus 348	ibipennella 728	incertana 1181	<i>interruptella</i> 297
hippocastanaria 2317	icarus 2014	incognitana 1529	<i>interruptella</i> 972
hippomarathri 508	ichneumoniformis 1098	incognitella 80	intimella 111
hippotoe 1979	i-cinctum p.98	inconditellus 228	intricata 2249
hirsuta 196	ictella 1546	incongruella 552	inturbata 2217
hirtaria 2342	<i>icterana</i> 1153	incursana 1540	inulae 1601
hispidarium 2340	icterata 2265	incursata 2118	<i>inulifolia</i> 795
histrionana 1150	<i>icterella</i> 752	indigata 2255, p.98	inunctella 871
hofmanniella 284	icteritia 2684	indivisa 1498	inundana 1321
hohenwartiana 1425	idaea 690	<i>infernalis</i> 966	inustella 1004
<i>hohenwartiana</i> 1428	idaei 819	infernella 966	io 1920
<i>holdnella</i> 612	idas 2003	infida 1314	<i>iphis</i> 1967
holmiana 1198	ignicomella 221	infidana 1422	ipsilon 2929
homoiodyctyla 1595	<i>ignobilella</i> 56	infidaria 2130	iris 1910
honoraria 2382	ignorantellus 957	<i>inflatellum</i> 1008	irregularis 2813
<i>hornigi</i> 703	ilia 1911	inflexella 891	irriguata 2256
hornigi 896	ilicifolium 1844	infuscata 2152	irrorella 2448
hornigii 1668	ilicis 1986	ingratella 1757	irrorellus 392
horridella 445	<i>ilignella</i> 1628	<i>ingrica</i> 2716	isabellae 2344
<i>hortellus</i> 310	illigerella 1551	innotata 2238	isertana 1393
<i>hortuella</i> 1714	illuminatella 412	ino 1933	<i>ismenias</i> 2004
hortulata 1802	illutana 1500	inopiana 1224	<i>isogrammaria</i> 2209
hostilis 1626	illyria 2747	<i>inornata</i> 2095	ivella 423
<i>huebnerella</i> 1057	<i>ilmatariella</i> 950	<i>inornatana</i> 1349	
huebneri 591, 1019, 1557	imbecillus 2856	inornatella 1069	<i>jaceana</i> 1426
<i>huebneri</i> 1020	imella 243	inquilina 1467	jacobaeae 2486
<i>humeralis</i> 933	<i>immaculata</i> 2047	inquinata 2086	janiszewskae 844
humerella 1026	<i>immanata</i> 2150	inquinalis 1816	janthina 2872
humidalis 2506	immorata 2059	inquinatana 1494	janthinana 1508
humiliata 2085	immundana 1367	inquinatella 1726	<i>janthinella</i> 1630
humilis 626, 2694	immundata 2246	insectella 210	josephinae 553
humuli 15	immundella 96	insecurella 1554	jota 2598
hungaricella 1031	immutata 2071	insigniata 2243	jubata 2360
hyale 1903	imparellus p.97	insignitellus 356	<i>juliana</i> 1478
hyalinalis 1799	implicitana 1258	insolita 1083	juncicolella 699
hybnerella 56	impluviata 2168	insperatella 298	junctanum 1419
hybridana 1271	<i>impudens</i> 2833	inspersella 855	junctellum 1017
hybridella 1261	impura 2835	insulana 1470	jungiella 1514
hydratum 2197	impurata 2259	interjecta 2873	juniperata 2161
hyemana 1215	<i>impurella</i> 502	<i>interjectana</i> 1178	juniperella 1062
hylaeformis 1077	incanana 1189	<i>interjectaria</i> 2083	junoniellus 339
<i>hylas</i> 2011	incanata 2069	intermedia 2391	jurtina 1960
hymenaea 2521	<i>incanata</i> 2087	internella 571	juventina 2666
hyperantus 1962	<i>incanella</i> 627	interposita 2869	
<i>hypericana</i> 1457	<i>incarnana</i> 1395	interpunctella 1688	kadenii 2640
hypericella 502	incarnatanum 1405	interrogationis 2601	kaekeritziana 519
hyperici 2665	incarnatella 462	interrupta 972	karelica 1455
<i>hypsipyle</i> 1889	incerta 2841	<i>interruptana</i> 1487	kilmunella 613

kindermanniana 1255	lantanelus 331	leucapennella 273	lipsiella 597
kiningerella 1002	laodice 1928	<i>leucapennella</i> 670	<i>listerella</i> 183
kitti 2817	<i>lapella</i> 255	leucatella 918	literana 1222
kleemannellus 323	lapidata 2170	leucocerella 151	literosa 2758
klimeschi 114, 992	lapideana 1329	leucodactyla 1589	<i>lithargyrana</i> 1205
<i>klimeschi</i> 770	lappella 873	leucographa 2908	<i>lithargyria</i> 2830
klosi 1013	laponica 25	leucographellus 318	lithargyrinella 712
<i>knaggsiellum</i> 1019	laquaearia 2214	leucomelanellum 1010	lithodactylus 1605
knochella 849	laricana 1442	<i>leucophaea</i> 2855	lithoxylaea 2736
koernerella 158	laricella 754	leucophaearia 2348	<i>litterata</i> 1826
kochiana 1384	lariciata 2223	leucopsiformis 1104	littorcola 648
kochiella 1211	<i>laripennella</i> 771	leucostigma 2776	litura 2695
kollariella 279	larseniella 1038	leuwenhoekella 828	litrata 2305
kroesmanniellum 1020	laspeyrella 807	levana 1925	<i>liturella</i> 501
kroneella 682	latens 2883	libatrix 2512	liturosa 501
kuehnella 727	laterana 1200	libertinella 884	livida 2625
kuehniella 1689	laterella 521	lichenarius 2364	livornica 1866
	<i>laterellus</i> 234	liebwerdella 108	lixella 750
l-album 2837	lateritia 2740	lienigiana 1604	ljungiana 1139
<i>l-album</i> 1918	lathonia 1932	lienigiella 833	lobarzewskii 1512
l-nigrum 2443	lathoniellus 1721	ligea 1955	lobella 495, p.97
laburnella 480	lathyrana 1513	<i>lignata</i> 2109	lobulina 1843
labyrinthella 363	<i>latifasciana</i> 1200	lignella 1639	locupletella 816
lacertinaria 2019	<i>latifascianus</i> 1298	ligula 2701	loefflingianum 1193
lacteana 1335, 1433	latipennella 1044	<i>ligulella</i> 1036, 1038	<i>logiana</i> 1208
lactearia 2048	<i>latreillella</i> 829	ligustri 1854, 2566	logiana 1212
lacteella 822	latruncula 2755	limacodes 1125	longicaudella 109
<i>lactella</i> 589	<i>laurinata</i> 2174	<i>limbalis</i> 1793	<i>longicornis</i> 962
lactucae 2610	lautellus 306	limbata 1766	loniceræ 1121
lacunanus 1297	ledi 487, 695	limbella 848	lonicerarum 84
lacustrata 1758	ledianus 1283	<i>limitata</i> 2106	lophyrella 843
laeta 1122	lediella 79	limosella 275, 1064	lorana 1571
laetana 1340	<i>legatalis</i> 1658	limosipennella 680	loranthi 1097
laetella 1763	legatea 1658	linariata 2212	lorquiniana 1218
laevigata 2082	<i>legatella</i> 1658	lineana 1315, 1677	lota 2690
laevigatella 411	legatella 2273	linearia 2057	lotella 482, 1617
laevigella 240	leguminana 1505	<i>lineariella</i> 783	loti 1115
laevis 2696	lecheanum 1162	<i>lineata</i> 1866	louisella 103
laichartingellum 177	lemnata 1705	lineata 2397	lubricipeda 2476
lambdella 570	lemniscella 71, 1022	lineatella 1055	<i>lubricipeda</i> 2477
lamda 2717	<i>lenigaria</i> 2051	lineola 1885	lucella 446
laminella 859	<i>lenta</i> 2652	lineolea 710	lucens 2769
lampra 2814	lentiginosella 973	lineolellum 1070	lucida 2576
lancealana 1334	<i>leonhardi</i> 251	linneella 806	<i>lucida</i> 2692
lancealis 1803	<i>leonuri</i> 1572	linogrisea 2874	lucidella 893
lanceata 2226	<i>lepida</i> 2812	linosyridella 787	lucifuga 2609
lanestris 1833	leporina 2560	linosyris 765	<i>lucilla</i> 1915
langiella 814	leucacrinella 1663	lipsiana 1216	lucina 1972

- lucipara 2659
 lucipeta 2882
lucivagana 1277
 luctifera 2481
luctuata 2121
 luctuata 2178
 luctuellus 955
 luctuosa 2531
luctuosanum 1414, 1415
 luctuosella 564
 luculellus 934
 ludifica 2551
 luedersiana 1463
 lugdunarium 2198
lugdunensis 647
lugubrata 2178
 lugubrellus 952
 lunaedactyla 1573
 lunalis 2499
 lunanus 1170
lunaria 2329
 lunaris 2524
lundana 1353
lunigera 1843
 lunula 2619
 lunulana 1518
 lunularia 2329
 lupulinus 18
 luridata 2108
luridata 2368
 lurideolum 2462
 luridicomella 575
 lusciniaepennella 692
 lusoria 2526
 lustratella 484
 lutarea 403, 669
 lutatellum 1071, 2458
lutea 2681
 luteago 2806
 lutealis 1813
 luteella 31, 1746
 luteolata 2319
 luteum 2477
 luticomella 617
 lutipennella 672
 lutosa 2766
 lutulenta 2710
 lutulentella 892
- luzella 161
 lycaon 1961
 lychnidis 2688
 lychnitis 2616
 lythargyrella 1741
- maccana 1221
 machaon 1893
 macilenta 2691
 maculalis 1733
 maculana 1360
 macularia 2314
maculata 2359
 maculatella 974
maculeum 1014
maculiferellum 1015
maculipennis 458
 maculosa 2482
 maculosana p.97
 maera 1970
 maestingellus 305
 magdalenae 50
magnatella 570
magnificella 604, 605
 maillardi 2742
maja 1927
majorella 472
 malella 37
mali 80
 malifoliella 483
 malinellus 390
 malvae 1876
malvella 1054
 manniana 1233
 mannii 180, 304
 margaritacea 2879
margaritalis 1773
 margaritana 1245
 margaritata 2381
 margaritella 1736
 margarotana 1250
margarotana 1453
 marginana 1324
 marginaria 2351
 marginata 2299
 marginea 173, 1636
 marginella 1061, p.97
 marginepunctata 2067
- marginepunctellum* 177
marginicella 71
 mariae p.96
 maritima 2629
maritima 1433
 maritimus 1686, 2651
 marmorea 1656
 marmoreum 1012
marmorosa 2792
martialis 1822
 martinii 610, 881 K
 masculella 160
 matronula 2470
mattiacella 858
 matura 2657
 maturna 1945
 maura 2656
 maurella 217
 mayrella 723
 mazzolella 149, p.96
 medicaginellus 355
 medicaginis 1483
mediopectinella 455
 medullana 1421
 medusa 1959
 megacephala 2554
 megera 1969
 megerlella 651
melagona 2415
 melanaria 2365
melanella 1639
 melanocephala 1081
meleager 2017
meliloti 1116
 mellinata 2144
 mellonella 1610
 mendica 2479, 2862
mendica 431
 mendicella 223
menthastri 2476
 menyanthidis 2562
 mercurella 1764
 meridionella p.96
 mesomella 2454
 mespilellus 335
 mespilicola 57
 messingiella 463
 metallella 128
- metallica 136
 metallicanus p.97
metallicella 127
 metaxellus 133
 meticulosa 2660
 metzneriana 1434
 metzneriella 875
 mi 2532
 miata 2149
 micacea 2770
 micanus 1292
 micella 887
 microdactyla 1597
 microdon 2792
 microgrammana 1458
 microtheriella 34
 milhauseri 2417
 millefoliata 2264
 millefolii 780
 milleniana 1502
 milvipennis 677
 miniata 2450
 minima 2784
 minimella 126, 140
 minimus 1990
 miniosa 2844
minosella 1617
 ministrana 1172
minorana 1181
 minoratum 2200
 minorella 1046
minorella 472
 minos 1123
 minusculella 54
 minutana 1397
 minutatum 2582
 minutella 574
 miscella 818
misella 210
 mitterbacheriana 1345
mixtana 1215
 mnemosyne 1891
modesta 2589
modestella 669
 modestoides 2589
 moeniata 2104
 molesta 1511
 molluginata 2125

molothina 2875	myella p.98	<i>nigrella</i> 647, 664	<i>nylandriella</i> 50
monacha 2444	mygindianus 1286	nigrescentellus 359	nylandriella 51
monachella 244	myllerana 1128	nigricana 1371, 1496	nymphaeata 1704
moneta 2587	myopaeformis 1093	nigricans 2919	
moniliata 2097	<i>myosotivora</i> 603	<i>nigricella</i> 683	obductella 1622
<i>monilifera</i> 178	myrmidone 1906	nigricomella 368	obelisca 2922
monodactyla 1607	myrtillana 1354, 1390	nigricostana 1326	obeliscata 2156
monoglypha 2734	myrtillella 63	nigricostellus 939	obesalis 2510
monosemiella 630	myrtilli 2793	<i>nigrobrunella</i> 37	obfuscata 1788
montanana 1534	mytilella 1734	<i>nigrofasciata</i> 2134	obliquella 65
montanata 2116		<i>nigromaculana</i> 1438	<i>obliquella</i> 651
<i>monticola</i> 614	naevana 1388	nigropunctata 2062	oblitella 1679
moravica 98	nana 1266	<i>nigrovittana</i> 1334	<i>obliterata</i> 2286
morio 2434	<i>nana</i> 2802, 2809	nimbellum 1682	obliterata 2415
moritzella 1003	nanana 1381	niobe 1931	oblonga 2744
morosa 165	nanata 2237	nisella 1369	oblongana 1323
morpheus 1883	nanatella 518	nitida 2692	<i>oblongata</i> 2241
morpheus 2639	nanella 917	<i>nitidalis</i> 1697	obsценella 762
motacillella 767	napi 1899	nitidana 1460	<i>obscura</i> 2745, 2886
mouffetellus 938	naturnella 24	nitidata 2093	obscurana 1464
mucronata 2107	nausithous 2001	<i>nitidella</i> 46, 436	<i>obscuraria</i> 2387
mucronella 439	nebritana 1515	nitidulana 1400	obscuratus 2387
mucronellus 1710	nebulalis 1812	<i>nivea</i> 1703	obscuraella 845, 1051
<i>muehligiella</i> 606	nebulata 2286, p.98	<i>nivealis</i> 1815	<i>obscuraella</i> 946
muelleriellus 307	<i>nebulella</i> 403	<i>niveana</i> 1212	<i>obsoleta</i> 2632
mughiana 1445	nebulellum 1681	niveicostella 717	obsoleta 2826
mulinella 971	nebulosa 2824	nobilella 620	obsoletanus 1288
multangula 2878	nebulosellus 956	<i>noctualis</i> 2582	obsoletarium 2205
munda 2849	<i>neglecta</i> 1943	noctuella 1824	obsoletella 994
mundana 2451	<i>neglectana</i> 1398	<i>nodicolella</i> 825	<i>obsoletella</i> 1618
murana 1761	memoralis 1586, 1829	nolckenii 637	obstipata 2110
muricata 2075	<i>memoralis</i> 2496	noltei 373	<i>obtusa</i> 1653
<i>murina</i> 2452	memoraria 2060	noricella 856	obtusana 1350
murinana 1141	nemorella 440	normalis 1776	obtusella 1653
murinaria 2313	nemorivaga 1375	notana 1206	obumbratana 1429
murinata 2289	<i>memorum</i> 728	notata 1110, 2302	obviella 242
murinella 698, 996	nerii 1863	notatellus 927	occidentalis 661, p.96
<i>murinipennella</i> 758	nervosa 531, 2567	notha 2034	occultella 125
muscaeformis 1101	neuropterella 878	<i>novaki</i> 1083	occultus 2885
<i>muscalella</i> 160	neustria 1836	nubeculosa 2707	ocellana 499, 1441
muscella 198	nexa 2779	nubiferana 1304	ocellaris 2686
muscerda 2455	ni 2585	nubilalis 1801	ocellata 2139
muscosella 981	nicellii 325	nubilana 1184	ocellatella 993
musculana 1149	nickerlii 182, 838, 2764	nubilosella 565	ocellatus 1857
musculosa 2788	<i>nictitans</i> 2767	nudella 193	ocelleus 1711
musiva 2860	nigra 983, p.97	nupta 2516	<i>ochracea</i> 2773
<i>mussehliana</i> 1236	nigralbellus 235	nutantella 799	ochraceella 821
<i>mutatella</i> 1633	nigrata 1789	<i>nyctemeralis</i> 1821	ochrata 2081

- ochrea 749
 ochripenella 673
 ochrodactyla 1587
 ochrofasciella 1041
 ochroleuca 2762
 ochroleucana 1305
 ochsenheimerella 145
 ochsenheimeriana 1480
 ocnerostomellum 384
 octogenaria 2644
 octogesimea 2027
 ocularis 2027
 oculatea 2767
 oculella 491
 odorariella 774
 oehlmanniella 156
 ohridella 361
 oleracea 2798
 olerella 535
 olivaceella 712
 olivalis 1820
 olivana 2578
 olivanus 1292
 olivata 2165
 oliviella 581
 omissella 282
 oneratella 268
 ononaria 2038
 ononidis 280
 ononis 2630
 onosmella 753
 onustella 269
 oo 2675
 operarius 2394
 ophiogramma 2751
 ophtalmicana 1360
 opima 2845
 oporanus 1143
 oppletellus 954
 oppositella 943
 oppressana 1399
 optilete 2008
 or 2028
 orana 1161
 orbicularia 2050
 orbitella 700
 orbona 2868
 orichalcea 831
 orion 1995
 ornata 2064
 ornatella 1648
 ornatipennella 751
 ornitopodella 659
 ornitopus 2714
 orobana 1519
 orphnata 2261
 orstadii 624, p.96
 osseana 1186
 osseata 2085
 osteodactyla 1602
 osterodensis 1114
 osthelderi 4, 1732, p.96
 ostrinalis 1783
 otidipennella 758
 otitae 777
 otregiata 2138
 oxalina 2674
 oxyacanthae 336, 2721
 oxyacanthana 1179
 oxyacanthana 1184
 oxyacanthella 52
 oxytropidis 1484
 pabulatricula 2752
 pacifella 248
 pactolana 1485
 padellus 389
 palaemon 1881
 palaen 1902
 paleacea 2670
 palealis 1795
 paleana 1153
 pales 1937
 pallens 2836
 pallescentella 253
 palliatella 727
 palliatellum 2460
 pallida 1759
 pallidactyla 1588
 pallidana 1160, 1264
 pallidata 1772, 2092
 pallidella 97
 pallidiciliella 66
 pallifrons 2459
 pallifrontana 1523
 pallorella 520
 pallustris 2653
 palpella 592
 palpinum 2421
 paludata 2275
 paludella 1713
 paludiphila 1391
 paludum 1568
 paludum 662
 palumbella 1621
 palustralis 1800
 palustranus 1293
 palustrella 895
 palustris 858
 pamphilus 1963
 pandalis 1798
 pandora 1927
 panzerella 555
 panzerellus 131, 132
 paphia 1926
 papilionaria 2040
 pappiferella 772
 paradoxa 46
 paralellaria 2321
 parallelolineatum 2208
 parasitella 238, 1691
 parenthesesella 450
 pariana 1131
 parietariella 205
 parilella 509
 paripennella 703
 paripunctellus 924
 parthenias 2033
 parthenie 1944
 partitella 744
 parvella 860
 parvidactylus 1564, p.97
 parvulella 665
 pascuana 1176
 pascuella 1715
 pasuana 1176
 pastinacella 543
 pastinum 2527
 pastorellus 341
 paucipunctella 877
 paula 2582
 paulella 852
 pauperana 1431
 pauxillaria 2233
 pavonia 1872
 paykulliana 1365
 pectinataria 2166
 pectinea 159
 pectinella 191
 pedaria 2341
 pedella 599
 pelidnodactyla 1577
 peliella 969
 pellionella 250
 peltigera 2631
 pendularia 2050
 pendularia 2053
 penkleriana 1370, 1490
 pennaria 2338
 pennella 753
 pentadactylus 1592
 penthinana 1300
 penziana 1188
 perdicellum 383
 perflua 2624
 perfugella 870
 peribenanderi 781
 perla 2574
 perlellus 1723
 perlepidana 1514
 perlucidalis 1805
 permixtana 1236
 permixtana 1330
 permutatella 1731
 perpetuellus 961
 perplexa 2812
 perplexella 626
 perpygmaeella 81
 persicariae 2818
 persicella 449
 personellus 227
 perversalis 1700
 petasitis 527, 1001, 2772
 petiolella 290
 petiverella 1524
 petraria 2318
 petrificella p.98
 petrophila 1760
 petryi 129
 pfifferella 128
 pflugianum 1411, 1414
 phaeodactyla 1573

<i>phaeorrhoea</i> 2440	<i>plantaginis</i> 2468	<i>populella</i> 67	<i>propinquella</i> 524
<i>phasianipennellus</i> 276	<i>platani</i> 351	<i>populeti</i> 2846	<i>propinquella</i> 823
<i>phegea</i> 2487	<i>platanoidellus</i> 353	<i>populetorum</i> 259	<i>prosapiaria</i> 2383
<i>phlaeas</i> 1974	<i>plebeja</i> 2802	<i>populi</i> 1831, 1858, 1912	<i>proserpina</i> 1862
<i>phoebe</i> 1940	<i>plecta</i> 2861	<i>populi</i> 2846	<i>protea</i> 2724
<i>phoebe</i> 2416	<i>plumarium</i> 2372	<i>populifolia</i> 1847	<i>proxima</i> 2857
<i>phragmitella</i> 841	<i>plumbagana</i> 1527	<i>populifoliellus</i> 340	<i>proximana</i> 1374
<i>phragmitellus</i> 1712	<i>plumbana</i> 1542	<i>porata</i> 2055	<i>proximellus</i> 928
<i>phryganella</i> 597	<i>plumbaria</i> 2108	<i>porcellus</i> 1868	<i>proximum</i> 1015
<i>phryxa</i> 1930	<i>plumbellus</i> 394	<i>porphyralis</i> 1784	<i>pruinata</i> 2039
<i>phycidella</i> 868	<i>plumbeolata</i> 2235	<i>porphyra</i> 1339	<i>pruinosecellus</i> 940
<i>picaepennis</i> 857	<i>plumella</i> 192	<i>porphyrea</i> 2731	<i>prunalis</i> 1815
<i>picarellus</i> 231	<i>plumella</i> 194	<i>porphyrea</i> 2876	<i>prunaria</i> 2339
<i>picata</i> 2186	<i>plumifera</i> 199	<i>porrectella</i> 459	<i>prunata</i> 2141
<i>piceanus</i> 1143	<i>plumigera</i> 2420	<i>porrinata</i> 2045	<i>prunetorum</i> 35
<i>pictaria</i> 2379	<i>poae</i> 611	<i>posterana</i> 1265	<i>pruni</i> 1107, 1848, 1983
<i>pictella</i> 882	<i>podalirius</i> 1892	<i>posticana</i> 1443	<i>pruniana</i> 1303
<i>piercella</i> 248	<i>podanus</i> 1144	<i>potatoria</i> 1842	<i>pruniella</i> 435
<i>pigerella</i> 606	<i>podoliensis</i> 1539	<i>potentillae</i> 702	<i>prunifoliae</i> 686
<i>pigra</i> 2432	<i>pokorny</i> 578	<i>potentillella</i> 847	<i>prunifoliella</i> 485
<i>pilellus</i> 130	<i>poliella</i> 1728	<i>poterii</i> 78	<i>prunivorana</i> 1512
<i>pilleriana</i> 1269	<i>politalis</i> 1771	<i>praeangusta</i> 812	<i>pseudogemmellus</i> 915
<i>pilosarium</i> 2341	<i>politana</i> 1139	<i>praecocella</i> 415	<i>pseudospretella</i> 590
<i>pilosellae</i> 1561	<i>politella</i> 184	<i>praecox</i> 2914	<i>psi</i> 2558
<i>pilulellus</i> 135	<i>pollinalis</i> 1777	<i>praeformata</i> 2278	<i>psilella</i> 999
<i>pimpinellae</i> 542	<i>pollinariella</i> 633, p.96	<i>praelatella</i> 169	<i>ptarmicia</i> 709
<i>pimpinellata</i> 2232	<i>pollutella</i> 632	<i>praetoriella</i> 212	<i>pterodactyla</i> 1582
<i>pinastri</i> 1855	<i>polycommata</i> 2291	<i>prasinana</i> 2548	<i>pudibunda</i> 2438
<i>pinella</i> 1735	<i>polygona</i> 2888	<i>prasinanus</i> 2549	<i>pudoralis</i> 1660
<i>pinetana</i> 1485	<i>polygonalis</i> 1793	<i>prasinus</i> 2910	<i>pudorina</i> 595, 2833
<i>pineti</i> 183	<i>polygrammata</i> 2127	<i>pratilis</i> 1812	<i>pudora</i> 2035
<i>pinguinalis</i> 1701	<i>polychloros</i> 1916	<i>pratella</i> 764	<i>puerpera</i> 2519
<i>penguinella</i> 984	<i>polymita</i> 2727	<i>pratellus</i> 1720	<i>pulchella</i> 433, 2467
<i>pinguis</i> 1673	<i>polyodon</i> 2664	<i>pratellus</i> 1721	<i>pulchella</i> 627
<i>pini</i> 1841	<i>polypori</i> 208	<i>pretiosa</i> 75	<i>pulchellana</i> 1139
<i>pini</i> 2210	<i>polyxena</i> 1889	<i>primulae</i> 2862	<i>pulcherrimella</i> 537
<i>piniana</i> 1451	<i>pomella</i> 80	<i>proboscidalis</i> 2509	<i>pulchrina</i> 2596
<i>pinariellum</i> 406	<i>pomerana</i> 625	<i>procellata</i> 2176	<i>pulla</i> 194
<i>pinarius</i> 2374	<i>pomoeraria</i> 2111	<i>procerella</i> 580	<i>pullata</i> 2389
<i>pinicola</i> 1448	<i>pomonaria</i> 2345	<i>proclivella</i> 990	<i>pullicomella</i> 649
<i>pinicoella</i> 813	<i>pomonella</i> 1501	<i>prodromanus</i> 1170	<i>pulmonariella</i> 694
<i>piniperda</i> 2850	<i>pomonellus</i> 333	<i>prodromella</i> 1637	<i>pulmonaris</i> 2649
<i>pinivora</i> 2433	<i>pomposella</i> 839	<i>productella</i> 854	<i>pulveralis</i> 1809
<i>pinivorana</i> 1449	<i>pontificella</i> 1550	<i>profugella</i> 1549	<i>pulveraria</i> 2315
<i>pisi</i> 2819	<i>populana</i> 1474	<i>profundana</i> 1338	<i>pulveratella</i> 909
<i>pistacina</i> 2688	<i>popularis</i> 2853	<i>promissa</i> 2520	<i>pulverosella</i> 101
<i>plagiata</i> 2276	<i>populata</i> 2143	<i>pronuba</i> 2867	<i>pulverulenta</i> 2843
<i>plagicoella</i> 70	<i>populella</i> 1047	<i>pronubella</i> 366	<i>pulverulentella</i> 488

pumicana 1175	pyropella 593	reali 1895	<i>rhenella</i> 1627
<i>pumilata</i> 2267	pyrrhulipennella 732	reaumurella 147	rhododactylus 1574
punctalis 1696, 1825		rebeli 1998	rhombana 1202
punctaria 2056	quadra 2464	recens 2435	rhombella 976
<i>punctata</i> 2074	quadrana 1424	receptricula 2570	rhombelliformis 985
punctidactyla 1576	<i>quadrella</i> 607	rectalis 2490	rhombicanus 1169
punctinalis 2362	<i>quadrellus</i> 1749	rectangula 2877	rhomboidarius 2354
punctulana 1191	quadrifarius 2395	rectangulata 2269	rhomboidea 2900
<i>punctularia</i> 2370	quadrifasciata 2115	rectifasciana 1272	rhomboidella 1057
punctulata 2370	quadrilleva 557	rectilinea 2662	<i>rhynchosporella</i> 663
pupillana 1432	quadrimaculana 1328	recussa 2915	<i>ribeana</i> 1135
purpuralis 1124, 1782	quadripuncta 865	redimitella 164	ribeata 2357
<i>purpurana</i> 1276	<i>quadripunctaria</i> 2037	regalis 1699	rica 2452
purpuraria 2100	quadripunctaria 2484	regiana 1476	ridens 2032
<i>purpurata</i> 2101	quadripunctata 504	regiella 48	rigana 1192
purpurata 2475	<i>quadripunctata</i> 2642	regificella 604	riguata 2102
purpurea 513	quadripunctella 607	relicinella 215	rimicola 1835
<i>purpurella</i> 12	<i>quadruplellus</i> 276	reliquana 1330	rivata 2124
purpurinum 2583	quercana 588	<i>reliquella</i> 20	rivulanus 1296
pusaria 2375	quercaria p.98	remissa 2745	rivularis 1915, 2811
pusiella 558	<i>quercella</i> 1049	remissella 1030	<i>rivulata</i> 1704
pusillana 1372	quercicolellus 233	remmi 2761	robertellus 135
<i>pusillaria</i> 2086	quercifolia 1846	<i>remutaria</i> 2073	robiniella 281
pusillata 2218	quercifoliellus 302	repandalis 1797	robiniellus 299
<i>pusillata</i> 2224	quercimontaria 2054	repandana 1654	<i>roboralis</i> 1631
<i>pusulata</i> 2041	quercinana 1207	repandaria 2320	roboranum 1406
putata 2049	quercinarius 2324, p.98	repandata 2358	roboraria 2361
putnami 2591	quercus 1839, 1982	resinella 1452	roborella 90, 1631
<i>putripennella</i> 811	querna 2413	respersa 2647	roboris 303
putris 2858	<i>quinatus</i> 316	<i>reticulana</i> 1161	robustana p.97
pygarga 2577	quinqueguttellus 350	reticularis 1826	robustella 266
pygmaeana 1385		reticulata 417	roesella 477
pygmaeella 425	raddella p.96	reticulatum 2162	roesslerella 221a
<i>pygmaeella</i> 81	<i>radiatella</i> 451	reticulatus 2816	<i>roessleri</i> 745
pygmaeolum 2459	radicaria 2174	reticulella 465	rogana 1156
pygmina 2787	rajellus 313	retinella 429	rorrellus 393
pyralella 1756	ramella 1365	retusa 2668	rosaceana 1276
pyraliata 2145	ramosa 2621	<i>reuttiana</i> 623	rosaecolanum 1408
pyralina 2678	ramosella 784	revayana 2543	rosanus 1148
pyramidea 2622	<i>rancidella</i> 990	<i>revinctella</i> 656	roscida 2449
pyramidella p.98	rancidellus 941	rhaetica 2893	roscidana 1210
pyrella 400	rapae 1898	<i>rhamnata</i> 2185	roscidella p.97
pyreneata 2213	raptracula 2573	rhamnella 38	roscipennella 260
pyri 53, 1871	raschkiella 817	rharni 1909	roseana 1259
<i>pyricola</i> 55	rasilella 1067	rharniella 842	rosella 1660
pyrina 1073	ratisbonensis 372	rhediella 1481	roseomaculana 1307
pyritoides 2026	ratzeburgiana 1391	<i>rhenalis</i> 1625	<i>roseticolana</i> 1509
pyrivora p.	ravida 2886	rhenella 1625	rostralis 2508

<i>rotaria</i> 2101	<i>rusticana</i> 1155	<i>saxonellus</i> 1742	<i>scutulanum</i> 1414
<i>rotundella</i> 533	<i>rusticata</i> 2090	<i>scabidulana</i> 1250	<i>secalella</i> 2760
<i>rozsikella</i> 895	<i>rusticella</i> 240, 1496	<i>scabiosae</i> 1114	<i>secalis</i> 2759
<i>ruberata</i> 2169	<i>ruticilla</i> 2697	<i>scabiosata</i> 2260	<i>secundarius</i> 2355
<i>rubi</i> 1840, 1988, 2865	<i>rutilana</i> 1248	<i>scabiosellus</i> 360	<i>sedatana</i> 1543
<i>rubicundana</i> 1268	<i>rutilella</i> 1618	<i>scabrella</i> 444	<i>sedellus</i> 395
<i>rubidana</i> 1205		<i>scabriuscula</i> 2654	<i>segetis</i> 2931
<i>rubidata</i> 2119	<i>sabinella</i> 978	<i>scalella</i> 920	<i>segetum</i> 2932
<i>rubiella</i> 167	<i>sabulicola</i> 769	<i>scarodactyla</i> 1598	<i>segnella</i> 870
<i>rubigana</i> 1244	<i>sacraria</i> 2099	<i>schaefferella</i> 561	<i>sehestediana</i> 1129
<i>rubiginalis</i> 1794	<i>sagittellus</i> 342	<i>schaefferi</i> 5	<i>selasana</i> 1205
<i>rubiginata</i> 2066, 2154	<i>sagittatum</i> 2206	<i>schalleriana</i> 1200	<i>selasella</i> 1727
<i>rubiginea</i> 2704	<i>sagittigera</i> 2855	<i>schalleriana</i> 1208	<i>selenalis</i> 1795
<i>rubiginella</i> 1638	<i>sakhalinella</i> 30	<i>schleichi</i> 1011	<i>selenaria</i> 2369
<i>rubiginosa</i> 2702	<i>salaciella</i> 20	<i>schmidtella</i> 1060	<i>selene</i> 1934
<i>rubiginosana</i> 1378	<i>salicalis</i> 2503	<i>schoenicoella</i> p.96	<i>selenitica</i> 2437a
<i>rubivora</i> 123	<i>salicata</i> 2140	<i>schrankella</i> 816	<i>selinata</i> 2228
<i>rubricollis</i> 2453	<i>salicella</i> 598, 1308	<i>schreiberellus</i> 326	<i>selini</i> 507, 2641
<i>rubricosa</i> 2907	<i>salicicolellus</i> 349	<i>schreiberiana</i> 1306	<i>seliniella</i> p.96
<i>rubirena</i> 2743	<i>salicis</i> 61, 2442	<i>schreibersiana</i> 1225	<i>sellana</i> 1323
<i>rudectella</i> 645	<i>salictellus</i> 347	<i>schuetzeella</i> 1634	<i>semele</i> 1950
<i>rudolphella</i> 425	<i>saligna</i> 362	<i>schuetzei</i> 859	<i>semialbana</i> 1157
<i>rufana</i> 1217, 1275	<i>salopiella</i> 11	<i>schulzianus</i> 1290	<i>semiargus</i> 2009
<i>rufaria</i> 2080	<i>saltatricella</i> 127	<i>schumacherana</i> 1270	<i>semibrunnea</i> 2712
<i>rufata</i> 2274	<i>saltuum</i> 929	<i>schwarzella</i> 829	<i>semicostella</i> 1024
<i>rufescens</i> 1072	<i>sambucalis</i> 1804	<i>schwarzellus</i> 131	<i>semifasciana</i> 1313
<i>ruficapitella</i> 87	<i>sambucaria</i> 2337	<i>scintillella</i> 1050	<i>semifulvella</i> 254
<i>ruficeps</i> 410	<i>samiatella</i> 89	<i>scirpi</i> 2838	<i>semifusca</i> 434
<i>ruficiliana</i> 1267	<i>sangiella</i> 1034	<i>scirrhosella</i> 1609	<i>semifuscana</i> 1361
<i>ruficornis</i> 2412	<i>sangii</i> 13	<i>scita</i> 2661	<i>semigraphata</i> 2258
<i>rufifasciata</i> 2267	<i>sanguinalis</i> 1785	<i>scitella</i> 483	<i>semipurpurella</i> 14
<i>rufifrontella</i> 154	<i>sanguisorbana</i> 1241	<i>scitulellus</i> 309	<i>semirubella</i> 1619
<i>rufimitrana</i> 1392	<i>sannio</i> 2474	<i>scoliaeformis</i> 1084	<i>semitestacella</i> 438
<i>rufimitrella</i> 152	<i>sao</i> 1875	<i>scolopacina</i> 2750	<i>senecionana</i> 1155
<i>rufipennella</i> 263	<i>saponariella</i> 801	<i>scopariana</i> 1513	<i>senecionis</i> 517
<i>rufobasella</i> 1030	<i>saportellus</i> 310	<i>scopariella</i> 528	<i>senectella</i> 946, p.97
<i>rufocinerea</i> 629	<i>sappho</i> 1914	<i>scopariellus</i> 357	<i>senescens</i> 857
<i>rugosana</i> 1227	<i>sarcitrella</i> 589	<i>scopolella</i> 850	<i>senex</i> 2447
<i>rumicetella</i> 897	<i>sarracenella</i> 517	<i>scopoliana</i> 1425	<i>senilella</i> 460
<i>rumicis</i> 2565	<i>satellitita</i> 2698	<i>scopolianum</i> 1411	<i>senna</i> 2887
<i>rupella</i> 168	<i>satura</i> 2731	<i>scoticella</i> 292	<i>separatella</i> 775
<i>rupicapraria</i> 2380	<i>saturatella</i> 716	<i>scoticus</i> 1717	<i>separatellus</i> 911
<i>rupicola</i> 1256	<i>saturnana</i> 1542, 1543	<i>scotinella</i> 977	<i>sepiaria</i> 2353
<i>ruralis</i> 1827	<i>satyrata</i> 2247	<i>scribaiella</i> 832	<i>sepicolella</i> 898
<i>rurea</i> 2428	<i>sauciana</i> 1320	<i>scriptana</i> 1315	<i>sepium</i> 186
<i>rurestrana</i> 1277	<i>saucium</i> 2912	<i>scriptellus</i> 923	<i>seppella</i> 6
<i>uricolellus</i> 229	<i>saxicolella</i> 766	<i>scrophulariae</i> 2617	<i>septembrella</i> 106
<i>urinana</i> 1157	<i>saxicolus</i> 1684	<i>scutosa</i> 2633	<i>sequana</i> 1530

sequax 936	silenella 798	sorbiella 427	<i>squalidalis</i> 1748
sequella 453	<i>silesiaca</i> 1	<i>sordarius</i> 2393	squalorella 804
<i>serena</i> 2803	silesiaca 550	sordens 2749	squamosella 646, 769
seriata 2087	silvellus 1716	<i>sordida</i> 2748	stabilella 666
sericealis 2501	silvicolus 1882	sordidana 1357	<i>stabilis</i> 2847
sericiella 127	<i>similana</i> 1356	<i>sordidata</i> 2167	stachydalis 1806
sericopeza 102	similanum 1417	sordidatella 540	<i>stagnalis</i> 613
serotinaris p.98	similaria 2368	sordidella 586	stagnana 1389
serpentata 2079	<i>similata</i> 2079	<i>sorhageniella</i> 363	stagnata 1707
serpylletorum 737	similella 566, 1641	sororculana 1319	standfussi 203
serratella 684	similis 945, 2441	sororculella 979	<i>stanneella</i> 127
<i>serratella</i> 685, 837	<i>similis</i> 1103	sororculum 2456	stannellus 396
serratilinea 2825	simpiana 1401	sororiata 2275	<i>staphyleae</i> 121
serratulae 1879	simplicella 900, 1633	spadicearia 2113	statices 1112
serratulella 734	<i>simplicella</i> 214	spadicella 1630	statilinus 1951
serricornis 660	simpliciana 1533	<i>spadicella</i> 1643	steinkellneriana 490
sertata 2293	simpliciata 2240	sparganella 470	stellatarum 1861
sertorius 1875	simpliciella 471	sparganii 2782	<i>stenoptycha</i> 1674
servella p.97	simulans 2881	sparsana 1201	stephensiana 1174
servillana 1489	sinapis 1894	sparsata 2272	sternipennella 768
sestertiella 986	sincera 2892	<i>spartata</i> 2273	stettinensis 322
sexalata 2294	singula 970	<i>spartiata</i> 2273	steueri 256, 640, 998
<i>sexalisata</i> 2294	<i>sinuana</i> 1359	spartiella 1056	stibianus 1294
sexguttella 903	sinuella 479	spartifoliella 481	sticticalis 1791
<i>sexpunctella</i> 559	sinuellum 1680	speciosa 83, 2891	sticticanum 1413, p.97
sexpunctella 962	sinuosaria 2227	spectrana 1158	stigmatella 267
sexstrigata 2903	siterata 2148	sphacificiformis 1085	<i>stigmatica</i> 2900
shepherdana 1203	smaragdaria 2042	sphinx 2706	stigmatodactyla p.97
<i>sibilla</i> 1913	smeathmanniana 1247	<i>spinaciae</i> 2804	stipella 562
sicariella 1028	sobrina 2911	spinella 685	<i>stipella</i> 903
siccella 861	<i>sobrinata</i> 2218	spini 1985	stolida 2525
siccifolia 681	socia 2713	spiniana 1473	stomoxiformis 1086
sicula 2735	sociana 1398	<i>spinicolellus</i> 333	<i>stragulata</i> 2159
<i>sicula</i> 2838	sociaria p.98	<i>spiniella</i> 434	<i>straminalis</i> 1772
<i>siculana</i> 1355	<i>sociata</i> 2123	<i>spinolellus</i> 348	<i>straminata</i> 2088
sideranus 1299	sociella 1613	spinosella 124, 431	straminata 2095
sieboldi p.96	sodalella 1650	spiraeella 671	straminea 1229, 2834
sieversii 2427	sodaliana 1226	<i>spissicella</i> 1631	<i>stramineana</i> 1160
sigma 2905	soffneri 1091	<i>spissicornis</i> 723	straminella 1729
signaria 2304	solandriana 1358	splendana 1490	stratarius 2346
signatana 1376	solidaginis 2711	splendens 2797	stratitotum 1706
signatum 382	<i>solitariella</i> 712	<i>splendidella</i> 1635	striana 1273
signifera 2926	solitariella 791	splendidissima 74	striata 2465
<i>signum</i> 2905	solutella 963	splendidulana 1462	striatella 879
<i>silacealis</i> 1801	somnulenta 478	sponsa 2514	striatipennella 790
silaceata 2146	sophialis 1769	<i>sponsana</i> 1201	<i>strigana</i> 1160
silacella 1058	sorbi 69, 338	spumella 644	strigana 1457
silenata 2230	<i>sorbiana</i> 1142	spurcella 968	<i>strigaria</i> 2063

<i>strigata</i> 2043	<i>subumbrata</i> 2260	<i>tanaceti</i> 745, 1534	<i>texturata</i> 2817
<i>strigilaria</i> 2062	<i>succedana</i> 1482	<i>tantillaria</i> 2224	<i>thalassina</i> 2800
<i>strigilatus</i> 2498	<i>succenturiata</i> 2266	<i>tapetzella</i> 245	<i>thalictri</i> 2513
<i>strigilis</i> 2753	<i>succisae</i> 859	<i>taraxaci</i> 1849	<i>thapsiana</i> 1383
<i>strigillaria</i> 2399	<i>succursella</i> 776	<i>taraxaci</i> 2645	<i>thapsiphaga</i> 2615
<i>strigosa</i> 2561	<i>sudetanus</i> 1288	<i>tarsicrinalis</i> 2495	<i>therinella</i> 763
<i>strigula</i> 2537	<i>sudetica</i> 1765	<i>tarsicristalis</i> 2500	<i>therinella</i> 781
<i>strigula</i> 2876	<i>suffumata</i> 2137	<i>tarsipennalis</i> 2494	<i>thersamon</i> 1980
<i>strigulana</i> 489	<i>suffusanum</i> 1407	<i>tarsiplumalis</i> 2499	<i>thersites</i> 2013
<i>strigulatellus</i> 312	<i>suffusella</i> 364	<i>tau</i> 1870	<i>thoracella</i> 380
<i>strioletta</i> 248	<i>suffusella</i> 894	<i>taurella</i> 455, p.96	<i>thrasonella</i> 475
<i>strobilata</i> 2211	<i>sulphurago</i> 2683	<i>tedella</i> 1373	<i>thuiella</i> 419
<i>strobilella</i> 1506	<i>sulphurella</i> 273	<i>teleius</i> 2000	<i>thuringiaca</i> 45
<i>stroemiana</i> 1356	<i>superbella</i> 883	<i>temerata</i> 2378	<i>thymi</i> 93, 782
<i>sturnipennella</i> 825	<i>superstes</i> 2646	<i>templi</i> 2708	<i>tiliae</i> 28, 1856
<i>suasa</i> 2801	<i>suppeliella</i> 970	<i>tenebrata</i> 2637	<i>timidella</i> 1049
<i>suavella</i> 1659	<i>susinella</i> 479	<i>tenebrella</i> 888	<i>tincta</i> 2823
<i>subalbidella</i> 655	<i>suspecta</i> 2671	<i>tenebrosa</i> 2655	<i>tinctella</i> 568
<i>subarcuana</i> 1349	<i>suspectana</i> 1472	<i>tenebrosana</i> 1509	<i>tineana</i> 1351
<i>subargentella</i> 600	<i>suspectella</i> 948	<i>tenellus</i> 311	<i>tiphon</i> 1964
<i>subbimaculella</i> 117	<i>svenssoni</i> 642	<i>tenerana</i> 1370	<i>tipuliformis</i> 1095
<i>subbistrigella</i> 826	<i>swammerdamellus</i> 134	<i>tenerellus</i> 311	<i>tischeriellum</i> 1006
<i>subcinerea</i> 1053	<i>sylvata</i> 2284	<i>tentacularius</i> 2497	<i>tityrella</i> 60
<i>subdirectella</i> 789	<i>sylvaticella</i> 761	<i>tenthrediniformis</i> 1106	<i>tityrus</i> 1977
<i>subericinella</i> 906	<i>sylvatus</i> 2298	<i>tenuiata</i> 2216	<i>tityus</i> 1859
<i>subfasciella</i> 405	<i>sylvella</i> 448	<i>tephradactyla</i> 1603	<i>togata</i> 2210
<i>subfulvaria</i> 2265	<i>sylvellus</i> 352	<i>terebrella</i> 1672	<i>togata</i> 2681
<i>subfulvata</i> 2265	<i>sylvestrana</i> 1446	<i>terminella</i> 559, 815	<i>togatulalis</i> 2535
<i>subfusca</i> 1752	<i>sylvestraria</i> 2088	<i>ternata</i> 2072	<i>tophaceata</i> p.98
<i>subfuscata</i> 2262	<i>sylvestrella</i> 1635	<i>terrealis</i> 1807	<i>tormentillella</i> 76
<i>subhastata</i> 2180	<i>sylvestris</i> 1884	<i>terrella</i> 948	<i>torminalis</i> 47
<i>sublubstris</i> 2737	<i>sylvicolana</i> p.97	<i>terrifica</i> 2417	<i>torquatella</i> 408
<i>subnigrella</i> 622	<i>sylvinus</i> 16	<i>tersata</i> 2173	<i>torquillella</i> 295
<i>subnitidella</i> 99	<i>syringaria</i> 2331	<i>tessella</i> 921	<i>torridana</i> 1440
<i>subnotata</i> 2240	<i>syringella</i> 272	<i>tesseradactyla</i> 1583	<i>tortricellus</i> 1182
<i>subocellana</i> 1363	<i>szoecsi</i> 293	<i>tesserana</i> 1249	<i>torva</i> 2410
<i>subocellea</i> 638, 1023	<i>tabaniformis</i> 1082	<i>tessulatella</i> 207	<i>trabealis</i> 2575
<i>subochreella</i> 555	<i>taediiformis</i> 1106	<i>testacea</i> 2763	<i>tragicellus</i> 958
<i>subornatella</i> 1649	<i>taenialis</i> 2504	<i>testaceata</i> 2284	<i>tragopoginis</i> 2626
<i>subpropinquella</i> 525	<i>taeniata</i> 654	<i>testata</i> 2142	<i>translucens</i> 251
<i>subpunctaria</i> 2074	<i>taeniatum</i> 2194	<i>tetra</i> 2627	<i>transversa</i> 2698
<i>subpurpurella</i> 7	<i>taeniipennella</i> 760	<i>tetradactyla</i> 1587	<i>transversata</i> 2185
<i>subrosea</i> 2906	<i>taeniolella</i> 1039	<i>tetragonanum</i> 1403	<i>transversella</i> 386
<i>subseliniella</i> p.97	<i>tages</i> 1873	<i>tetragonella</i> 608	<i>trapezana</i> 1358
<i>subsequana</i> 1386	<i>talosi</i> 2735	<i>tetralunaria</i> 2330	<i>trapeziella</i> 658
<i>subsequella</i> 1051	<i>tamesis</i> 756	<i>tetraquetra</i> 1368	<i>trapezina</i> 2679
<i>subsolana</i> 1108	<i>tanaceti</i> 792, 2613	<i>tetricella</i> 1665	<i>trauniana</i> 1477
<i>subtusa</i> 2669		<i>textana</i> 1455	<i>treitschkiella</i> 129

tremula 2419	trisignaria 2254	ulmiphaga 43	<i>ustule</i>
<i>tremulae</i> 342	tristalis 2492	ulmivora 44	utone
tremulifolium 1845	tristata 2122	ultima 2771	
<i>trepida</i> 2407	tristella 1725	ultimella 546	v-ata
triangulana 1246	tristis 1566	ulula 1075	<i>v-aun</i>
triangulum 2897	tristrigellus 328	umbelaria 2061	v-flav
triannuliformis 1100	tritici 2920	umbra 2634	<i>vaccii</i>
triatomea p.96	<i>tritophus</i> 2410	umbrana 1219	vaccii
<i>tribunella</i> 1613	tritophus 2416	umbratica 2611	vaccii
tributella 860	trochilella 785	<i>umbratica</i> 2655	vaccu
trichodactyla 1572	<i>troglodytella</i> 785, 795	umbrella 1054	valeri
tricolorellum 1016	truncata 2151	<i>umbrosa</i> 2903	variat
<i>tridactyla</i> 1589	truncatella 1747	umbrosanus 1287	variat
tridactyla 1590	truncicolella 1762	umbrosella 943	varieg
tridens 2557, 2774	tubulosa 185	unangulata 2187	<i>varieg</i>
trifariella 714	tullia 1964	unanimis 2746	vauall
trifasciata 416	tumidana 1655	<i>uncana</i> 1343	<i>vaupu</i>
<i>trifasciata</i> 2079	<i>tumidella</i> 1654	uncella 1343	vectis
<i>trifoliana</i> 1327	tunbergella 2	uncula 2579	velita
trifolii 705, 1120, 1838,	turbidalis 1792	unculana 1342	veloci
2791	turbidana 1316	undalis 1779	venati
<i>trigemina</i> 2604	turbidanum 1410	undulana 1311	venos
<i>trigeminanum</i> 1412	turbidella 113	undulata 2182	venus
trigeminella 687	turca 2828	unguicella 1344	<i>vepre</i>
trigonella 1356	<i>turfosalis</i> 2506	<i>unicolor</i> 196	veratr
<i>trigonodactyla</i> 1585	turfosanus 1291	unicolorella 885	verba
trigrammica 2790	<i>turicella</i> 60	<i>unidentaria</i> 2114	verba
<i>triguttella</i> 850	<i>turicensis</i> 252	<i>unifasciana</i> 1159	verba
<i>trilineata</i> 2077	<i>turionana</i> 1444	<i>unifasciata</i> 2199	verbe
<i>trimacula</i> 2411	turionella 1444	unifasciella 653	verell
<i>trimaculana</i> 1362	turpella 984	unimaculella 9	<i>verhu</i>
trimaculanum 1407	tusciaria 2335	unionalis 1828	verhu
trimaculella 67	<i>tussilaginel</i> 1000	unipuncta 2840	verna
trinalis p.98	tussilaginis 1000	<i>unipunctana</i> 1388	versic
tringipennella 274	tutti 2593	unipunctella 364, 805	versic
trinetella 255, 1059, p.97	typhae 2778	<i>unita</i> 2460	versu
<i>triparellus</i> 924	typica 2909	unitana 1154	vertic
tripartita 2602		unitella 569	<i>vertic</i>
<i>triplasia</i> 2602	<i>udana</i> 1233, 1235	upupana 1346	<i>vespe</i>
triplasia 2604	uddmannianum 1404	urella 456	vespe
tripuncta 576	uliginosellus 1717	<i>ursinella</i> 468	vespit
<i>tripunctana</i> 1206	<i>ulmana</i> 1270	urticae 1921, 2478	vestia
<i>tripunctanum</i> 1402	ulmella 377	<i>urticana</i> 1127, 1311	vestig
tripunctaria 2222	<i>ulmella</i> 1755	<i>urticata</i> 1802	vetule
<i>tripunctulana</i> 1205	<i>ulmicola</i> 44	ustalella 1063	vetule
triquetrella 181	ulmifoliae 378	ustella 451	vetusi
tririvella 835	<i>ulmifoliae</i> 44	ustomaculana 1387	vetusi
triseriatella p.96	ulmifoliellus 320	ustulana 1325	vibice

<i>vibicella</i> 747	<i>vitellina</i> 2832	<i>zebeana</i> 1502
<i>vibicigerella</i> 742	<i>vitisella</i> 696	<i>zebeana</i> 1503
<i>viburnana</i> 1152	<i>vitta</i> 2923	<i>zebrella</i> 962
<i>viburniana</i> 1152	<i>vittarius</i> 2393	<i>zelleralis</i> 2500
<i>viciae</i> 1116, 2528	<i>vittata</i> 2109	<i>zelleri</i> 1614
<i>viciella</i> 200	<i>vittella</i> 454	<i>zelleri</i> 1654, 1752
<i>vicinella</i> 748	<i>vlachi</i> 784	<i>zelleriella</i> 64, 730
<i>vicinellum</i> 1008	<i>vorticella</i> 1036	<i>zephyrana</i> 1251
<i>vicrama</i> 1994	<i>vulgana</i> 1167	<i>zephyrella</i> 510
<i>viduata</i> 2363	<i>vulgata</i> 2244	<i>zetterstedtii</i> 1584
<i>viduellus</i> 951	<i>vulgellus</i> 922	<i>ziczac</i> 2425
<i>vigintipunctatus</i> 395	<i>vulnerariae</i> 752	<i>zieglerella</i> 830
<i>vilella</i> 1053	<i>vulpecula</i> 721	<i>zimmermanni</i> 118, 709
<i>villica</i> 2472	<i>vulpinaria</i> 2090, 2474	<i>zinckenella</i> 1645
<i>villosella</i> 197		<i>zoegana</i> 1238
<i>viminalis</i> 2709	<i>w-album</i> 1984	<i>zollikoferi</i> 2765
<i>viminetella</i> 692	<i>w-latinum</i> 2795	<i>zonaria</i> 2343
<i>vimineticola</i> 62	<i>wagae</i> 925	<i>zonariella</i> 657
<i>viminiellus</i> 347	<i>wailesella</i> 480	<i>zophodactyla</i> 1579
<i>vinella</i> 1033	<i>warringtonellus</i> 1723	<i>zosimi</i> p.98
<i>vinosa</i> 1133	<i>wauaria</i> 2309	
<i>vinula</i> 2401	<i>weaverella</i> 241	
<i>violacea</i> 703	<i>weaveri</i> 105	
<i>violaria</i> 138	<i>weirana</i> 1459	
<i>violata</i> 2065	<i>weirella</i> 540	
<i>violella</i> 138	<i>wilkella</i> 882	
<i>violella</i> 148	<i>williana</i> 1251	
<i>virens</i> 2774	<i>wockeï</i> p.96	
<i>viretata</i> 2295	<i>woeberiana</i> 1454	
<i>virgata</i> 2103	<i>wolffiellus</i> 226	
<i>virgatella</i> 735	<i>woodiana</i> 1274	
<i>virgaureae</i> 1976	<i>woolhopiella</i> 126	
<i>virgaureae</i> 762	<i>wulfeniana</i> 1780	
<i>virgaureana</i> 1178		
<i>virgaureata</i> 2221	<i>xanthodactyla</i> p.97	
<i>virgella</i> 962	<i>xanthographa</i> 2904	
<i>virginella</i> 1735	<i>xanthomelas</i> 1917	
<i>virgo</i> 2667	<i>xanthomista</i> 2728	
<i>virgularia</i> 2087	<i>xenia</i> 363	
<i>virgulata</i> 2063	<i>xerodactyla</i> 1594	
<i>viridana</i> 1194	<i>xylosteanus</i> 1147	
<i>viridaria</i> 2166	<i>xylostella</i> 441	
<i>viridaria</i> 2511	<i>xylostella</i> 458	
<i>viridata</i> 2044		
<i>viridella</i> 147	<i>yeatiana</i> 514	
<i>viriplaca</i> 2628	<i>yildizae</i> 234	
<i>viscerella</i> 42	<i>ypsillon</i> 2672	
<i>vitalbata</i> 2172	<i>ypsilon</i> 2928	

