

**First record of *Remaudiereana annulipes* from the Balkan Peninsula
(Heteroptera: Lygaeidae)**

**První nález *Remaudiereana annulipes* z Balkánského poloostrova
(Heteroptera: Lygaeidae)**

† Otokar KUBÍK

Bachmačská 695, CZ-280 00 Kolín, Czech Republic

Faunistics, Heteroptera, Lygaeidae, Rhyparochrominae, *Remaudiereana annulipes*, Dalmatia

Abstract. *Remaudiereana annulipes* (Baerensprung, 1859) is recorded as a new genus and species for the Balkan Peninsula. Collection circumstances are given and known distribution of the species is reviewed.

The genus *Remaudiereana* Hoberlandt, 1954 was not reported from the Balkan Peninsula by Josifov (1986). The following record of *R. annulipes* (Baerensprung, 1859) thus widens the known distribution of the species and genus: Dalmatia, Pelješac Peninsula, Drače village, 29.viii.1987, 10 ♂♂, 3 ♀♀, O. Kubík leg. and coll., J. Stehlík det.

The specimens were collected at light (bungalow window) on the sea coast at full darkness (21.00 h). Surrounding vegetation consisted of olive trees with few figs and pomegranate trees. Surface vegetation consisted of small patches of grass or blackberries.

The species is widely distributed across the Palaearctic (Cyprus, Crete, Italy, Sardinia, France, Spain, Portugal, Canary Islands, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Turkey, Syria, Israel, Saudi Arabia, Taiwan) as well as in Oriental (India, Ceylon) and Ethiopian (Sudan, Somalia, Ghana, Guinea, Senegal, Cape Verde Islands, Mauritius) Regions. Josifov (1986) recorded *R. annulipes* (as *Pachybrachius annulipes*) only from Crete.

REFERENCE

JOSIFOV M. 1986: Verzeichnis der von der Balkanhalbinsel bekannten Heteropterenarten (Insecta, Heteroptera). *Faun. Abh. Staat. Mus. Tierk. Dresden*, 14: 61-93.

SOUHRN

Nález druhu *Remaudiereana annulipes* (Baerensprung, 1859) v Dalmácii (u obce Drače na poloostrově Pelješac) je velmi zajímavý, jelikož jde o jeho první zjištění na Balkánském poloostrově (nejblíže odtud je znám z Kréty). Tato ploštice sice byla zjištěna ve valné části mediteránní podoblasti palearktu (a je také rozšířena i v etiopské a orientální oblasti), ale jde o méně známý rod a druh zřejmě proto, že je nalézán zřídka. *R. annulipes* je jediný druh tohoto rodu, který se vyskytuje v palearktické oblasti. Od popsání rodu *Remaudiereana* Hoberlandt, 1954 bylo do něj postupně převedeno 14 validních a několik dalších, dnes již synonymizovaných druhů.

The manuscript was revised by Dr Jaroslav L. Stehlík as the author deceased before the paper was accepted.