Klapalekiana, **34**: 99-131, 1998
ISSN 1210-6100

Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska v letech 1992-96 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období

Interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from Bohemia, Moravia and Slovakia in the years 1992-96 and supplementary data on earlier records

Petr VESELÝ[1)] & Ivo TĚŤÁL[2)]

[1)]Lánská 1030, CZ-198 00 Praha 9
[2)]Bendova 21, CZ-301 27 Plzeň

Faunistics, Coleoptera, Carabidae, Bohemia, Moravia, Slovakia

Abstract. Faunistic records of 251 rare or little known species of the family Carabidae from Bohemia, Moravia and Slovakia obtained from 44 private collections are presented. Three species are recorded for the first time from Moravia: *Dyschirius benedikti* Bulirsch, 1995; *Acupalpus dubius* Schilsky, 1888 and *Harpalus cupreus fastuosus* Faldermann, 1835. *Parophonus hirsutulus* (Dejean, 1829) and *Agonum hypocrita* (Apfelbeck, 1904) are recorded as new for Slovakia. *Gynandromorphus etruscus* (Quensel, 1806) is treated as an introduced and not acclimatized species for Bohemia.

ÚVOD

V tomto příspěvku uvádíme přehled údajů o zajímavých a nových nálezech střevlíkovitých brouků z území Čech, Moravy a Slovenska z let 1992-96 a doplňky z let 1988-91, jak je poskytli k publikaci členové Carabidologické sekce České společnosti entomologické. Navazujeme na dříve publikované přehledy zajímavých nálezů střevlíkovitých brouků (Benedikt & Těťál 1989, 1990, 1991, 1994). V případě, že některé údaje již byly mezitím publikovány jinde, uvádíme zde jen ty, které poskytují doplňující nebo upřesňující informace. Bionomické, faunistické i další poznámky v komentářích k jednotlivým druhům vycházejí, pokud není uvedeno jinak, ze situace ve zkoumaném území, tj. v Čechách, na Moravě a na Slovensku.

MATERIÁL A METODIKA

Pokud není uvedeno jinak, determinoval uváděné exemplář ten, kdo údaje poskytl k publikaci, a v jehož sbírce jsou též uloženy. Jeho jméno, nebo zkratka jména v případě, že se v textu opakuje častěji, jsou uvedeny v závorce na konci každého faunistického údaje.

Systematické řazení taxonů a nomenklatura je podle Hůrky (1996).

Údaje o nálezech jsou řazeny podle nejprve podle zemí (Boh., Mor., Slov.), dále potom podle data nálezu. Lokalitám jsou přiřazena čísla mapových polí podle Zeleného (1972) a Prunera & Míky (1996). Letopočty nálezů jsou zkráceny na poslední dvojčíslí.

V textu jsou použity následující zkratky: Boh. - Bohemia; Mor. - Moravia; Slov. - Slovakia; observ. - pozoroval; revid. - revidoval.

ZKRATKY JMEN MAJITELŮ SBÍREK A DETERMINÁTORŮ

B - Petr Bulirsch, Lovosice
BE - Stanislav Benedikt, Starý Plzenec
H - Jiří Hejkal, Kraslice
HŮ - Karel Hůrka, Praha
K - Lubomír Koloničný, Ostrava
KC - Tomáš Kopecký, Hradec Králové
KO - Václav Kocourek, Praha
KP - Ludvík Kašpar, Česká Lípa
L - Radek Láska, Uherský Brod
LT - Martin Linhart, Praha
MA - Ivan Mareček, Praha
MK - Adolf Mikyška, Poděbrady
ML - Libor Mikulenka, Třemešná ve Slezsku
MN - Zdeněk Malinka, Opava
MO - Pavel Moravec, Litoměřice
P - Jaroslav Prouza, Hradec Králové
RB - Karel Rébl, Nové Strašecí
RS - Květoslav Resl, Uherský Brod
S - Jiří Stanovský, Ostrava
T - Ivo Těťál, Plzeň
UT - Bohumil Utinek, Mysločovice
VE - Petr Veselý, Praha
VO - Pavel Vonička, Liberec
Z - Miroslav Zúber, Bradlec

PŘEHLED DRUHŮ

Leistus montanus Stephens, 1827 - Boh.: Stráž nad Ohří (5644), 3.XI.92 - v čedičové suti pod zříceninou hradu Himlštejn, 3 ex. (H), 3 ex. (T); České středohoří - vrch Srdov (5548), 4.IX.93 - - 1 ex. v suti (H); Krkonoše - Vysoké Kolo (5259), 6.IX.93 - 1 ex. na hřebeni (P), IX.95 - 1 ex. v suti (KC); České středohoří - vrch Raná (5548), 18.IV.92 - 1 ex. pod kamenem na úpatí suťového pole (KO), 13.-14.VI.95 - 12 ex. sedících v noci (23.00 - 0.30 hod.) na kamenech v suti, po deštích, teplota 9 °C, vlhkost 100 % (VE); Ústí nad Labem - Průčelská rokle (5350), 24.IX.95 - 23 ex. (RS).
Lokálně se vyskytující a skrytě žijící druh suťových polí.

Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) - Mor.: Uherský Brod (6971), 14.V.92 - 134 ex. (RS); Veletiny (6971), 24.V.92 - 2 ex. v puklinách kolmých břehů lesních potoků a strží (RS); Tlumačov - Křemenná (6771), 16.VI.92 - 13 ex., většinou immaturních, v lese pod listím (VE); Beskydy, Dolní Bečva - Dolní Rozpité (6575), 19.VI.92 - 1 ex. v listnatém lese (K); Třinec - - Nebory (6477), 2.VII.92 - 1 ex. pod listím ve smíšeném lese (S); Štramberk (6474), 24.IX.92 - - 1 ex. pod listím a travou na okraji lesa (S); Břeclav - Pohansko (7267), 27.III.94 - 3 ex. (Z); Raduň (6173), 12.VI.94 - 1 ex. v údolí potoka v zámeckém parku (MN, S revid.); Lidečko - Ves (6874), 25.VI.94 - 3 ex. v jedlosmrkovém lese pod zapadlými balvany (F. Urbánek, L det.); Dobrá (6376), 28.IX.94 - 3 ex. pod kůrou ležící olše (S); Bzenec - Přívoz (7069), 5.VI.94 - 1 ex. pod tlejícím dřevem v lužním lese kolem řeky Moravy (L), 21.V.95 - 3 immaturní ex. v borovém lese (VE); Krnov - Chomýž (5972), 20.VIII.95 - 1 ex. pod kamenem na kraji lesa (ML); Pouzdřany (7065), 13.IX.95 - 1 ex. na okraji lesa v listí (KC); Mysločovice (6771), 25.X.95 - 3 ex. v lesíku pod humusem a dřevem (UT); Slov.: Plášťovce (7879), 28.V.92 - 1 ex. v korytě potoka (KP), 1 ex. (B); Rybník pr. Levice (7486), 12.-16.VI.94 - 1 ex. na okraji lesa pod kameny (KP).
Druh hájů a listnatých lesů, v současnosti se šíří i na druhotných stanovištích.

Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) - Boh.: Vepřek pr. Nová Ves (5651), 18.VII.94 - 1 ex. v břehovém porostu potoka (VE); Horní Lukavice (6345), 26.V.96 - 1 ex. mezi listím na rozhraní pole a lesa (T); Slov.: Suchá Hora (6684), 21.VI.95 - 5 ex. na rašeliništi (K).
Lokálně se vyskytující druh vlhčích a stinných stanovišť s kyselou půdní reakcí.

Nebria picicornis (Fabricius, 1792) - Mor.: Bystřice nad Olší (6378), 21.VI.92 - 3 ex. na štěrkopískovém břehu řeky Olše, pozorováno více ex. (S); Vyšní Lhoty (6376), 7.V.94 - 3 ex. u řeky Morávky (S); Dobrá (6376), 28.IX.94 - 3 ex. (S); Slov.: Hrabovec (6794), 18.VI.93 - 21 ex.

u řeky Topľy (LT); Liptovský Hrádok (6984), 9.VIII.96 - 5 ex. na břehu Váhu (T).
Velmi lokální druh zachovalých štěrkopískových břehů řek s čistou vodou.

Nebria livida (Linnaeus, 1758) - Boh.: Valy pr. Přelouč (5959), 15.V.92 - hromadně na břehu zatopené pískovny (LT); Pomezná (5839), 10.VI.95 - 7 ex. pod kameny na břehu Ohře před jejím ústím do přehradní nádrže Skalka (T).
Druh neznečištěných písčitých břehů stojatých i tekoucích vod.

Notiophilus germinyi Fauvel in Grenier, 1863 - Boh.: České středohoří - vrch Oblík (5548), 12.V.90 - 1 ex. a 27.VIII.94 - 4 ex. v detritu (KC), 6.VIII.92 - 3 ex. (LT); Mimoň env., Hradčany (5354), 21.VII.93 - 1 ex. a 22.IV.94 - 1 ex. (VO); Břehyně (5454), IX.94 - 3 ex. (VO); Běleč nad Orlicí (5861), IX.96 - 2 ex. v detritu na lesní pasece (KC); Slov.: Marcelová env. - Mašan (8275), 22.-23.V.95 - 1 ex. (K, VE det.).
Lokální druh zachovalých otevřených suchých stanovišť, například stepí a vřesovišť.

Notiophilus laticollis Chaudoir, 1850 - Boh.: České středohoří - vrch Oblík (5548), 2.VIII.92 - 1 ex. na pastvině (B), 4.VIII.92 - 1 ex. a 29.VIII.92 - 31 ex. (MA), 6.VIII.92 - 9 ex. v suchém listí a pod kameny na okraji pastviny (LT), 19.IX.92 - 3 ex. na pastvině (H), 8 ex. (B); České středohoří - Písečný vrch (5548), 12.IX.92 - 1 ex. (MA); Mor.: Uherský Brod - Havřice (6971), 18.VI.94 - hojně v cihelně na vyprahlých místech mezi vegetací (L); Slov.: Rumince (7686), 22.V.93 - 1 ex. na pastvině (T).
Xerofilní druh sprašových a vápenitých půd s řídkou nízkou vegetací, v Čechách velmi lokální na xerotermních pastvinách.

Notiophilus rufipes Curtis, 1829 - Boh.: Praha - Prokopské údolí (5952), 10.VII.94 - 1 ex. mezi listím při okraji mladšího dubového lesa (VE); Mor.: Uherčice (7065), 6.VI.94 - 1 ex. mezi listím na okraji lesa (T); Pouzdřany (7065), 13.IX.95 - 1 ex. v detritu na okraji lesa (KC); Břeclav - Pohansko (7267), 6.IV.96 - 1 ex. (RS), VII.96 - 1 ex. na okraji cesty (KC); Slov.: Kováčovské kopce (8178), 24.IV.90 - 4 ex. a IV.92 - 2 ex. (KC); Imeľ - Nesvady (8074), 24.-25.V.95 - 1 ex. (K).
Druh teplomilných hájů a druhotně vinic, v Čechách lokálně v nejteplejších oblastech.

Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) - Slov.: Kleňany (7880), 23.VI.94 - 1 torzo na pastvině (VE); Šahy - Tešmák (7979), 21.-22.VI.94 - hojně na solitérních dubech na pastvině (VE observ.); Sírnik - vrch Avaš (7696), 15.VI.96 - 1 torzo na stepi (VE observ.); Rad (7697), 17.VI.96 - 1 ex. na okraji lužního lesa (VE observ.).
V poslední době opět častěji pozorovaný druh potravně vázaný na housenky motýlů žijící na stromech, nejčastěji na dubech.

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) - Mor.: Víceměřice (6669), 9.IX.93 - 1 ex. do zemní pasti na okraji pole (K); Slov.: Senec - Martinský les (7780), 21.V.95 - 3 ex. na rozhraní pole a lesa (K).
Na Moravě a Slovensku lokálně se vyskytující xerofilní polní druh. Recentní výskyt v Čechách není ověřen.

Carabus scabriusculus Olivier, 1795 - Slov.: Sírnik - vrch Avaš (7696), 24.-25.IV.93 - 1 ex. na okraji pole (VE); Štúrovo - Hegyfárok (8177), 25.IV.93 - 2 ex. na okraji lesíka a stepi (K); Rumince (7686), 22.V.93 - 2 ex. pod hromadami plevele na okraji pole mezi pastvinami (T).
Nehojný druh stepních oblastí Moravy a Slovenska.

Carabus zawadszkii Kraatz, 1854 - Slov.: Slanské vrchy - vrch Bogota (7295), 14.VI.92 - 1 ex. pod kamenem na prameništi v nadmořské výšce 600-700 m (KO, J. Macek det.).
Lokálně se vyskytující druh lesů východního Slovenska.

Carabus arvensis carpathus Born, 1902 - Mor.: Beskydy - Slavíč (6477), 25.V.93 - 1 ex. pod kůrou na pasece, v nadmořské výšce cca 1000 m (S); Beskydy - Travný (6477), 27.V.93 - 2 ex. do zemní pasti v nadmořské výšce cca 1000 m (S).
Lokality na západní hranici areálu tohoto karpatského poddruhu.

Carabus auratus Linnaeus, 1761 - Boh.: Bílý Potok pod Smrkem (5157), 1.VI.95 - 2 ex. na louce do zemní pasti (VO).
V severních Čechách velmi lokálně se vyskytující druh otevřených stanovišť, zajímavý je v tomto případě společný výskyt s *C. auronitens auronitens* Fabricius, 1792.

Carabus montivagus montivagus Palliardi, 1825 - Slov.: Plášťovce (7879), 18.-19.VI.94 - 7 ex. v zemních pastech na lesostepi (VE), 10.III.95 - 5 ex. na okraji lesostepi (P); Šahy - Tešmák (7979), 21.VI.94 - 1 immaturní ex. na pastvině (VE), 14.VII.95 - 5 ex. pod listím na kraji lesa (ML); Silická Ladnica env. (7489), 27.V.95 - 1 ex. (MA).
Druh teplomilných hájů a lesostepí jižního Slovenska.

Carabus problematicus problematicus Herbst, 1786 - Slov.: Veľká Fatra - vrch Križná (7180), 6.VII.92 - 2 ex. na horské louce nad horní hranicí lesa (KO, J. Macek revid.).
Především lesní druh, ze Slovenska známo málo údajů.

Carabus hungaricus hungaricus Fabricius, 1792 - Mor.: Pouzdřany (7065), 8.VI.95 - 1 ex. pod polenem na stepi (ML).
Na lokalitě stálý výskyt tohoto stepního druhu.

Carabus irregularis montandoni Buysson, 1882 - Mor.: Těšínské Beskydy - Mionší (6478), 9.VI.93 - 1 ex. v jedlovém pahýlu (S).
Lokalita na západní hranici areálu tohoto karpatského poddruhu.

Cicindela germanica Linnaeus, 1758 - Mor.: Zlín - Malenovice (6771), 19.VI.92 - hojně v hliništi cihelny, několik párů při kopulaci, 1 kukla nehluboko v zemi (VE observ.).
Lokální druh teplejších stanovišť s volnou hlinitou půdou a řídkou vegetací.

Cicindela arenaria viennensis Schrank, 1781 - Boh.: Roudný pr. Louňovice (6355), 7.VII.91 - 5 ex. na výsypce zlatého dolu, pozorováno více ex. (J. Strejček).
V Čechách jen velmi lokální výskyt na písčitých stanovištích.

Cicindela soluta pannonica Mandl, 1935 - Mor.: Sedlec - Skalka (7266), 11.V.96 - 2 ex. na písčitém poli (J. Moravec).
Z jižní Moravy uváděn na základě publikovaného údaje Jagemanna (1945): Jaroměřice [nad Rokytnou]. Tento údaj je však málo pravděpodobný a jde nejspíše o omyl. Nynější nález je tak prvním bezpečně ověřeným údajem o výskytu na Moravě.

Blethisa multipunctata multipunctata (Linnaeus, 1758) - Boh.: Štěnkov - Suté břehy (5862), 1.IX.91 - 2 ex. na písčině u řeky Orlice (KC); Žlutice (5944), 8.V.94 - 8 ex. (pozorovány desítky exemplářů) na zamokřeném břehu přehradní nádrže (T); Dnešice (6345), 26.V.96 - 2 ex. mezi vegetací na zarostlém břehu rybníka Utopený (T); Mor.: Břeclav - Pohansko (7267), 2.V.93 - více ex. na bahně podmáčené louky (ML), VII.96 - více ex. u rybníčků (KC); Slov.: Šahy - Tešmák (7979), 22.VI.94 - více ex. u močálu (VE).
Lokální druh vázaný především na vegetací zarostlé břehy neznečištěných vod, často i u vod s kolísavou hladinou.

Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 - Slov.: Gbelce (8177), 16.VI.94 - 1 ex. na rašelině (KP); Plášťovce (7879), 18.VI.94 - 1 ex. u vody v prohlubních lesní cesty (VE).
Nehojný druh na vegetací zarostlých březích vod nevyhraněného typu.

Elaphrus aureus aureus Ph. Müller, 1821 - Boh.: Hodkovice nad Mohelkou (5356), V.-VI.94 - 1 ex. v zemní pasti (VO); Dražice nad Jizerou - Stará Jizera (5755), 1.VI.96 - 1 ex. (VO).
V Čechách lokální druh písčitých a hlinitopísčitých břehů neznečištěných řek.

Elaphrus ulrichi W. Redtenbacher, 1842 - Slov.: Hrabovec (6794), 18.VI.93 - 3 ex. u řeky Topľy (LT).
Na Slovensku lokální, reliktní druh zachovalých písčitých břehů; potvrzení stálého výskytu na lokalitě.

Dyschirius abditus Fedorenko, 1993 - Slov.: Tarnov (6692-93), 11.VII.92 - 1 ex. na písčitém břehu Sveržovky (KO), 3.VII.94 - 3 ex. (Z).
Na Slovensku lokální druh zachovalých písčitých břehů; potvrzení stálého výskytu na lokalitě.

Dyschirius angustatus (Ahrens, 1830) - Boh.: Trávčice (5551), 13.VIII.94 - 7 ex. (MO); Roudný pr. Louňovice (6355), 19.VI.95 - 1 ex. do zemní pasti na staré výsypce (HŮ); Benátky nad Jizerou - Traviny (5755), 1.VI.96 - 1 ex. (VO, B revid.); Mor.: Vyšní Lhoty (6376), 23.IV.94 - 1 ex. na písčitém břehu řeky Morávky (S); Slov.: Tarnov (6692-93), 11.VII.92 - 1 ex. na písčitém břehu Sveržovky (KO); Jurský Chlm (8277), 22.VI.96 - 1 ex. v pískovně (VE).
Druh písčitých a hlinitopísčitých otevřených stanovišť i mimo dosah řek, v Čechách potvrzen recentní výskyt.

Dyschirius benedikti Bulirsch, 1995 - Mor.: Bzenec - Přívoz (7069), 18.VI.94 - 1 ex. v pískovně ve vlhku (KP, B det.), 20.VII.95 a 3.VIII.95 - celkem 14 ex. na březích jezera v pískovně (K, B det.).
Nedávno ze Slovenska popsaný druh (Bulirsch 1995), nyní nalezen i na Moravě. Písčité břehy stojatých vod, pískovny. Nový druh pro Moravu a Českou republiku.

Dyschirius bonellii Putzeys, 1846 - Mor.: Čejč (7067), 20.IV.96 - 2 ex., 27.IV.96 - 2 ex. a 11.V.96 - 1 ex. (RS), 27.IV.96 - 3 ex. na stepi (MA).
Vzácný reliktní druh vázaný na sprašové a vápencové stepi. Potvrzení stálého výskytu na lokalitě.

Dyschirius chalceus Erichson, 1837 - Mor.: Čejč (7067), 11.VII.95 - 1 ex. na světlo (RS); Slov.: Tvrdošovce (7974), 9.V.92 - 1 ex. na slanisku (ML), 25.VII.92 - 183 ex. na světlo u rybníčku (VE), 6.V.93 - 9 ex. (LT), 26.V.93 - 11 ex. (T); Malá nad Hronom (8178), 23.VII.92 - 1 ex. na světlo u Hronu (VE); Čenkov (8277), 24.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE); Studienka (7468), 9.VIII.94 - 1 ex. na světlo (RS).
Halobiontní druh, při přeletech ho však lze jednotlivě zastihnout i na subhalofilních stanovištích.

Dyschirius chalybaeus gibbifrons Apfelbeck, 1899 - Slov.: Veľké Trakany (7698), 18.VII.92 - více ex. na břehu slepého ramene Tisy (KO); Malé Trakany (7698), 7.VII.94 - 3 ex. (Z).
Jen na několika lokalitách na Slovensku. Potvrzení stálého výskytu druhu na uvedené lokalitě.

Dyschirius digitatus (Dejean, 1825) - Boh.: Běleč nad Orlicí (5761), 1.V.96 - 2 ex. u řeky Orlice (KC).
V Čechách lokální druh s vazbou na neznečištěné písčité a štěrkopískové břehy vod.

Dyschirius extensus extensus Putzeys, 1846 - Slov.: Prešov - Solivar (7093), 22.V.95 - 7 ex. (MA); Zlatná na Ostrove (8273), 16.VI.95 - 2 ex. na slanisku (KP).
Zlatná na Ostrove je novou, dosud nepublikovanou lokalitou tohoto halobiontního druhu.

Dyschirius laevisculus Putzeys, (1846) - Slov.: Zlatná na Ostrove - Dolná Novina (8273), 13.V.91 - 6 ex. na zvýšeném břehu pískovny (VE), 16.VI.95 - 4 ex. na slanisku (KP).
Vzácný, lokální druh, vyskytující se na dvou diametrálně odlišných typech biotopů: na nížinných slaniskách a na štěrkopískových březích podhorských toků.

Dyschirius politus politus (Dejean, 1825) - Boh.: Česká Lípa - Lada (5353), 7.V.95 - 1 ex. na zahradě na záhoně (KP); Mor.: Čejč (7067), 7.V.92 - 2 ex. u vysychající louže na okraji pole (LT, B det.).
Pozorování dokládá značnou adaptabilitu a přelety tohoto druhu.

Dyschirius rufipes (Dejean, 1825) - Mor.: Čejč (7067), 29.IV.95 - 56 ex. a 11.V.96 - 26 ex. v naplaveném detritu po silných deštích (RS), 13.VII.96 - více ex. na sprašové stepi v naplavené hlíně a úlomcích vegetace po silných deštích (L); Slov.: Kamenica nad Hronom (8178), 12.V.92 - 9 ex. mezi vinicí a lesem (B); Hrhov (7390), 28.VII.93 - 1 ex. pod kamenem na stepi (K); Hokovce (7879), 16.IV.95 - 1 ex. na vinici (MA), 16.IV.95 - 2 ex. na okraji pole a 10.IX.95 - 2 ex. v naplaveném detritu na okraji polní cesty (RS).
Sběry v Čejči naznačují skutečnou početnost jinak převážně jednotlivě nalézaného a skrytě žijícího stepního druhu.

Dyschirius substriatus priscus J. Müller, 1922 - Slov.: Iža - Bokroš (8275), 15.V.92 - 1 ex. na břehu zasoleného kanálu (B).
Jde o poslední dosud známý údaj o výskytu v Podunají. V letech 1987-89 byl druh početněji sbíraný ve Zlatné na Ostrove (cf. Benedikt & Těťál 1989, 1990).

Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821 - Mor.: Břeclav (7267), 26.III.94 - 1 ex. (Z); Břeclav - Pohansko (7267), 6.IV.96 - 5 ex. a 21.IV.96 - 12 ex. v náplavech Dyje (L); Lanžhot, Soutok - Cahnov (7367), 25.V.96 - 3 ex. a 8.V.96 - 5 ex. (RS).
Jediné recentní moravské lokality druhu vázaného na zaplavované louky a pastviny.

Brachinus incertus Brullé, 1834 - Slov.: Boľ - Latorica (7597), 21.XI.92 - 3 ex. v náplavu (V. Vyhnálek).
Další tři exempláře pocházející z téhož náplavu jako exemplář, který uvádí Stanovský (1995) v první zprávě o výskytu tohoto druhu na Slovensku.

Miscodera arctica (Paykull, 1798) - Mor.: Bzenec - Přívoz (7069), 27.IX.94 - 8 ex. a 22.X.95 - 31 ex. (K), 10.VIII.96 - 18 ex. (MA).
Stálý výskyt na jediné dosud známé lokalitě (cf. Divoký 1989), větší početnost sběrů je nejspíše ovlivněna vlhčím podnebím v posledních letech.

Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 - Boh.: Krkonoše - Labská bouda env. (5259), 13.VIII.92 - 2 ex. pod kameny (LT); Břehyně (5454), 17.VIII.94 - 1 ex. (Z); Doksy - Borný (5454), 4.IX.94 - 1 ex. (VO).
Reliktní druh rašelinišť a kyselých půd.

Patrobus styriacus Chaudoir, 1871 - Slov.: Vihorlat - Morské oko (7099), 13.VII.92 - 1 ex. na břehu potoka tekoucího do Morského oka (KO).
Východokarpatský druh; poměrně běžný v Bukovských vrších, na Vihorlatě vzácnější.

Patrobus australis J. Sahlberg, 1875 - Boh.: Rožďalovice (5657), 20.VI.92 - 4 ex. u lesního rybníka (MK); Mor.: Havířov (6378), VI.92 - 11 ex. na březích lesního rybníka (KC).
Velmi lokální, reliktní druh mokřadů s chladným mikroklimatem.

Thalassophilus longicornis (Sturm, 1825) - Mor.: Nižní Lhoty (6376), 12.V.94 - 1 ex. a 14.V.94 - 1 ex. (S); Vyšní Lhoty (6376), 7.VI.94 - 1 ex. u řeky Morávky (S); Slov.: Uličˇ (7000), VII.95 - 1 ex. (KC).
Reliktní druh výhradně vázaný na zachovalé štěrkové břehy toků.

Perileptus areolatus (Creutzer, 1799) - Boh.: Višňová - Předlánce (5056), 94-95 - velmi hojný na štěrkopísčitých náplavech řeky Smědé (VO); Mor.: Vyšní Lhoty (6376), 27.V.93 - 3 ex. ve štěrku na břehu řeky Morávky (S).

Reliktní druh výhradně vázaný na zachovalé štěrkové břehy toků.

Epaphius rivularis (Gyllenhal, 1810) - Boh.: Břehyně (5454), 27.VI.92 - 1 ex. v rákosí v rašeliništi (KP); Šumava, Dobrá (7149), 13.VIII.92 - 1 ex. a 10.VIII.94 - 2 ex. v rákosí u Vltavy (KP); Mimoň env., Hradčany - Boreček (5354), 8.VIII.93 - 1 ex. a VII.94 - 1 ex. (VO); Břehyňský rybník (5454), 19.VI.93 - 1 ex., 8.VIII.93 - 1 ex. a 3.IX.94 - 1 ex., v zemních pastech (VO).
Velmi lokální reliktní druh rašelinišť a podmáčených kyselých půd.

Trechus austriacus Dejean, 1831 - Mor.: Mikulov - Anenský vrch, (7165), 26.III.93 - 1 ex. (LT).
Skrytě žijící a jen lokálně nalézaný druh bez větších nároků na stanoviště.

Trechus montanellus Gemminger et Harold, 1868 - Slov.: Vernár (7187), 25.VI.94 - 3 ex. na břehu potoka (MA), 24.IV.96 - 2 ex. (RS).
Lokální montánní druh, potvrzení stálého výskytu na lokalitě.

Trechus obtusus obtusus Erichson, 1837 - Boh.: Mimoň env., Hradčany - Boreček (5354), 3.X.93 - 1 ex. a 7.XI.93 - 2 ex. (VO, MO revid.).
Široce rozšířený druh, z Českolipska je zatím známo nemnoho údajů.

Trechus rubens (Fabricius, 1792) - Boh.: Osnice pr. Praha (6053), 19.V.93 - 1 ex. na stinném bahnitém břehu potoka Botiče (VE); Jizerské hory - Jizerka (5157), 12.VI.96 - 1 ex. v nadmořské výšce 850 m (VO); Mor.: Hrachovec (6574), 22.VII.95 - 1 ex. na světlo v hliništi cihelny (VE); Slov.: Pribylina (6984), 20.VI.92 - 1 ex. ve štěrku na břehu řeky Belé a 1 ex. v letu (KO).
Spíše podhorský a horský druh, v nižších polohách jen vzácně se vyskytující.

Trechus tristis (Duftschmid, 1812) - Slov.: Trstín (7470), 16.IX.92 - 4 ex. pod kameny ve vápencovém lomu (T); Plášťovce (7879), 2.XII.95 - 2 ex. v prosevu na stepi (VE).
Lokální druh kamenitých lesostepí a stepí na Slovensku.

Lasiotrechus discus discus (Fabricius, 1792) - Boh.: Běleč nad Orlicí (5861), IX.89 - 5 ex., VIII.90 - 4 ex. a IX.90 - 2 ex. v rákosině vypuštěného rybníka (KC); Jablonné v Podještědí env., Heřmanice (5254), 25.VII.92 - 1 ex. (VO); Mor.: Lednice (7266), 6.VII.93 - 1 ex. v bažině v rákosí (ML); Slov.: Boľ (7596), VII.95 - 1 ex. na světlo (KC).
Skrytě žijící mikrokavernikol, častěji sbíraný jen v náplavech a odchytem na světlo

Trechoblemus micros (Herbst, 1784) - Boh.: Praha - Kyje (5953), 17.-25.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE); Krušné hory - Přebuz (5641), 30.VI.93 - 1 ex. v porostu kleče na rašelině (T); Praha - Zbraslav (6052), 16.V.96 - 1 ex. vyplaven povodní z břehu tůně (VE); Mor.: Lanžhot, Soutok - Cahnov (7367), 30.III.96 - 3 ex. v náplavu (RS); Břeclav - Pohansko (7267), 6.IV.96 - 2 ex. v náplavu (RS).
Skrytě žijící mikrokavernikol, častěji sbíraný jen v náplavech nebo v podzemních prostorách, v letu dosud nebyl pozorován.

Pseudanophthalmus pilosellus poloninensis Hůrka, 1974 - Slov.: Bukovské vrchy - Čelo (7000), 25.V.95 - 2 ex. v nadmořské výšce 950 m (MA).
Vzácný východokarpatský poddruh karpatského endogenního druhu.

Pseudanophthalmus pilosellus stobieckii (Csiki, 1907) - Mor.: Beskydy - Čertův mlýn (6575), 17.VI.93 - 14 ex. a 24.VI.93 - 10 ex. pod kameny na lesní cestě v nadmořské výšce 1190-1200 m (K), 2.VI.96 - 3 ex. (RS); Moravskoslezské Beskydy - Pustevny (6575), 2.IX.96 - 1 ex. pod zapadlým balvanem (UT); Slov.: Nízké Tatry, Ohniště - Poľana (7084), 10.VII.92 - 5 ex. pod kameny na louce v nadmořské výšce 1480 m (MA), 1 ex. (LT).
V pohořích západních Karpat lokálně rozšířený poddruh.

Duvalius subterraneus subterraneus (Miller, 1868) - Slov.: Nová Sedlica (6901), 16.VI.92 - 1 ex. na břehu potoka (KO), 13.VI.93 - 2 ex. (LT); Bukovské vrchy - Runina (6900), 16.VI.92 -

2 ex. na prameništích potoků pod vrchem Ďurkovec (KO); Bukovské vrchy - Ďurkovec (6900), 16.VI.93 - 1 ex. ve vyschlém korytu potoka (MA), 1 ex. (LT); Bukovské vrchy, Runina - Ďurkovec (6900), 23.V.95 - 3 ex. a 25.V.95 - 2 ex. nadmořské výšce 1050-1000 m (MA).
Ověření stálého výskytu východokarpatského druhu v oblasti Bukovských vrchů.

Duvalius bokori gelidus (Csiki, 1912) - Slov.: Silická Ladnica env. (7489), 21.-27.V.95 - 9 ex. (MA).
Endogenní poddruh, známý pouze ze Slovenského krasu. Ověření stálého výskytu na lokalitě.

Duvalius goemoeriensis (Bokor, 1922) - Slov.: Špánie pole, jeskyně Puklina (7486), 22.VI.94 - 1 ex. pod kamenem ve vchodu do jeskyně (MA).
Endemit několika jeskyní v Gemerském krasu. Ověření stálého výskytu na klasické lokalitě.

Duvalius microphthalmus tatricus Jeannel, 1928 - Slov.: Veľká Fatra - vrch Krížná (7180), 6.VII.92 - 2 ex. pod kameny na horské louce v nadmořské výšce 1400-1500 m (KO), 18.VII.92 - 1 ex. pod kamenem v nadmořské výšce cca 1500 m (MK); Kremnické vrchy - Zlatá studňa (7280), 16.VI.96 - 7 ex. v nadmořské výšce 1100-1150 m (MA).
Endogenní montánní druh. Potvrzení stálého výskytu tohoto poddruhu v obou pohořích.

Duvalius szaboi veporensis Hůrka, Janák et Moravec, 1989 - Slov.: Veporské vrchy - Klenovský Vepor (7384), 27.V.95 - 19 ex. v nadmořské výšce 1150 m (MA).
Ověření stálého výskytu na klasické lokalitě.

Pogonus luridipennis (Germar, 1822) - Slov.: Studienka (7468), 10.VIII.93 - 1 ex. na světlo a 9.VII.94 - 1 ex. na světlo (RS).
Halobiont, na Slovensku i na Moravě velmi vzácně nalézán při přeletech na slaniskách i na subhalofilních lokalitách (nejbližší stálé populace žijí v okolí Neziderského jezera). První přímé pozorování letu.

Pogonus persicus peisonis Ganglbauer, 1892 - Slov.: Tvrdošovce (7974), 21.VI.92 - 5 ex. na vysychajícím bahně v okolí rybníčku (L), 25.VII.92 - 1 ex. na světlo u rybníčku (VE); Prešov - Solivar (7093), 12.VI.93 - více ex. (LT).
Halobiont, se stálým výskytem na uvedených lokalitách. První přímé pozorování letu.

Paratachys* (?) *caspius Kolenati, 1845 - Mor.: Zlín - Malenovice (6771), 19.VI.92 - hojně pod kameny v hliništi cihelny (VE); Bzenec - Přívoz (7069), 8.VI.96 - 3 ex. na břehu řeky Moravy pod naplaveným dřevem v písku (L); Slov.: Tvrdošovce (7974), VII.92 - 1 ex. u rybníčku (KC).
V jižních oblastech Moravy a Slovenska lokálně nevzácný druh vlhčích hlinitopísčitých stanovišť. Druhová příslušnost taxonu dosud není vyjasněna, viz Hůrka (1996).

Paratachys fulvicollis (Dejean, 1831) - Boh.: Praha - Kyje (5953), 6.VI.93 - 1 ex. na světlo (VE); Slov.: Plášťovce (7879), 19.VI.94 - 1 ex. na světlo (VE); Malé Trakany (7698), 8.VII.94 - 1 ex. mezi bahenní vegetací na břehu Tisy (ML); Veľké Trakany (7698), 9.VII.95 - 1 ex. pod hnijícím dřevem na břehu slepého ramene Tisy (ML); Rad (7597), 17.VI.96 - 1 ex. v rákosině na břehu kanálu (VE).
Vzácný, skrytě žijící druh, v Čechách sbírán jen ojediněle a většinou na světlo.

Paratachys micros (Fischer von Waldheim, 1828) - Boh.: Rašovice (5862), V.92 - 3 ex. u kanálu v pískovně (KC); Běleč nad Orlicí (5761), 1.V.96 - 6 ex. ve vrbinách na břehu řeky Orlice (KC); Praha - Zbraslav (6052), 16.V.96 - 1 ex. v náplavu Vltavy a 3.IX.96 - 1 ex. na zvýšeném štěrkopískovém břehu řeky Berounky (VE).
Reliktní druh zachovalejších štěrkových a písčitých břehů.

Elaphropus diabrachys Kolenati, 1845 - Boh.: Bukovina (5860), VI.90 - 6 ex. na popílkovišti (KC); Nepasice (5761), 1.V.96 - 4 ex. ve slínovém lomu (KC); Mor.: Mysločovice (6771), 26.VIII.96 - 1 ex. na bahně u vodní nádrže (UT).

Expanzívní druh, v Čechách poprvé sbírán v roce 1983 v Praze (Soustružník 1984), nyní již na více, často druhotných, lokalitách.

Elaphropus parvulus (Dejean, 1831) - Boh.: Bukovina (5861), VI.90 - 2 ex. na popílkovišti (KC); Stráž pod Ralskem (5354), 5.V.92 - 45 ex. na haldách (KP); Štěnkov - Suté břehy (5862), VII.92 - více ex. v pískovně (KC); Mor.: Kružberk (6171), 13.VII.96 - více ex. pod kamínky na ruderálu (S).

Lokálně někdy i hojný druh písčitých stanovišť.

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) - Boh.: Žihle (5946), 9.VI.93 - 1 ex. (V. Týr, S det.); Mor.: Břeclav - Boří les (7267), 28.VIII.93 - 6 ex. na spodní straně kůry na hromadě rozkládajících se dřevěných zbytků, po dešti (ML); Bylnice (6974), 20.V.95 - 3 ex. v hromadách dřevního odpadu z pily (L); Uherský Brod (6971), 14.VI.95 - 1 ex. na výsypce kůry a štěpků z pily (L); Slov.: Uličˇ (7000), 19.-20.VI.92 - 10 ex. v hromadě pilin a odřezků dřeva u pily (KO); Studienka (7468), 9.VII.94 - 1 ex. a 15.VII.94 - 1 ex. na světlo (RS).

Skrytě žijící druh vázaný na tlející rostlinný materiál.

Asaphidion austriacum Schweiger, 1975 - Slov.: Bratislava - Veľký ostrov (7868), 3.IV.90 - 2 ex. v lužním lese (H), 7.IV.90 - 3 ex. na okraji lužního lesa (VE); Bratislava - Devín (7868), 18.VIII.96 - více ex. na písčitém vyvýšeném břehu mezi mechem a listím, spíše na zastíněných místech, společně s *Asaphidion flavipes* (Linnaeus, 1761) (VE).

Nedávno popsaný evropský druh, zřejmě široce rozšířen a dříve zaměňován za *A. flavipes*. Na Slovensku dosud jen u Dunaje. Jako nový druh pro Slovensko citován Hůrkou (1996).

Asaphidion caraboides caraboides (Schrank, 1781) - Slov.: Uličˇ (7000), 15.VI.93 - 1 ex. na břehu Uličky (LT); Remetské Hámre (7199), 21.VII.93 - 1 ex. na břehu potoka pod kamenem (UT).

Reliktní druh zachovalých hlinitopísčitých a štěrkopískových břehů řek a potoků.

Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) - Boh.: Václavice (5155), 30.VII.95 - 1 ex. v pískovně (VO); Milovice (5755), 4.V.96 - 1 ex. na bahnité půdě střelnice v bývalém vojenském prostoru Mladá (VE); Benátky nad Jizerou env. - Traviny (5755), 1.VI.96 - 1 ex. (VO).

V Čechách jen lokálně hojný druh volných hlinitopísčitých stanovišť.

Ocys harpaloides (Audinet-Serville, 1821) - Slov.: Bratislava (7867-68), 21. a 29.III.92 - 8 ex. na Veľkém ostrove (MA), 21.III.92 - 10 ex. pod kůrou vrb (*Salix* sp.) na Veľkém ostrove (LT); Bratislava - Devín (7867-68), 4.IV.93 - 10 ex. pod kůrou vrb (*Salix* sp.) na Veľkém ostrove (KO).

Na Slovensku znám dosud jen z Bratislavy a okolí (cf. Benedikt & Těťál 1990).

Bembidion striatum (Fabricius, 1792) - Mor.: Bzenec - Přívoz (7096), VII.93 - 1 ex. na světlo (R. Šťastný, L det.); Ostrožská Nová Ves (6970), 29.VIII.93 - 1 ex. (R. Šťastný, L det.); Slov.: Kamenín (8177), 9.V.92 - 3 ex. (ML); Komárno (8274), 4.IX.92 - více ex. na břehu Dunaje (KO).

Druh zachovalých písčitých břehů, údaj o příletu na světlo je první svého druhu, jinak je druh považován spíše za heliofilní.

Bembidion litorale (Olivier, 1791) - Boh.: Černousy (5056), 6.V.95 - 1 ex. a 20.VIII.95 - 1 ex. (VO); Višňová - Předlánce (5056), 6.V.95 - masový výskyt a 21.VII.95 - 1 ex. (R. Beran); Běleč nad Orlicí (5761), 1.V.96 - více ex. (KC); Slov.: Rokytov pr. Bardejov (6693), 11.VII.92 - více ex. na břehu řeky Topľa (KO).

V Čechách velmi lokální druh zachovalých písčitých břehů.

Bembidion laticolle (Duftschmid, 1812) - Mor.: Ostrožská Nová Ves (6970), 29.VIII.93 - 52 ex. (L), 11.IX.93 - 51 ex. na písčitém břehu jezera (RS); Slov.: Kamenín (8177), 9.V.92 - 3 ex. (ML); Malá nad Hronom (8178), 23.VII.92 - 1 ex. na světlo u Hronu (VE); Iža - Bokroš (8275),

22.V.95 - 1 ex. na okraji kaluže (K); Imeľ - Nesvady (8074), 24.-25.V.95 - 1 ex. na písčitém břehu jezera (K); Malé Trakany (7698), 9.VII.95 - více ex. na bahnitém břehu Tisy (ML).
Druh zachovalých písčitých a hlinitopísčitých břehů. Moravskými nálezy recentně potvrzen nepublikovaný nález J. Pulpána z padesátých let z Rohatce (Pulpán - msc., in coll P. Veselý, Praha). Přílet na světlo nebyl dosud zaznamenán.

Bembidion nigricorne Gyllenhal, (1837) - Boh.: Doksy (5454), 8.V.92 - více ex. v borovém jehličí a 23.IV.95 - více ex. na písku a jehličí (KP); Kraslice - vrch Tisovec (5641), 26.IX.92 - 10 ex. (LT); Břehyně (5454), 2.IX.94 - více ex., a 20.VIII.95 - více ex. (VO); Břehyně (5454), 3.X.94 - 35 ex. (Z).
Severoevropský druh kyselých půd, lokálně hojný.

Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) - Boh.: Stráž pod Ralskem (5354), 5.V.92 - 4 ex. na haldě (KP); Milovice (5755), 21.VI.92 - 1 ex. (MK); Mor.: Vyšní Lhoty (6376), 4.VI.92 - 1 ex. na štěrkovém břehu řeky Morávky (S); Slov.: Tarnov (6692-93), 11.VII.92 - hojně na břehu řeky Topľy (KO).
Druh přírodně zachovalých oblastí, v Čechách jen na několika lokalitách, především na obnažených písčitých půdách v bývalých vojenských územích.

Bembidion splendidum Sturm, 1825 - Slov.: Malé Trakany (7698), 8.VII.94 - 3 ex. a 9.VII.95 - několik ex. na bahnitém břehu Tisy (ML).
Ověření stálého výskytu na jedné z mála slovenských lokalit.

Bembidion obliquum Sturm, 1825 - Boh.: Praha - Kyje (5953), 10.VI.93 - 1 ex. na světlo (VE); Slov.: Suchá Hora (6684), 21.VI.95 - 1 ex. na rašeliništi (K).
Na Slovensku známo málo lokalit, v Čechách místy hojný. Přílet na světlo je jen zřídka pozorován.

Bembidion latiplaga Chaudoir, 1850 - Slov.: Štúrovo (81-8278), 19.VI.92 - 1 ex. na bahně u Dunaje (ML).
Na sledovaném území pouze v nejjižnějších oblastech Slovenska.

Bembidion minimum (Fabricius, 1792) - Boh.: Lány (5849), 6.VII.94 - 1 ex. na světlo (RB).
Hygrofilní druh, v Čechách velmi lokální.

Bembidion humerale Sturm, 1825 - Boh.: Doksy (5454), 8.V.92 - 2 ex., 16.V.92 - 3 ex., 17.V.92 - 4 ex. a 21.V.92 - 1 ex. v rašelinném mokřadu, 23.IV.95 - 8 ex. na rašeliništi (KP); Pomezná (5839), 10.VI.95 - 1 ex. na břehu malé tůňky v pískovně v blízkosti přítokové části přehradní nádrže Skalka (T); Běleč nad Orlicí (5861), 3.VI.96 - více ex. na lesní pasece (KP); Slov.: Suchá Hora (6684), 23.VI.94 - 12 ex. na okraji rašeliniště (S), 21.VI.95 - 10 ex. na rašeliništi (K).
Reliktní druh rašelinných stanovišť.

Bembidion neresheimeri J. Müller, 1930 - Mor.: Brod nad Dyjí (7165), 17.IV.93 - 23 ex. (LT); Slov.: Rohožník (7568), 27.V.93 - 2 ex. pod vegetací na břehu kanálu, spojujícího menší rybníčky (T); Lakšárská Nová Ves - ŠPR Červený rybník (7468), 27.V.93 - 1 ex. pod vegetací a spadaným listím (T).
Lokální druh slatin a subhalofilních mokřadů.

Bembidion decoratum (Duftschmid, 1812) - Slov.: Malé Karpaty - Pernek (7668), 27.V.93 - více ex. pod kameny na zastíněném břehu potoka (T).
Ověření stálého výskytu na jediné známé recentní lokalitě na Slovensku.

Bembidion millerianum Heyden, 1883 - Boh.: Šumava - Prášily (6846), 19.V.95 - 9 ex. na březích Prášilského potoka a říčky Křemelné (T).
V Čechách vzácný druh štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion ruficorne Sturm, 1825 - Mor.: Vyšní Lhoty (6376), 7.VI.94 - 2 ex. na štěrkovém břehu řeky Morávky (S); Slov.: Uličˇ (7000), 15.VI.93 - 3 ex. na břehu Uličky (LT); Kameničany (7075), 14.VIII.96 - 7 ex. (RS).
Lokální a vzácný druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion doderoi Ganglbauer, 1892 - Mor.: Zlín - Podhoří (6771), 4.X.96 - 10 ex. na břehu potoka pod kamením (UT); Slov.: Malé Karpaty - Pernek (7668), 27.V.93 - 1 ex. pod kameny na zastíněném břehu potoka (T).
Rozšířený, ale skrytě žijící podhorský lesní druh.

Bembidion difficile Motschulsky, 1844 - Slov.: Klenovský Vepor (7384), 21.VI.94 - 1 ex. (MA); Vernár (7187), 25.VI.94 - 25 ex. na břehu potoka (MA), 24.IV.96 - 1 ex. (RS).
Klenovský Vepor (Slovenské Rudohorie) je novou a pozoruhodnou lokalitou tohoto montánního druhu na Slovensku; dosud jen Veľká a Malá Fatra, Vysoké a Nízké Tatry (Hůrka 1996).

Bembidion prasinum (Duftschmid, 1812) - Mor.: Dobrá (6376), 30.VI.94 - více ex. (S); Raškovice (6376), 2.VI.96 - 1 ex. (RS); Slov.: Uličˇ (7000), 15.VI.93 - více ex. na břehu řeky Uličky (LT).
Velmi lokální druh zachovalých štěrkových břehů podhorských i nížinných toků.

Bembidion ascendens K. Daniel, 1902 - Boh.: Šumava - Prášily (6846), 19.V.95 - 11 ex. na březích Prášilského potoka a říčky Křemelné (T); Slov.: Sverˇžov (6693), 3.VII.94 - více ex. v štěrkovitém řečišti Sverˇžovky (ML).
V Čechách vzácný druh zachovalých štěrkopískových břehů toků.

Bembidion conforme Dejean, 1831 - Mor.: Vyšní Lhoty (6376), 4.VI.92 - 8 ex., 2.V.94, 7.V.94 a 12.V.94 - více ex. u řeky Morávky (S); Dobrá (6376), 30.VI.94 - více ex. (S); Raškovice (6376), 2.VI.96 - 20 ex. (RS); Slov.: Tarnov (6693), 3.VII.94 - 2 ex. v pobřežním štěrkovišti řeky Topľy (ML).
Velmi lokální reliktní druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion fasciolatum (Duftschmid, 1812) - Slov.: Komárno (8274), 4.IX.92 - 5 ex. na břehu Dunaje (KO).
Velmi lokální druh zachovalých štěrkopískových břehů vodních toků.

Bembidion varicolor (Fabricius, 1803) - Boh.: Černousy (5056), 26.VII.92 - 1 ex. u řeky Smědé (M. Jaroš).
V Čechách od čtyřicátých let nezvěstný druh (cf. Fassati 1947, 1957) zachovalých štěrkopískových břehů řek; potvrzení recentního výskytu.

Bembidion monticola monticola Sturm, 1825 - Mor.: Rožnov pod Radhoštěm (6574), 2.XI.95 - 12 ex. pod kameny na břehu řeky Bečvy (UT).
Lokální druh zachovalých štěrkopískových břehů, především u podhorských toků.

Bembidion modestum (Fabricius, 1801) - Boh.: Běleč nad Orlicí (5761), IV.90 - 5 ex. a 1.V.96 - 3 ex., běžný na písčinách řeky Orlice (KC); Višňová - Předlánce (5056), 94-95 - velmi hojný na březích řeky Smědé (VO); Slov.: Závod env. (7467), 28.V.93 - 1 ex. pod vegetací a spadaným listím na písčitém okraji lesa (T).
V Čechách již jen lokálně se vyskytující druh písčitých břehů vodních toků.

Bembidion dalmatinum Dejean, (1831) - Mor.: Popovice (6971), 10.V.92 - 23 ex. (RS); Uherský Brod (6971), 14.V.92 - 1 ex. (RS); Veletiny (6971), 24.V.92 - 10 ex. ve stržích a na kolmých březích lesních potoků (RS); Slov.: Plášťovce (7879), 28.III.92 - 4 ex. na podmáčené lesní cestě (LT), 28.V.92 - 1 ex. v korytě potoka (KP); Kováčovské kopce (8178), IV.92 - 15 ex. na březích lesních přívalových potoků (KC).

Druh teplomilných listnatých lesů. Poslední publikovaný údaj z Moravy pochází z roku 1943 z Němčiček (Kult 1948). Potvrzení recentního výskytu na Moravě.

Bembidion milleri kulti Fassati, 1942 - Boh.: Opatovice nad Labem - Opatovický písník (5860), VI.90 - 5 ex. (KC); Nepasice (5761), VII.91 - 20 ex. ve slínovém lomu po dešti u kaluží (KC); Praha - Radlice (5952), 30.IV.92 - 1 ex. v hliništi cihelny (VE); Boučí (5741), 26.IX.92 - 3 ex. v suti a 21.IV.93 - 4 ex. (LT); Vrbová (5840), 3.VI.95 - 10 ex. na písčitojílovitém břehu slepého ramene Ohře (T).

Druh vázaný na volné jílovité půdy, téměř výhradně nalézán v cihelnách a lomech, zajímavý je proto nález na přirozeném břehu slepého ramene.

Bembidion fluviatile Dejean, 1831 - Boh.: Opatovice nad Labem - Opatovický písník (5860), VI.90 - 2 ex. (KC); Běleč nad Orlicí (5761), VII.91 - 15 ex. na březích řeky Orlice (KC); Višňová - Předlánce (5056), 94-95 - velmi hojný na hlinitých březích řeky Smědé (VO); Vrbová (5840), 3.VI.95 - více ex. na písčitojílovitém břehu slepého ramene Ohře (T); Mor.: Bzenec - Přívoz (7069), 22.V.94 - hojně v puklinách na strmém břehu meandru Moravy (L); Slov.: Komárno (8274), 4.IX.92 - 10 ex. na břehu Dunaje (KO).

Lokálně hojný druh neznečištěných písčitých a hlinitopísčitých břehů vod.

Bembidion scapulare lomnickii Netolitzky, 1916 - Slov.: Uličské (7000), 18.VI.92 - 1 ex. pod kamenem na štěrkové výspě řeky Uličky (KO, O. Hovorka revid.).

Vzácný druh štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion subcostatum javurkovae Fassati, 1944 - Slov.: Slovenský kras - Kečovo (7588), 10.VII.92 - 5 ex. u vyvěračky (ML), 12.VII.94 - více ex. na břehu potůčku pod vyvěračkou v teplém vápencovém údolí (ML, Z); Vlkanová pr. Zvolen (7980), VII.95 - 1 ex. (KC); Malé Trakany (7698), VII.95 - 7 ex. (KC).

Lokálně hojný druh hlinitých a hlinitopísčitých břehů vodních toků.

Poecilus punctulatus (Schaller, 1783) - Mor.: Kobylí (7067), 3.V.92 - 1 ex. na stepi (KO); Slov.: Sírnik - vrch Avaš (7696), 25.IV.93 - 3 ex. na okraji pole (VE), 1 ex. (H).

Lokální stepní druh. Ověření výskytu na známých, izolovaných lokalitách.

Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1824 - Mor.: Čejč (7067), 3.V.92 - 1 ex. na stepi (KO); Dolní Dunajovice (7165), 30.VII.95 - 2 ex. na kamenité stepi (ML); Slov.: Bielovce env. (7879), 14.V.92 - 5 ex. aktivních za slunečného dopoledne v blízkosti puklin vyschlé půdy na úhoru (VE); Tvrdošovce (7974), 21.VI.92 - 1 ex. na polní cestě za obcí (L), 26.V.93 - 1 ex. pod vegetací na okraji pole (T); Jatov (7874), 27.V.93 - 1 ex. vyšlapán z pobřežního porostu v rákosišti (T).

Lokální reliktní druh stepních oblastí.

Poecilus szepligetii havelkai Kult, 1947 - Slov.: Donovaly - vrch Zvolen (7181), 5.VIII.96 - 4 ex. pod kameny na pastvině (T).

Ověření výskytu na jedné z mála současných slovenských lokalit.

Pterostichus inquinatus (Sturm, 1824) - Slov.: Šahy - Tešmák (7979), 14.V.92 - 2 ex. (B); Boľ - Rad (7597), 31.X.-2.XI.92 - více ex. v náplavu a na hrázích Latorice (S, K. Orszulik); Rad (7597), 25.IV.93 - 2 ex. v náplavu na hrázi (H); Rad - Zatín (7597), 27.IV.93 - 5 ex. v náplavu na hrázi (H); Zatín - Boľ (7597), 28.IV.93 - 1 ex. na pastvině (H); Boľ (7597), 23.III.92 - 3 ex. na pastvině pod dlaždicemi (MA), 5 ex. (LT), 24.III.92 - 2 ex. pod kameny na hrázi Latorice (LT), 27.III.92 - 2 ex. pod kameny na pastvině (LT), 21.-22.XI.92 - 4 ex. v náplavu Latorice (K), 27.IV.93 - 12 ex. a 29.IV.93 - 3 ex. na vlhké pastvině (H).

Druh zaplavovaných luk, pastvin a jejich bližšího okolí. Na Slovensku v současnosti jen v okolí řek Latorice a Ipľu.

Pterostichus chameleon (Motschulsky, 1865) - Mor.: Lanžhot, Soutok - Cahnov (7367), 19.IV.96 - 2 ex. a 8.V.96 - 1 ex. (RS); Slov.: Boľ - Latorica (7597), 24.-27.III.92 - 14 ex. na pastvině u Latorice (LT); Boľ (7597), 4.IV.92 - 28 ex. v náplavu Latorice (KO); Tvrdošovce (7974), 28.V.94 - 1 ex. (RS).

Pouze v dosahu řek s přirozeným vodním režimem a zachovalými lužními porosty.

Pterostichus cursor (Dejean, 1828) - Mor.: Hlohovec (7266), 8.VII.93 - 1 ex. a 28.VIII.93 - 2 ex. pod polehlou vegetací na bahně vypuštěného rybníka (ML); Slov.: Rad - Boľ (7597), 1.-2.III.92 - 4 ex. přezimující pod dřevem (VE); Rad - Latorica (7597), 24.III.92 - 1 ex. pod kamenem na hrázi (LT); Boľ (7597), 4.IV.92 - 2 ex. v náplavu Latorice (KO); Kamenín (8177), IV.92 - 1 ex. (KC); Pusté Úľany (7880), 30.V.92 - 1 ex. v rákosině (B); Leles (7598), 30.IV.93 - 1 ex. v mokřadu (H); Plášťovce (7879), 7.V.93 - 1 ex. (LT); Malá Bara (7696), 1.IV.94 - 3 ex. (KC).

Halofil, lokálně na zachovalých mokřadech a slatinách.

Pterostichus leonisi Apfelbeck, 1904 - Boh.: Praha - Zličín (5951), 24.V.93 - 1 ex. na mokřině u malého potůčku v poli (VE); Mor.: Uherský Brod (6971), 17.IV.94 - 2 ex. na rumišti pod odpadky (L); Slov.: Boľ (7597), 2.III.92 - 14 ex. přezimujících pod kameny u statku (VE), 4.IV.92 - 1 ex. v náplavu Latorice (KO).

V případě pražského nálezu jde o druhý údaj z Čech, první nález uvádí Resl (1992) z Prahy - Slivence. V jižních částech Moravy a Slovenska sbírán častěji.

Pterostichus blandulus Miller, 1859 - Slov.: Západné Tatry - Baníkovské sedlo (6884), 31.VII.92 - 5 ex. pod kameny na vlhčích místech společně s hojnějším *Deltomerus tatricus* (L. Miller, 1859) (ML).

Reliktní druh alpínského pásma, častěji ve Vysokých a Nízkých Tatrách.

Pterostichus negligens (Sturm, 1824) - Boh.: Krkonoše - Vysoké Kolo (5259), 13.VIII.92 - 11 ex. pod kameny na vrcholu (LT); Slov.: Vysoké Tatry - Zlomisková dolina (6886), 17.VII.95 - 1 ex. pod kamenem (UT).

Reliktní druh kamenitých sutí, od pahorkatin do hor.

Pterostichus piceolus latoricaensis Pulpán, 1965 - Mor.: Lanžhot env. (7367), 5.XI.92 - 2 ex. pod kůrou padlých kmenů v lužním lese (VE), 24.III.96 - 4 ex. (L); Lanžhot, Soutok - Cahnov (7367), 30.III.96 - 1 ex. a 19.IV.96 - 3 ex. (RS); Slov.: Boľ env. (7597), 24.III.92 - 1 ex. pod kamenem na hrázi (LT), 27.III.92 - 2 ex. pod kameny na pastvině (LT), 31.X.-2.XI.92 - více ex. v náplavu a na hrázích Latorice (S, K. Orszulik), 28.IV.93 - 2 ex. pod listím na břehu mokřiny vně hráze Latorice (VE), 29.IV.93 - 1 ex. na okraji mokřiny (H); Zatín (7597), 4.IV.92 - 5 ex. v náplavu na hrázi (KO); 31.X.-2.XI.92 - více ex. v náplavu a na hrázích Latorice (S, K. Orszulik); Rad (7597), 31.X.-2.XI.92 - více ex. v náplavu a na hrázích Latorice (S, K. Orszulik); Zatín env. (7597), 27.IV.93 - 6 ex. v náplavu na hrázi (H).

Pouze v blízkosti řek s přirozeným vodním režimem a zachovalými lužními porosty. Moravské nálezy potvrzují existenci plošně nevelkého refugia v lužním lese u Dyje (viz též Veselý 1992).

Pterostichus aterrimus aterrimus (Herbst, 1784) - Slov.: Rad - Latorica (7597), 24.III.92 - 1 ex. pod kamenem na hrázi (LT); Boľ env. (7597), 4.IV.92 - 1 ex. v náplavu Latorice (KO), 21.XI.92 - 1 ex. v náplavu Latorice (K); Jatov (7874), 30.V.92 8 ex. v rákosině (B), 27.V.93 - 1 ex. (T).

Reliktní hygrofilní druh vázaný na zachovalé močály.

Pterostichus elongatus elongatus (Duftschmid, 1812) - Mor.: Sedlec (7266), 28.V.93 - 2 ex. na bahně rybníka Nesyt pod dřevem (KO); Bzenec - Přívoz (7069), 30.V.93 - 1 ex. pod kusem dřeva na bahnitém břehu řeky Moravy (L); Hlohovec (7266), 14.VI.96 - 1 ex. vyšlapán ze severozápadního břehu Hlohoveckého rybníka (KP); Slov.: Kiarov (7882), 20.V.92 - 4 ex. v rákosí močálu (S), 25.V.92 - 1 ex. (B); Ipeľské Predmostie (7980), 24.V.92 - 1 ex. v rákosině (B); Jatov (7874), 30.V.92 - 30 ex. v rákosině (B), 27.V.93 - 6 ex. v rákosině (T); Pusté Úľany (7880), 30.V.92 - 2 ex. v rákosině (J. Říha, B det.); Malá Bara (7696), 1.IV.94 - 3 ex. (KC).
V Podunají rozšířený druh rákosin a mokřadů, na Moravě a v Potiské nížině nalézán sporadicky.

Pterostichus macer macer (Marsham, 1802) - Boh.: Lomnice pr. Sokolov (5741), 3.IV.93 - 8 ex. v kopečcích hlíny na téměř holé jílovité ploše (H); Sokolov (5841), 20.VIII.93 - 1 ex. na ruderální ploše (H).
Dříve i na polích a dalších druhotných stanovištích s jílovitou půdou hojný druh, nyní častěji jen v dosahu zachovalých lokalit a na ruderálech vzácně.

Pterostichus quadrifoveolatus Letzner, 1852 - Mor.: Ostrava env., Kyjovice (6174), 28.IV.93 - 1 ex. na lesním spáleništi (S); Bílé Karpaty - Lopeník (7072), 2.V.93 - 5 ex. a 25.VII.93 - 10 ex. pod trsy vřesu a úlomky dřeva mezi smrkovými pařezy na pasece (L); Slezské Beskydy - Girová (6478), 3.VI.93 - 1 ex. na vypáleném místě na pasece (S); Slov.: Malacky (7568), 19.VII.92 - 2 ex. v borovém lese (ML), 30.VII.96 - 6 ex. pod dřevem na pasece (UT).
Druh vázaný na lesy s kyselým půdním podkladem, zde potom příležitostně vyhledává spáleniště.

Pterostichus caspius (Ménétriés, 1832) - Mor.: Břeclav (7267), 28.V.93 - 1 ex. pod kusem kůry v areálu dřevozpracujícího podniku Vojenských lesů Břeclav (KO); Bylnice (6974), 28.VII.94 - 25 ex. na pile ve vlhkém odpadu po zpracování dřeva (F. Urbánek et L).
Další lokality tohoto zavlečeného a aklimatizovaného západoasijského lesního druhu. Na přirozených stanovištích dosud nenalezen.

Pterostichus rufitarsis cordatus Letzner, 1847 - Slov.: Bukovské vrchy - Nová Sedlica (6901), 19.VI.92 - 1 ex. pod kůrou kmene ležícího přes potok (KO); Bukovské vrchy - Ďurkovec (6900), 16.VI.93 - 7 ex. (LT).
Ověření stálého výskytu tohoto lesního druhu ve zmíněné oblasti.

Pterostichus hungaricus (Dejean, 1828) - Slov.: Kováčovské kopce (8178), 25.IV.90 - více ex. v lese pod dřevem (KC); Plášťovce (7879), 28.III.92 - 1 ex. pod kamenem v lese (LT); Hrhov (7390), 16.IV.94 - 1 ex. pod kamenem na stepi (K); Krupinská planina - Drieňovo (7780), 14.V.94 - 12 ex. (L).
Lokálně hojný druh lesostepí a okrajů listnatých lesů jižní části Slovenska.

Pterostichus incommodus Schaum, 1858 - Mor.: Louka (7070), 9.V.92 - 27 ex. (KO); Slov.: Kamenica nad Hronom (8178), 8.V.93 - 1 ex. (LT); Vlkyňa (7787), 23.V.93 - 1 ex. pod kamenem na pastvině (T).
Lokální druh lesostepí jižního Slovenska. Na Moravě jde o jedinou známou populaci.

Pterostichus melas melas (Creutzer, 1799) - Mor.: Vsetín env., Huslenky - Losový (6674), 10.IX.96 - 6 ex. pod předměty na pastvině (S).
Lokálně hojný druh okrajů teplejších listnatých lesů.

Pterostichus cylindricus cylindricus (Herbst, 1784) - Slov.: Kamenný Most (8177), 12., 18. a 19.VII.92 - vždy po jednom ex. pod starými hadry u pole (ML).
V podzemních chodbičkách skrytě žijící lokální druh teplejších oblastí, zejména v nivách na vlhčích půdách.

Platyderes rufus (Duftschmid, 1812) - Slov.: Sírnik - vrch Avaš (7696), 27.III.92 - 1 ex. pod kamenem na stepi (LT); Čabrad' - hrad (7780), 27.V.92 - 3 ex. v okolí zříceniny hradu (B); Plešivecká planina (7488), 14.VII.92 - 1 ex. pod kamenem na pastvině (ML); Rumince (7686), 22.V.93 - 1 ex. na pastvině pod kamenem (T); Kráľovský Chlmec (7597), 22.IV.95 - 1 ex. na Nagy Hegy (K); Plešany env. (7597), 23.IV.95 - 1 ex. pod kamenem (K); Imeľ - Nesvady (8074), 24.-25.V.95 - 1 ex. pod kamenem na okraji akátového porostu (K).
Lesní až lesostepní druh, v jižních oblastech Slovenska lokálně hojný.

Calathus cinctus Motschulsky, 1850 - Boh.: Plzeň - vrch Mikulka (6246), 7.V.93 - 1 ex. pod kamenem na ladem ležící ploše nad staveništěm fakultní nemocnice (T); Mor.: Pouzdřany (7065), 24.VIII.94 - 1 ex. pod kamenem na stepi (K); Slov.: Tvrdošovce (7974), 6.IX.92 - 2 ex. na stepi (KO); Veľký Lél (8273), 21.-22.V.95 - 2 ex. na hrázi Dunaje (K); Jurský Chlm (8277), 23.-24.V.95 - 2 ex. na stepi (K); Imeľ - Nesvady (8074), 24.-25.V.95 - 17 ex. na okrajích polí (K); Šaštín - Stráže (7368), 18.VIII.96 - 1 ex. na světlo v pískovně (VE).
Lokální xerofilní druh, v Čechách vzácný, v letu dosud nezjištěn.

Dolichus halensis (Schaller, 1783) - Boh.: České středohoří - Písečný vrch (5548), 3.VII.93 - 1 ex. na úhoru (VE); Dušníky pr. Veltrusy (5651), 20.-21.VII.93 - 2 ex. na okraji písčitého pole u Vltavy (VE); Vepřek pr. Nová Ves (5651), 28.VII.93 - 2 ex. a 18.VII.94 - 3 ex. na okraji chmelnice (VE); Praha - Zbraslav (6052), 3.IX.96 - 2 ex. na starém úhoru u řeky Berounky (VE); Mor.: Víceměřice (6669), 10.IX.93 - 1 ex. pod předmětem na polní cestě (K).
V Čechách teprve od počátku devadesátých let opět častěji nalézaný polní druh. Častější nálezy jsou zřejmě důsledkem omezení chemizace v zemědělství, rozšíření rozlohy neobdělávaných úhorů a značné pohyblivosti tohoto druhu.

Laemostenus punctatus Dejean, 1828 - Slov.: Štúrovo - Hegyfarok (8178), 8.V.92 - 1 ex. pod kusem dřeva na vinici (KO), 9.IX.95 - 10 ex. v hromadě cihel (RS); Jurský Chlm (8277), 16.VIII.96 - 1 ex. ve sprašovém úkopu (VE).
Druh jižní části Slovenska, na rozdíl od následujícího druhu bývá častěji nalézán volně mimo podzemní prostory.

Laemostenus terricola (Herbst, 1784) - Boh.: Slatiňany (6060), 16.II.92 - 1 ex. ve sklepě pod koňskými stájemi (P); České středohoří - vrch Šibeník (5548), 5.VII.92 - 11 ex. do pastí ve vchodech liščích nor během noci s vytrvalým deštěm (VE); České středohoří - vrch Raná (5548), 11.X.93 - 1 ex. na okraji suťového pole (MA); Straškov env. (5651), 21.VII.96 - 4 ex. (MA).
V norách žijící druh, druhotně i ve sklepech. V místech výskytu bývá početnější.

Olisthopus rotundatus (Paykull, 1790) - Boh.: Podhorní Újezd (5658), 9.VII.92 - 15 ex. ve zrušeném pískovcovém lomu (P); Mor.: Zlín - Malenovice (6771), 19.VI.92 - hojně pod kameny v hliništi cihelny, většinou immaturní ex. (VE); Slov.: Vihorlat - Remetské Hámre (7198-99), 12.VII.92 a 16.VII.92 - 9 ex. na stepní pastvině (KO); Petrovce (7200), 14.VII.92 - 1 ex. na pastvině (KO); Jovsa (7198), 15.VII.92 - 1 ex. na stepi (KO).
Lokální druh, spíše v pahorkatinách a v podhůří na hlinitých a písčitých půdách.

Olisthopus sturmii (Duftschmid, 1812) - Mor.: Čejč (7067), 27.IV.96 - 12 ex., 3.V.96 - 1 ex. a 11.V.96 - 1 ex. (RS); Slov.: Hrhov (7390), 28.VII.93 - 1 ex. pod kamenem na stepi (K); Jurský Chlm (8277), 15.VI.95 - 1 ex. v pískovně (KP).
Reliktní druh lesostepí a stepí, lokálně hojný.

Sericoda quadripunctata (De Geer, 1774) - Boh.: Orlické hory - Mnichová (5764), 7.VI.92 - 14 ex. na lesním spáleništi (P); Břehyně (5454), 1.V.96 - masový výskyt na spáleništi (VO); Mor.:

Beskydy - Lysá hora (6476), 1.VI.92 - 1 ex. pod kamenem (S); Slezské Beskydy - Girová (6478), 3.VI.93 - 4 ex. na vypáleném místě na pasece (S); Krnov - Cvilín (5972), 20.XII.94 - 1 ex. pod kůrou paty borovice ve společnosti *Dromius angustus* Brullé, 1834 (ML); Bílé Karpaty - Študlov (6874), 16.VI.96 - více ex. na lesní mýtině v popelu po pálení klestí (L).
Podhorský lesní druh s vazbou na lesní spáleniště.

Platynus livens (Gyllenhal, 1810) - Slov.: Jatov (7874), 30.V.92 - 22 ex. pod kůrou usychajícího topolu (KP).
Zajímavé okolnosti nálezu, jinak typické spíše pro přezimování.

Platynus krynickii (Sperk, 1837) - Mor.: Lanžhot (7267), 31.V.92 - 3 ex. v lužním lese (B); Břeclav - Pohansko (7267), 2.V.93 - 4 ex. na bahnité sníženině vlhké louky (ML); Lednice (7266), 14.VII.93 - 1 ex. u Mlýnského rybníka (LT); Břeclav (7267), 26.III.94 - 1 ex. (Z).
Na Moravě stálý výskyt pouze v lužních lesích u Dyje.

Platynus longiventris Mannerheim, 1825 - Mor.: Lanžhot, Soutok - Cahnov (7367), 2.VIII.96 - 1 ex. pod kůrou vrby (RS); Slov.: Šahy - Tešmák (7979), 22.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE); Malá nad Hronom (8178), 23.VII.92 - 1 ex. na světlo u Hronu (VE); Ipeľské Predmostie (7979), 16.IV.95 - 5 ex. pod kůrou (RS); Kováčov (8178), 19.IV.95 - 1 ex. v náplavu na břehu Dunaje (ML).
Lokální druh zachovalých lužních porostů.

Agonum atratum (Duftschmid, 1812) - Slov.: Čenkov (8277), 24.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE); Studienka (7468), 9.VII.94 - 1 ex. na světlo (RS); Patince (8275), 15.VII.96 - 7 ex. na světlo (VE).
Halofilní hygrofil, na světlo chytán poměrně často.

Agonum ericeti (Panzer, 1809) - Boh.: Břehyně (5454), V.94 - 21 ex. v zemních pastech na rašeliništi v nadmořské výšce 270 m (VO).
Tyrfobiont, nejnižší dosud zaznamenaná nadmořská výška výskytu v Čechách.

Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) - Boh.: České středohoří - vrch Raná (5548), 29.VIII.92 - 1 ex. pod kamenem v trávě (MA); Slov.: Plášťovce (7879), 21.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE); Malá nad Hronom (8178), 23.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE); Tvrdošovce (7974), 25.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE).
Bionomie druhu dosud nedostatečně známa; velmi pohyblivý, chytán nejčastěji na světlo nebo náhodně při přeletech na rozmanitých stanovištích. Původně snad druh lesních mokřin.

Agonum hypocrita (Apfelbeck, 1904) - Slov.: Svätojurský Šúr (7769), 26.XII.94 - 2 ex. a 4.II.95 - 3 ex. pod kůrou padlých kmenů na okrajích močálu (L).
Zachovalé močály, rašeliniště. Nedostatečně známý druh s nesouvislým rozšířením v Evropě, Malé Asii, na Kavkaze a v oblasti Kaspického moře (Schmidt 1994, 1995; Hůrka 1996). Znám z Čech (Schmidt 1995). Nový druh pro Slovensko.

Agonum permoestum Puel, 1938 - Slov.: Patince (8275), 15.VII.96 - 1 ex. na světlo (VE).
Další lokalita tohoto euromediterránního halofilního druhu. Na Slovensku dosud jen Jatov, Kamenín a Štúrovo (Schmidt 1995).

Europhilus antennarius (Duftschmid, 1812) - Slov.: Petrovce (7200), 14.VII.92 - 2 ex. na pastvině poblíž vodního pramene (KO); Plášťovce (7879), 7.V.93 - 2 ex. (MA), 2 ex. (LT), 18.VI.94 - 13 ex. u vody v prohlubních lesní cesty, z toho 7 ex. immaturních (VE), 19.VI.94 - více ex. u louží na cestě v lese (MA), 17.IV.95 - 10 ex. (RS); Obyce pr. Zlaté Moravce (7576), 16.VIII.95 - 1 immaturní ex. na pastvině u lesa (VE).
Lokálně v mokřinách v listnatých lesích na Slovensku.

Europhilus gracilis (Sturm, 1824) - Mor.: Rýmařov env., Horní město - Skály, Skalské rašeliniště (6069), 23.VII.96 - 5 ex. vyšlapáno z rašeliny (S).
Lokální druh mokřadů na kyselých půdách, na Moravě není známo mnoho lokalit.

Amara chaudoiri incognita Fassati, 1946 - Mor.: Tlumačov - Křemenná (6771), 20.V.95 - 1 ex. pod vegetací u vápencového lomu (VE); Bzenec - Přívoz (7069), 21.V.95 - 1 ex. pod mechem v borovém lese (VE); Slov.: Šahy - Tešmák (7979), 14.V.92 - 4 ex. nočním smykem luk u Ipľu (VE).
Zajímavá pozorování heliofilního druhu, častého především na zaplavovaných loukách u nížinných řek.

Amara concinna Zimmermann, 1831 - Slov.: Boľ (7597), 27.III.92 - 1 ex. na plovoucí kládě při stoupající vodě (MA); Boľ env. (7597), 28.IV.93 - 2 ex. na hrázi a okraji pastviny (H); Ipeľské Predmostie (7979), 16.IV.95 - 2 ex. (MA).
Na zaplavovaných loukách a v jejich okolí, hojněji v dosahu řek Latorice a Ipľu.

Amara fulvipes (Audinet-Serville, 1821) - Slov.: Čabrad' - hrad (7780), 26.V.92 - 8 ex. smykem na travinách (KP), 5 ex. (B); Modrý Kameň, Prše (7780), 28.V.92 - 8 ex. smykem na travinách (KP), 5 ex. (B); Špánie Pole (7486), 22.VI.94 - 2 ex. na louce (MA).
Lokální druh sušších luk v pahorkatinách jižní části Slovenska.

Amara pseudostrenua Kult, 1946 - Slov.: Tvrdošovce (7974), 30.V.92 - 18 ex. smykem na slaných lukách (KP).
Halobiont, ověření stálého výskytu na lokalitě.

Amara tricuspidata Dejean, 1831 - Mor.: Uherčice (7065), 25.V.93 - 1 ex. na okraji pole (KO); Břeclav - Boří les (7266-67), 22.VI.95 - 3 ex. na okraji paseky na písčinách na travách (L); Čejč (7067), 24.VI.95 - hojně na okraji pole na chundelce metlici (*Apera spica-venti* Beauv.) i na klasech pšenice (*Triticum* sp.) (L); Bzenec - Přívoz (7069), 25.VI.95 - 1 ex. na stepi na travách (L), 6.VII.95 - 21 ex. na travách (RS); Čejč (7067), 6.VII.95 - 5 ex. na travách, pozorováno velké množství ex. a 27.IV.96 - 1 ex. (RS), 10.VI.96 - více ex. v podvečer na travách (S); Břeclav - Pohansko (7267), 6.IV.96 - 1 ex. (RS); Lanžhot, Soutok - Cahnov (7367), 25.V.96 - 2 ex. (RS); Sedlec (7266), 5.VI.96 - 3 ex. na trávě v podvečer (KC); Slov.: Závod env. (7467), 28.V.93 - 3 ex. pod vegetací a spadaným listím na písčitém okraji lesa (T); Šahy - Tešmák (7979), 21.VI.94 - 1 ex. smykem na písčité části pastviny v lese (VE); Nesvady pr. Nové Zámky (8074), 14.VI.95 - 18 ex. smykem na travinách (KP); Somotor env. (7697), 16.VI.96 - více ex. na travách při okrajích polí a na písečné duně (VE).
Vyskytuje se zejména na písčinách, v posledních letech přibývá nálezů, nejspíše v důsledku omezení chemizace v zemědělství.

Amara anthobia A. et G. B. Villa, 1833 - Slov.: Plášťovce (7879), 17.IV.94 - 1 ex. (RS); Pohranice (7675), 15.IV.95 - 2 ex. (RS); Šahy (7979), 16.IV.95 - 3 ex. (RS); Čenkov (8277), 22.V.95 - 1 ex. na lesostepi (K).
Na Slovensku v oblastech s vinicemi poměrně častý druh.

Amara famelica Zimmermann, 1831 - Boh.: Běleč nad Orlicí (5861), VIII.90 - 1 ex. na břehu rybníka v detritu (KC); Hrdoňovice (5457), 4.VII.93 - 2 ex. pod předměty v pískovně, z toho 1 ex. immaturní (S); Mimoň - Hvězdov (5354), V.-VI.94 - 5 ex. v zemních pastech (VO, MO det.).
Velmi lokální druh kyselých půd, zejména na vřesovištích.

Amara lucida (Duftschmid, 1812) - Mor.: Břeclav - Pohansko (7267), 6.IV.96 - 1 ex. (RS); Břeclav - Boří les (7266), 1.IX.96 - 1 ex. na písčinách pod plevelem (L); Slov.: Veľký Kamenec - vrch Tarbucka (7696), 24.III.92 - 1 ex. na stepi (LT); Ladmovce (75-7697), 30.IV.93 - 1 ex. na

stepi (H); Malá Bara (7696), 2.IV.94 - 1 ex. (KC); Kamenica nad Hronom (8178), 11.V.92 - 4 ex. na stepi (B); Plášťovce (7879), 29.V.94 - 1 ex. (VE), 13.-14.VI.94 - 10 ex. na stepi v drnech a zemině (KP), 17.IV.95 - 9 ex. (RS), 19.VI.94 - masový výskyt immaturních ex. v zemi na okrajích políček (VE); Hokovce (7879), 16.IV.95 - 1 ex. (RS); Jurský Chlm (8277), 16.IV.95 - 1 ex. mezi vegetací v pískovém lomu (ML); Marcelová env. - Mašan (8275), 22.-23.V.95 - 1 ex. (K); Malé Trakany (7698), VII.95 - 1 ex. (KC).

Lokálně někdy i hojný druh lehkých až písčitých půd teplejších oblastí.

Amara nigricornis C. G. Thomson, 1857 - Boh.: Šumava - vrch Churáňov (6947), 14.V.88 - 1 ex. v nadmořské výšce 1000-1100 m, 15.V.95 - 2 ex. v nadmořské výšce 1200 m (HŮ); Šumava - vrch Ždanidla (6846), 3.VIII.94 - 15 ex. pod kameny na cca 6-7 let staré lesní pasece po polomu (RB), 18.V.96 - 4 ex. (H); Šumava - vrch Dřevěná hůl (6846), 20.V.95 - 2 ex. pod dřevy a kameny na pasekách v nadmořské výšce 1150-1180 m (P), 2 ex. (T), 1 ex. (H), 18.V.96 - 2 ex. (H), 20.V.96 - 1 ex. (H); Šumava - Hůrecký vrch (6846), 20.V.95 - 1 ex. pod kameny na bývalé lesní cestě v nadmořské výšce cca 1050 m (P), 2 ex. (H), 18.V.96 - 2 ex. (H); Šumava - vrch Špičák (6845), 21.V.95 - 1 ex. pod kameny na pasece (P), 1 ex. (T), 19.V.96 - 5 ex. (H), 1.VI.96 - 4 ex. v detritu u silnice na lesní pasece v nadmořské výšce 1100 m (VE), 1 ex. (F. Fiala, VE det.); Šumava - vrch Přilba (6947), 16.V.95 - 3 ex. v nadmořské výšce 1200 m (HŮ).

Další nálezy nedávno (Benedikt & Těťál 1989, 1991) na Šumavě zjištěného montánního druhu.

Amara nitida nitida Sturm, 1825 - Boh.: Praha - Pitkovické údolí (5953), 16.V.95 - 1 ex. a 27.VI.95 - 1 ex. na nivní louce u potoka (VE); Mor.: Mysločovice (6771), 6.V.94 - 4 ex. na louce v trávě (UT).

Zejména v podhůří rozšířený druh, vzácně i v nižších polohách v nivách vodních toků.

Amara proxima Putzeys, 1866 - Slov.: Kiarov (7882), 22.V.92 - 1 ex. (K. Orszulik, VE det.); Plášťovce (7879), 17.V.93 - 2 ex. na stepi (J. Plechač, BE et H det.), 29.V.94 - 11 ex. a 17.IV.95 - 26 ex. (RS), 12.VI.94 - 39 ex. vyhrabáno na stepi (KP, BE det.), 18.-19.VI.94 - velmi hojně na erodovaných plochách stepi, většina ex. immaturních, 11.III.95 - více ex. (VE), 19.VI.94 - více ex., často immaturních (MA).

Stepní až lesostepní druh. Na Slovensku jsou známé pouze tyto dvě recentní lokality. V Plášťovcích žije početná populace.

Amara pulpani Kult, 1949 - Boh.: Slavkovský les, Prameny - Křížky (5942), 11.V.91 - 1 ex. na hadcové skalce (R. Schles, H det.); Boučský vrch (5741), 1.V.92 - 1 ex., 8.V.92 - 1 ex., 3.IV.93 - 1 ex. v suti (H).

Lokální druh suchých lesních stanovišť, zejména suťových lesů, vřesovišť a písčin.

Amara schimperi Wencker in Wencker et Silbermann, 1866 - Mor.: Vyšní Lhoty (6376), 23.IV.94 - 4 ex. na písčitém břehu řeky Morávky (S); Slov.: Pribylina (6984), 20.VI.92 - 1 ex. na břehu řeky Belé (KO), 9.VII.92 - 4 ex. pod kameny na břehu Belé (MA), 5 ex. (LT); Tarnov (6692-93), 11.VII.92 - 1 ex. na břehu řeky Topľy (KO).

Reliktní druh štěrkopískových břehů podhorských a horských toků.

Amara brunnea (Gyllenhal, 1810) - Boh.: Běleč nad Orlicí (5861), 2.IX.91 - 1 ex. (KC); Milovice env. (5755), 20.VI.92 - 1 ex. (VO); Břehyně (5454), 19.VI.93 - více ex. (VO), 3.X.94 - 2 ex. (Z); Straškov env. (5651), 1.IX.96 - 2 ex. (MA).

Lokální druh lesních porostů s břízami, na lehkých sypkých půdách.

Amara infima (Duftschmid, 1812) - Boh.: Hrdoňovice (5457), 4.VII.93 - 1 ex. pod vřesem na okraji pískovny (S); Praha - Divoká Šárka (5852), 23.IX.93 - 7 ex., 6.X.93 - 4 ex. pod vřesem (VE).

Na vřesovištích lokálně hojný druh.

Amara praetermissa (C. R. Sahlberg, 1827) - Boh.: Boučský vrch (5741), 8.V.92 - 1 ex. v suti (H).
Velmi lokální druh, zejména lesních světlin a vřesovišť, i vysoko v horách.

Amara sabulosa (Audinet-Serville, 1821) - Boh.: Úpohlavy pr. Lovosice (5550), 5.VI.92 - velmi hojně na okraji vápencového lomu (VE observ.); Praha - Zličín (5951), 24.V.93 - hojně na mezích a ruderálech (VE observ.); České středohoří - vrch Raná (5548), 4.IX.93 - 1 ex. na okraji stepi a úhoru (H); Praha - Braník (5952), 7.IX.93 - 2 ex. na ruderálu v okolí Branické ulice (KO); Mor.: Louka (7070), 24.V.92 - hojně na okraji vinice pod kameny (L observ.); Kovalovice - Křeby (6669), 21.VI.94 - 1 ex. a 6.IX.95 - 3 ex. pod předměty na stepi (K).
V minulosti považován za vzácný druh, posledních letech nalézán často velmi početně zejména na druhotných stanovištích v teplejších oblastech.

Amara sollicita Pantel, 1888 - Slov.: Kamenica nad Hronom (8178), 11.V.92 - 22 ex. na ruderalizovaných okrajích stepi, většinou immaturní ex. (VE), 21 ex. (P), 18 ex. (B), 23.V.92 - 3 ex. vyhrabány na stepi (KP, B det.); Malá nad Hronom (8178), 13.V.92 - 2 ex. na hrázi Hronu (VE), 4 ex. (B); Plášťovce (7879), 28.V.92 - 2 ex. na okraji vinice (B); Levice env. - Horšianská dolina (7778), 18.V.92 - 2 ex. pod trávou na vyprahlé stepní stráni (S), 2 ex. (P. Boža), 2 ex. (D. Dluhoš), 4 ex. (K. Orszulik).
Velmi lokální, skrytě žijící druh. Na jižním Slovensku v oblastech s vinicemi.

Amara crenata Dejean, 1828 - Boh.: České středohoří - vrch Oblík (5548), 12.VI.92 - 5 ex. na okraji úhoru a 4.VII.92 - masový výskyt na hlinitém úhoru po silném dešti, pod přízemními listy rostlin a v ústí vyhloubených chodbiček, až kolem 20 ex. pod jednou rostlinou (VE), 12.VI.92 - 1 ex. v detritu na okraji pole (S), 2.VIII.92 - 19 ex. a 15.VIII.92 - 9 ex. (KO), 2.VIII.92 - velmi hojně na úhoru (LT), 2.VIII.92 a 30.VIII.92 - více ex. (B), 4.VIII.92 - 17 ex. (MA), 19.IX.92 - 29 ex. a 24.IX.94 - 9 ex. na pastvině pod kameny (KP, B det.), 19.IX.92 - 2 ex. na zdevastované pastvině, 7.VIII.93 - 14 ex. na okraji pole (H), 24.IV.94 - 12 ex. pod hroudami na okraji čerstvě osetého pole na JV úpatí (T); České středohoří, Černodoly pr. Louny (5648), 19.IX.92 - 1 ex. na okraji pole (LT).
Velmi lokální a většinou i vzácný druh se v příznivých podmínkách občas objeví v masovém počtu. Na vrchu Oblíku jde zřejmě o důsledek zrušení pastvy, kdy následná počáteční sukcesní stádia vegetace druhu maximálně vyhovovala. Během další sukcese vegetace početnost druhu opět klesá. Optimum tohoto druhu bylo nejspíše v dobách úhorového polního hospodaření.

Amara gebleri Dejean, 1831 - Boh.: Dušníky pr. Veltrusy (5651), 20.-22.VII.93 - 1 ex. v břehových porostech u Vltavy (VE); Mor.: Vernířovice (5968), VIII.91 - 9 ex. v podvečer při žíru na květech bodláku (KC); Vlárský průsmyk (6974), 17.V.92 - 2 ex. v kypré půdě pod starou suchou vegetací při břehu potoka (L).
Lokální druh vlhčích stanovišť, zejména v okolí toků v podhůří místy hojný.

Zabrus tenebrioides tenebrioides (Goeze, 1777) - Slov.: Vihorlat - Morské oko (7099), 13.VII.92 - 1 ex. pod kamenem na bahnitém břehu (KO); Západné Tatry - Tri kopy (6884), 31.VII.92 - 1 ex. pod kamenem v nadmořské výšce cca 2100 m (ML).
Obě pozorování svědčí o přeletech na delší vzdálenosti.

Zabrus spinipes spinipes (Fabricius, 1798) - Mor.: Pavlovské kopce (7165), 19.V.90 - 1 ex. v listí (KC); Pavlovské kopce - Turold (7165), 29.V.93 - 1 ex. na okraji pole (KO); Slov.: Kamenica nad Hronom (8178), 7.V.92 - 1 ex. pod kamenem na poli (KO), 15.IV.95 - 2 ex. (MA).
Reliktní stepní druh, nejčastěji nalézán v oblastech s vinicemi. Ověření stálého výskytu na uvedených lokalitách.

Callistus lunatus (Fabricius, 1775) - Mor.: Otrokovice (6771), 17.VI.92 - 1 ex. na stráni nad řekou Moravou (VE); Napajedla (6871), 18.VI.92 - 5 ex. ve staré cihelně (VE); Zlín - Malenovice (6771), 19.V.92 - 5 ex. v hliništi cihelny (VE); Vsetín env., Huslenky - Losový (6674), 10.IX.96 - 1 ex. pod předmětem na pastvině (S); Slov.: Zádiel (7391), 7.VII.92 - 1 ex. na kamenité pastvině (ML); Štúrovo - Hegyfárok (8177), 25.IV.93 - 1 ex. na stepi (K); Vihorlat - Remetské Hámre (7198-99), 12.VII.92 a 16.VII.92 - 6 ex. na stepní pastvině, 1.VI.93 - 10 ex. pod jediným kamenem na stepní pastvině (KO); Petrovce (7200), 14.VII.92 - 1 ex. na pastvině (KO); Vyšná Rybnica (7199), 20.VII.93 - 1 ex. na staré vinici pod kamenem (UT).
Lokální druh. Častěji na erodovaných jílovitých, sprašových a vápencových půdách, od pahorkatin do podhůří.

Chlaenius spoliatus spoliatus (Rossi, 1790) - Boh.: Praha - Kyje (5953), 1.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE); Mor.: Nový Přerov (7164), 5.V.92 - 4 ex. na břehu rybníka (KO); Hlohovec (7266), 8.VII.93 - 1 ex. pod tlející vegetací na bahně vypuštěného rybníka (ML).
V Čechách velmi vzácný hygrofilní druh, většinou nalézán při přeletech; na jižní Moravě místy hojný.

Chlaenius festivus (Panzer, 1796) - Slov.: Rad (7597), 2.XI.92 - 1 ex. pod kamenem na hrázi Latorice (S); Zatín env. (7597), 27.IV.93 - 1 ex. u mokřiny pod hrází Latorice (VE); Malá Bara (7696), 1.IV.94 - 1 ex. na břehu rybníka (KC); Tvrdošovce (7974), 6.-7.VII.96 - 1 ex. v trsu trávy u vody (KC).
Většinou jednotlivě nalézaný druh zachovalých mokřadů.

Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) - Slov.: Patince (8275), 15.VII.96 - 1 ex. na světlo (VE).
Přílet tohoto hygrofilního druhu na světlo byl pozorován dosud jen jednou (Veselý 1987).

Chlaenius tristis (Schaller, 1783) - Mor.: Nový Přerov (7164), 5.V.92 - 2 ex. na břehu rybníka (KO); Hlohovec (7266), 7.VII.93 - 4 ex. při kořenech vegetace na bahně vypuštěného rybníka (ML); Ostrava env., Děhylov - Nádražní rybník (6175), 1.VIII.96 - 1 ex. vyšlapán z vegetace (S); Slov.: Patince (8275), 15.VII.96 - 15 ex. na světlo (VE).
Druh zachovalých mokřadů, mimo jižní Moravu a Slovensko jen lokálně a vzácně se vyskytující.

Oodes gracilis A. et G. B. Villa, 1833 - Boh.: Břehyně (5454), 22.III.92 - 1 ex. pod mechem na břehu, 8.V.92 - 1 ex. v rákosí, 17.V.92 - 1 ex. v rákosí, 8.V.93 - 5 ex. ve vodě v rákosí a 14.V.94 - 12 ex. ve vodě na rákosí (KP); Mor.: Sedlec (7266), VII.91 - 1 ex. v rákosině u rybníka (KC); Lanžhot (7267), 31.V.92 - 1 ex. v lužním lese (B); Břeclav - Pohansko (7267), 2.V.93 - 3 ex. na bahně podmáčené louky (ML); Slov.: Ladmovce (7596), 25.III.92 - 1 ex. pod kamenem na stepi (LT); Kráľovský Chlmec (7597), 26.III.92 - 1 ex. (LT); Bratislava - Devín (7867-68), 4.IV.93 - 1 ex. pod kůrou Salix sp. na Veľkém ostrove (KO); Malá Bara (7696), 1.IV.94 - 1 ex. u rybníka (KC).
Druh zachovalých mokřadů a slatin, vzácně i v lužních lesích. V případě jedinců nalézaných brzy zjara na stepích jde o kusy zalétlé k přezimování.

Licinus hoffmannseggii (Panzer, 1803) - Slov.: Slanské vrchy - vrch Bogota (7295), 14.VI.92 - 2 ex. pod kameny na prameništi potoka v nadmořské výšce 600 - 700 m (KO); Silická Ladnica env. (7489), 22.V.95 - 1 ex. (MA).
Reliktní druh původních, především bukových lesů.

Licinus cassideus (Fabricius, 1792) - Boh.: České středohoří - vrch Raná (5548), 29.VIII.92 - 1 ex. (MA), 15.III.93 - 5 ex. a 19.IX.93 - 1 ex. (LT), 10.IV.93 - 2 ex. (T), 10.IV.93 - 3 ex., 4.IX.93 - 2 ex. a 3.X.93 - 4 ex. (H), 24.IV.94 - 3 ex. (T), 14.V.94 - 6 ex. (RS); České středohoří - Písečný vrch (5548), 3.VII.93 - 1 ex. na úhoru (VE); Mor.: Mikulov - Anenský vrch (7165), 26.III.93 - 1 ex., 17.IV.93 - 1 ex. a 6.VII.93 - 7 ex. (LT); Pouzdřany (7065), 25.III.95 - 1 ex. mezi hroudami

na vinici (ML); Mysločovice (6771), 12.VIII.96 - 1 ex. na stráni pod kamenem (UT); Slov.: Ladmovce (7596), 25.III.92 - 1 ex. pod kamenem na stepi (LT), 18.VII.92 - 3 ex. pod kameny na stepi v okolí lomu (KO); Trstín (7470), 16.IX.92 - 1 ex. pod kamenem ve vápencovém lomu (T); Pohranice (7675), 15.IV.95 - 1 ex. (RS), 1 ex. (MA), 28.V.95 - 1 ex. na stepi (MA); Hrhov (7390), 16.IV.94 - 1 ex. pod kamenem na stepi (K); Marcelová env. - Mašan (8275), 22.V.95 - 1 ex. pod dřevem na okraji vinice (K).
Reliktní stepní druh vápnitých a sprašových půd, v poslední době v Čechách sbírán častěji.

Licinus depressus (Paykull, 1790) - Boh.: Hradec Králové - Plachta (5861), 1.IX.91 - 3 ex. (KC); Hradec Králové (5860), IV.92 - 5 ex. na břehu Labe pod dřevem (KC); Mimoň - Hvězdov (5354), 93 - 2 ex. v zemních pastech (VO); České středohoří - vrch Raná (5548), 3.X.93 - 1 ex. na pastvině (H); Dušníky pr. Veltrusy, (56-5751), 20.-21.VII.93 - 2 ex. na bahnitém stinném břehu tůně u Vltavy, v největším vlhku (VE); Mor.: Lednice (7266), 11.VII.93 - 1 ex. v lese (LT); Sedlec (7266), 28.VIII.93 - 1 ex. v trávě na suchém slanisku (ML); Slov.: Hrhov (7390), 16.IV.94 - 1 ex. pod kamenem na stepi (K); Kováčov (8178), 14.IV.95 - 1 ex. v náplavu u Dunaje (ML); Malá Fatra - Vrátna (6780), 15.VIII.95 - 1 ex. pod kamenem (KP).
Druh široké škály stanovišť, chybí na ruderálech v primárním stádiu sukcese. Výskytuje se většinou jednotlivě, je predátorem menších druhů měkkýšů.

Badister dorsiger (Duftschmid, 1812) - Mor.: Lanžhot (7368), 4.IV.92 - 1 ex. pod kůrou vrby (D. Dluhoš, S det.); Tvrdonice (7267), 13.VI.94 - 2 ex. na mokřině v lužním lese (J. Helešic et L, L det.); Lanžhot, Soutok - Cahnov (7367), 19.IV.96 - 2 ex., 25.V.96 - 1 ex. a 7.VI.96 - 1 ex. (RS).
Druh s lokálním výskytem v zachovalých lužních porostech s přirozeným vodním režimem.

Badister peltatus (Panzer, 1797) - Boh.: Praha - Kyje (5953), 1.VII.92 - 1 ex., 6. VI.93 - 1 ex., 5.VII.94 - 1 ex., vše na světlo (VE); Slov.: Patince (8275), 10.V.96 - 5 ex. v rákosině (P).
Vzácný druh, v lužních lesích a na zachovalých mokřadech, jen ojediněle se objevuje u rybníků.

Anisodactylus poeciloides (Stephens, 1828) - Slov.: Tvrdošovce (7974), 6.V.92 - 10 ex. pod kameny a vegetací u rybníčku v obci (KO), 19.VII.92 - 3 ex. pod vyvezenými zbytky cihel (ML); Prešov - Solivar (7093), 12.VI.93 - 11 ex. (LT).
Halobiont, ověření stálého výskytu na uvedených lokalitách.

Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) - Slov.: Vihorlat - Remetské Hámre, (7198-99), 12.VII.92 - 1 ex. (KO); Zádiel - Vršok (7390), 23.VI.94 - 1 ex. pod kamenem u prameniště potoka v nadmořské výšce 850 m (MA).
Lokální druh vlhčích luk, pastvin a okolí vod, i v podhůří.

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) - Mor.: Bzenec - Přívoz (7069), 11.VI.95 - velmi hojně pod slehlou travou na vysýchajícím bahně na břehu Moravy (L observ.); Sedlec (7266), 5.VI.96 - 5 ex. v podvečer na trávě (KC); Újezdec pr. Luhačovice (6972), 7.VI.96 - desítky ex. na ruderálu po zrušeném polním hnojišti pod vegetací na vlhkých místech (L observ.); Ostrava env., Děhylov - Nádražní rybník (6175), 10.VII.96 - 1 ex. pod kůrou na bahnitém břehu (S); Slov.: Nemšová (7074), 20.VIII.95 - 1 ex. na břehu Váhu, pod kamením a štěrkem (L).
Vlhkomilný druh, často na loukách i na dalších stanovištích v dosahu větších řek, někdy v masovém množství. Příležitostně migruje i na rozmanitá stanoviště v širokém okolí.

Stenolophus discophorus Fischer von Waldheimn, 1824 - Mor.: Bzenec - Přívoz (7069), 11.VI.95 - 1 ex. na břehu Moravy, na bahně pod naplaveným dřevem (L); Hrachovec (6574), 22.VII.95 - 1 ex. na světlo v hliništi cihelny (VE).
Mimo jižní Moravu a Slovensko sporadicky nalézaný druh hlinitopísčitých a písčitých břehů vod.

Trichocellus cognatus (Gyllenhal, 1827) - Boh.: Nakléřov - Panenská (5249), 24.IX.95 - 18 ex. (RS), 14 ex. (MA).
Ověření stálého výskytu na jediné známé lokalitě v Čechách (Morozinski 1987, Benedikt & Těťal 1989).

Trichocellus placidus (Gyllenhal, 1827) - Boh.: Běleč nad Orlicí (5861), X.90 - více ex. při smyku *Carex* sp. (KC); Postřekov (6542), 22.VI.92 - 1 ex. na bahnitém břehu rybníka (T); Dnešice (6345), 26.V.96 - 6 ex. v hromadě starého rákosí na zarostlém břehu rybníka Utopený (T).
Široce rozšířený hygrofilní druh, zajímavý je nález v podzimním smyku.

Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828) - Slov.: Suchá Hora (6684), 21.VI.95 - 10 ex., hojný na rašeliništi (K).
Na Slovensku jen velmi lokální druh s vazbou na porosty vřesu.

Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) - Boh.: Běleč nad Orlicí (5861), VIII.89 - 1 ex. v lapači na kůrovce (KC); Praha - Pitkovické údolí (5953), 7.X.95 - 1 pár při kopulaci pod detritem na ruderálu (VE).
Široce rozšířený druh rozmanitých stanovišť, pro skrytý způsob života v zemi sbírán hlavně na světlo, často ve větším počtu.

Acupalpus interstitialis Reitter, 1884 - Boh.: Úpohlavy (5550), 5.VI.92 - 3 ex. pod vegetací na okraji vápencového lomu (VE); České středohoří - vrch Lovoš (5549), 4.VII.93 - 3 ex. na okraji pole (VE); Mor.: Dolní Dunajovice (7165), 1.V.92 - 1 ex. u vinice na stepním svahu (ML); Břeclav (7267), 8.VII.92 - 1 ex. (ML); Pouzdřany (7065), 27.VIII.93 - 1 ex. pod kamenem na vinici (ML); Mikulov - Růžový vrch (7165), 21.IV.94 - 1 ex. pod kameny a starou vegetací (L); Čejč (7067), 6.VII.95 - 1 ex. (RS); Břeclav - Pohansko (7267), 6.IV.96 - 1 ex. (RS); Slov.: Levice env. - Kalinčiakovo (7778), 17.V.92 - 3 ex. pod detritem na okraji vinice (S); Rad env. (7597), 27.IV.93 - 3 ex. na světlo v lužním lese (VE), 1 ex. (H).
Lokální druh. Především v oblastech s vinicemi, na nichž je často hojný.

Acupalpus brunnipes Sturm, 1825 - Boh.: Bukovina (5860), VI.90 - 1 ex. na okraji popílkoviště (KC); Hradec Králové - Plachta (5861), V.91 - 15 ex. (KC); Slov.: Cerová - Lieskové (7470), 17.IX.92 - 1 ex. na písčitojílovitém břehu vodní nádrže (T); Rohožník (7568), 27.V.93 - 2 ex. na břehu rybníčku (T).
Velmi lokální druh podmáčených, spoře porostlých písčin.

Acupalpus dubius Schilsky, 1888 - Boh.: Hradec Králové - Plachta (5861), V.91 - více ex. pod mechem (KC); Františkovy Lázně (5840), 30.IV.95 - 1 ex. (MA); Mor.: Mikulčice (7168), 11.III.95 - 1 ex. a 17.IV.96 - 1 ex. pod kůrou vrby (*Salix viminalis* L.) na břehu slepého ramene Moravy (J. Helešic, RS det.).
Velmi lokální druh mokřadů na kyselých půdách, na mechy porostlých březích. První konkrétní údaj z Moravy (cf. Mikát, Fremuth & Prouza 1997).

Acupalpus elegans (Dejean, 1829) - Mor.: Novosedly - slanisko (7164), 17.VII.93 - více ex., často immaturních (MA); Sedlec (7266), VII.94 - 1 ex. a 5.VI.96 - více ex. na slaništi (KC); Čejč (7067), 11.VII.95 - 1 ex. na světlo (RS); Břeclav - Pohansko (7267), VII.96 - 2 ex. na slané louce (KC); Slov.: Tvrdošovce (7974), 6.V.92 - více ex. mezi vegetací na březích rybníčku v obci (KO), 25.VII.92 - 61 ex. na světlo u rybníčku (VE), 6.V.93 - hojně (LT).
Halobiont, na slaniskách místy početně. V Čejči jde zřejmě o příležitostný výskyt na subhalofilní lokalitě.

Acupalpus maculatus (Schaum, 1860) - Mor.: Lednice (7266), 6.VII.93 - 2 ex. mezi rákosem na bahně tůňky (ML); Bzenec - Přívoz (7069), 5.VI.94 - 1 ex. na mokřině v pískovně (L); Sedlec

(7266), 5.VI.96 - více ex. na slaništi (KC); Slov.: Rohožník (7568), 27.V.93 - 3 ex. na bahnitém břehu rybníčku u obce (T).
Na jižní Moravě vzácněji se vyskytující druh, na Slovensku častější.

Acupalpus suturalis Dejean, 1829 - Slov.: Rad (7597), 2.XI.92 - 1 ex. v náplavu Latorice (S); Veľké Trakany (7698), 18.VII.92 - 2 ex. (KO), 8.VII.94 - 2 ex. mezi vegetací na bahně slepého ramene Tisy (ML).
Vzácný druh, ze Slovenska znám jen z několika subhalofilních lokalit v jižní a východní části území.

Anthracus longicornis (Schaum, 1857) - Mor.: Břeclav (7267), 8.VII.92 - 1 ex. ve štěrku u cesty (ML); Sedlec (7266), 5.VI.96 - 5 ex. na slaništi (KC); Slov.: Veľké Trakany (7698), 8.VII.94 - 1 ex. mezi vegetací na bahně slepého ramene Tisy (ML); Malé Trakany (7698), 9.VII.95 - 1 ex. pod vegetací v lužním lese (ML).
Lokální druh zachovalých mokřadů, slanisek a subhalofilních lokalit.

Parophonus hirsutulus (Dejean, 1829) - Slov.: Jurský Chlm (8277), 22.VI.96 - 2 ex. ve spražovém úkopu (VE, HŮ et VE det.).
Mediterránní druh, uváděný ze Španělska, Francie, Itálie a Balkánu (Turin 1981). Rovněž v poslední době zjištěn v Maďarsku (Ádám 1996). Zřejmě expanzívní druh pronikající do střední Evropy v posledních teplotně příznivých letech. Nový druh pro Slovensko.

Parophonus maculicornis (Duftschmid, 1812) - Slov.: Kamenín (8177), IV.92 - 1 ex. (KC); Veľký Lél (8273), 9.V.93 - 2 ex. v drnech na hrázi Dunaje (MA).
Lokální a vzácný druh travnatých ploch, zejména pastvin.

Parophonus mendax (Rossi, 1790) - Slov.: Boľ env. (7597), 27.IV.93 - 12 ex. na pastvině v prostoru mezi hrází a mokřinou (H); Zatín env. (7597), 27.IV.93 - 5 ex. v detritu pod keři vrb u mokřiny vně hráze Latorice (H); Rad (7597), 26.IV.93 - 2 ex. na hrázi (H).
Doplnění údajů Stanovského (1995) o výskytu na Slovensku.

Ophonus ardosiacus (Lutschnik, 1922) - Mor.: Mikulov - Růžový vrch (7165), 5.IX.92 - 72 ex. na okraji kukuřičného pole (P); Mikulov - Anenský vrch (7165), 18.IX.92 - 6 ex. pod kameny na okraji pole (T); Mikulov (7165), 6.VII.93 - 3 ex. (LT). Ve všech případech jde o tutéž lokalitu (P, T a LT, ústní sdělení).
Stálý výskyt na jedné ze tří dosud známých lokalit na jižní Moravě (cf. Veselý 1992).

Ophonus cribricollis (Dejean, 1829) - Slov.: Sírnik - vrch Avaš (7496), 24.IV.93 - 1 ex. na stepi (H); Veľký Lél (8273), 9.V.93 - 17 ex. (LT); Pohranice (7675), 28.V.95 - 1 ex. na stepi (MA).
Druh stepních oblastí jižního Slovenska a jižní Moravy, na Slovenku místy hojnější.

Ophonus diffinis (Dejean, 1829) - Boh.: České středohoří - vrch Srdov (5548), 4.VII.92 - 22 ex., část immaturních, na úhoru po dešti (VE), 19.IX.92 - 1 ex. mezi drny (KP, B det.); České středohoří - vrch Raná (5548), 18.VIII.93 - 1 ex. immaturní (MA), 19.IX.93 - 15 ex. (LT); České středohoří - sedlo mezi vrchy Srdov a Oblík (5548), 22.VIII.92 - 4 ex. a 19.IX.92 - 1 ex. (B), 19.IX.92 - 3 ex. (LT), 19.IX.92 - 4 ex. a 4.IX.93 - 16 ex. na zorané lesostepi (H); Mor.: Mikulov - Anenský vrch (7165), 18.IX.92 - 3 ex. pod kameny na okraji pole (T), 6.VII.93 - 1 ex. (LT); Sedlec (7266), 8.VII.93 - 1 ex. pod kamenem na slanisku (ML); Pouzdřanská step (7065), 27.VIII.93 - 1 ex. pod kamenem (ML); Slov.: Petrovce (7200), 14.VII.92 - 1 ex. na pastvině (KO); Remetské Hámre (7198-99), 16.VII.92 - 2 ex. na stepní pastvině (KO); Prešov - Solivar (7093), 12.VI.93 - 1 ex. (LT).
V Čechách doposud vzácně jen na několika lokalitách.

Ophonus sabulicola sabulicola (Panzer, 1796) - Boh.: České středohoří - vrch Oblík (5548), 6.VIII.92 - 7 ex. na okraji pole (LT), 14.VIII.92 - 10 ex. na okrajích polí a vinice (VE), 7.VIII.93 - 8 ex. na okraji pole (H), 28.VIII.94 - více ex. (KC); České středohoří - vrch Syslík (5549), 12.IX.92 - 1 ex. pod kamenem u pole, živící se semeny *Caucalis platycarpos* L. (VE); České středohoří - vrch Raná (5548), 4.VIII.92 - 36 ex. (MA), 6.VIII.92 - velmi hojně na okraji pole (LT), 7.VIII.93 - 30 ex. a 4.IX.93 - 1 ex. na okraji pole a stepi (H); České středohoří - Bečovský vrch (5548), 7.VIII.93 - 6 ex. na okraji pole a stepi (H), 24.IV.94 - 4 ex. pod kameny a zaschlými drny na okraji bramborového pole (T); Praha - Holyně (5952), 18.IX.93 - 6 ex. na erodovaném horním okraji bývalého vápencového lomu s porostem *Caucalis platycarpos* L. (VE); Mor.: Louka (7070), 24.V.92 - 8 ex. a 20.IX.92 - 9 ex. na suchých úhorech pod zapadlými kameny (L); Slov.: Kamenica nad Hronom. (8178), 19.VI.92 - 2 ex. pod kamenem na vyprahlém okraji pole (ML), 18.VI.95 - více ex. pod kameny na kraji pole (ML).
V letech 1992-93 zaznamenána v Českém středohoří pro tento druh typická populační exploze (cf. Havelka 1975), daná zřejmě příhodnými klimatickými podmínkami.

Ophonus stictus Stephens, 1828 - Boh.: Milovice (5755), 9.IV.94 - 1 ex. a 4.V.96 - 3 ex. při náspu střelnice v bývalém vojenském prostoru Mladá (VE), 3 ex. (F. Fiala, VE det.); Milovice (5755), 8.VIII.95 - 2 ex. pod plastovými pláty na okraji divoké skládky v bývalém vojenském prostoru Mladá (ML); Mor.: Lipov (7070), 26.V.93 - 11 ex. na stepi (KO); Mikulov (7165), 29.V.93 - 1 ex. na stepi (KO); Brod nad Dyjí (7165), 8.VII.93 - 7 ex. (LT); Uherčice (7065), 10.VIII.93 - 4 ex. na stepi (KO); Pouzdřany (7065), 27.VIII.93 - 1 ex. pod kamenem na stepní louce u lesa (ML), 26.III.94 - 1 ex. pod balvanem (ML), 13.IX.95 - 2 ex. (KC); Koválovice - Křéby (6669), 17.IX.95 - 1 ex. v zemní pasti (K); Slov.: Zádiel (7390), 28.VII.93 - 1 ex. pod kamenem na stepi (K); Patince (8275), 15.VII.96 - 1 ex. na světlo (VE); Komárno (8274), 18.VII.96 - 1 ex. na okraji pole v porostu *Daucus carota* L. (VE).
Lokální druh různých otevřených stanovišť, v poslední době nalézán opět častěji, zřejmě v důsledku omezení chemizace v zemědělství.

Ophonus cordatus (Duftschmid, 1812) - Boh.: Praha - Radotínské údolí, Cikánka (6051), 24.VI.93 - 4 ex. na okraji vápencového lomu, z toho 1 ex. immaturní (VE); Plzeň - Hradiště (6246), 28.VII.93 - 1 ex. na spilitové stráni pod kamenem (T); Lysá nad Labem (5755), 5.V.96 - 1 ex. ve starém opukovém lomu (VE); Mor.: Klentnice (7165), 11.VI.94 - 2 ex. (RS); Slov.: Zádiel (7391), 15.VII.92 - 2 ex. na kamenité pastvině (ML); Ladmovce (7596), 18.VII.92 - 8 ex. pod kameny na stepi v okolí lomu (KO); Veľký Kamenec - vrch Tarbucka (7696), 9.VII.94 - 2 ex. (Z); Hrhov (7390), 11.VII.94 - 4 ex. (Z).
Lokální druh vápnitých xerotermních lokalit, typický pro lomy a xerotermní pastviny.

Ophonus gammeli (Schauberger, 1932) - Mor.: Uherčice (7065), 14.IV.92 - 1 ex. v trávě (S), 8.V.92 - 4 ex. na okraji pole (LT).
Velice lokální a většinou i vzácný druh hájů jižní Moravy a Slovenska, především na vápencových půdách a spraších.

Ophonus parallelus (Dejean, 1829) - Slov.: Kamenica nad Hronom (8178), 11.V.92 - 1 ex. na okraji pole (VE), 2 ex. pod keři na jižní stráni (P); Ipeľské Predmostie (7979), 24.V.92 - 1 ex. na břehu Ipľu (KP, VE det.); Šahy - Tešmák (7979), 24.V.92 - 3 ex. na vápnité stepi (KP, VE det.), 22.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE), 15.VI.94 - 4 ex. na vápnité stepi (KP, VE det.); Hokovce (7879), 19.-20.VI.94 - 1 ex. na vinici (MA); Malá nad Hronom (8178), 23.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE).
Vzácný druh stepí jižního Slovenska. Na nejteplejších místech, na vápnitých půdách.

Ophonus subsinuatus Rey, 1886 - Mor.: Dolní Bečva (6575), 27.VII.94 - 1 ex. na světlo ve 22.15 hod. (S); Ždánice (6968), 4.VII.96 - 2 ex. v zahradě pod plevelem (O. Luža et L, L det.); Slov.: Studienka (7468), 9.VII.94 - 1 ex. na světlo, 9.VIII.94 - 1 ex. na světlo (RS).
Málo známý druh, v posledních letech nalézán jen zřídka, většinou na světlo.

Cryptophonus melancholicus (Dejean, 1829) - Mor.: Bzenec - Přívoz (7069), 12.VII.93 - 5 ex. (LT), 10.VIII.93 - 12 ex. pod kusy dřeva na písku (KO); Slov.: Šaštín - Stráže (7368), 15.-16.V.92 a 22.-23.V.92 - více ex. (B), 23.V.92 - 18 ex. v pískovně pod dřevem (KP), 18.VIII.96 - 6 ex. na světlo v pískovně (VE); Závod env. (7467), 28.V.93 - 1 ex. pod vegetací a spadaným listím na písčitém okraji lesa (T).
Psamobiont, vázaný na volné váté písky.

Cryptophonus tenebrosus centralis (Schauberger, 1929) - Boh.: České středohoří - vrch Oblík (5548), 14.VIII.92 - 1 ex. na okraji pole (VE); Malé Žernoseky (5450), 18.VIII.92 - 1 ex. na zahrádce (B); České středohoří - vrch Lovoš (5549), 9.IX.92 - 6 ex. a 13.IX.92 - 10 ex. při cestě v sadu pod rostlinami *Daucus carota* L. (VE) ; České středohoří - Písečný vrch (5548), 11.IX.93 - 3 ex. na úhoru (VE), 31.VIII.96 - 1 ex. (MA); Mor.: Mikulov - Anenský vrch (7165), 18.IX.92 - 1 ex. pod kamenem na okraji pole (T); Uherčice (7065), 25.V.93 a 10.VIII.93 - hojně na stepi (KO), 15.VII.93 - 27 ex. (LT), 6.VI.94 - více ex. (T); Pouzdřanská step (7065), 27.VIII.93 - 7 ex. pod kameny na strništi (ML); Slov.: Plášťovce (7879), 19.VIII.94 - 1 ex. pod kamenem u cesty (K); Senec - Martinský les (7770), 21.V.95 - 1 ex. na okraji pole (K).
Zejména v Čechách vzácnější druh xerotermních lokalit.

Pseudophonus calceatus (Duftschmid, 1812) - Mor.: Beskydy, Dolní Bečva - Dolní Rozpité (6575), 14.VIII.93 - 1 ex. po dešti na ostružiníku (K).
Polní druh, častěji na písčitých půdách. Pravděpodobně náhodně zalétlý kus.

Harpalus hospes hospes Sturm, 1818 - Slov.: Hronský Beňadik (7677), 16.V.92 - 2 ex. pod hroudami na vinici (S); Šahy - Tešmák (7979), 15.VI.94 - 1 ex. v drnech na stepi (KP).
Lokální druh. Především na jižním Slovensku v oblastech s vinicemi.

Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) - Boh.: České středohoří - vrch Raná (5548), 18.IV.92 - 3 ex. pod kameny na rozhraní pole a stepi (KO); Plzeň - vrch Mikulka (6246), 7.V.93 - 9 ex. (pozorováno několik desítek ex.) pod kameny a vegetací na ladem ležící ploše nad staveništěm fakultní nemocnice (T); Praha - Zličín (5951), 24.V.93 - 1 ex. na opukové mezi (VE); Mladá Boleslav env., lom u Chrástu (5555), 19.V.96 - 1 ex. (VO); Mor.: Pouzdřany (7065), 16.IV.94 - 4 ex. pod kameny (ML); Slov.: Sírnik - vrch Avaš (7696), 24.IV.93 - 1 ex. na okraji pole (VE).
V poslední době opět častěji se objevující druh přechodných stanovišť a úhorů.

Harpalus albanicus Reitter, 1900 - Mor.: Mikulov - Růžový vrch (7165), 5.V.92 - 1 ex. (L); Pouzdřany (7065), 27.VIII.93 - více ex. pod kameny na strništi (ML); Slov.: Iža - Bokroš (8275), 22.V.95 - 1 ex. na slanisku (K).
Druh oblastí vinic na jižním Slovensku a jižní Moravě.

Harpalus atratus Latreille, 1804 - Boh.: Praha - Kyje (5953), 7.-8.VI.96 - 1 ex. na světlo (VE).
Po dlouhé době potvrzení jediného literárního údaje o letu (Roubal 1930). Během 14 let odchytu na světlo v Praze - Kyjích přílet zaznamenán jen v tomto jediném případě, ačkoliv je zde druh velmi hojný.

Harpalus cisteloides hurkai Divoký, Pulpán et Rébl, 1989 - Boh.: České středohoří - Raná (5548), 22.VIII.92 - 1 ex. na okraji pole (B), 10.IV.93 - 1 ex. mezi listím pod keřem hlohu na okraji zanedbaného pole (T); České středohoří - Písečný vrch (5548), 30.VIII.92 - 18 ex. (KO),

12.IX.92 - 13 ex. pod travou a mechem (některé ex. immaturní) (MA), 14 ex. (LT), 19.IX.92 - 4 ex. a 20.IX.92 - 4 ex. na vrcholu (B), 20.IX.92 - 3 ex. a 24.IX.94 - 12 ex. v drnech (KP, B det.), 26.IX.92 - 7 ex. a 10.IV.93 - 2 ex. na stepi (H), 4 ex. (LT), 3.VII.93 - 12 ex. na úhoru, 3.VII.93 - 2 ex. na světlo a 11.IX.93 - 15 ex. na úhoru (VE), 3.VII.93 - 7 ex. (L), 24.IV.94 - 3 ex. pod vegetací na spoře porostlých místech vrcholové plošiny (T); České středohoří - Bečovský vrch (5548), 30.VIII.92 - 1 ex. na okraji pole (B), 7.VIII.93 - 1 ex. na rozhraní pole a stepi (H), 24.IV.94 - 1 ex. pod kameny a zaschlými drny na okraji pole (T).
Početné nálezy stepního druhu zjištěného zatím jen v této části Lounského středohohoří jsou pravděpodobně důsledkem vzrůstu početnosti populací během posledních teplotně příznivých let.

Harpalus cupreus fastuosus Faldermann, 1835 - Mor.: Břeclav - Pohansko (7267), 16.IV.95 - 1 ex. v náplavu Dyje (J. Helešic, L det.); Lanžhot, Soutok - Cahnov (7267), 8.V.96 - 1 ex. pod vegetací na louce (RS); Břeclav - Boří les (7266), 22.VI.95 - 1 ex. na mokřadu na písčinách pod vegetací (L, D. Wrase det.); Slov.: Boľ - Latorica (7597), 27.III.92 - 3 ex. pod kameny na hrázi řeky Latorice (LT); Boľ (7597), 4.IV.92 - 1 ex. v náplavu Latorice (KO), 31.X.-2.XI.92 - více ex. v náplavu Latorice (S); Rad (7597), 31.X.-2.XI.92 - více ex. v náplavu Latorice (S); Zatín (7597), 31.X.-2.XI.92 - více ex. v náplavu Latorice (S); Boťany (7598), 29.IV.93 - 2 ex. na louce (H); Vyšná Pokoradz (7586), 24.V.93 - 1 ex. pod vegetací na dně vyschlého a zarůstajícího rybníčku na pastvině (T); Plášťovce (7879), 18.VI.94 - 1 ex. u vody v prohlubních lesní cesty (VE), 19.VI.94 - 1 ex. pod listím na lesní cestě (MA); Šahy - Tešmák (7979), 16.IV.95 - 1 ex. (MA).
Především na zaplavovaných loukách a pastvinách. Nálezy na Moravě potvrzují starší nepublikovaný údaj: Břeclav, V.56 - 1 ex. (V. Vosyka, J. Pulpán det.). Nový druh pro Moravu a Českou republiku.

Harpalus flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783) - Boh.: Běleč nad Orlicí (5861), VI.89 - 1 ex. a VII.91 - 7 ex. (KC); Hradčanské rybníky, Držník (5354), 21.VII.93 - 1 ex. a 93 - 2 ex. v zemní pasti (VO); Slov.: Šaštín - Stráže (7368), 15.V.92 - více ex. pozorováno v noci ve vyjetých prohlubních v písku, brouci se živili zbytky navátého hmyzu (VE observ.).
Psamobiont vázaný na volné váté písky.

Harpalus flavicornis flavicornis Dejean, 1829 - Mor.: Podyjí - Popice (7162), 12.V.91 - 1 ex. (KC).
Na Moravě vzácný stepní druh.

Harpalus fuscipalpis Sturm, 1818 - Slov.: Kamenica nad Hronom (8178), 11.V.92 - 1 ex. na okraji stepi (VE); Jurský Chlm (8277), 15.VI.95 - 1 ex. v pískovně (KP, BE det.), 22.VI.96 - 3 ex., 15.VII.96 - 10 ex. a 16.VIII.96 - 1 immaturní ex. v pískovně na hlinitopísčitém, spoře porostlém svahu (VE), 22.VI.96 - 3 ex. a 14.IX.96 - 1 ex. (S).
Velmi lokální a většinou i vzácný druh otevřených spražových a písčitých lokalit jižního a jihovýchodního Slovenska.

Harpalus hirtipes (Panzer, 1797) - Slov.: Šaštín - Stráže (7368), 15.V.92 - více ex. pozorováno v noci ve vyjetých prohlubních v písku, brouci se živili zbytky navátého hmyzu (VE observ.), 15.-16.V.92 a 22.-23.V.92 - více ex. (B); Mikulášov (7468), 15.VII.94 - 1 ex. na světlo a 9.VIII.94 - 1 ex. na světlo (RS); Imeľ - Nesvady (8074), 24.-25.V.95 - 2 ex. pod předměty na písku (K).
Psamobiont vázaný na volné váté písky.

Harpalus marginellus Dejean, 1829 - Mor.: Bílé Karpaty - Strání (7072), 17.VI.94 - 11 ex. na pasekách pod dřevem (KP).
Druh podhorských lesních světlin jižních oblastí Moravy a Slovenska.

Harpalus neglectus Audinet-Serville, 1821 - Boh.: Písty (5856), 25.IV.93 - 18 ex. (LT).
Psamobiont vázaný na volné váté písky. Ověření stálého výskytu na jedné z mála recentních lokalit.

Harpalus politus Dejean, 1829 - Boh.: České středohoří - Písečný vrch (5548), 30.VIII.92 - 4 ex. (KO), 12.IX.92 - 1 ex. (MA), 4 ex. (LT), 20.IX.92 - 2 ex. v drnech (KP, B det.); České středohoří - vrch Oblík (5548), 15.VI.92 - 2 ex. pod kameny na pastvině (S); Praha - Zlíchov, Dívčí hrady (5952), 25.V.94 - 15 ex. a 15.IX.94 - 2 immaturní ex. na vápencové skalní stepi (VE); Praha - Prokopské údolí (5952), 31.V.94 - 1 mrtvý ex. na cestě na stepní stráni (VE); Praha - Podolí, Kavčí hory (5952), 3.V.95 - 2 ex. na vápencové stepi (J. Strejček, VE det.).
Druh xerotermních oblastí Českého krasu a Českého středohoří, především na vápnitých půdách.

Harpalus progrediens Schauberger, 1922 - Boh.: Dušníky pr. Veltrusy (5651), 21.VII.93 - 1 ex., 17.-18.V.94 - 5 ex. na louce u Vltavy, 1 ex. v letu za slunečného dopoledne po dešti a 18.V.-25.VII.94 - 3 ex. v zemní pasti (VE); Mor.: Lanžhot env. (7367), 6.XI.92 - 1 immaturní ex. na louce u Dyje (VE); Bzenec - Přívoz (7069), 5.VI.93 - 6 ex. a 20.VI.93 - 2 ex. v lužním lese kolem řeky Moravy (L), 10.VIII.93 - 1 ex. a 23.V.94 - 42 ex. (RS), 30.I.94 - 1 ex. pod mechem v lese (MA); Vyšní Lhoty (6376), 23.IV.94 - 3 ex. na břehu řeky Morávky (S); Slov.: Bratislava - Devín (7868), 21.III.92 - 10 ex. pod kůrou vrby (*Salix* sp.) (LT); Uličˇ (7000), 18.VI.92 - 1 ex. na břehu řeky Uličky (KO).
Lokální druh nenarušených zaplavovaných luk a okolí vodních toků.

Harpalus pygmaeus Dejean, 1829 - Slov.: Malý Horeš env. (7597), 5.IV.92 - 8 ex. na stepní pastvině (KO); Prešov - Solivar (7093), 12.VI.93 - 1 ex. (MA); Palárikovo (7974), 25.V.95 - 1 ex. na břehu slané jámy u nádraží (K); Tvrdošovce (7974), 10.VI.95 - 4 ex. na slané stepi (KP).
Nehojný halofilní stepní druh.

Harpalus saxicola Dejean, 1829 - Slov.: Sírnik - vrch Avaš (7696), 25.-27.III.92 - 28 ex. (MA), 27.III.92 - 21 ex. (LT), 24.-25.IV.93 - hojně, pozorována denní aktivita včetně kopulace dvou párů (VE observ.), 24.IV.93 - 8 ex., 25.IV.93 - 7 ex. (H), 9.VII.94 - 2 ex. (Z); Šahy - Tešmák (7979), 20.VI.94 - 1 ex. pod kamenem na cestě, 16.IV.95 - 1 ex. (MA), 2 ex. (RS).
Stepní druh vázaný na sprašové či písčité xerotermní pastviny. Uvedené údaje pocházejí z jediných v současnosti známých lokalit.

Harpalus solitaris Dejean, 1829 - Boh.: Běleč nad Orlicí (5761), VII.89 - 1 ex. na břehu řeky Orlice (KC); Milovice env. (5755), 20.VI.92 - 1 ex. (VO); Slavkovský les - Krásno (5842), 8.V.93 - 5 ex. pod vřesem na rašeliništi (KO); Šumava - vrch Smrčina (7149), 9.VI.94 - 10 ex. v detritu na lesní pasece v nadmořské výšce 900-1000 m (VE); Modrava (6946-47), 10.VIII.94 - 4 ex. a 5.-12.VIII.95 - 3 ex. pod kameny na pasece (KP); Mor.: Bílé Karpaty - Malý Lopeník (7072), 22.VIII.92 - 43 ex. pod suchou trávou na lesní pasece v nadmořské výšce cca 800 m, z toho více ex. immaturních (L), 30.VIII.92 - 11 ex. (RS); Slov.: Suchá Hora (6684), 21.VI.95 - 2 ex. na rašeliništi (K).
V nižších polohách vzácný a lokální, v horách místy nevzácný druh lesních světlin.

Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923 - Mor.: Moravský Písek (7169), 6.VIII.92 - 2 ex. pod mechem (K); Slov.: Plešany env. (7597), 22.IV.95 - 1 ex. (K, VE det.).
Velmi lokální druh, častěji na vátých píscích, místy i ve světlých suťových lesích.

Harpalus zabroides Dejean, 1829 - Boh.: Velké Žernoseky - vrch Strážiště (5450), 26.IV.92 - 3 ex. (LT); Mor.: Bořetice (7067), 11.V.94 - 5 ex. na okraji vinice pod hroudami a plevelem (L); Čejč (7067), 11.VII.95 - 1 ex. na světlo (RS); Uherčice (7065), 11.VIII.96 - 1 ex. (MA); Slov.: Malá nad Hronom (8178), 23.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE).

Lokální, skrytě v zemi žijící druh, zejména na sprašových půdách nejteplejších oblastí.

Pangus scaritides (Sturm, 1818) - Slov.: Medveďov (81-8271), 23.V.92 - 5 ex. na hrázi Dunaje (KP), 4 ex. (B), 9.V.93 - 5 ex. (MA), 3 ex. (LT); Veľký Lél (8273), 9.V.93 - více ex. (LT); Štúrovo (8178), 30.V.94 - 5 ex. na hrázi Hronu a 2 ex. na hrázi Dunaje (RS), 7.V.95 - 1 ex. sesmýkán na hrázi u Dunaje (ML); Komárno (8274), 18.VIII.96 - 2 ex. na hrázi Dunaje, výskyt na známé lokalitě velmi ojedinělý (VE).

Další pozorování tohoto, teprve od roku 1991 početněji sbíraného druhu. Všechny dosud známé nálezy jsou z dunajských hrází nebo z jejich těsné blízkosti (cf. Benedikt & Veselý 1994).

Gynandromorphus etruscus (Quensel, 1806) - Boh.: Hodkovice nad Mohelkou env. (5356), V.94 - 1 samice v zemní pasti v olšině u potoka (VO, MO det.).

Druh s výskytem v jižní Evropě, na Krymu, na Kavkaze a v Přední Asii, nejblíže v Panonské nížině. Stálý výskyt je vyloučen, jde o zavlečený exemplář. Lokalita se nachází mezi hlavní silnicí Praha - Liberec a železniční tratí Turnov - Liberec.

Amblystomus niger Heer, 1838 - Mor.: Lanžhot, Soutok - Cahnov (7367), 30.III.96 - 3 ex. (RS); Slov.: Vihorlat - Remetské Hámre (7198-99), 12.VII.92 - 1 ex. (KO); Tvrdošovce (7974), 28.V.94 - 3 ex. (RS).

Druh rozmanitých stanovišť, od stepí a slanisek po teplejší listnaté lesy. Dosud poslední známý nález z Moravy uvádí Krejcárek (1951). Potvrzení recentního výskytu na Moravě.

Polistichus connexus Fourcroy, 1785 - Boh.: České středohoří - vrch Raná (5548), 15.III.93 - 8 ex. a 10.IV.93 - 2 ex. (LT), 10.IV.93 - 1 ex. v suti a 17.IV.94 - 2 ex. pod kamenem na okraji stepi (MA), 10.IV.93 - 5 ex. na okraji stepi a úhoru (H), 14.V.94 - 1 ex. (RS), 20.VI.93 - 1 ex. pod betonovou dlaždicí na okraji stepi (KO); České středohoří - vrch Oblík (5548), 29.VIII.93 - 1 ex. pod kamenem na okraji stepi a pole (KO); Mor.: Čejč (7067), VIII.89 - 1 ex. na světlo (P. Číla, J. Pulpán det.); Lanžhot, Soutok - Cahnov (7367), 30.III.96 - 1 ex. (RS) ; Slov.: Oborín - Latorica (7597), 22.III.92 - 3 ex. na pastvině pod kameny (LT); Boľ - Latorica (7597), 23.III.92 - 11 ex. a 27.III.92 - 5 ex. na pastvině pod kameny (LT); Rad - Latorica (7597), 24.III.92 - 1 ex. na hrázi (LT); Plášťovce (7879), 21.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE); Boľ (7597), 31.X.-2.XI.92 - více ex. v náplavu a pod betonovými dlaždicemi na pastvině (S, K. Orszulik), 29.IV.93 - 2 ex. na vlhké pastvině (H); Rad (7597), 31.X.-2.XI.92 - více ex. v náplavu (S, K. Orszulik); Zatín (7597), 31.X.-2.XI.92 - více ex. v náplavu (S, K. Orszulik); Somotor env. (7697), 26.IV.93 - 1 ex. pod balvanem u mokřiny v písečných dunách (VE); Zatín env. (7597), 27.IV.93 - 1 ex. u tůně pod hrází (H); Jurský Chlm (8277), 16.VIII.96 - 1 ex. na světlo (VE); Šaštín - Stráže (7368), 18.VIII.96 - 2 ex. na světlo v pískovně (VE).

Druh vázaný především na vysýchavé jílovité půdy, v jejichž puklinách žije. Lokálně na stepích, početněji na loukách a pastvinách v okolí řek s přirozeným vodním režimem.

Perigona nigriceps (Dejean, 1831) - Boh.: Praha - Kyje (5953), 3.VIII.92 - 12 ex. na světlo (VE); Slov.: Čenkov (8277), 24.VII.92 - 1 ex. pod kůrou suchého ořešáku (*Juglans* sp.) (VE).

Skrytě žijící druh vázaný na tlející rostlinný materiál.

Masoreus wetterhalli (Gyllenhal, 1813) - Boh.: České středohoří - vrch Raná (5548), 6.VIII.92 - 2 ex. pod kameny na stepi (LT); České středohoří - Písečný vrch (5548), 12.IX.92 - 1 ex. (MA); Lány (5949), 18.VII.93 - 2 ex. na výslunné stráni pod předměty (RB); Praha - Řeporyje (5952), 25.VIII.93 - 2 ex. na diabasové stepní stráni (VE); Praha - Troja (5852), 7.VIII.93 - 1 ex. na hrázi Vltavy (J. Strejček, VE det.); Praha - Podbabské skály (5852), 22.IV.94 - 1 ex. na skalní stepi (VE); Praha - Prokopské údolí (5952), 18.VIII.94 - 1 ex. na diabasové skalní stepi (VE);

Praha - Pitkovické údolí (5953), 5.IV.95 - 2 ex. a 19.VI.95 - 1 immaturní ex. na stepi (J. Strejček, VE det.), 12.V.95 - 2 ex. a 3.VI.95 - 2 ex. (VE); Mor.: Znojmo - Kraví hora (7162), 14.VII.95 - 1 immaturní ex. na vřesovišti (VE); Bzenec - Přívoz (7070), 5.VII.92 - 2 ex. na lesní pasece pod kusy dřeva v písku (L), 18.VI.94 - 1 ex. pod kusy dřev v pískovně (KP), X.96 - 5 ex. na okraji lesa pod mechem (KC).
Reliktní xerofilní druh, žijící zejména na skalních stepích a písčinách.

Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758) - Boh.: České středohoří - vrch Raná (5548), 3.X.93 - 1 ex. na pastvině (H), 8.X.93 - 1 ex. na stepi (KO); České středohoří - Písečný vrch (5548), 24.IX.94 - 1 ex. pod kamenem na louce (KP); Libochovany (5450), 23.III.96 - 4 ex. a 7.IV.96 - 15 ex. (MA); Slov.: Ladmovce (7596), 25.III.92 - 1 ex. pod kamenem na stepi (LT); Plášťovce (7879), 10.III.95 - 3 ex. pod kameny na stepi (P).
V současnosti velmi lokální druh kamenitých stepí a pastvin.

Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) - Boh.: Čelákovice (5854), 10.IV.93 - 1 ex. pod spadaným dubovým listím na rozhraní pole a písečného přesypu (KO); České středohoří - vrch Raná (5548), 14.V.94 - 1 ex. pod kamenem na stepi (MA); Dušníky pr. Veltrusy (5651), 28.V.94 - 1 ex. smykem břehových porostů u Vltavy (J. Strejček, VE det.); Hradec Králové - Plachta (5861), III.95 - 1 ex. v trsu trávy (KC); Praha - Pitkovické údolí (5953), 19.VI.95 - 1 ex. na stepní stráni (VE); Choťovice (5858), IV.96 - 1 ex. pod dřevem na stepi (KC); Mor.: Lednice (7266), 7.VII.93 - 3 ex. smykem křovin poblíž řeky Dyje (ML); Čejč (7067), 27.IV.96 - 1 ex. (MA), 1 ex. (RS); Slov.: Boľ env. (7597), 21.XI.92 - 4 ex. v náplavu Latorice (K); Plášťovce (7879), 19.VI.94 - 1 ex. a 17.IV.95 - 2 ex. (MA), 17.IV.95 - 5 ex. (RS); Kamenica nad Hronom (8178), 15.IV.95 - 3 ex. (MA).
Druh rozmanitých, většinou však přírodně zachovalých stanovišť. V současné době se objevuje i v místech, kde nebyl po dlouhou dobu pozorován.

Lebia humeralis Dejean, 1825 - Slov.: Plášťovce (7879), 21.VII.92 - 1 ex. na světlo (VE); Malá Bara (7696), 1.IV.94 - 1 ex. v prosevu (KC); Hokovce (7879), 19.-20.VI.94 - 9 ex. na vinici a v kukuřičném poli (MA).
Vzácný xerofilní druh jižních oblastí Slovenska, kde žije zejména na vinicích.

Lebia marginata (Fourcroy, 1785) - Mor.: Znojmo - Kraví hora (7162), 3.V.94 - více ex. (Z. Kraus), 6.VI.96 - 1 ex. sesmýkán a 26.X.96 - 128 ex. v prosevu (RS), 9.VI.96 - 2 ex. v prosevu detritu pod vřesem (S); Slov.: Uličˇ (7000), 15.VI.93 - 1 ex. na břehu řeky Uličky (MA), 1 ex. (LT).
Velmi lokální druh, na Moravě potvrzen recentní výskyt.

Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758) - Boh.: Břehyně (5454), 6.V.92 - 1 ex. vyšlapán z rákosí společně s *D. imperialis* (Germar, 1824) a *D. monostigma* Samouelle, 1819 (KP, BE revid.); Bělá env. (pr. Luže) (6161), 4.X.95 - 2 ex., chráněné území Stráně nad Bělou, prosev na lesostepi a v lese (J. Strejček, VE det.); Voletice pr. Vysoké Mýto (6062), 5.X.95 - 1 ex. na xerotermní stráni (J. Strejček, VE det.); Mor.: Podyjí - Popice (7162), 9.-12.V.91 - 3 ex. pod trávou (KC).
Expanzívní druh, na Moravě a na Slovensku často na druhotných stanovištích typu mezí a úhorů. V Čechách velmi vzácně, uvedenými údaji je potvrzen recentní výskyt.

Demetrias monostigma Samouelle, 1819 - Boh.: Ruda (5849), 14.IX.93 - 9 ex. a 16.V.94 - 2 ex. v melioračních rýhách v porostu sítiny a ve smyku na lesní meliorované pasece s 5-ti letou smrkovou monokulturou (RB); Dnešice (6345), 26.V.96 - 1 ex. mezi vegetací na zarostlém břehu rybníka Utopený (T); Slov.: Bodrog (7597), 28.II.92 - 1 ex. pod kůrou kmene u Latorice (VE).
Lokální druh, častější na kyselých půdách.

Paradromius longiceps (Dejean, 1826) - Boh.: Krňovice (5861), IV.91 - více ex. pod kůrou vrb (*Salix* sp.) u řeky Orlice (KC); Břehyně (5454), 6.V.92 - 1 ex. v rákosí (KP); Mor.: Lanžhot, Soutok - Cahnov (7367), 30.III.96 - 1 ex. (RS); Slov.: Bodrog env. (7597), 29.II.92 - 1 ex. pod kůrou vrby (*Salix* sp.) (VE).
Skrytě žijící druh rozsáhlejších rákosin.

Paradromius strigiceps (Reitter, 1905) - Slov.: Nízké Tatry - Kráľova hoľa (7187), 19.VII.95 - 1 ex. v prosevu vegetace u potoka Hnilce v nadmořské výšce 1 650 m (VE), 1 ex. (P); Vernár (7187), 25.VI.94 - 5 ex. v trsech trávy, 19.VI.96 - 15 ex. (MA), 24.IV.96 - 1 ex. (RS).
Velmi lokální montánní druh.

Dromius kuntzei Polentz, 1939 - Mor.: Ostrava - Plesná (6175), 25.I.92 - 1 ex. pod kůrou *Picea* sp. (LT, B revid.); Drslavice (6971), 29.I.94 - 1 ex. pod kůrou jírovce (*Aesculus* sp.) (MA), 19.II.95 - 1 ex. pod kůrou starého platanu (*Platanus* sp.) (L), 1.XII.95 - 1 ex. (RS).
Vzácný a lokální druh.

Dromius laeviceps Motschulsky, 1850 - Mor.: Ostrava - Antošovice (6175), 25.I.92 - 3 ex. pod kůrou topolu (S); Polanka nad Odrou (6275), 29.II.92 - 4 ex. pod kůrou *Populus* sp. a *Fraxinus* sp. (KO); Louky nad Olší (6177), 24.I.93 - 27 ex. (LT).
Vzácný druh rozšířený pouze ve Slezsku.

Dromius meridionalis Dejean, (1825) - Slov.: Plášťovce (7879), 19.VI.94 - 1 ex. na světlo na lesostepní stráni (VE).
Upřesnění údaje citovaného Hůrkou (1996).

Dromius quadraticollis A. Morawitz, 1862 - Mor.: Štramberk (6474), 28.XI.92 - 1 ex. pod kůrou *Acer pseudoplatanus* L. (S); Mošnov env. (6374), 1.XII.92 - 8 ex. pod kůrou *Acer pseudoplatanus* L. u lesního potůčku (S); Bernartice nad Odrou (6373), 3.XII.92 - 3 ex. pod kůrou *Picea* sp. (S); Ostrava - Plesná (6175), 25.I.92 - 1 ex. a 29.II.92 - 2 ex. pod kůrou *Picea abies* (L.) (KO), 24.I.93 - 4 ex. (LT).
Lokální a vzácný druh, ve Slezsku poměrně rozšířený.

Philorhizus crucifer crucifer (Lucas, 1846) - Boh.: České středohoří - Písečný vrch (5548), 26.IX.92 - 1 ex. na stepi (H); Vepřek pr. Nová Ves (5651), 20.VII.93 - 1 ex. na travnaté stráni (VE); Blažim pr. Konstantinovy Lázně (6044), 6.V.95 - 2 ex. mezi vegetací na okraji březového lesíka (T); Mor.: Třebíč (6761), 11.IV.93 - 1 pár při kopulaci na mezi u pole (MN, MO det.); Břeclav - Boří les (7266-67), 22.VI.95 - 3 ex. na písčinách pod plevelem (L).
Xerofilní druh s dosud nepříliš známým rozšířením, dříve zaměňován za *P. notatus* (Stephens, 1828) (Wrase 1992).

Philorhizus quadrisignatus (Dejean, 1825) - Boh.: Hradec Králové (5860), XII.91 - 5 ex. pod kůrou *Acer* sp. (KC); Slov.: Somotor (7697), 28.II.92 - 1 ex. pod kůrou solitérního topolu (*Populus* sp.) na pastvině (VE); Zatínské močiare (7597), 6.XI.93 - 1 ex. pod šupinou kůry staré vrby (*Salix* sp.) (K).
Lokální a vzácný druh, z Potiské nížiny dosud neuváděn.

Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) - Mor.: Uherský Brod (6971), 4.VI.95 - 1 ex. na okraji pole, pod plevelem a kamínky (L); Slov.: Vyšná Pokoradz (7586), 25.V.93 - 1 ex. pod vegetací na dně vyschlého a zarůstajícího rybníčku na pastvině (T); Malý Horeš (7697), 10.VII.95 - 1 ex. mezi stepní vegetací (ML).
Lokálně hojný druh v teplejších oblastech Slovenska, na jižní Moravě vzácněji.

Syntomus pallipes Dejean, 1825 - Boh.: Valy pr. Přelouč (5959), 15.V.92 - 1 ex. v okolí zatopené pískovny (LT); Velké Žernoseky (5450), 21.III.93 - 5 ex. (LT); Dušníky pr. Veltrusy

(5651), 8.VII.93 - 3 ex. v prosevu na hrázi Vltavy (J. Strejček, VE det.); Mor.: Pouzdřany (7065), 26.III.94 - 5 ex. (Z); Slov.: Jurský Chlm (8177), 15.VI.95 - 11 ex. v pískovně (KP).
V Čechách lokální a vzácný xerofilní druh, nejčastěji poblíž řek Labe a Vltavy.

Microlestes corticalis escorialensis C. Brisout de Barneville, 1885 - Slov.: Iža - Bokroš (8275), 8.V.93 - 1 ex. (MA).
Lokální a vzácný xerofilní druh, většinou na slanějších půdách.

Microlestes fissuralis Reitter, 1901 - Boh.: České středohoří - Dlouhý vrch (5548), 11.VI.92 - 1 ex. na stepi (VE); Praha - Jinonice (5952), 10.X.94 - 2 ex. v prosevu detritu na náspu silnice (VE); Mor.: Pavlovské kopce (7165), IX.91 - 1 ex. (KC); Čejč (7067), 6.VII.95 - 1 ex. (RS); Slov.: Štúrovo - Hegyfarok (8278), IV.92 - 1 ex. na mezi (KC); Plášťovce (7879), 13.-14.VI.94 - 2 ex. na stepi v drnech a zemině (KP).
V Čechách lokální xerofilní druh, v posledních letech se objevuje početněji i na druhotných stanovištích (rumiště, náspy) v blízkosti přírodně zachovalých lokalit.

Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 - Boh.: Běleč nad Orlicí (5861), VII.91 - 10 ex. v pískovně (KC); České středohoří - Písečný vrch (5548), 20.V.92 - 2 ex. pod kameny v lomu a 24.IX.94 - 8 ex. při kořínících trav a pod kameny (KP), 10.X.92 - 3 ex. na stepi (KO); Hradec Králové - Plachta (5861), VI.92 - 3 ex. (KC); Lomnice pr. Sokolov (5741), 3.IV.93 - 1 ex. v kopečcích hlíny na téměř holé jílovité ploše (H); Mor.: Pouzdřany (7065), 26.III.94 - 1 ex. (Z); Bzenec - Přívoz (7069), 17.IV.93 - 13 ex. pod hlouběji zapadlým dřevem ve svahu zarostlého lomu (K), 18.VI.94 - 1 ex. pod kusy dřev v pískovně (KP); Pavlovské vrchy - Liščí kopec (7165), 15.IV.95 - 1 ex. pod kamenem (ML).
Xerofilní druh přírodně zachovalých lokalit, případně jejich nejbližšího okolí.

Cymindis axillaris (Fabricius, 1794) - Boh.: České středohoří - Písečný vrch (5548), 12.IX.92 - 1 ex. na stepi (MA), 2 ex. (LT), 19.IX.93 - 1 ex. (LT); Praha - Podbabské skály (5952), 22.IV.94 - 9 ex. a 9.V.94 - 1 ex. při drnech na skalní stepi (VE); Praha - Sedlecké skály (5852), 22.IV.94 - 1 ex., 9.V.94 - 4 ex. a 24.VIII.94 - 2 ex. na skalní stepi (VE).
Xerofilní druh přírodně zachovalých lokalit, výhradně na stepích a xerotermních pastvinách.

Cymindis cingulata Dejean, 1825 - Mor.: Beskydy, Dolní Bečva - Dolní Rozpité (6575), 1.-2.VIII.92 - 2 ex. pod kameny v trávě na lesní cestě a 22.VIII.93 - 1 ex. pod kamenem na nezastíněné lesní cestě (K); Bílé Karpaty - Malý Lopeník (7072), 22.VIII.92 - 1 ex. pod zapadlým kamenem na okraji lesní paseky v nadmořské výšce cca 800 m (L); Beskydy - Pustevny (6575), 20.VII.95 - 1 ex. pod travou na holině (S); Rožnov pod Radhoštěm (6574), 2.X.95 - 1 ex. pod kamenem v lomu (UT); Slov.: Popričný - Petrovce (7299), 29.V.91 - 1 ex. (T. Sitek, S det.); Popričný (7200), 12.VII.92 - 2 ex. (KP); Veľká Fatra - vrch Zvolen (7181), 4.VII.92 - 1 ex. a 18.VIII.93 - 2 ex. pod kameny na pastvině (KO); Klenovský Vepor (7384), 21.VI.94 - 1 ex. pod kusem kůry na cestě (MA); Jedľové Kostoľany, (7576-77), 15.VII.95 - 1 ex. na okraji paseky v bukovém lese (VE); Donovaly - vrch Zvolen (7181), 5.VIII.96 - 1 ex. pod kamenem na pastvině (T).
Velmi lokální a jednotlivě nalézaný druh. Převážně v horských a podhorských oblastech.

Cymindis scapularis Schaum, 1857 - Slov.: Sírnik - vrch Avaš (7696), 27.III.92 - 2 ex. pod kameny na stepi (MA), 1 ex. (LT); Kuchyňa (7568), 10.V.92 - 1 ex. na okraji borového lesa (ML); Hrhov (7390), 28.VII.93 - 2 ex. pod kamenem na stepi (K); Mikulášov (7468), 9.VII.94 - 4 ex. (RS); Veľký Kamenec (7696), 9.VII.94 - více ex. pod kameny na stepi (ML, Z); Plavecký Mikuláš, vojenský prostor Reznisko (7469), 20.V.95 - 1 ex. pod dřevem na písku (K).
Xerofilní druh přírodně zachovalých lokalit, výhradně na stepích a xerotermních pastvinách.

Cymindis macularis Mannerheim in Fischer von Waldheim, 1824 - Mor.: Moravský Písek (7169), 6.VIII.92 - 1 ex. pod předmětem (K); Bzenec - Přívoz (7069), 18.VI.94 - 1 ex. v pískovně pod dřevem (KP).
Psamobiont vázaný na volné váté písky.

Cymindis vaporariorum (Linnaeus, 1758) - Boh.: Krušné hory - Přebuz (5641), 26.IX.92 - 14 ex. pod vřesem na rašelině (MA), 7 ex. (LT); Doksy (5454), 15.III.95 - 14 ex. a 15.X.95 - 22 ex. pod dřevem a ve vřesu (KP); Staré Splavy (5454), 28.IX.95 - 1 ex. (MA).
Reliktní a velmi lokální druh zachovalých lokalit, v chladnějších polohách na kyselých půdách.

Cymindis variolosa (Fabricius, 1794) - Slov.: Malacky (7568), 31.V.92 - 1 ex. na vátých píscích (B); Zádiel (7391), 15.VII.92 - 7 ex. na vápencové pastvině (ML); Hrhov (7390), 28.VII.93 - 1 ex. a 16.IV.94 - 1 ex. pod kameny na stepi (K); Veľký Kamenec (7696), 9.VII.94 - 5 ex. pod kameny na stepi, většinou ve společnosti *Cymindis scapularis* Schaum, 1857 (ML), 6 ex. (Z); Mikulášov (7468), 9.VII.94 - 2 ex. a 13.VII.95 - 1 ex. (RS); Pohranice (7675), 15.IV.95 - 1 ex. na stepi (MA).
Xerofilní druh přírodně zachovalých lokalit, výhradně na stepích a xerotermních pastvinách.

LITERATURA

ÁDÁM L. 1996: A check-list of the Hungarian caraboid beetles (Coleoptera). *Fol. Entomol. Hung.,* 57: 5-64.

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1988). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni,* 6-7: 13-31 (in Czech, German title).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk za rok 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1989 und der Nachtrag zu den Funden im Jahre 1988). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni,* 8: 19-40 (in Czech, German summary).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1990 and supplement of prior period collections). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni, Series Carabidologica,* 1: 9-40 (in Czech, English summary).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1991 and supplementary data of prior period collections). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni, Series Carabidologica,* 2: 15-30 (in Czech, English summary).

BENEDIKT S. & VESELÝ P. 1994: K bionomii, morfologii a rozšíření Pangus scaritides v Československu. (About bionomy, morphology and spreading of Pangus scaritides in Czechoslovakia). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni, Series Carabidologica,* 2: 3-5 (in Czech, English summary).

BULIRSCH P. 1995: Dyschirius benedikti sp. n., new species of tribe Clivinini from Southern Slovakia (Coleoptera: Carabidae: Clivinini). *Fol. Heyrovskyana,* 3: 74-77.

DIVOKÝ V. 1989: Miscodera arctica (Paykull, 1798) - new species for Czechoslovakia (Coleoptera, Carabidae). *Acta Entomol. Bohemoslov.,* 86: 306-307.

FASSATI M. 1947: Nové nebo zajímavé nálezy Carabidů na území Čech a Slezska. *Čas. Čs. Společ. Entomol.,* 44: 121-122 (in Czech).

FASSATI M. 1957: Faunistické, biologické a systematické poznámky o broucích čeledi Carabidae z Československa. *Čas. Čs. Společ. Entomol.,* 54: 239-245 (in Czech).

HAVELKA J. 1975: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) buližníkového skalního suku ve středních Čechách. *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 11: 47-54 (in Czech).

HŮRKA K. 1996: *Carabidae of the Czech and Slovak Republics. (Carabidae České a Slovenské republiky).* Kabourek, Zlín, 565 pp. (in English and Czech).

JAGEMANN E. 1945: Cicindelinae Československa, klíč a popisy všech našich druhů. *Fol. Entomol.,* 9: 19-32 (in Czech).

KREJČÁREK L. 1951: Průzkum zvířeny Gottwaldovského kraje (I.). *Čas. Čs. Společ. Entomol.,* 48: 53-59 (in Czech).

KULT K. 1948: Amara meschniggi, n. sp. a další poznámky o Carabidech ČSR. (Amara meschniggi, n. sp. and some notes on Czechoslovak Carabidae. (Col.)). *Čas. Čs. Společ. Entomol.,* 45: 22-34 (in Czech, English summary).

MIKÁT M., FREMUTH J. & PROUZA J. 1997: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) navrhovaného chráněného území „Na Plachtě" v Hradci Králové. (Contribution to the knowledge of fauna of beetles (Coleoptera) of protected area Na Plachtě (Eastern Bohemia, Czech Republic)). *Acta Mus. Reginaehradecensis, Ser. A.,* 25: 93-154 (in Czech, English abstr.).

MOROZINSKI J. 1987: *Střevlíkovití (Coleoptera - Carabidae) pomezí Krušných hor a Labských pískovců.* Unpubl. msc. Dep. in Czech Agricultural University, Praha, 24 pp. (in Czech).

PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana,* 32 (Suppl.): 1-115 (in Czech, English abstr.).

PULPÁN J. : *Prodromus střevlíkovitých brouků Československa. (Prodromus of the ground-beetles of Czechoslovakia).* Unpubl. msc., dep. in coll. P. Veselý, Praha.

RESL K. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera, Carabidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.,* 89: 387-391.

ROUBAL J. 1930: *Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska I.* Učená společ. Šafaříkova v Bratislavě, Praha, 527 pp. (in Czech).

SCHMIDT J. 1994: Revision der mit Agonum (s. str.) viduum (Panzer, 1797) verwandten Arten (Coleoptera, Carabidae). *Beitr. Entomol.,* 44: 3-51.

SCHMIDT J. 1995: Zur Synonymie und Verbreitung einiger paläarktischer Arten des Tribus Platynini (Insecta: Coleoptera: Carabidae). *Entomol. Abh. Mus. Tierkd. Dresden,* 56: 161-170.

SOUSTRUŽNÍK J. 1984: Příspěvek k poznání střevlíkovitých brouků Trojské kotliny (Coleoptera, Carabidae). (Carabids of the Troja basin (Coleoptera, Carabidae)). *Gazella* (Praha), 3 (3): 97-106 (in Czech, English summary).

STANOVSKÝ J. 1995: Hromadný výskyt střevlíka Parophonus mendax (Coleoptera: Carabidae) na východním Slovensku a další poznámky k jeho rozšíření na Slovensku. (Common occurrence of ground-beetle Parophonus mendax (Coleoptera: Carabidae) in eastern Slovakia and notes on its distribution in Slovakia). *Klapalekiana,* 31: 55-58 (in Czech, English abstr.).

TURIN H. 1981: *Provisional check-list of the European ground-beetles (Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae).* Nederland. Entomol. Soc., Amsterdam, 253 pp.

VESELÝ P. 1987: Odchyt střevlíkovitých na světelný zdroj (Coleoptera, Carabidae). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 23: 65-79 (in Czech).

VESELÝ P. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera, Carabidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.,* 89: 387-391.

WRASE D. W. 1992: Taxonomische und faunistische bemerkungen über einige Carabiden-Arten (Col., Carabidae). *Linzer Biol. Beitr.,* 24: 123-138.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. (Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für faunistischen Forschung). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV,* 8: 3-16 (in Czech, German abstr.).

SUMMARY

Remarkable records and records of rare or little known carabid beetles from Bohemia, Moravia and Slovakia are given. Notes on biology and distribution of some species are presented.

The number in round brackets after the locality name represents the grid mapping square code used for faunistic research in the Czech and Slovak Republics (Zelený 1972, Pruner & Míka 1996). Abbreviations of the private collections and determinators are listed in "Zkratky jmen majitelů sbírek a determinátorů".