Published December 31, 1998

Klapalekiana, **34**: 195-201, 1998
ISSN 1210-6100

Beitrag zur Kenntnis Corticariiden*) (Coleoptera) aus der Türkei

Příspěvek k poznání čeledi Corticariidae (Coleoptera) z Turecka

Pavel MÍKA[1)] & Wolfgang H. RÜCKER[2)]

[1)]Fr. Křížka 38, CZ-170 00 Praha 7, Tschechische Republik
[2)]Von Ebner-Eschenbach Strasse 12, D-56567 Neuwied, Deutschland

Faunistics, Coleoptera, Corticariidae, Turkey, Iraq, Slovakia, Bulgaria, Ukraine

Abstract. Data on 22 species of Corticariidae are presented from Turkey, of which 15 are recorded from this territory for the first time: *Latridius brevicollis* (Thomson, 1868), *L. latissimus* Rücker, 1986, *Enicmus rugosus* (Herbst, 1793), *E. histrio* Joy et Tomlin, 1910, *E. brevicornis* (Mannerheim, 1844), *E. amici* Lohse, 1981, *Stephostethus angusticollis* (Gyllenhal, 1827), *S. sinuatocollis* (Faldermann, 1837), *Corticaria crenulata* (Gyllenhal, 1827), *C. elongata* (Gyllenhal, 1827), *Coricarina similata* (Gyllenhal, 1827), *Melanophthalma suturalis* (Mannerheim, 1844), *M. sericea* (Mannerheim, 1844), *M. distinguenda* (Comolli, 1837) and *M. fuscipennis* Mannerheim, 1844. First records of *Latridius latissimus* from Iraq, and of *Enicmus amici* from Slovakia, Bulgaria, and Ukraine, are included.

EINLEITUNG

In dieser Arbeit sind die Funde der tschechischen und deutschen Entomologen aus den Aufsammlungen in der Türkei aus den Jahren 1963 bis 1997 und weitere Funde der Expedition des National Museum in Prag im Jahr 1947 aufgeführt. Es sind hier die Angaben über 22 Arten der Familie Corticariidae, bei einzelnen Arten auch die bekannten literarischen Angaben aus der Türkei aufgeführt, bzw. die häufigste bisherige Verbreitung. Die Autoren haben 247 Exemplare dieser Familie determiniert (M. det., R. det.). Wenn nicht anders angegeben, sind die Tiere in den Sammlungen P. Míka, W. H. Rücker oder in der Sammlung des National Museums Prag (coll. NMP) deponiert.

Einzelne Angaben über die Käfer dieser Familie aus der Türkei finden wir in den Arbeiten von Mannerheim (1844), Motschulsky (1866), Reitter (1875, 1894, 1903), Brisout de Barneville (1881), Gozis (1881), Belon (1897), Hetschko (1926), Horion (1961), Johnson (1977, 1980, 1986, 1989), Otto (1978), Rücker (1983), Burakowski, Mroczkowski & Stefańska (1986) und Saluk (1992). Die Grundangaben über die Verbreitung einzelner Arten haben wir aus den Arbeiten von Mannerheim (1844), Brisout de Barneville (1881), Hetschko (1926), Horion (1961), Dajoz (1970), Johnson (1986), Burakowski, Mroczkowski & Stefańska (1986), Koch (1989), Rücker (1992) und Míka (1996) gewonnen.

Diese Übersicht soll nur ein Beitrag zur Faunistik der Türkei darstellen und erhebt nicht den Anspruch einer kompletten Studie, schon deshalb, da die zu erwartende Anzahl der Arten der Familie Corticariidae, vom Balkan, aus dem Mittelmeergebiet, Kaukasus und weiteren Gebieten sehr viel mehr Arten beinhaltet, als hier erwähnt sind.

---

*) Nach Pakaluk, Ślipiński & Lawrence (1994) haben die Corticariidae Curtis, 1829 vor Latridiidae Erichson, 1842 die Priorität.

DIE ÜBERSICHT DER ARTEN

Inklusive dieser Arbeit stellen wir also aus der Türkei also 33 Arten der Familie Corticariidae fest.

Das untersuchte Material

Latridius minutus (Linnaeus, 1767)
Turcia centr., Anatolia, Hasanoglan, 13.VII.1947, 2♂♂, 3♀♀, R. et M. det., coll. NMP; Turcia occ., Edirne, 28.IV.1991, 1 ♂, T. Růžička leg. et coll., M. det.
Kosmopolit, eine im ganzen Mittelmeergebiet verbreitete Art.

Latridius brevicollis (Thomson, 1868)
Turcia mer., Cilicia, Bürücek, 5.VII.1983, 1 Ex., J. Jelínek leg., M. det., coll. NMP.
In Südeuropa aus den Pyrenäen, Kroatien, Bosnien und Krim bekannt. Neu für die Türkei.

Latridius latissimus Rücker, 1986
Turcia mer., Prov. Mersin, Camliyayla, 1000-1200 m, 8.-9.VI.1996, 1♂, P. Zahradník leg., M. det. et coll.
Diese Art wurde inzwischen aus Frankreich beschrieben, und auch in Iraq (Bagdad [= Baghdad], 2♂♂, 1♀, Kálalová leg., R. et M. det., coll. NMP) gefunden. Neu für die Türkei.

Enicmus rugosus (Herbst, 1793)
Turcia occ., Edirne, 16.V.1993, 1♂, P. Průdek leg., M. det. et coll.
Europa, Kaukasus, Sibirien, Nordafrika. In Südeuropa allgemein verbreitet, Balkan bis Griechenland, Kreta. Neu für die Türkei.

Enicmus histrio Joy et Tomlin, 1910
Turcia centr., Cogun, 23.VI.1993, 1♀, T. Růžička leg. et coll., M. det.
Europa, in Südeuropa vom Balkan, Bosnien, Dalmatien bekannt. Neu für die Türkei.

Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844)
Turcia, "Asia Minor", Goek-Dagh, 1 Ex., v. Bodemeyer leg., M. det., coll. NMP.
Europa, Nordafrika, in Südeuropa in Spanien, Italien, Dalmatien, Bosnien, Griechenland, Südrussland bis Kaukasus. Neu für Türkei.

Enicmus amici Lohse, 1981
Turcia centr., Nevsehir env., Göreme, 38°39'N, 34°56'O, 26.-28.VIII.1988, 1♂, J. Růžička & A. Hlasová leg., M. det. et coll.; Turcia occ., Edirne, 28.IV.1991, 1♂, T. Růžička leg., M. et R. det., coll. M.; Turcia occ., Edirne, 16.V.1993, 1 Ex., P. Průdek leg. et coll., M. det.; Turcia mer., Prov. Adana, Pozanti, 900 m, 6.-9.VI.1996, 1 ♀, P. Zahradník leg. et coll., M. det.; Turcia mer., Prov. Antalya, Avlanbell env., Elmali, 800-1600 m, 14.-17.VI.1996, 1♂, 1♀, P. Zahradník leg., M. det. et coll.
Diese Art wurde vom Neusiedlersee beschrieben, auch in Deutschland, Slowakei (Komárno, III.1937, 1♂, A. Pfeffer leg., M. det. et coll.), Bulgarien (Nesembre [= Nesebar], VI.1984, 1 ♂, A. Pfeffer leg., M. det. et coll.) und Ukraine (Odessa, 4.VI.1988, 1♂, T. Růžička leg., M. det. et coll.) gefunden. Neu für die Türkei.

Stephostethus angusticollis (Gyllenhal, 1827)
Turcia bor., Prov. Zonguldak, Karabük, 20 km O, 22.-23.VI.1996, 2 Exx., P. Zahradník leg. et coll., M. det.
Allgemein verbreitet in Europa und Sibirien, auch in Südeuropa. Neu für die Türkei.

Stephostethus sinuatocollis (Faldermann, 1837)
Turcia bor., Prov. Zonguldak, Karabük, 20 km O, 22.-23.VI.1996, 6 Exx., P. Zahradník leg. et coll., M. det.
Aus Schlesien beschrieben als *S. campicola* Gerhard, 1911, auch in Deutschland, Böhmen, Mähren, Daghestan und Kaukasus. Neu für die Türkei.

Corticaria crenulata (Gyllenhal, 1827)
Turcia mer., Adana, 1.-3.VIII.1947, 1♀, R. det., coll. NMP; Turcia mer., Karatas, 2.-5.VIII.1947, 1♀, R. det., coll. NMP.
In ganz Europa, Sibirien, Kaukasus, Nordafrika, in Südeuropa aus Spanien, Italien, Dalmatien bekannt. Neu für die Türkei.

Corticaria illaesa Mannerheim, 1844
Turcia centr., Nevsehir env., Göreme, 38°39'N, 34°56'O, 26.-28.VIII.1988, 1♂, J. Růžička & A. Hlasová leg., M. det. et coll.; Turcia centr., Sultandagi, 18.V.1997, 1 Ex., in verblühten Köpfen von *Acroptilon repens*, U. Schaffner leg., R. det. et coll.
Südeuropa, Mittelmeergebiet, Tauria, Kaukasus, Griechenland, aus „Anatolien, Tokat" gibt Belon (1897) an, aus Kleinasien gibt Brisout de Barneville (1881), Rücker (1983) und aus östlichen Mettelmeergebiet gibt Hetschko (1926) an.

Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827)
Turcia, Anatolia, Hasanoglan, 13.VII.1947, 15 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia. mer., Toros, Bürücek, 29.-31.VII.1947, 1 Ex., R. det., coll. NMP; Turcia mer., Toros, Kazan, 8.-9.VIII.1947, 6 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia. mer., Adana, 1.-3.VIII.1947, 15 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia mer., Karatas, 2.-5.VIII.1947, 13 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia mer., Cakit env., Abacilar, 7.VIII.1947, 8 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia, Anatolia, Misis, 22.VIII.1947, 2 Exx., R. det., coll. NMP.
Kosmopolit, über die gesamte Paläarktis verbreitet, auch Afrika, Nordamerika, Südamerika, Australien und Neu Seeland. Neu für die Türkei.

Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793)
Turcia occ., Prov. Istanbul, Durusu env., 2.VI.1996, 1 Ex., P. Zahradník leg. et coll., M. det.; Turcia bor., Prov. Bolu, Albant Gölü, 1200 m, 4.VI.1996, 1 Ex., P. Zahradník leg. et coll., M. det.; Turcia bor., Prov. Zonguldak, Karabük, 20 km O, 22.-23.VI.1996, 5 Exx., P. Zahradník leg. et coll., M. det.
Kosmopolit, weltweite Verbreitung und überall sehr häufig bis gemein.

Corticarina similata (Gyllenhal, 1827)
Turcia bor., Prov. Bolu, Abant Gölü, 1200 m, 4.VI.1996, 1♂, 1♀, P. Zahradník leg. et coll., 1♀, V. Švihla leg., M. det., coll. NMP; Turcia bor., Prov. Kastamonu, Agli, 56 km NNW Kastamonu, 22.VI.1996, 1♀, V. Švihla leg., M. det. et coll.

Holarktische Region - Europa, Sibirien, Nordafrika, Nordamerika. In Südeuropa in Spanien, Italien, dem Balkan, Griechenland und Korfu. Neu für die Türkei.

Corticarina fulvipes (Comolli, 1837)
Turcia centr., Ankara env., Mogan gölü, 9.VII.1947, 1 Ex., R. det.; coll. NMP.
Südeuropa, Nordafrika, Kanaren, Azoren, Kaukasus, im ganzen Mediterrangebiet von Spanien bis Griechenland, auch aus Kleinasien (Horion 1961; Burakowski, Mroczkowski & Stefańska 1986).

Melanophthalma curticollis (Mannerheim, 1844)
Turcia, „Asia Minor", Izmir, Gümüldür, V.1963, 1♀, A. Pfeffer leg. et coll., M. det.; Turcia mer., Toros, Bürücek, 29.-31.VII.1947, 1♀, M. det., coll. NMP.
Aus Armenien und Tauria beschriebene Art, aus Kleinasien führt Johnson (1986) und Saluk (1992) an.

Melanophthalma suturalis (Mannerheim, 1844)
Turcia mer., Prov. Antakya, Tell Acana, 14.V.1995, 1♀, T. Kopecký leg., M. det. et coll.; Turcia bor., Prov. Bolu, Abant Gölü, 1200 m, 4.VI.1996, 1♀, J. Vávra leg., 23.-24.VI.1996, 1♂, 2♀♀, V. Švihla leg., det. et coll. M.
Mitteleuropa, Südeuropa, Russland, Kirgisien. Neu für die Türkei.

Melanophthalma maura Motschulsky, 1866
Turcia bor., Prov. Kastamonu, Agli, 56 km NNW Kastamonu, 22.VI.1996, 1♂, P. Zahradník leg., M. det. et coll.; Turcia bor., Prov. Zonguldak, Karabük, 20 km O, 22.-23.VI.1996, 1 Ex., P. Zahradník leg. et coll., M. det.
In Mittel- und Südeuropa allgemein verbreitet, aus Türkei führt Johnson (1986) und Saluk (1992) an.

Melanophthalma sericea (Mannerheim, 1844)
Turcia occ., Edirne, 8.-13.VI.1947, 1 Ex., R. det, coll. NMP; Turcia mer., Adana, 1.-3.VIII.1947, 3 Ex., R. det., coll. NMP; Turcia mer., Karatas, 2.-5.VIII.1947, 26 Exx., R. det, 2 Exx., M. det., coll. NMP; Turcia mer., Cakit env., Abacilar, 7.VIII.1947, 6 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia mer., Toros, Kazan, 8.-9.VIII.1947, 14 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia mer., Prov. Antakya, Tell Acana, 14.V.1995, 2♀♀, T. Kopecký leg., M. det. et coll.; Turcia bor., Prov. Bolu, Abant Gölü, 1200 m, 4.VI.1996, 1♀, V. Švihla leg., M. det. et coll.; Turcia bor., Prov. Zonguldak, Safranbolu, 1000 m, 4.-5.VI.1996, 1♂, P. Zahradník leg., 1♂, J. Vávra leg., M. det. et coll.
Daghestan, Mittelmeergebiet, in Südeuropa allgemein verbreitet, neu für die Türkei.

Melanophthalma taurica (Mannerheim, 1844)
Turcia, Anatolia, Hasanoglan, 13.VI.1947, 3 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia centr., Ankara env., Mogan gölü, 9.VII.1947, 2 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia mer., Adana, 1.-3.VIII.1947, 7 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia mer., Karatas, 2.-5.VIII.1947, 25 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia mer., Toros, Kazan, 8.-9.VIII.1947, 2 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia, Anatolia, Misis, 22.VIII.1947, 1♂, R. det., coll. NMP; Turcia, Anatolia, Alata, 26.VIII.1947, 3 Exx., R. det., coll. NMP; Turcia mer., Mersin 15 km W, 1.-5.VII.1992, 3♀♀, D. Hauck leg., M. det., coll. P. Průdek; Turcia mer., Namrun, 7.-13.VII.1992, 1♀, D. Hauck leg., M. det., coll. P. Průdek; Turcia mer., Silifke env., Kurtulus, 16.-19.V.1994, 1♀, P. Průdek leg. et coll., M. det.; Turcia mer., Prov. Antakya, Tell

Acana, 14.V.1995, 9 ♂♂, 6 ♀♀, T. Kopecký leg., M. det. et coll.; Turcia occ., Prov. Istanbul, Durusu, 1♂, 2.VI.1996, P. Zahradník leg. et coll., M. det.; Tur. mer., Prov. Mersin, Güzeloluk, 1200-1400 m, 11.-12.VI.1996, 1♂, P. Zahradník leg. et coll., M. det.; Turcia. bor., Prov. Zonguldak, Karabük 20 km O, 22.-23.VI.1996, 1♂, 1♀, P. Zahradník leg., M. det. et coll.
Paläarktische region, in Mitteleuropa und hauptsächlich in Südeuropa sehr häufige bis gemeine Art.

Melanophthalma distinguenda (Comolli, 1837)
Turcia, Anat., Gyaur Dag or., 17.VIII.1947, 1♀, M. det, coll. NMP; Turcia bor., Prov. Zonguldak, Safranbolu, 1000 m, 4.-5.VI.1996, 1♂, 1♀, J. Vávra leg, M. det. et coll.; Turcia bor., Prov. Zonguldak, Karabük, 22.VI.1996, 1♀, J. Vávra leg., M. det. et coll.; Turcia bor., Prov. Zonguldak, Karabük 20 km O, 22.-23.VI.1996, 1♀, V. Švihla leg., M. det. et coll.
Paläarktische Region. In Südeuropa und dem Mittelmeergebiet allgemein verbreitet, meist sehr häufig, aber nach Norden seltener. Neu für die Türkei.

Melanophthalma fuscipennis Mannerheim, 1844
Turcia mer., Karatas, 2.-5.VIII.1947, 5 Exx., M. det., coll. NMP; Turcia occ., Edirne, 16.V.1993, 1♀, P. Průdek leg. et coll., M. det.; Turcia bor., prov Zonguldak, Karabük, 300 m, 22.VI.1996, 3 Exx., J. Vávra leg., M. det. et coll.; Turcia bor., Prov. Zonguldak, Karabük 20 km O, 22.-23.VI.1996, 1♀, P. Zahradník leg. et coll., M. det.
Mediterrangebiet in Nordafrika, Kaukasus; Südafrika. In ganz Südeuropa von der Iberischen bis zur Balkanhalbinsel weit verbreitet. Neu für die Türkei.

Weitere Arten, aus der Türkei beschrieben oder bekannt, aber in userer Übersicht der gefundenen Arten nicht enthalten

Enicmus anatolicus Reitter, 1903. Aus Kleinasien gibt Reitter (1903) und Hetschko (1926) an.
Cartodere apfelbecki (Reitter, 1901). Aus der Türkei gibt Reitter (1911) und Hetschko (1926), aus Kleinasien Rücker (1983) an.
Dienerella anatolica Mannerheim, 1844. Aus Anatolien beschriebene Art, auch aus Anatolien und Kleinasien gibt Motschulsky (1866), Gozis (1881), Belon (1897) und Hetschko (1926), Rücker (1983) an.
Dienerella filiformis (Gyllenhal, 1827). Aus der Türkei, Konstantinopel (Istanbul) gibt Belon (1897) an.
Corticaria thea Reitter, 1894. Aus der Nord-Türkei, Trapezunt (Trabzon) beschriebene (Reitter 1894) Art.
Corticaria pubescens (Gyllenhal, 1827). Aus Kleinasien gibt Belon (1897) an.
Corticaria fulva (Comolli, 1837). Aus „Asia Minor" gibt Reitter (1875) und Gozis (1881), aus Anatolien, Smyrna (Izmir) gibt Belon (1897) an.
Corticaria anatolica Johnson, 1989. Aus der Türkei beschriebene (Johnson 1989) Art.
Corticarina fulvipes oblongipennis Johnson, 1981. Paratypus aus der Türkei, Antakya (Johnson 1981).
Melanophthalma wittmeri Otto, 1978. Holotypus aus der Türkei, Aydin (Otto 1978).
Migneauxia crassiuscula (Aubé, 1850). Aus „Asia Minor" gibt Johnson (1977) und aus der Türkei gibt Rücker (1983) an.

LITERATUR

BRISOUT de BARNEVILLE H. 1881: Essai Monographique des Espèces d'Europe et des confins de la Méditerranée du Genre Corticaria. *Ann. Soc. Entomol. Fr., 6. Sér.*, 1: 375-422.

BELON M. J. 1897: Essai de classification générale des Lathridiidae, avec le catalogue systematique et alphabetique de toutes les espèces due Globe. *Rev. Entomol.*, 16: 105-221.

BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŃSKA J. 1986: *Chraszcze - Coleoptera: Cucujoidea, 2. Katalog Fauny Polski. Cz. 23, T. 13.* PWN, Warszawa, 278 pp (in Polish).

DAJOZ R. 1970: Contribution a l'étude des Coléoptères Lathridiidae de la Péninsule Ibérique et du Maroc. *Rev. Écol. Biol. Sol.*, 7: 255-275.

GOZIS M. 1881: Révision des Latridiidae d'Europe. *L'Abeille Journ. Entomol.*, 18: 1-178.

HETSCHKO A. 1926: Lathridiidae. In: JUNK W. (ed.): *Coleopterorum Catalogus, Pars 85.* Junk & Schenkling, Berlin, 86 pp.

HORION A. 1961: *Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer, Band 8, Teil 2.* Genehmigter Nachdruk 1992. Antiquariat Goecke & Evers, Krefeld, xvi+375 pp.

JOHNSON C. 1977: Beiträge zur Kenntnis der Fauna Afghanistans, Merophysidae und Lathridiidae (Coleoptera). *Acta Musei Moraviae, Sci. Natur.*, 62: 123-132.

JOHNSON C. 1981: New species of Corticarina Reitter (Col., Lathridiidae). *Entomologist's Month. Mag.*, 117: 117-123.

JOHNSON C. 1986: Notes on some Palearctic Melanophthalma Motschulsky (Coleoptera: Latridiidae), with special reference to transversalis auctt. *Entomol. Gazette*, 37: 117-125.

JOHNSON C. 1989: Studies on the Genus Corticaria Marsham (Col., Latridiidae), part 3. *Entomol. Gazette*, 40: 79-80.

KOCH K. 1989: *Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Band 2.* Goecke & Evers, Krefeld, 382 pp.

MANNERHEIM C. G. 1844: Versuch einer monographischen Darstellung der Käfergattungen Corticaria und Lathridius. *Zeitschr. Entomol.*, 5: 1-112.

MÍKA P. 1996: Faunistic records from the Czech Republic - 55. *Klapalekiana*, 32: 275-277.

MOTSCHULSKY V. 1866: Enumération des Espèces de Coléoptères rapportés de seys Voyages, 5éme article, Lathridiens. *Bull. Soc. Imper. Natur. Mosc.*, 39: 225-290.

OTTO J. 1978: Neue Lathridiidae aus dem Naturhistorischen Museum Basel (Col.). *Entomol. Basiliensia*, 3: 287-290.

PAKALUK J., ŚLIPIŃSKI S. A. & LAWRENCE J. F. 1994: Current classification and family-group names in Cucujoidea (Coleoptera). *Genus*, 5: 223-268.

REITTER E. 1875: Revision der europäischer Latridiidae. *Stett. Entomol. Zeitung*, 36: 297-340, 410-445.

REITTER E. 1894: Vierter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. *Wien. Entomol. Zeitung*, 13: 101-102.

REITTER E. 1903: Uebersicht der Coleopteren-Arten aus der nächsten verwandtschaft des Enicmus Mannerheimi Kolen. *Wien. Entomol. Zeitung*, 22: 234.

REITTER E. 1911: *Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. Band III.* K. G. Lutz Verlag, Stuttgart, 128 pp.

RÜCKER W. H. 1983: *Bunkóscsápú bogarak - Clavicornia 7., Fauna Hung. 158, Coleoptera 3.* Akadémiai Kiadó, Budapest, 68 pp (in Hungarian).

RÜCKER W. H. 1992: Latridiidae, pp. 139-160. In: LOHSE G. A. & LUCHT W. H. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 13. 2. Supplementband.* Goecke & Evers, Krefeld, 375 pp.

SALUK S. V. 1992: Lathridiidae, pp. 379-392. In: LER P. A. (ed.): *Key to the identification of the insects of the Far East of the USSR, Vol. 3, Coleoptera, Part 2.* Nauka, St. Peterburg, 704 pp.

SOUHRN

V práci jsou uvedeny nálezy brouků čeledi Coricariidae, sbírané českými a německými entomology na území Turecka v letech 1963 až 1997 a údaje ze sběrů expedice Národního muzea v Praze v roce 1947. Autoři determinovali 247 exemplářů 22 druhů, z toho 15 druhů je uvedeno z Turecka poprvé: *Latridius brevicollis* (Thomson, 1868), *L. latissimus* Rücker, 1986, *Enicmus rugosus* (Herbst, 1793), *E. histrio* Joy et Tomlin, 1910, *E. brevicornis* (Mannerheim, 1844), *E. amici* Lohse, 1981, *Stephostethus angusticollis* (Gyllenhal, 1827), *S. sinuatocollis* (Faldermann, 1837), *Corticaria crenulata* (Gyllenhal, 1827), *C. elongata* (Gyllenhal, 1827), *Coricarina similata* (Gyllenhal, 1827), *Melanophthalma suturalis* (Mannerheim, 1844), *M. sericea* (Mannerheim, 1844), *M. distinguenda* (Comolli, 1837) a *M. fuscipennis* Mannerheim, 1844.

Druhá část práce obsahuje seznam 11 druhů známých z tohoto území, ale v námi studovaném materiálu nezastoupených. Dosud je tedy z Turecka známo 33 druhů čeledi Corticariidae.

Vzhledem k tomu, že fauna brouků této čeledi je v Turecku dosud relativně jen málo prozkoumána, nelze považovat předložený přehled za konečný a je odtud možno očekávat nálezy řady dalších druhů.

V rámci poznámek o celkovém rozšíření jednotlivých druhů jsou připojeny první údaje o výskytu *Latridius latissimus* v Iráku a o výskytu *Enicmus amici* na Slovensku, v Bulharsku a na Ukrajině.