

PŘÍSPĚVEK K FAUNISTICE ČESKOSLOVENSKÝCH COLEOPTER

Ladislav V y s l o u ž i l

V této práci uvádím některé významnější nálezy brouků z různých oblastí naší republiky. O všech druzích platí, pokud není jinak uvedeno, Vysloužil lgt., coll. et det.

1. Asaphidion caraboides Schrnk. - Boh.or., Blešno, 28.3.1965, 1 ex. v náplavu Orlice.
2. Masoreus wetterhali Gyll. - Boh. c., Týřov, 22.7.1962, 1 ex. na skalní lesostepi; Boh. mer., Vlkov, 11.7.1964, písečný přesyp, 1 ex.
3. Lebia marginata Fourcr. - Mor.c., Myslejovice, 27.8.1954, 1 ex. sklepan z Salix caprea.
4. Liodes curta Fairm. - Slov.b., Tatr.Matliary, 31.7.1952, 1 ex. sesmýkán na lesní louce, Roubal det.
5. Encephalus complicans Westw. - Boh.or., Vojice, 10.10.1966, 1 ex. v prosevu pod Sarothamnus. Z podobného prostředí uvádí tohoto vzácného fungikola již Roubal (1948).
6. Homaloplia spiraeae Pall. f. limbata Kryn. - Mor.m., Pouzďřany, 9.6.1960, 2 ex. v letu na stepi.
7. Phradonoma villosulum Duft. - Slov.or., Zádíel, 7.1955, hojně na květech Achillea spolu s Acmaeodera a Chlorophorus.
8. Anthocomus coccineus Schall. - Tento druh není tak vzácný, jak se v literatuře všeobecně udává, ale je hojným obyvatelem většiny rozsáhlejších porostů Phragmites, kde patří spolu s Psammoecus a Silis ruficollis F. k nejvýznamnějším druhům biocoenoty. Např.: Boh.or., Bašnice, 8.1952; Boh.m., Hluboká n/Vlt., 7.1963; Třeboň, 8.1964; na všech lokalitách hromadně.
9. Calytis scabra Thunb. - Slov.b., Belanské Tatry, 7.1965, více ex. pod kůrou starých Abies spolu s Ostoma, Zimioma, Adelocera fasciata L.
10. Anitya rubens Hoffm. - Boh.or., Hořice, 5.1964, více ex. vypěstováno spolu s Mycetophagus quadriguttatus Müll. a Pentaphyllus testaceus Hellw. z choroše Polyporus hirsutus, rostoucího na staré třešni.
11. Helichus substriatus Müll. - Slov.or. - Vihorlát, 7.1955, více ex. na bukových větvích spadlých do lezního potoka.
12. Agrilus subauratus Gebl. - Boh.or., Hořice, Lukavecký

kříž, 6.1953, více ex. za poledního vedra na listech *Populus tremula* spolu s *Agrilus roberti* Chevr. f. *pratensis* Ratz.

13. *Airaphilus geminus* Kr. - Boh.m., Třeboň, rybník Káňov, 26.8.1964, 1 ex. v prosevu pod *Juniperus* na břehu rybníka.

14. *Lathropus sepicola* Müll. - Boh.m., Hluboká n/Vlt., 20.6.1964, 1 ex. na větvi *Quercus* napadeného *Scolytus intricatus* Ratz.

15. *Synchita humeralis* F. - Boh.c., Chočovice, 26.7.1953, 1 ex. na *Quercus*; Boh.m., Hluboká n/Vlt., 5.1964, 1 ex. vypěstován z trouchnivějící větve *Alnus*; Boh.or., Třtěnice, 10.6.1966, více ex. na kmeni *Populus* spolu s *Ptilinus*.

16. *Xanthochroa carniolica* Gistel - Slov.c., Kremnica, 24.7.1952, 1 ex. v květu *Filipendula*. Po více než půl století od nálezu na Sitně opět zjištěn na Slovensku. Nedávno též zjištěn Rektoričkem v Prievidze (Heyrovský).

17. *Salpingus aeratus* Muls. - Boh.or., Hořice, 15.3.1962, více ex. v náplavu řeky Bystřice.

18. *Oodescelis polita* Sturm. - Slov.or., Zádíel, 6.1960, více ex. v trávě a pod drny na náhorní planině.

19. *Alphitophagus bifasciatus* Say - Tento druh není tak vzácný, jak se běžně uvádí v literatuře; dobře se přizpůsobil prostředí stájí domácích zvířat, kde žije po celý rok často v masách spolu s *Typhaea* a *Ahasverus* na zbytcích krmiv, hnijící podestýlce apod. Např.: Boh.or., Chomutice, Staré Smrkovice, Lískovice, Holovousy aj.

20. *Strangalia thoracica* Creutz. - Slov.or., Vihorlát, Remetské Hámre, 5.7.1955, 1 ex., samička kladoucí vajíčka na bukovém metru.

21. *Lema tristis* Hrbst. - Boh.or., Hradec Králové, 25.10.1961, 1 ex. na pískovišti pod suchými listy *Echium*.

BEITRAG ZUR KENNTNIS DER COLEOPTEREN-FAUNA DER TSCHÉCHOSLOWAKEI

Der Autor führt eine Reihe in der Tschechoslowakei seltener Käfer-Arten an und bei einigen Arten fügt er Angaben zu deren Bionomie zu.

LITERATURA

H e y r o v s k ý L., 1965: Faunistické zprávy. Zprávy Čs.spol.ent. I, sešit 1:14; R e i t t e r E., 1908-1916: Fauna Germanica 1-5, Stuttgart; R e i t t e r E., 1921: Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren 91, Pythidae. Trop-pau. R o u b a l J., 1936-40: Katalog Coleopter Slovenska. 1,2, Bratislava; 3 Praha. R o u b a l J., 1948: Sarothamnus scoparius Wimm., jeho význam pro život Coleopter hlavně v Čechách, 2.Acta entom.Mus.Nat.Pragae, 26: 353.

PRÍSPĚVEK K POZNÁNÍ VÝSKYTU ČELEDI CARABIDAE (COLEOPTERA) V OKOLÍ TELČE (MOR.OCC.)

Zdeněk M l y n á ř

Měl jsem možnost provést několik speciálně zaměřených sběrných exkursí v okolí Telče. Vzhledem k úplnému nedostatku literárních a materiálových podkladů pro poznání výskytu Carabidů v této oblasti (viz např. již poukaz Kultův v jeho "Klíči čeledi Carabidae ČSR", Praha 1947, str. 21) považuji za zajímavé publikovat jejich výsledky.

Lokalita, na níž byly sběry Carabidů prováděny, leží asi 10 km západně a jihozápadně od Telče a je vymezena okolím následujících obcí a vesnic: Krahulčí, Mrákotín, Študená, Praskolesy, Olší, Borovná a Dobrá Voda. Průměrná nadmořská výška lokality je kolem 600 m (nejvyšší bod - Hradisko - 760 m). Geologickým základem jsou krystalické břidlice a vyvřelé horniny (známý žulový lom u Mrákotína), svrchní vrstvy lokality charakterizují stěrkopískové nánosy, které pokrývají skalní podklad. Lokalita je pokryta menšími lesními komplexy (převážně kulturní smrkový les s menšími partiemi smíšeného lesa - hlavně buk, habr a břízy - a s ostrůvky borovic a modřínů), na jejichž okrajích jsou časté biotopy typu suchých, teplých strání a suchopárů. Mezi lesními komplexy leží pravidelně pole, často okopávaná, v údolích pak četné vlhké a bažinaté louky. Na lokalitě jsou tři rybníky a skupina menších tůní (u Praskoles) s pobřež-