Published December 14, 1999

Klapalekiana, **35**: 39, 1999
ISSN 1210-6100

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 82

Hymenoptera: Nyssonidae

Bembecinus hungaricus (Frivaldszky, 1876). Bohemia mer., Lužnice – Slepičí vršek protected area (6954), 21.vii.1994, 1 ♀, J. Holuša leg., det. et coll. Distributed in south-eastern Europe (Balthasar 1972). Known from Moravia and Slovakia (Pádr 1989). First record from Bohemia.

BALTHASAR V. 1972: *Fauna ČSSR 20. Grabwespen - Sphecoidea*. Academia, Praha, 471 pp. - PÁDR Z. 1989: Sphecoidea, pp. 165-171. In: ŠEDIVÝ J. (ed.): Check list of Czechoslovak insects III (Hymenoptera). *Acta Faun. Entomol. Mus. Nat. Pragae*, 19: 1-195.

Jaroslav HOLUŠA, Jr., Hasičská 3040,
CZ-738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic

RECENZE

LAŠTŮVKA A. & LAŠTŮVKA Z. 1997: *Nepticulidae Mitteleuropas. Ein illustrierter Begleiter (Lepidoptera)*. Konvoj Verlag, Brno, 230 s.

Autoři předkládají velice zdařilý a nanejvýš potřebný určovací průvodce pro 184 druhů velice obtížné čeledi Nepticulidae. Nelehkého úkolu se oba autoři zhostili s vysokou odbornou erudovaností, kterou prokázali již při zpracování obdobného díla věnovaného nesytkám (Sesiidae).

Průvodce je zpracován moderním způsobem, stručně a bez jakýchkoliv nomenklatorických nejasností, kterými byla tato skupina v mnohých předchozích pracích zatížena. Tento fakt je výsledkem obrovské píle obou autorů, kterou věnovali synonymice čeledi.

Práce je členěna na několik částí, které na sebe logicky navazují. Po úvodní stati následuje stručná morfologická charakteristika čeledi a zdařilé perokresby vysvětlující odbornou terminologii v popisu habitu a genitálií používanou při specifikaci mezidruhových rozdílů. V další stati je obecně popsána bionomie, kterou doplňuje systematický přehled živných rostlin jednotlivých druhů.

Kapitola o geografickém rozšíření zpracovávaných druhů přináší obecné informace o rozšíření zástupců čeledi Nepticulidae a přehlednou mapku znázorňující region, kterému je práce věnována. Tento region zahrnuje kromě centrální Evropy též jižní část Skandinávie, východní část Francie, alpské oblasti jižní Evropy a na východě západní část Ukrajiny a Rumunska. Zejména jižnější oblasti sledovaného regionu nebyly v současné literatuře souhrnně zpracovány. Čtenář tak dostává informaci o zhruba 85% dnes známých druhů této čeledi v Evropě.