

ist hier ziemlich artenarm und weicht von der der benachbarten Gebiete in Südböhmen bei Jindřichův Hradec, auf der Böhmischemährischen Anhöhe oder bei Třebíč in Nordmähren bedeutend ab.

PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ METATROPIS RUFESCENS (HERRICH-SCHÄFFER
1835) V ČESKOSLOVENSKU (HETEROPTERA, BERYTIDAE)

Otakar K u b í k

Metatropis rufescens H.S. je podle literatury rozšířen široko po celé Evropě.

A.C.Jensen-Haarup (1912) ho uvádí z jižního Dánska, při čemž ho pokládá za druh ne řidký. Gulde (1930) uvádí střední a severní Evropu až po střední Švédsko a střední Finsko. Dle Villierse (1945) se vyskytuje ve východní a severní Francii. W.Stiechel (1955-1960) uvádí Polsko (dříve Východní Prusy), Hanover, Norsko, Švédsko, Finsko, Pobaltské SR, západní Rusko, Dánsko, Anglii, Holandsko, Belgie, Francii, Itálii, Švýcars, Rakousko, Československo, Jugoslávii, Rumunsko, Japonsko. Dr.K.Singer (1952) udává tento druh z dolního poříčí Mohanu v západním Německu. Kiričenko (1951) uvádí nálezy z Litevské SR, Estonské SR, Leningradské, Novgorodské a Kalininské oblasti, dále cituje Kazan a Zakavkazí.

V Československu ho předpokládá Balthasar (1937) a dokládá Stehlík (1958) z Moravy a Slovenska. O tento druh je však nutno na základě nových nálezů též doplnit faunu Čech. Je trvale nalézán na nepatrných lokalitách čarovníku horského (*Circea alpina* L.) u obce Jelen, ležící na pravém břehu Labe na východ od Kolína. Lokalita se nachází ve starém smrkovém lese s četnými duby. Les v místech růstu čarovníku horského je značně vlhký, někde i bažinatý. Sytě zelené larvy sají na tobolkách a řapících čarovníku. Po svléknutí je dospělý exemplář zelený, úplné zhnědnutí nastane během 2 dnů (12.8.1959 1 ex.; 4.9.1960 4 ex.; 4.7.1965 2 ex.)

Další nález uvádím ze Slovenska z Malé Fatry (Vrátná). V tomto místě roste jak *Circea lutetiana* L., tak i *Circea alpina* L. Druh byl však nalézán pouze na *Circea alpina* L. (18.7.1964 3 ex.)

BEITRAG ZUR VERBREITUNG VON METATROPIS RUFESCENS (H.S.)
IN DER TSCHESCHOSLOWAKEI (HETEROPTERA, BERYTIDAE)

In der Umgebung von Kolín (Böhmen) befindet sich eine Lokalität von *Circea alpina* L., an welcher jährlich diese Wanze lebt. Für Böhmen wurde die Art hiemit das erste mal festgestellt. Eine weitere Lokalität befindet sich in der Slowakei: Vrátná in der Malá Fatra.

LITERATURA

B a l t h a s a r V l ., 1937: Slovenské ploštice, "Bratislava" XI.: 226. G u l d e J ., 1935: Wanzen Mitteleuropas 4: 312. Frankfurt am Main. H e d i c k e H ., 1935: Heteroptera. Tierwelt Mitteleuropas. Berlin. J e n s e n - H a a r u p A.C., 1912: Tæger (Danmarks Fauna): 144. København. K i r i -
č e n k o A.N., 1951: Nastojaščije polužestkokrylyje jevro-
pějskoj časti SSSR: 259. Moskva - Leningrad. S i n g e r K ., 1952: Die Wanzen (Hemiptera, Heteroptera) des unteren Mainge-
bietes von Hanau bis Nürzburg mit Einschluss des Spissarts. Aschaffenburg. S t e h l í k J.L., 1958: Zajímavé nálezy He-
teropter na Moravě a na Slovensku III. Časopis Moravského mu-
zea - 43: 141. S t i e c h e l W ., 1956: Illustrierte Be-
stimmungstabellen der Wanzen. Europa. 1: 58-59. Berlin - Herms-
dorf. V l a c h V ., 1933: Květena Kolínska a Kouřimská. Ko-
línsko a Kouřimsko.

Z P R Á V Y O S O B N Í

Profesor Karel Kult, padesátiletý.

Letošního roku se dožil padesáti let jeden z významných členů Československé společnosti entomologické, profesor Karel Kult. Narodil se dne 27.ledna 1917 v Praze jako syn hajného. Žil od dětství v Heřmanově Městci a měl tedy záhy mož-
nost sledovat a pozorovat život v přírodě. Jako středoškolský student vynikal v přírodních vědách a zoologii, v té době hlav-
ně ornitologii, se věnoval i mimo školu. Po maturitě na pardu-
bické reálce se zapsal na Přírodovědeckou fakultu Karlovy uni-