

je plachý a často při přiblížení uletí, zvláště samečkové.

Děkuji za spolupráci p. Jar. Wichrovi, který velmi ochotně mnohé obtížnější druhy určil nebo určení kontroloval.

LITERATURA

B e r g m a n n A., 1955: Die Grossschmetterlinge Mitteldeutschlands 2, Leipzig. H r u b ý K., 1964: Prodrómus Lepidopter Slovenska, Bratislava. P a c l t J., 1949: Fragmenta Lepidopterologica, 3e Note. Fol.ent., 12: 61. S k a l a H., 1913: Die Lepidopterenfauna Mährens. Verh.Nat.Ver. Brünn, 51: 159. S k a l a H., 1936: Zur Lepidopterenfauna Mährens und Schlesiens, Brünn.

NÁLEZ SITARIS MURALIS FORST. (COL., MELOIDAE) NA JIŽNÍ MORAVĚ.

Augustin H o f f e r

Nálezy tohoto po mnohé stránce velmi zajímavého Meloida jsou ve střední a jižní Evropě zcela ojedinělé. Svůj vývoj prodělává v hnízdech samotářských včel z rodu Anthophora (uváděny jsou hlavně druhy plagiata Ill., retusa L. a acervorum L.), která opouští v pozdním létě a na podzim. Z našeho území jsou hlášeny dosud pouze dva nálezy ze Slovenska, a to z Bratislavy (kde byl chycen na zdi starého domu Kavanem) a z Králového nad Tisou, jak uvádí Roubal ve svém Katalogu Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi, díl II. z r.1936. Fleischer v Přehledu brouků fauny Československé Republiky z r.1930 neuvádí žádný nález z našeho území. Zajímavý hromadný výskyt samců zaznamenává Reitter (Fauna germanica III.) z Frankfurtu n.Moh. na podzim r. 1874, a to opět na starých zdech, osídlených Anthophorami.

Jediný exemplář samce tohoto podle Roubala nanejvýš vzácného brouka nalezl jsem na kolmé sprásové stěně na jihovýchodním svahu známé Pouzdřanské stepi v srpnu r. 1928. Stěna byla velmi početně osídlena různými druhy solitérních včel i jinými

druhy Hymenopter, žijícími podobným způsobem, společně s jejich parasites. Tento dosud nepublikovaný nález je prvním z území Moravy.

Dokladový kus nachází se v mé sbírce palaearktických Coleopter, již jsem věnoval r. 1939 tehdejšímu Zoologickému oddělení Národního musea v Praze.

SITARIS MURALIS FORST. (COL., MELOIDAE) IN SÜD-MÄHREN.

An einer Lösswand des südöstlichen Abhanges der bekannten Steppen-Reservation bei Pouzdřany, wo viele Arten der solitären Bienen nisten, fand ich im August 1928 ein einziges Exemplar männlichen Geschlechtes dieser ausserordentlich seltenen Meloiden-Art. Dieses Exemplar stellt den ersten bekannt gewordenen Fund für das Gebiet von Mähren dar und wurde im Jahre 1939 samt meiner ganzen Koleopterensammlung der ehemaligen Zoologischen Abteilung des Nationalmuseums in Praha geschenkt.

SLOŽENÝ EXHAUSTOR.

Vladimír V o j á č e k

Nezbytnou pomůckou pro každého entomologa při vybírání hmyzu z prosevů, buď přímo v terénu nebo později v pracovně, je exhaustor. Jednoduchých exhaustorů je mnoho typů, universálních i speciálních pro různé úkony i skupiny hmyzu, jak si ho každý sběratel udělal nebo upravil. Společnou nevýhodou všech těchto exhaustorů je:

a) Velká ztráta času při vysypávání nachyteného hmyzu do smrtičky. (Po každém úlovku několika jedinců, nebo vychytání naleziště, na kterém je třeba jen několik jedinců, např. odloupená kůra, odvalený kámen atd., je nutné se zastavit, vyprázdnit exhaustor do smrtičky, aby se hmyz z jednotlivých stanovišť nesmíchal a poznamenat si na lístek naleziště. Pak teprve je možno pokračovat v lovu.)

b) Poškození křehkého a jemného hmyzu hmyzem hrubým nebo dravým.