NÁLEZ DRUHU ONCOMERA FEMORATA STEPHENS NA SLOVENSKU (COL., OEDEMERIDAE)

Leo Heyrovský

Oncomera femorata STEPHENS je jihoevropský druh, vzácně se však vyskytuje i ve střední a západní Evropě. GANGLBAUER (1881) uvádí jej ze střední a jižní Evropy, REITTER (1911) pouze z jižní části západního Německa. Životní cyklus není dosud znám.

Od nás byl ohlášen pouze ze dvou nalezišť ze Slovenska. Katalog Fleischerův (FLEISCHER 1927–1930) ho z Československa vůbec neuvádí. ROUBAL (1936) uvádí ze Slovenska dva starší nálezy, a to Csikiho od Bardějova a Kuthyho od Hermandu na břehu řeky Popradu. Z našich sběratelů ho chytal pouze Artur Vávra v bývalé Podkarpatské Rusi v Užhorodu v letu kolem lípy. Další kus nalezl jsem ve sbírce p.Adolfa Luňáka, který ho ulovil v Rači (býv. Račisdorfu) u Bratislavy dne 19.8.1927, a to ve formě *purpureocoerulea* GANGLBAUER. ROUBAL uvádí, že *Oncomera femorata* STEPHENS žije v přírodně bohatých biotopech, na kvetoucích okoličnatých, Tilia, Sambucus, Rubus, Acer aj. Pozorován v podzimních nocích na některých květech v pahorkatinách a předhořích.

FUND VON ONCOMERA FEMORATA STEPHENS IN DER SLOWAKEI (COL., OEDEMERIDAE)

Der Autor führt ein neues Fundort der seltenen Oedemeriden-Art *Oncomera femorata* STEPHENS (fa *purpureocoerulea* GANGLBAUER aus Rača bei Bratislava in der Slowakei an. Ein einziged Stück hat dort am 19.8.1927 H.Adolf Luňák erbeutet.

FLEISCHER A., 1927–1930: Seznam brouků Československé republiky. Brno. GANGLBAUER L., 1881: Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren, IV.A.: 11. HEYROVSKY L., 1965: Naši stehenáči, Živa: 220. REITTER E., 1911: Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches, III: 410 Stuttgart. ROUBAL J., 1936: Katalog coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi, II: 259. Bratislava.

PŘEZIMOVÁNÍ KUKLY LIŠAJE SVLAČCOVÉHO (HERSE CONVOLVULI L.)

Miloslav Soldát

V rámci plánovité evidence a revidování údajů migrujících druhů motýlů *Acherontia atropos L.*, *Herse convolvuli L.* a *Daphnis nerii L.*, které provádím v komisi pro zjišťování tažných motýlů při naší společnosti, považuji za vhodné podat zprávu o přezimování lišaje svlačcového *(Herse convolvuli* L.*)* u nás.

Kuklu tohoto motýla mi předal p.Podolan, který ji nalezl dne 9. září 1966 na jižní Moravě v Tvarožné Lhotě u Kněždubu, okres Hodonín, při dobývání brambor. Kukla ležela v zemi podle mého odhadu nejméně 7 – 12 dní, byla světle hnědá a velmi pohyblivá. Umístil jsem ji do vlněné látky a choval v houseníku za teploty +13 až +22st C.Při kontrole jsem v prosinci zjistil, že si kukla ponechala světlou barvu a na dotek reagovala mrskáním. Koncem prosince jsem houseník s kuklou přenesl na verandu, kde byla teplota kolem nuly nebo o málo méně, ale jen ojediněle klesala na -3 až -4st C. Zde kukla přezimovala. Na jaře jsem obnovil vlhčení a v květnu jsem zjistil, že světle hnědá barva kukly zůstává stále nezměněna a že kukla je stále stejně pohyblivá jako v září 1966. Dne 23. června 1967 se z ní vylíhl dospělý motýl, sameček.