(Published November 14, 2002

Klapalekiana, **38**: 63-83, 2002
ISSN 1210-6100

Příspěvek k poznání tesaříkovitých (Coleoptera: Cerambycidae) Jablunkovské brázdy a blízkého okolí

Contribution to the knowledge of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Jablunkovská brázda valley and its close environs

Richard SZOPA

CZ-739 95 Bystřice nad Olší 332

Faunistics, Coleoptera, Cerambycidae, Central Europe, Czech Republic, northern Moravia

Abstract. The faunistic data of Cerambycidae from the Jablunkovská brázda valley (northern Moravia, Czech Republic) and its environs are presented. The study is based on about 1000 specimens from this territory and literature data. A total of 58 species from 44 genera were found. Additional 34 species were found in adjacent areas.

ÚVOD

Území Jablunkovské brázdy a jeho blízké okolí je entomology dosti opomíjené, zřídka navštěvované a z hlediska výskytu tesaříků nedostatečně prozkoumané. O tom svědčí i velmi malé množství publikovaných údajů. Relativní neatraktivnost lokalit v této oblasti je pravděpodobně způsobena silně narušeným přírodním prostředím s většinou druhotnými monokulturními, převážně smrkovými lesy. V minulosti bylo publikováno několik prací zabývajících se rozšířením tesaříků v širší oblasti Beskyd: Fleischer (1927-1930), Heyrovský (1930), Navrátil (1975), Nohel (1977), Vysoký (1993), Kočárek et al. (1995), Sláma (1998), avšak více konkrétních údajů z území Jablunkovské brázdy podává pouze Navrátil (1975).

V této práci uvádím veškeré údaje získané vlastními sběry, prováděnými nepravidelně na zkoumaném území v letech 1993-2002, a data jiných sběratelů působících v tomto regionu. Pro úplnost jsou zde také uvedeny literární údaje, které jsou většinou velmi staré, a výskyt řady druhů nebyl dosud recentně potvrzen. Jejich autoři udávali lokality často jen velice obecně bez bližších podrobností.

MATERIÁL A METODIKA

Materiál jsem získával hlavně v jarních a letních měsících sběrem imág, kdy jsem používal metody klasického sběru, smýkání, sklepávání a sběru na světlo. U některých druhů byla imága pouze pozorována a jejich evidence byla vedena bez jejich odchytu. Takto získané údaje jsou vždy na konci označeny zkratkou „observ.". Mnoho exemplářů jsem také vychoval z larev nebo kukel, které jsem sbíral převážně v podzimních až jarních měsících vyřezáváním ze dřeva keřů a stromů.

Další údaje byly získány ze sbírek Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, Jiřího Nežerky a Miroslava Folwarczného. Údaje od Jiřího Káni a Jiřího Vávry (Ostrava) byly získány písemným, resp. ústním sdělením. Veškerý materiál (mimo údajů o materiálu převzatých z literatury a od J. Káni) jsem determinoval popř. revidoval.

Pro tuto práci bylo použito údajů o zhruba 1000 ex. tesaříků nalezených ve sledovaném území a v jeho okolí, které jsou v kapitole Přehled zjištěných druhů rozděleny na dvě části: Literární údaje a Materiál a pozorování. Tyto jsou dále seřazeny v pořadí: lokalita, číslo faunistického čtverce, datum, počet ex., poznámka, leg., coll. Lokality jsou seřazeny podle faunistických čtverců od západu k východu, v rámci jednotlivých čtverců pak podle abecedy. Stejným způsobem jsou řazeny i lokality v kapitole Stručný popis lokalit. Za názvem lokality je uveden faunistický čtverec a její střední nadmořská výška. Pokud se jedná o kopec nebo horu, uvádím za názvy jejich nadmořskou výšku v závorkách.

Druhy nalezené v okolí zkoumaného území, které se mi dosud nepodařilo zjistit nebo recentně potvrdit, ale jejichž výskyt je ve sledované oblasti vzhledem k literárním údajům možný, uvádím samostatně ve zvláštní kapitole.

Charakteristiky určité míry vzácnosti jsou uvedeny pouze u druhů nehojných až vzácných, vztahují se pouze na sledovanou oblast a vycházejí z vlastní zkušenosti. Nomenklatura je převzata z prací Slámy (1993) a Althoffa & Danilevského (1997). Označení lokalit čísly faunistických čtverců a nadmořskou výškou uvádím podle Prunera & Míky (1996). Jména dřevin, popř. bylin jsou podle Slámy (1998).

ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY

V textu jsou použity zkratky, označující sbírku, ve které je dokladový materiál uložen: JKC - coll. Jiří Káňa, Havířov; JNC - coll. Jiří Nežerka, Třinec; MBFM - coll. Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek (Magdaléna Roháčová); MFC - coll. Miroslav Folwarczny, Albrechtice; RSC - coll. Richard Szopa, Bystřice nad Olší.

Dále jsou v textu použity následující zkratky: ex larva - vychováno z larvy, ex pupa - vychováno z kukly (datum přiřazené k těmto zkratkám je datem sběru larvy nebo kukly, nikoli datem líhnutí imága), CHÚ - chráněné území, CHKO - chráněná krajinná oblast, NPR - národní přírodní rezervace, PP - přírodní památka, PR - přírodní rezervace.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Sledované území (viz obr. 1) je nejvýchodnější oblastí České republiky, s rozlohou kolem 200 km^2 a spadá do faunistických čtverců: 6377, 6378, 6477, 6478, 6479 (Pruner & Míka 1996); zeměpisné souřadnice: 49°30'-41' severní šířky, 18°41'-51' východní délky. Hranici tohoto území tvoří na severu a východě státní hranice s Polskem, na jihu státní hranice se Slovenskou republikou. Její západní strana je vymezena z části železniční tratí (po katastr obce Dolní Lomná) a z části hřebeny a severovýchodními svahy Moravskoslezských Beskyd s vrcholy: Kyčera (745 m), Malá Kykula (789 m), Kozubová (982 m), Kalužný vrch (993 m), Ostrý (1044 m), Kozinec (642 m). Území uzavírají na severozápadě hranice katastrů obce Oldřichovice, města Třince a obce Horní Líštná.

Podle Demka (1987) náleží geomorfologicky celé sledované území k provincii Západní Karpaty a subprovincii Vnější Západní Karpaty, která se dělí na oblast Západobeskydského podhůří a oblast Západních Beskyd. Do oblasti Západobeskydského podhůří spadá pouze jeden celek - Pobeskydská pahorkatina. Většina sledovaného území náležící oblasti Západních Beskyd obsahuje celky: Moravskoslezské Beskydy, Slezské Beskydy, Jablunkovské mezihoří a Jablunkovskou brázdu. Obě oblasti jsou složeny z flyšových hornin, s ojedinělým bradlem jurských vápenců.

Nižší polohy sledované oblasti (tj. Jablunkovská brázda a Pobeskydská pahorkatina) jsou řídce zalesněny, zejména porosty smrku (*Picea abies*), místy s bukem (*Fagus sylvatica*) a habrem (*Carpinus betulus*). Vyskytuje se zde také modřín (*Larix decidua*) a ojediněle i borovice (*Pinus sylvestris*). V okolí vodních toků jsou hojné porosty olše (*Alnus* sp.) a různých druhů vrb (*Salix* spp.). Velká část tohoto území je obydlená, zemědělsky a hospodářsky využívána. Louky slouží často jako pastviny. Nadmořská výška se zde pohybuje mezi 300-600 m, průměrná roční teplota je 7°C, srážky cca 700 mm a délka vegetačního období kolem 150 dní (Demek 1987).

Vyšší polohy sledovaného území (tj. Moravskoslezské Beskydy, Slezské Beskydy a Jablunkovské mezihoří) jsou méně narušené urbanizací než Jablunkovská brázda, podhorské a horské biotopy jsou zachovalejší. Zalesněny jsou především porosty smrku (*Picea abies*), místy s příměsí buku (*Fagus sylvatica*). Ojediněle se zde vyskytuje také jedle (*Abies alba*). Nadmořská výška se zde pohybuje mezi 700-1050 m, průměrná roční teplota je 6°C, srážky okolo 900 mm a vegetační období trvá zhruba 130 dní (Demek 1987).

STRUČNÝ POPIS LOKALIT

1. Ostrý (1044 m) – 63-6477, nejvýše položená lokalita sledovaného území, spadající do celku Moravskoslezských Beskyd, součást CHKO Beskydy. Sběry zde byly prováděny zejména v lesích, na jejich okrajích a pasekách. Na severní straně této lokality se nachází zbytky původního buko-jedlového porostu (Fageto-Abietum) pralesovitého charakteru. Většinu lokality však pokrývají již nepůvodní porosty smrku (*Picea abies*) a buku (*Fagus sylvatica*). Na jižní straně se nachází rozlehlá horská louka, dosti zarostlá, zejména porosty borůvky (*Vaccinium* sp.).

2. Třinec – 6377-78, 325 m, město spadající do celku Pobeskydské pahorkatiny. Sběry byly prováděny na loukách, v lesích a okrajových zemědělsky využívaných částech města. Porosty jsou na této lokalitě řídké, s převažujícím smrkem (*Picea abies*), místy s příměsí borovice (*Pinus sylvestris*) a modřínu (*Larix decidua*), hlavně však buku (*Fagus sylvatica*), habru (*Carpinus betulus*), v okolí řeky Olše často různých druhů vrb (*Salix* spp.) a olše (*Alnus* sp.).

3. Filipka (762 m) – 6378, vrch ve Slezských Beskydech. Sběry byly prováděny hlavně kolem potoků v údolích přilehlých k tomuto vrchu, zalesněných zejména smrkem (*Picea abies*) a bukem (*Fagus sylvatica*), ale i na loukách a okrajích lesů, ležících

pod samotným vrcholem této lokality. Jižně od této lokality se nachází PP Filipka (1,1 ha), sloužící k ochraně jalovce (*Juniperus communis*).

4. Bystřice nad Olší – 6378, 340 m, obec spadající do celku Jablunkovské brázdy. Okolí obce je zemědělsky využíváno. Sběry byly prováděny v centru obce kolem potoků, v remízcích mezi poli, které jsou převážně smíšeného charakteru, s převažujícím smrkem (*Picea abies*) a bukem (*Fagus sylvatica*). V okolí řeky Olše dominují porosty olše (*Alnus* sp.), různých druhů vrb (*Salix* spp.) a habru (*Carpinus betulus*).

5. Horní Líštná – 6378, 360 m, obec v Pobeskydské pahorkatině. Sběry byly prováděny na loukách, pastvinách a pasekách v blízkém okolí této obce, které je řídce zalesněno nepůvodními smíšenými porosty s převládajícím smrkem (*Picea abies*), bukem (*Fagus sylvatica*), místy s modřínem (*Larix decidua*) a řídce i jedlí (*Abies alba*).

6. Hrádek – 6378, 353 m, obec v Jablunkovské brázdě. Sběry byly prováděny v okolí řeky Olše s převažujícími porosty různých druhů vrb (*Salix* sp.), olše (*Alnus* sp.) a místy i habru (*Carpinus betulus*). Dále bylo sbíráno na loukách, pasekách a okrajích lesů na jižních svazích Slezských Beskyd, které jsou zalesněny hlavně porosty smrku (*Picea abies*) s příměsí buku (*Fagus sylvatica*) a řídce i jedle (*Abies alba*).

7. Jahodná (407 m) – 6378, se nachází v Pobeskydské pahorkatině. Sběry na této lokalitě byly soustředěny hlavně na okolí starého vápencového lomu, nacházejícího na konci velké louky, na které bylo rovněž sbíráno. Dále bylo sbíráno na pasekách a okrajích lesů v CHÚ Pod Sosnou, rozkádajícím se severovýchodně od vrcholu kopce, zalesněným smíšeným porostem. Dominantní dřevinou je zde smrk (*Picea abies*), místy se vyskytuje také modřín (*Larix decidua*), habr (*Carpinus betulus*) a buk (*Fagus sylvatica*). Řídce se zde objevují i keře zimolezu (*Lonicera nigra*).

8. Karpentná – 6378, 382 m, obec v Jablunkovské brázdě. Okolí je zemědělsky využíváno, proto je jen řídce zalesněno smíšenými remízky. V blízkosti se nacházejí na podmáčených půdách porosty smrku (*Picea abies*). Sběry byly prováděny právě v těchto smrčinách a na jejich okrajích.

9. Košariska – 63-6478, 458 m, obec ležící v CHKO Beskydy na hranici celků Jablunkovské brázdy a Moravskoslezských Beskyd. Lesní porosty jsou zde převážně smrkové (*Picea abies*), často s výskytem buku (*Fagus sylvatica*), jen místy smíšené s jedlí (*Abies alba*). Jihovýchodní svahy jsou využívány k pasteveckým a zemědělským účelům, na kterých se hojně vyskytují porosty jalovce (*Juniperus communis*). Sběry byly prováděny na těchto pastvinách a loukách, ale i v lesích a na jejich okrajích, zejména však v údolí okolo potoka Kopytná.

10. Kozinec (654 m) – 6378, kopec v CHKO Beskydy, spadající do celku Moravskoslezských Beskyd. Tato lokalita je zalesněna porosty smrku (*Picea abies*) a řídce i buku (*Fagus sylvatica*). Sběry zde byly prováděny v lesích a na pasekách.

11. Milíkov – 63-6478, 420 m, obec na hranici Moravskoslezských Beskyd a Jablunkovské brázdy, z části spadající do CHKO Beskydy. Tato lokalita je zalesněná jen ostůvkovitě smíšenými remízky, ve kterých byla prováděná část sběrů. Hlavně však bylo sbíráno v souvislejších porostech smrku (*Picea abies*), obklopujících ze severu a severozápadu od obce zemědělsky využívané plochy, a také v okolí potoka Kopytná.

12. Návsí – 63-6478, 386 m, obec v Jablunkovské brázdě. Velkou část této lokality tvoří pastviny a zemědělsky využívané plochy. Souvisleji zalesněné jsou až jižní svahy Slezských Beskyd vystupující za touto obcí, v jejichž údolích byly prováděny sběry. Dominantní dřevinou je zde opět smrk (*Picea abies*), méně buk (*Fagus sylvatica*), zřídka se objevuje i jedle (*Abies alba*). Na této lokalitě se nachází PP Rohovec (29,5 ha), sloužící jako chráněný biotop lesních mravenců (*Formica* spp.).

13. Nýdek – 6378, 410 m, obec ve Slezských Beskydech. Sběry na této lokalitě byly prováděny v údolích kolem potoků, na loukách a v remízcích smíšeného charakteru, přecházejících postupně se zvedající se nadmořskou výškou v souvislejší lesní porost, který je zde také převážně smrkový (*Picea abies*) s častým výskytem buku (*Fagus sylvatica*).

14. Velká Čantoryje (995 m) – 6378, nejvyšší hora Slezských Beskyd, zalesněná porosty smrku (*Picea abies*) a buku (*Fagus sylvatica*). Sběry byly prováděny západně od vrcholu v NPR Čantoria (39,5 ha), ve které je zachován původní buko-jedlový (Fageto-Abietum) porost pralesovitého charakteru, s posledním výskytem tisu (*Taxus* sp.) v Beskydech.


15. Vendryně – 6378, 350 m, obec ležící na hranicích celků Jablunkovské brázdy, Pobeskydské pahorkatiny a Slezských Beskyd. Okolí obce tvoří hlavně pastviny a zemědělsky využívané půdy. Na jejich okrajích jsou řídké lesíky, převážně smíšeného charakteru, ve kterých byly prováděny sběry. Často se zde vyskytují keře hlohu (*Crataegus* sp.). Severozápadně od obce se nachází starý ovocný sad s porosty jabloní (*Malus* sp.), švestky (*Prunus* sp.) a rybízu (*Ribes* sp.), ve kterém bylo rovněž sbíráno.

16. Kalužný (993 m) – 6477, kopec v CHKO Beskydy, náležící celku Moravskoslezských Beskyd, zalesněný porosty zejména smrku (*Picea abies*) a buku (*Fagus sylvatica*). Sběry zde byly prováděny v lesích a na pasekách.

17. Bukovec – 6478-79, 455 m, obec v Jablunkovské brázdě. Okolí této obce tvoří rozlehlé louky a pastviny, s řídkými porosty buku (*Fagus sylvatica*), smrku (*Picea abies*), místy i jedle (*A. alba*), na jejichž okrajích byly prováděny sběry. V blízkosti se nachází PR Bukovec (7,3 ha), kterou tvoří mokřadní podhorské louky rašelinného typu se vzácnou květenou.

18. Dolní Lomná – 6478, 460 m, obec v CHKO Beskydy, spadající do celku Moravskoslezských Beskyd. Okolí obce je rovněž zalesněno smíšenými porosty s převahou smrku (*Picea abies*). Obcí protéká říčka Lomná, kolem které se vyskytují místy hojně keře zimolezu (*Lonicera nigra*). Sběry zde byly prováděny právě okolo této říčky a v jejím blízkém okolí.

19. Girová (840 m) – 6478, nejvyšší hora Jablunkovského mezihoří, ležící v jeho středu. Sběry na této lokalitě byly prováděny na pasekách a v lesích, kde je převažující dřevinou smrk (*Picea abies*) s příměsí buku (*Fagus sylvatica*). Časté jsou zde i horské louky, na kterých bylo rovněž sbíráno.



Obr. 1. Mapa sledovaného území.
Fig. 1. Map of the studied area.

20. Jablunkov – 6478, 386 m, město v Jablunkovské brázdě. Centrum této lokality je hustě osídleno. Sběry byly prováděny v blízkém okolí města, řídce zalesněným smíšenými porosty s dominantním smrkem (*Picea abies*), a také na březích řeky Olše, kde převažují porosty olše (*Alnus* sp.), různých druhů vrb (*Salix* spp.) a místy habru (*Carpinus betulus*).

21. Kozubová (982 m) – 6478, hora v CHKO Beskydy, spadající do celku Moravskoslezských Beskyd. Tato lokalita je zalesněna zejména porosty smrku (*Picea abies*), severozápadně od vrcholu hory, přecházejícími do smíšených s převládajícím bukem (*Fagus sylvatica*). Sběry byly prováděny zejména na horských loukách a pasekách.

22. Mosty u Jablunkova – 6478, 490 m, obec v Jablunkovské brázdě. Okolí obce tvoří četné louky, pastviny a zemědělsky využívaná půda, jen místy s malými lesíky smíšeného charakteru. Souvislejší porost, hlavně smrkový (*Picea abies*), jen místy s příměsí borovice (*Pinus sylvestris*) a buku (*F. sylvatica*), vytváří až západní svahy Jablunkovského mezihoří, na jejichž pasekách a loukách byly prováděny sběry.

23. Písek – 6478, 420 m, obec ležící v Jablunkovské brázdě. Sběry byly prováděny v údolích přilehlých k této obci, ve smíšených remízcích, i na jižních svazích Slezských Beskyd souvisle zalesněných zejména porosty smrku (*Picea abies*) a buku (*Fagus sylvatica*).

PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ

1. *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758)

Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6378, jako nález uskutečněný po roce 1959, a ze čtverců 6477-78, jako nálezy uskutečněné do roku 1959.

Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 24.VII.1994, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Třinec (6377), 21.VIII.1985, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Košařiska (6478), 1.VIII. 1993, 1 ex. na světlo, R. Szopa leg., RSC; 12.VII.1994, 1 ex. na světlo, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 9.VIII.1999, 1 ex. v letu - večer, R. Szopa leg., RSC; Nýdek (6378), 4.VIII.1972, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Vendryně (6378), 30.VII.1989, 1 ex. na zemi, P. Jakobek leg., J. Nežerka det., JNC.

Jednotlivě se vyskytující druh.

2. *Tetropium castaneum* (Linnaeus, 1758)

Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný po roce 1959.

Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 2.VI.1993, 1 ex., K. Nežerka leg., J. Nežerka det., JNC; 5.VII.1993, 1 ex., K. Nežerka leg., J. Nežerka det., JNC; Třinec (6377), 15.VI.1969, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; Filipka (6378), 24.V.1999, 5 ex. na kládách *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC.; Bystřice nad Olší (6378), 27.V.1999, 1 ex. na pařezu *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; Jahodná (6378), 11.V.1999, 7 ex. pod kůrou pařezů *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; Karpentná (6378), 27.V.1999, 1 ex. na pařezu *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; Košařiska (6378), 6.VI. 1993, 1 ex. na zemi, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 24.V.1994, 2 ex. na pařezech *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; 10.VI.1994, 2 ex. na pařezech *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; 11.V.1999, 2 ex. pod kůrou *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; Nýdek (6378), 18.VI.1972, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; 27.V.1999, 6 ex. pod kůrou pařezů *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; Mosty u Jablunkova (6478), 22.V.1974, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC.

3. *Tetropium fuscum* (Fabricius, 1787)

Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný po roce 1959.

Materiál a pozorování: Horní Líštná (6378), 5.III.1999, 2 ex. ex larva z kmene *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC; 17.III.1999, 3 ex. ex larva z kmene *P. abies*, R. Szopa leg., RSC.

Vzácný, zatím pouze vychován z larev.

4. *Tetropium gabrieli* Weise, 1905

Literární údaje: Fleischer (1927-1930): udáván z lokality Beskydy; Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy.

Materiál a pozorování: Třinec (6378), 7.IX.2000, torza 2 ex. z kmene *Larix decidua*, ve kterém bylo velmi mnoho starých výletových otvorů, R. Szopa leg., RSC.

Vzácný, vázaný na modřín (*Larix decidua*).

5. *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839)

Materiál a pozorování: Kozubová (6478), 27.VIII.1989, 1 ex. na pařezu, M. Folwarczny leg., MFC.

Velmi vzácný. Zatím pouze tento jediný nález.

6. *Arhopalus rusticus* (Linnaeus, 1758)

Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6378, jako nález uskutečněný po roce 1959, a ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný do roku 1959.

Materiál a pozorování: Horní Líštná (6378), 17.III.1999, výletové otvory v pařezech *Pinus sylvestris*, R. Szopa observ.; Milíkov (6378), 11.V.1999, torzo 1 ex. u pařezu *Picea abies*, R. Szopa leg.; 5.VII.2000, 1 ex. pod kůrou pařezu *P. abies*, R. Szopa leg., RSC.

Vzácný.

7. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758)

Literární údaje: Navrátil (1975): Mosty u Jablunkova (6478), 2.VIII.1969, 1 ex., B. Bubeník leg.; Sláma (1998): udáván ze čtverce 6378, jako nález uskutečněný do roku 1959.

Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 2.VIII.1981, více ex. vysekaných z klády *Fagus sylvatica*, J. Nežerka leg. et det., JNC; Jablunkov (6478), 23.VIII.1966, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Mosty u Jablunkova (6478), 7.VII.1971, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; 27.VI.1971, 1 ex., E. Burša leg., MBFM.

Vzácný, již delší dobu znovu nenalezen.

8. *Obrium brunneum* (Fabricius, 1792)

Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6377, jako nález uskutečněný po roce 1959.

Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 14.VI.1997, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Milíkov (6378), 4.VI.1997, 55 ex. na květech *Aruncus* sp., R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6478), 6.VI.1994, 1 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 3.VI.1997, 6 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 8.VI.1997, 8 ex. na květech *Aruncus* sp., R. Szopa leg., RSC; Girová (6478), 9.VII.1995, 1 ex, J. Káňa leg. et det., JKC.

9. *Molorchus minor* (Linnaeus, 1758)

Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6377, jako nález uskutečněný po roce 1959.

Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 7.VI.1997, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Bystřice nad Olší (6378), 5.X.1997, 5 ex. ex larva z větve *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC; Karpentná (6378), 10.XI.1997, 5 ex. ex larva z větví *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 24.V.1994, 2 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 3.VI.1997, 5 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg.,

RSC; Nýdek (6378), 15.XI.1997, 5 ex. ex larva z větve *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; Vendryně (6378), 22.V.1999, 3 ex. oklepem *Crataegus* sp., R. Szopa leg., RSC; Bukovec (6478), 31.V.1978, 1 ex., F. Petřík leg., MBFM; Dolní Lomná (6478), 27.VI.1999, 2 ex. na květech *Aruncus* sp., R. Szopa leg., RSC.

10. *Molorchus umbellatarum* (Schreber, 1759)
Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6378, jako nález uskutečněný do roku 1959.
Materiál a pozorování: Třinec (6378), 4.XII.2000, 2 ex. ex larva z větve *Viburnum* sp.; Bystřice nad Olší (6378), 6.II.2002, 2 ex. ex larva z vetvičky *Malus* sp.; Vendryně (6378), 15.XII.1998, 3 ex. ex larva z větve *Malus* sp.; 19.XII.1998, 1 ex. ex larva z větve *Malus* sp.; 15.XI.2001, 4 ex. ex larva z větvičky *Malus* sp.; vše R. Szopa leg., RSC.
Nehojný. Zatím pouze vychován z larev.

11. *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758)
Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6378, jako nález uskutečněný po roce 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 6.VII.1972, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; 15.VIII.1976, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Třinec (6377), 12.VII.1971, 1 ex. na trámu z *Picea abies*, J. Nežerka leg. et det., JNC; Bystřice nad Olší (6378), 6.VI.1998, 1 ex. na zemi - ráno, R. Szopa leg., RSC; 9.VII.1999, 2 ex. na světlo, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 29.VII.1993, 1 ex. na zemi, R. Szopa leg., RSC; 19.VII.1999, 1 ex. v letu - odpoledne, R. Szopa leg., RSC; Košařiska (6478), 9.VI.1993, 1 ex. v letu - večer, R. Szopa leg.
Nehojný, nalézán většinou v blízkosti lidských obydlí.

12. *Pronocera angusta* (Kriechbaum, 1844)
Materiál a pozorování: Milíkov (6378), 17.VIII.1998, 1 ex. v pavučině, R. Szopa leg., RSC; 8.XI.1998, staré požerky ve větvičkách *Picea abies*, R. Szopa observ., J. Vávra revid.
Velmi vzácný.

13. *Callidium violaceum* (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Navrátil (1975): Jablunkov (6478), 10.V.1968, 3 ex., B. Chytil leg.; Sláma (1998): udáván ze čtverců 6477-78, jako nálezy uskutečněné po roce 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 29.VII.1984, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Filipka (6378), 24.V.1999, 1 ex. na *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC; Bystřice nad Olší (6378), 10.V.1974, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; 11.V.1999, 2 ex. na zemi, R. Szopa leg., RSC; 15.X.1997, 2 ex. ex larva z větví *Larix decidua*, R. Szopa leg., RSC; 16.V.2001, 1 ex. v letu, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 24.V.1994, 12 ex. na metrech dříví, R. Szopa leg., RSC; 19.XII.1998, 1 ex. ex larva z kmene *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC; Vendryně (6378), 20.I.1995, 1 ex. ex larva z kmene *P. abies*, J. Nežerka leg. et det., JNC; Jablunkov (6478), 25.V.1981, 1 ex., M. Szmaragowská leg., MBFM; Košařiska (6478), 9.VI.1993, 1 ex. v letu - v poledne, R. Szopa leg., RSC; 27.V.2001, 1 ex. na metrech dříví, R. Szopa leg., RSC.

14. *Phymatodes testaceus* (Linnaeus, 1758)
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 2.VI.1996, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Třinec (6377),

20.VI.1955, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Bystřice nad Olší (6378), 21.VI.2001, 1 ex. na cestě, R. Szopa leg., RSC; Košařiska (6478), 6.V.1995, 16 ex. na polenech *Betula* sp., R. Szopa leg., RSC; 18.XI.1996, 2 ex. ex larva z polen *Betula* sp., R. Szopa leg., RSC.

15. ***Anaglyptus mysticus*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 20.VI.1974, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; 14.VI.1997, 1 ex. na *Tilia* sp., J. Nežerka leg. et det., JNC.
Vzácný.

16. ***Chlorophorus figuratus*** (Scopoli, 1763)
Literární údaj: Letzner (1871): udáván z lokality Těšín (6277).
Materiál: Ostrý (6478), 27.V.1977, 1 ex., F. Petřík leg., O. Sabol det., MBFM.
Velmi vzácný, recentně nepotvrzený.

17. ***Clytus arietis*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný do roku 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 19.VII.1990, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Bystřice nad Olší (6378), 4.II.2000, 1 ex. ex pupa z větvičky *Sarothamnus scoparius*, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 24.V.1994, 2 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC.
Vzácný.

18. ***Clytus lama*** Mulsant, 1847
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy, Wanka leg.
Materiál a pozorování: Bystřice nad Olší (6378), 4.II.2000, 1 ex. ex larva z větve *Larix decidua*; Milíkov (6378), 5.III.1997, 1 ex. ex larva z pařezu *Picea abies*; 10.VI.1998, 5 ex. na *P. abies*; Košařiska (6477), 5.VII.1994, 2 ex. na kládách *Fagus sylvatica*; vše R. Szopa leg., RSC.
Nehojný.

19. ***Oxymirus cursor*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverců 63-6477, jako nálezy uskutečněné po roce 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 15.VI.1971, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC ; 11.V.1973, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; 22.VI.1994, 15 ex. na pařezech *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC; Košařiska (6477), 4.VI.1972, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; Kozubová (6478), 15.VI.1970, 1 ex., E. Burša leg., MBFM.
Lokální, avšak ve vyšších polohách místy hojný.

20. ***Rhagium inquisitor inquisitor*** (Linnaeus, 1758)
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 15.VI.1968, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; 26.VI.1977, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; Bystřice nad Olší (6378), 17.IV.2002, 1 ex. na zemi, R. Szopa leg., RSC; Karpentná (6378), 27.V.1999, 2 ex. na pařezech *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC;

29.IX.2001, 2 ex. v pařezu *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; Vendryně (6378), 24.IV.1999, 1 ex. na kládě *Pinus sylvestris*, R. Szopa observ.; Košařiska (6478), 4.VI.1972, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; 13.VI.1994, 10 ex. na *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC.

21. *Rhagium mordax* (De Geer, 1775)
Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný po roce 1959.
Materiál a pozorování:Ostrý (6377), 19.V.1974, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; 26.VI.1995, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; Jahodná (6378), 11.V.1999, 1 ex. na pařezu *Picea abies*, R. Szopa observ.; 4.V.2001, 1 ex. v letu - v poledne, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 24.V.1994, 11 ex. na kládách *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; Třinec (6378), 1.IV.1997, 2 ex. pod kůrou pařezu *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; 7.IX.2000, 2 ex. pod kůrou *Larix decidua*, R. Szopa leg., RSC; Velká Čantoryje (6378), 4.X.2001, 2 ex. v kládě *Abies alba*, R. Szopa leg., RSC; Bukovec (6478), 4.VI.1999, 2 ex. na květech *Crataegus* sp., R. Szopa leg., RSC; Písek (6478), 1.VIII.1978, 1 ex., V. Šušák leg., MBFM.

22. *Rhagium bifasciatum* (Fabricius, 1775)
Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverců 63-6477, jako nálezy uskutečněné po roce 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 1.VII.1978, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; 22.VI.1994, 10 ex. na pařezech *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 23.XI.1996, 1 ex. v pařezu *Picea abies*, R. Szopa observ.; 16.III.1997, 1 ex. v pařezu *P. abies*, R. Szopa observ.; Velká Čantoryje (6378), 4.X.2001, 4 ex. v kládě *Abies alba*, R. Szopa leg., RSC; Bukovec (6478), 4.VI.1999, 1 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa observ.; Košařiska (6478), 5.VII.1994, 1 ex. na kládě *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC; 25.IV.1996, 1 ex. na listech *Betula* sp., R. Szopa leg., RSC.

23. *Pachyta quadrimaculata* (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Navrátil (1975): Jablunkov (6478), 25.VI.1967, 5 ex., B. Chytil leg.; 15.VII.1969, 1 ex., B. Bubeník leg.
Velmi vzácný, recentně nepotvrzený.

24. *Evodinus clathratus* (Fabricius, 1792)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Navrátil (1975): Jablunkov (6478), 25.VI.1967, 4 ex., 2.VII.1967, 1 ex., vše B. Chytil leg.; Sláma (1998): udáván ze čtverců 63-6477, jako nálezy uskutečněné po roce 1959.
Materiál a pozorování: Košařiska (6477), 13.VI.1994, 10 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Ostrý (6477), 22.VI.1994, 1 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 13.VII.1997, 1 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Dolní Lomná (6478), 15.VI.2000, 1 ex. na květu Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Košařiska (6478), 4.VI.1972, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC.
Nehojný, spíše ve vyšších polohách.

25. *Carilia virginea virginea* (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný po roce 1959.

Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 14.VI.1997, 1 ex. ve feromonovém lapáku na kůrovce, K. Nežerka leg., J. Nežerka det., JNC; Milíkov (6378), 24.V.1994, 15 ex. na květech *Sorbus* sp., R. Szopa leg., RSC; Návsí (6378), 28.VII.1999, 2 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa observ.; Nýdek (6378), 27.V.1999, 3 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Vendryně (6378), 22.V.1999, 2 ex. oklepem z *Crataegus* sp., R. Szopa observ.; Bukovec (6478), 4.VI.1999, 5 ex. na květech *Crataegus* sp., R. Szopa leg., RSC; Dolní Lomná (6478), 27.VI. 1999, 4 ex. na květech *Aruncus* sp., R. Szopa leg., RSC; Girová (6478), 9.VII.1995, 4 ex., J. Káňa leg. et det., JKC; Písek (6478), 23.VI.1989, 2 ex., J. Polášek leg., MBFM.

26. ***Pidonia lurida*** (Fabricius, 1792)
Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný po roce 1959.
Materiál a pozorování: Bystřice nad Olší (6378), 27.V.1999, 2 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 24.V.1994, 15 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Návsí (6378), 28.VII.1999, 1 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa observ.; Bukovec (6478), 4.VI.1999, 1 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa observ.; Dolní Lomná (6478), 27.VI.1999, 2 ex. na květech *Aruncus* sp., R. Szopa leg., RSC.

27. ***Grammoptera ruficornis*** (Fabricius, 1781)
Literární údaje: Navrátil (1975): Jablunkov (6478), 25.VI.1967, 1 ex., 2.VII.1967, 2 ex., vše B. Chytil leg.
Materiál a pozorování: Bystřice nad Olší (6378), 13.V.2001, 1 ex. na *Crataegus* sp.; 6.VI.2001, 1 ex. smýkáním; Filipka (6378), 24.V.1999, 1 ex. na květech *Crataegus* sp.; Milíkov (6378), 3.VI.1997, 3 ex. na květech Apiaceae; 8.VI.1997, 7 ex. na květech Apiaceae; Třinec (6378), 4.XII.2000, 1 ex. ex larva z větve *Viburnum* sp.; Vendryně (6378), 22.V.1999, 7 ex. na květech *Crataegus* sp.; Košařiska (6477), 11.V.1994, 10 ex. na květech Apiaceae; Bukovec (6478), 4.VI.1999, 1 ex. na květech *Crataegus* sp.; vše R. Szopa leg., RSC.

28. ***Alosterna tabacicolor tabacicolor*** (De Geer, 1775)
Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný do roku 1959 a ze čtverce 6478, jako nález uskutečněný po roce 1959.
Materiál a pozorování: Milíkov (6378), 4.VII.1997, 1 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 29.VI.2000, 1 ex. na *Tilia* sp., R. Szopa leg., RSC; Návsí (6378), 28.VII.1999, 1 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa observ.; Bukovec (6478), 4.VI.1999, 1 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC.
Nehojný.

29. ***Pseudovadonia livida livida*** (Fabricius, 1776)
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 15.VIII.1974, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; Bystřice nad Olší (6378), 19.VI.2000, 1 ex. na *Achillea* sp., R. Szopa leg., RSC; 16.VI.2001, 1 ex. smýkáním, R. Szopa leg., RSC; Košařiska (6477), 13.VI.1994, 2 ex. na *Achillea* sp., R. Szopa leg., RSC; Girová (6478), 9.VII.1995, 1 ex., J. Káňa leg. et det., JKC; Mosty u Jablunkova (6478), 20.VI.1994, 2 ex., M. Szmaragowská leg., J. Stanovský det., MBFM.
Nehojný.

30. ***Lepturobosca virens*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Navrátil (1975): Jablunkov (6478), 6.VII.1969, 1 ex., B. Chytil leg.
Velmi vzácný, recentně nepotvrzený.

31. ***Judolia sexmaculata*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný po roce 1959.
Materiál a pozorování: Košařiska (6477), 5.VII.1994, 2 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Girová (6478), 9.VII.1995, 1 ex., J. Káňa leg. et det., JKC.
Vzácný a lokální, vázaný na zachovalé horské biotopy.

32. ***Pachytodes cerambyciformis*** (Schrank, 1781)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverce 6377, jako nález uskutečněný po roce 1959, a ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný do roku 1959.
Materiál a pozorování: Milíkov (6378), 4.VII.1997, 10 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 11.VII.1997, 19 ex. na květech *Aruncus* sp., R. Szopa leg., RSC; Návsí (6378), 28.VII.1999, 28 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa observ.; Nýdek (6378), 18.VI.1972, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; Košařiska (6477), 13.VI.1994, 4 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 5.VII.1994, 1 ex., R. Szopa leg., RSC; Bukovec (6478), 4.VI.1999, 1 ex. na květu *Leucanthemum* sp., R. Szopa leg., RSC; Dolní Lomná (6478), 27.VI.1999, 2 ex. na květech *Aruncus* sp., R. Szopa leg., RSC; Girová (6478), 9.VII.1995, 5 ex., J. Káňa leg. et det., JKC; Jablunkov (6478), 28.VII.1999, 36 ex. na různých květech, R. Szopa observ.; Košařiska (6478), 12.VII.1997, 14 ex. na různých květech, R. Szopa leg., RSC; Mosty u Jablunkova (6478), 19.VII.1999, 3 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC.

33. ***Anastrangalia dubia*** (Scopoli, 1763)
Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverců 63-6477 a 6478, jako nálezy uskutečněné po roce 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 15.VIII.1974, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Milíkov (6378), 24.V.1994, 1 ex. na květu Apiaceae, R. Szopa leg., RSC, Návsí (6378), 28.VII.1999, více ex. na různých květech, R. Szopa observ.; Košařiska (6477), 13.VI.1994, 4 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 5.VII.1994, 1 ex., R. Szopa leg., RSC; Dolní Lomná (6478), 27.VI.1999, 2 ex. na květu *Aruncus* sp., R. Szopa leg., RSC; Girová (6478), 9.VII.1995, 3 ex., J. Káňa leg. et det., JKC; Jablunkov (6478), 28.VII.1999, 1 ex. na květu Apiaceae, R. Szopa observ.; Košařiska (6478), 12.VII.1994, 2 ex. na květu Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Mosty u Jablunkova (6478), 19.VII.1999, 4 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Písek (6478), 25.VII.1999, 1 ex., J. Káňa leg. et det., JKC.

34. ***Anastrangalia sanguinolenta*** (Linnaeus, 1761)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný po roce 1959.

Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 5.VIII.1973, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; Dolní Lomná (6478), 15.VI.2000, 1 ex. na Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Girová (6478), 9.VII.1995, 2 ex., J. Káňa leg. et det., JKC; Jablunkov (6478), 4.VII.1994, 1 ex., M. Szmaragowská leg., J. Stanovský det., MBFM; Košařiska (6478), 5.VII.1994, 5 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 12.VII.1994, 1 ex., R. Szopa leg., RSC; 13.VI.1994, 1 ex., R. Szopa leg., RSC; Mosty u Jablunkova (6478), 19.VII.1999, 4 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC.

35. ***Corymbia rubra*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverců 6377-78, jako nálezy uskutečněné po roce 1959, a ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný do roku 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 15.VIII.1976, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; Jahodná (6378), 20.VII.1999, 1 ex., R. Szopa leg., RSC; Karpentná (6378), 2.IX.1998, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Návsí (6378), 28.VII.1999, 26 ex. na různých květech, R. Szopa observ.; Dolní Lomná (6478), 23.VIII.2000, 1ex. na květu Apiaceae, R. Szopa observ.; Jablunkov (6478), 28.VII.1999, 29 ex. na různých květech, R. Szopa observ.; 18.VIII.1993, 2 ex. na *Urtica* sp., M. Szmaragowská leg., J. Stanovský det., MBFM; Košařiska (6478), 12.VII.1993, 1 ex., R. Szopa leg., RSC; 12.VII.1997, 1 ex. na květu Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 30.VII.1997, 10 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 19.VII.1961, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; Mosty u Jablunkova (6478), 19.VII.1999, 19 ex. na různých květech, R. Szopa observ.; Písek (6478), 25.VII.1999, 1 ex., J. Káňa leg. et det., JKC.

36. ***Brachyleptura tesserula tesserula*** (Charpentier, 1825)
Literární údaje: Fleischer (1927-1930): udáván z lokality Javorový (6377); Heyrovský (1930): udáván z lokalit Čantoria (6378) a Javorový (6377) u Těšína, Kliment leg.
Velmi vzácný, recentně nepotvrzený.

37. ***Brachyleptura maculicornis maculicornis*** (De Geer, 1775)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverce 6377, jako nález uskutečněný po roce 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 16.VII.1971, 1ex., F. Petřík leg., MBFM; Bystřice nad Olší (6378), 27.V.1999, 1 ex. na květu Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 15.VII.1994, 1 ex. na květu *Leucanthemum* sp., R. Szopa leg., RSC; Nýdek (6378), 6.IX.1975, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; Košařiska (6478), 19.VI.1972, 1 ex., F. Petřík leg., MBFM; Jablunkov (6478), 15.VII.1982, 1 ex., M. Szmaragowská leg., MBFM; Milíkov (6478), 19.VII.1972, 3 ex., F. Petřík leg., MBFM; Písek (6478), 25.VII.1999, 1 ex., J. Káňa leg. et det., JKC.
Nehojný.

38. ***Leptura quadrifasciata quadrifasciata*** Linnaeus, 1758
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverce 6377, jako nález uskutečněný po roce 1959, a ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný do roku 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 15.VIII.1985, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; 5.VIII.1990, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Milíkov (6378), 13.VII.1993, 2 ex. na květech Apiaceae, R.

Szopa leg., RSC; Návsí (6378), 28.VII.1999, 1 ex. na květu Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Dolní Lomná (6478), 23.VIII.2000, 3 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa observ.; Jablunkov (6478), 28.VII.1999, 2 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 15.VII.1982, 1 ex., M. Roháčová leg., MBFM; Košařiska (6478), 5.VII.1994, 11 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; 1.IX.1997, 1 ex., R. Szopa leg., RSC; 5.VIII.1998, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Písek (6478), 25.VII.1999, 2 ex., J. Káňa leg. et det., JKC.

39. ***Rutpela maculata*** (Poda, 1761)
Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6377, jako nález uskutečněný po roce 1959, a ze čtverce 6477, jako nález uskutečněn do roku 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 31.VII.1972, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; Třinec (6377), 2.VII.1963, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; Milíkov (6378), 11.VII.1997, 4 ex. na květech Apiaceae, R. Szopa leg., RSC; Návsí (6378), 28.VII.1999, 31 ex. na různých květech, R. Szopa observ.; Dolní Lomná (6478), 27.VI.1999, 3 ex. na květech *Aruncus* sp., R. Szopa leg., RSC; 23.VIII.2000, 1 ex. na květu Apiaceae, R. Szopa observ.; Jablunkov (6478), 28.VII.1999, 17 ex. na různých květech, R. Szopa observ.; Košařiska (6478), 5.VII.1994, 8 ex., R. Szopa leg., RSC.

40. ***Stenurella melanura*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6377, jako nález uskutečněný po roce 1959, a ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný do roku 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 27.VI.1976, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Třinec (6377), 1.VII.1963, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; Karpentná (6378), 1.VII.1963, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; Milíkov (6378), 4.VII. 1997, 18 ex. na květech *Aruncus* sp., R. Szopa leg., RSC; 11.VII.1997, 11 ex. na různých květech, R. Szopa leg., RSC; Návsí (6378), 28.VII.1999, 27 ex. na různých květech, R. Szopa observ.; Dolní Lomná (6478), 27.VI.1999, 2 ex. na *Achillea* sp., R. Szopa leg., RSC; Jablunkov (6478), 28.VII.1999, 36 ex. na různých květech, R. Szopa observ.; Girová (6478), 9.VII.1995, 2 ex., J. Káňa leg. et det., JKC; Mosty u Jablunkova (6478), 19.VII.1999, 19 ex. na různých květech, R. Szopa observ.

41. ***Monochamus sartor*** (Fabricius, 1787)
Literární údaje: Fleischer (1927-1930): udáván z lokality Beskydy; Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 15.VII.1973, 2 ex. na kládě *Picea abies*, J. Nežerka leg., JNC.
Velmi vzácný, recentně nepotvrzený.

42. ***Monochamus sutor*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverců 6377-78 a 6477, jako nálezy uskutečněné po roce 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 15.VIII.1974, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; 25.VII.1977, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; 31.VII.1994, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Milíkov (6378), 15.VII.1995, 1 ex. v letu - dopoledne, R. Szopa leg., RSC; Košařiska (6477),

13.VI.1994, 20 ex. na kládách *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC; 12.VII.1994, 10 ex. na kládách *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; 30.VII.1997, 1 ex. na kládě *P. abies*, R. Szopa leg., RSC; Dolní Lomná (6478), 17.VIII.1989, 1 ex., J. Polášek leg., I. Rychlík det., MBFM; Jablunkov (6478), 15.VII.1982, 1 ex., M. Szmaragowská leg., MBFM.

Lokální, na zachovalých lokalitách místy hojný.

43. ***Mesosa curculionoides*** (Linnaeus, 1761)

Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6378, jako nález uskutečněný do roku 1959.

Recentně nepotvrzený.

44. ***Anaesthetis testacea*** (Fabricius, 1781)

Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6378, jako nález uskutečněný do roku 1959.

Recentně nepotvrzený.

45. ***Agapanthia villosoviridescens*** (De Geer, 1775)

Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 21.VI.1972, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; 5.VII.1993, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; 7.VI.1997, 1 ex., J. Nežerka leg. et det., JNC; Třinec (6377), 11.VI.1996, 1 ex. ve vodě, J. Nežerka leg. et det., JNC; Milíkov (6378), 20.V.1993, 13 ex. na *Urtica* sp., R. Szopa leg., RSC; Dolní Lomná (6478), 22.VI.2000, 1 ex. na *Urtica* sp., R. Szopa leg., RSC; Košařiska (6478), 11.V.1993, 10 ex. na *Urtica* sp., R. Szopa leg., RSC; Mosty u Jablunkova (6478), 13.VII.1994, 1 ex., M. Szmaragowská leg., J. Stanovský det., MBFM.

46. ***Pogonocherus ovatus*** (Goeze, 1777)

Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný do roku 1959.

Materiál a pozorování: Vendryně (6378), 17.XII.1998, 2 ex.; Košařiska (6478), 2.I.1999, 2 ex.; 10.I.1999, 2 ex.; 8.III.2002, 1 ex.; vše pod borkou *Abies alba*, R. Szopa leg., RSC.

Vzácný a velmi lokální. Nalézán v podzimních až jarních měsících pod borkou živých kmenů jedlí (*Abies alba*).

47. ***Tetrops*** cf. ***praeusta*** (Linnaeus, 1758)

Materiál a pozorování: Bystřice nad Olší (6378), 24.V.1999, 4 ex. na *Salix* sp.; 21.I.2001, 7 ex. ex pupa z větví *Frangula alnus*; Vendryně (6378), 15.XII.1998, 2 ex. ex larva z větví *Malus* sp.; 22.V.1999, 3 ex. oklepem *Malus* sp.; vše R. Szopa leg., RSC.

Nehojný. Pravděpodobně se jedná o dva druhy, které je zatím možné rozlišit jen na základě studia morfologie larev (viz Švácha 2001).

48. ***Acanthoderes clavipes*** (Schrank, 1781)

Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy.

Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 5.VII.1993, 1 ex., J. Nežerka leg., JNC; 3.VII.1994, 1 ex., J. Nežerka leg., JNC; 31.VII.1994, 1 ex., J. Nežerka leg., JNC; Ostrý (6477), 22.VI.1994, 1 ex. na kládě *Fagus sylvatica*, R. Szopa leg., RSC; Košařiska (6478), 30.VII.1997, 1 ex. na kládě *F. sylvatica*, R. Szopa leg., RSC.

Nehojný a lokální, vyskytující se na zachovalých horských lokalitách.

49. ***Acanthocinus griseus griseus*** (Fabricius, 1792)
Literární údaje: Nohel (1977): Kalužný (6477), 12.VII.1973, 1 ex. na kmeni *Abies alba*, P. Nohel leg.; Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný po roce 1959.
Materiál a pozorování: Horní Líštná (6378), 17.III.1999, 10 ex. ex larva z padlého kmene *Picea abies*, R. Szopa leg., RSC.
Vzácný a lokální.

50. ***Leiopus nebulosus*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný po roce 1959.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 15.VIII.1974, 1 ex., K. Nežerka leg. et det., JNC; Bystřice nad Olší (6378), 17.I.1998, 1 ex. ex larva z kmene *Salix* sp., R. Szopa leg., RSC; 1.XI.1998, 11 ex. ex larva z větve *Alnus* sp., R. Szopa leg., RSC; 24.IV.2002, 2 ex. ex pupa z větve *Carpinus betulus*, R. Szopa leg., RSC; Kozinec (6378), 21.VI.1975, 1 ex., J. Skopal leg. et det., JNC; Milíkov (6378), 8.XI.1998, 3 ex. ex larva z kmene *Salix* sp., R. Szopa leg., RSC.

51. ***Saperda populnea*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný po roce 1959.
Materiál a pozorování: Hrádek (6378), 24.V.1999, 3 larvy v *Populus tremula*, R. Szopa observ.; Jahodná (6378), 14.I.2000, 1 ex. ex larva z *P. tremula*, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 8.XI.1998, 1 ex. ex larva z větve *P. tremula*, R. Szopa leg., RSC; Bukovec (6478), 4.VI.1999, 2 larvy v *P. tremula*, R. Szopa observ.; Košařiska (6478), 1.IX.1997, 2 ex. ex larva z větví *P. tremula*, R. Szopa leg., RSC.
Nehojný a lokální.

52. ***Saperda scalaris*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy.
Materiál a pozorování: Ostrý (6377), 12.VII.1985, 1 ex. na *Tilia* sp., J. Nežerka leg. et det., JNC; 10.VII.1992, 1 ex. na *Tilia* sp., J. Nežerka leg. et det., JNC; Bystřice nad Olší (6378), 17.I.1998, 2 ex. ex larva z kmene *Salix* sp., R. Szopa leg., RSC.
Nehojný.

53. ***Saperda carcharias*** (Linnaeus, 1758)
Materiál a pozorování: Bystřice nad Olší (6378), 27.V.1999, 2 larvy v *Populus tremula*, R. Szopa observ.; Košařiska (6378), 1.IX.1997, 1 ex. na *P. tremula*, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 1.IX.1997, larvy v *P. tremula*, R. Szopa observ.; Jablunkov (6478), 22.VII.1988, 2 ex., M. Szmaragowská leg., J. Polášek det., MBFM.
Nehojný a lokální.

54. ***Stenostola dubia*** (Laicharting, 1784)
Materiál a pozorování: Bystřice nad Olší (6378), 3.I.1999, 3 ex.; Hrádek (6378), 1.IV.1999, 1 ex.; vše ex larva z větve *Tilia* sp., R. Szopa leg., RSC.
Nehojný.

55. *Oberea linearis* (Linnaeus, 1761)
Materiál a pozorování: Bystřice nad Olší (6378), 28.I.2000, larva ve větvičce *Corylus avellana*, R. Szopa observ.; 10.III.2001, larva ve větvičce *C. avellana*, R. Szopa observ.; Horní Líštná (6378), 9.IV.1993, 2 larvy ve větvičce *C. avellana*, J. Vávra observ.; Jahodná (6378), 14.I.2000, 3 ex. ex larva z větviček *C. avellana*, R. Szopa leg., RSC; Milíkov (6378), 11.XI.1999, 13 larev ve větvičkách *C. avellana*, J. Vávra & R. Szopa observ.; 15.I.2000, larva ve větvičce *C. avellana*, R. Szopa leg.

Nehojný, lokální a často přehlížený druh, vyvíjející se ve velmi tenkých živých větvičkách *C. avellana*.

56. *Oberea oculata* (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverce 6377, jako nález uskutečněný po roce 1959.
Materiál a pozorování: Bystřice nad Olší (6378), 27.VIII.1998, 1 ex. na *Salix* sp., R. Szopa leg., RSC; Jahodná (6378), 20.VII.1999, 1 ex., na *Salix* sp., R. Szopa leg., RSC; Nýdek (6378), 27.V.1999, 2 larvy v *Salix* sp., R. Szopa observ.; Bukovec (6478), 4.VI.1999, 3 larvy v *Salix* sp., R. Szopa observ.; Girová (6478), 15.II.1999, larva v *Salix* sp., R. Szopa observ.; Košařiska (6478), 12.VII.1997, 3 ex. na *Salix* sp., R. Szopa leg., RSC; Mosty u Jablunkova (6478), 19.VII.1999, 2 ex. na *Salix* sp., R. Szopa leg., RSC.

57. *Oberea pupillata* (Gyllenhal, 1817)
Materiál a pozorování: Dolní Lomná (6478), 15.VI.2000, 1 ex. na listech *Lonicera nigra*, R. Szopa leg., RSC.

Velmi vzácný.

58. *Oberea erythrocephala* (Schrank, 1776)
Materiál a pozorování: Bystřice nad Olší (6378), 19.VI.2000, 9 ex.; 15.VI.2001, 2 ex.; 16.VI. 2001, 6 ex.; vše na *Euphorbia* sp., R. Szopa leg., RSC.

Nehojný, vyskytující se na lokalitách teplejšího charakteru.

DRUHY NALEZENÉ V OKOLÍ SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ

1. *Anisarthron barbipes* (Schrank, 1781)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy.

2. *Asemum striatum* (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný do roku 1959.
Materiál a pozorování: Horní Lomná (6477), 29.V.1999, 1 ex. pod kládou *Picea abies*, J. Káňa leg. et det., JKC.

3. *Rhopalopus ungaricus* (Herbst, 1784)
Literární údaj: Fleischer (1927-1930): udáván z lokality Těšínské Slezsko, na planých růžích, Reitter leg.

4. ***Semanotus undatus*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy.

5. ***Phymatodes rufipes*** (Fabricius, 1776)
Literární údaj: Sláma (1998): uvádí údaj Heyrovského - Těšín (6277), Letzner leg.

6. ***Xylotrechus pantherinus*** (Savenius, 1825)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Těšín (6277), Fleischer leg.

7. ***Xylotrechus rusticus*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Těšín (6277).

8. ***Isotomus speciosus*** (Schneider, 1787)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Těšín (6277).

9. ***Necydalis maior*** Linnaeus, 1758
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Těšín (6277).

10. ***Rhamnusium bicolor bicolor*** (Schrank, 1781)
Literární údaje: Reitter (1870): udáván z lokality Těšín (6277), vzácně na topolech, Kotula leg.; Letzner (1871): udáván z lokality Těšín (6277); Fleischer (1927-1930): udáván z okolí Těšína (6277), jako hojný druh.

11. ***Stenocorus meridianus*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Reitter (1870): udáván z lokality Těšín (6277); Sláma (1998): udáván ze čtverce 6277, jako nález uskutečněný do roku 1959.

12. ***Rhagium sycophanta*** (Schrank, 1781)
Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6277, jako nález uskutečněný do roku 1959.

13. ***Pachyta lamed lamed*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaj: Fleischer (1927-1930): udáván z lokality Beskydy.

14. ***Nivellia sanguinosa*** (Gyllenhal, 1827)
Literární údaj: Fleischer (1927-1930): udáván z lokality Beskydy.

15. ***Pachytodes erraticus*** (Dalman, 1817)
Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6277, jako nález uskutečněný do roku 1959.

16. ***Leptura aethiops*** Poda, 1761
Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6477, jako nález uskutečněný po roce 1959.

17. ***Stictoleptura scutellata scutellata*** (Fabricius, 1781)
Literární údaj: Navrátil (1975): Horní Lomná (6477), 8.VII.1967, 6 ex., B. Chytil leg.

18. ***Leptura arcuata*** Panzer, 1793
Literární údaje: Reitter (1870): udáván z lokality Těšínské pohoří jako vzácný; Letzner (1871): udáván z lokality Těšínské pohoří; Heyrovský (1930): udáván z lokality Těšínské pohoří.

19. ***Strangalia attenuata*** (Linnaeus, 1758)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy.

20. ***Monochamus galloprovincialis pistor*** (Germar, 1818)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy, Letzner leg.

21. ***Mesosa nebulosa*** (Fabricius, 1781)
Literární údaje: Reitter (1870): udáván z lokality Těšínské pohoří, Fleischer a Kotula leg.; Letzner (1871): udáván z lokality Těšínské pohoří; Heyrovský (1930): udáván z lokality Těšínské pohoří.

22. ***Oplosia fennica fennica*** (Paykull, 1800)
Literární údaj: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6277, jako nález uskutečněný do roku 1959.

23. ***Pogonocherus hispidulus*** (Piller et Mitterpacher, 1783)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy.

24. ***Acanthocinus reticulatus*** (Razoumovsky, 1789)
Literární údaje: Nohel (1977): Mionší (6478), 1.XI.1964, více ex.; 15.XI.1964, více ex. (3 ex. in MBFM, R. Szopa revid.); 17.XI.1969, 1 ex.; 18.XI.1970, 1 ex.; vše pod borkou *Abies alba*, P. Nohel leg.

25. ***Leiopus punctulatus*** (Paykull, 1800)
Literární údaje: Reitter (1870): udáván z lokality Těšínské pohoří, Fleischer a Kotula leg.; Letzner (1871): udáván z lokality Těšínské pohoří; Heyrovský (1930): udáván z lokality Těšínské pohoří, Letzner leg.

26. ***Exocentrus stierlini*** Ganglbauer, 1883
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Slezské Beskydy.

27. ***Saperda perforata*** (Pallas, 1773)
Literární údaje: Reitter (1870): udáván z lokality Těšín (6277), Fleischer leg.; Letzner (1871): udáván z lokality Těšín (6277); Fleischer (1927-1930): udáván z okolí Těšína (6277), na osikách *Populus tremula* kolem silnic, A. Fleischer leg.

28. ***Saperda punctata*** (Linnaeus, 1767)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy, Kamberský leg.

29. ***Saperda similis*** (Laicharting, 1784)
Literární údaj: Sláma (1998): uvádí údaj Letznera - Těšín (6277).

30. *Stenostola ferrea ferrea* (Schrank, 1776)
Literární údaje: Reitter (1870): udáván z lokality Těšínské pohoří; Letzner (1871): udáván z lokality Těšín (6277); Heyrovský (1930): udáván z lokality Těšín (6277); Sláma (1998): udáván ze čtverce 6277, jako nález uskutečněný do roku 1959.

31. *Phytoecia cylindrica* (Linnaeus, 1758)
Literární údaje: Heyrovský (1930): udáván z lokality Těšín (6277); Sláma (1998): udáván ze čtverce 6277, jako nález uskutečněný do roku 1959.

32. *Phytoecia uncinata* (W. Redtenbacher, 1842)
Literární údaj: Fleischer (1927-1930): udáván z okolí Těšína (6277), A. Fleischer leg.
Podle mého názoru mohlo u tohoto nálezu dojít k chybné determinaci, kdy mohl být tento druh zaměněn za černě zbarvený exemplář druhu *Phytoecia coerulescens* (Scopoli, 1763).

33. *Phytoecia nigripes nigripes* (Voët, 1778)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy, Stejskal leg.

34. *Phytoecia icterica* (Schaller, 1783)
Literární údaj: Heyrovský (1930): udáván z lokality Beskydy.

SOUHRN

Na zkoumaném území bylo dosud zjištěno celkem 58 druhů tesaříků ve 44 rodech, 19 tribech a 5 podčeledích, což představuje cca 28% z celkového počtu 209 druhů žijících v České republice (Sláma 1998). V blízkosti sledovaného území bylo zjištěno dalších 34 druhů. Výskyt většiny druhů, známých dosud jen ze starších literárních údajů, však bude potřeba ověřit a potvrdit novými nálezy. Pro sledované území považuji z faunistického hlediska za nejzajímavější nálezy druhů: *Tetropium fuscum* (Fabricius, 1787), *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839), *Molorchus umbellatarum* (Schreber, 1759), *Pronocera angusta* (Kriechbaum, 1844), *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763), *Judolia sexmaculata* (Linnaeus, 1758), *Monochamus sartor* (Linnaeus, 1758), *Pogonocherus ovatus* (Goeze, 1777), *Tetrops* cf. *praeusta* (Linnaeus, 1758), *Saperda scalaris* (Linnaeus, 1758), *S. carcharias* (Linnaeus, 1758), *Stenostola dubia* (Laicharting, 1784), *Oberea linearis* (Linnaeus, 1761), *O. pupillata* (Gyllenhal, 1817) a *O. erythrocephala* (Schrank, 1776). Z bionomického hlediska je zajímavý nález druhu *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758) v ležící kládě *Fagus sylvatica* na lokalitě Ostrý (1044 m). Pozoruhodný je také nález velmi vzácného druhu *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839). Tento druh je z území Moravy recentně doložen pouze z pohoří Jeseníku a z Krnova (Sláma 1998). Nejzajímavějším údajem je ze zoogeografického pohledu nález teplomilného druhu *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763) na úbočí lokality Ostrý. Tento druh je sice z Moravy znám, ale vyskytuje se hlavně v teplých oblastech lesostepního a stepního charakteru. Výskyt tohoto druhu v Beskydech by bylo vhodné doložit dalšími nálezy.

Přestože v této práci jsou uvedeny veškeré zjištěné údaje o výskytu tesaříků ve sledovaném území, není přehled druhů definitivně uzavřen. Jsou zde samozřejmě možné nálezy dalších druhů, zejména těch, jejichž bionomie je dosud málo známá a bývají často přehlíženy.

PODĚKOVÁNÍ. Děkuji kolegům Jiřímu Nežerkovi, Miroslavu Folwarcznému a Jiřímu Káňovi za poskytnutí faunistických údajů, paní Magdaleně Roháčové za zpřístupnění sbírky uložené v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Za připomínky k rukopisu děkuji Janu Vitnerovi (Praha) a Jiřímu Stanovskému (Ostrava), kterému vděčím i za zapůjčení literatury, a Petru Kočárkovi (Ostrava) za jazykový překlad. Zvláštní poděkování bych chtěl věnovat Jiřímu Vávrovi (Ostrava) za poskytnuté informace a kritické připomínky k celkovému pojetí tohoto příspěvku.

LITERATURA

ALTHOFF J. & DANILEVSKY M. L. 1997: *Seznam kozličev (Coleoptera, Cerambycoidea) Evrope. A Check-list of longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycoidea) of Europe*. Slovensko Entomol. Društvo Štefana Michielija, Ljubljana, 64 pp (in Slovenian and English).

ANONYMUS 1998: *Autoatlas Česká republika a Slovenská republika 1:200 000*. Geodezie Brno, Brno, 260 mp (in Czech).

ANONYMUS 1998: *Moravskoslezské Beskydy. Turistická mapa 1:50 000*. SHOCart, Zlín, 1 mp (in Czech).

DEMEK J. (ed.) 1987: *Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny*. Academia, Praha, 584 pp (in Czech).

FLEISCHER A. 1927-1930: *Přehled brouků fauny Československé republiky*. Moravské museum zemské, Brno, 485 pp (in Czech).

HEYROVSKÝ L. 1930: *Seznam brouků republiky Československé 1. Cerambycidae. Entomologické příručky 15. (Verzeichnis der Cerambyciden der Tschechoslow. Republik)*. Čs. společ. entomol., Praha, 61 pp (in Czech, German summary).

KOČÁREK P., HUDEČEK J. & ŠUHAJ J. 1995: Rozšíření a bionomie Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) ve Slezsku a na severní Moravě (Coleoptera, Cerambycidae). (Distribution and biology of Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) in Silesia and northern Moravia (Coleoptera, Cerambycidae). *Čas. Slez. Muz. Opava (A)*, 44: 241-249 (in Czech, English abstr.).

LETZNER K. 1871: *Verzeichnis der Käfer Schlesiens*. J. Hoffmann, Breslau, xxiv + 328 pp.

NAVRÁTIL M. 1975: Příspěvek k poznání čeledi Cerambycidae v Moravskoslezských Beskydách. *Pobeskydí, Metodický Zpravodaj VÚ Frýdek-Místek*, 2: 19-39 (in Czech).

NOHEL P. 1977: Nálezy vzácných tesaříků v Beskydách. *Těšínsko*, 2: 19 (in Czech).

PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana*, 32 (Suppl.): 1-115 (in Czech, English abstr.).

REITTER E. 1870: *Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien*. Verlag des Naturforsch. Ver. Brünn, Brünn, vii + 195 pp.

SLÁMA M. 1993: Cerambycidae, pp. 119-123. In: JELÍNEK J.(ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Fol. Heyrovskyana*, Suppl. 1: 3-172 (in English and Czech).

SLÁMA M. E. F. 1998: *Tesaříkovití (Coleoptera – Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky. (Bockkäfer (Coleoptera – Cerambycidae) der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik)*. M. Sláma, Krhanice, 383 pp (in Czech, German introduction).

ŠVÁCHA P. 2001: 17. Überfamilie: Chrysomeloidea, 114. Familie: Cerambycidae, 7. Unterfamilie: Lamiinae, pp. 248-298. In: KLAUSNITZER B. (ed.): *Die Larven der Käfer Mitteleuropas. 6. Band: Polyphaga, Teil 5*. Spektrum Akademische Verlag, Heidelberg – Berlin, 309 pp.

VYSOKÝ V. 1993: Příspěvek k výskytu tesaříků Beskyd (Coleoptera, Cerambycidae). (Der Beitrag zum Vorkommen von Bockkäfern in Beskydy (Coleoptera, Cerambycidae). *Práce a Stud. Muz. Beskyd*, 8: 193-199 (in Czech, German summary).

SUMMARY

Cerambycidae found in the Jablunkovská brázda valley and its environs (Beskydy Mts., northern Moravia, Czech Republic, 49°30'-41' N, 18°41'-51' E, map fields Nos 6377-78 and 6477-79 (Pruner & Míka 1996)) are reviewed in this paper; for the list of localities see "Stručný popis lokalit" and Fig. 1. About 1000 specimens from this territory have been studied. Most of them were collected by the author during the years 1993-2002. Moreover, the collection of Beskydy Museum (Frýdek-Místek, Czech Republic) and some private collections were studied.

Altogether 58 species of Cerambycidae belonging to 44 genera were found in the studied area. Records of additional 34 species from adjacent territories are mostly based on literature data; their occurrence in the target area is also possible. Although literature data have been included, it is necessary to verify them by recent findings.

The most remarkable records include: *Tetropium fuscum* (Fabricius, 1787), *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839), *Molorchus umbellatarum* (Schreber, 1759), *Pronocera angusta* (Kriechbaum, 1844), *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763), *Judolia sexmaculata* (Linnaeus, 1758), *Monochamus sartor* (Linnaeus, 1758), *Pogonocherus ovatus* (Goeze, 1777), *Tetrops* cf. *praeusta* (Linnaeus, 1758), *Saperda scalaris* (Linnaeus, 1758), *S. carcharias* (Linnaeus, 1758), *Stenostola dubia* (Laicharting, 1784), *Oberea linearis* (Linnaeus, 1761), *O. pupillata* (Gyllenhal, 1817) and *O. erythrocephala* (Schrank, 1776).

A record of *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758) in a fallen trunk of *Fagus sylvatica* is also unusual. One specimen of *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763) was surprisingly found on the slope of the Ostrý hill; the species mostly occurs in warm, steppe or forest-steppe habitats in Moravia