Published November 14, 2002

Klapalekiana, **38**: 85-109, 2002
ISSN 1210-6100

Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 1997-2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období

Interesting findings of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 1997-2001 with supplementary pre-1997 data

Petr VESELÝ[1)], Květoslav RESL[2)] & Ivo TĚŤÁL[3)]

[1)]Tálínská 1030, CZ-198 00 Praha 9; e-mail: vesely.pt@tiscali.cz
[2)]CZ-687 31 Šumice 299; e-mail: kvetoslav.resl@tiscali.cz
[3)]Bendova 21, CZ-301 27 Plzeň; e-mail: ivo.tetal@volny.cz

Faunistics, Coleoptera, Carabidae, Central Europe, Czech Republic, Bohemia, Moravia

Abstract. New faunistic records of 172 rare or little known species of the family Carabidae from the Czech Republic obtained from private collections are presented. Notes on biology and habitats of some species are included. *Agonum angustatum* Dejean, 1828 is recorded as new for the Czech Republic. *Syntomus obscuroguttatus* (Duftschmid, 1812) is recorded as new for Bohemia. The presence of *Diachromus germanus* (Linnaeus, 1758) in Bohemia is confirmed after 35 years. The occurrence of *Cymindis macularis* Mannerheim in Fischer von Waldheim, 1824 in Bohemia is confirmed after 33 years.

ÚVOD

V příspěvku uvádíme přehled faunistických údajů o nových zajímavých nálezech střevlíkovitých brouků z území České republiky z let 1997-2001 a doplňky z let dřívějších, jak je poskytli k publikaci členové Carabidologické sekce České společnosti entomologické a další sběratelé. Navazujeme na dříve publikované přehledy zajímavých nálezů střevlíkovitých brouků (Benedikt & Těťál 1989, 1990, 1991, 1994; Veselý & Těťál 1998). Bionomické, faunistické i další poznámky v komentářích k jednotlivým druhům vycházejí, pokud není uvedeno jinak, ze situace na zkoumaném území, tedy v České republice.

MATERIÁL A METODIKA

Jméno sběratele nebo zkratka jeho jména v případě, že se jméno v textu opakuje častěji, je v závorce na konci každého faunistického údaje. Pokud není uvedeno jinak, rozumí se, že dotyčný sbíral a determinoval uváděné exempláře sám a doklad materiál je uložen v jeho sbírce.

Systematické řazení taxonů a nomenklatura je podle Hůrky (1996). Nomenklatura poddruhů *Leistus montanus* Stephens, 1828 je podle Farkače & Fassatiho (1999).

Údaje o nálezech jsou řazeny nejprve podle zemí (Boh., Mor.), dále potom podle data nálezu. Lokalitám jsou přiřazena čísla mapových polí podle Prunera & Míky (1996).

V textu jsou použity následující zkratky: Boh. - Bohemia; Mor. - Moravia; PP - přírodní památka; PR - přírodní rezervace; observ. - pozoroval; revid. - revidoval.

ZKRATKY JMEN SBĚRATELŮ, DETERMINÁTORŮ A MAJITELŮ SBÍREK

BE - Stanislav Benedikt, Starý Plzenec
BR - Radek Beran, Liberec
H - Jiří Hejkal, Kraslice
CH - Jiří Chvalkovský, Česká Lípa
K - Lubomír Koloničný, Ostrava
KP - Ludvík Kašpar, Česká Lípa
KL - Václav Klapka, Česká Lípa
L - Radek Láska, Uherský Brod
MA - Ivan Mareček, Praha
MJ - Josef Moravec, Vrdy
ML - Libor Mikulenka, Třemešná ve Slezsku
MO - Pavel Moravec, Litoměřice
P - Jaroslav Prouza, Hradec Králové
RS - Květoslav Resl, Šumice
S - Jiří Stanovský, Ostrava
T - Ivo Těťál, Plzeň
VE - Petr Veselý, Praha
VO - Pavel Vonička, Liberec
Z - Miroslav Zúber, Bradlec

PŘEHLED DRUHŮ

Leistus montanus kultianus Farkač et Fassati, 1999 – Boh.: Ralsko (5354), 3.VII.1997 - 32 ex. v suti na vrchu (CH); Lužické hory, vrch Studenec (5152), 10.V.-21.VI.1998 - 1 ex. v zemní pasti v suti (J. Růžička lgt., MO det. et coll.).
Lokálně se vyskytující a skrytě žijící druh suťových polí (cf. Farkač & Fassati 1999).

Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) – Mor.: Třemešná (5771), 9.VII.1997 - 1 ex. pod hromadou dřeva u lesa (ML); Vyšní Lhoty (6476), 26.IX.1999 - 3 ex. na břehu řeky Morávky pod většími kameny dále od vody (S); Úvaly (7266), 30.IX.2001 - 1 ex. v pásu křovin na okraji vápencové stepi (L).
Druh hájů a listnatých lesů, v současnosti se šíří i na druhotných a nelesních stanovištích.

Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) – Boh.: Staré Sedliště (6242), 29.VI.1997 - 1 ex. na zarostlém břehu rybníka Mělký cca 1,5 km východně od obce (T); Mantov (6345), 30.V.1998 - 4 ex. pod vegetací v rákosí na břehu rybníka Metálka cca 1 km jihovýchodně od obce (T); Mor.: Mikulčice (7268), 3.V.1997 - 2 ex. (RS); Třemešná, Černý důl (5771), 8.V.1999 - 1 ex. ve štěrku u potoka (ML); Kvasice (6770), 17.VI.2001 - 12 ex. v rákosinách na mokřině v nivě řeky Moravy (L).
Lokálně se vyskytující druh vlhčích a stinných stanovišť s kyselou půdní reakcí.

Oreonebria castanea sumavica (Obenberger, 1922) – Boh.: Šumava, vrch Poledník (6946), 23.V.1999 - 4 ex. v trouchnivém dřevě na suti poblíž Prášilského jezera v nadmořské výšce 1130 m (MO). Osmá známá lokalita z české strany Šumavy (dosud jen Černé a Čertovo jezero, Jezerní hora, Ostrý, Plešný, Svaroh, Špičák).
Stenoekní druh, zřejmě primárně vázaný na suťová pole v ledovcových karech, který za příznivého počasí a jarního vlhka sutě opouští a nalézá dočasné úkryty v trouchnivém dřevě padlých a pod kůrou stojících stromů. Lokality na německé straně Šumavy mají též charakter ledovcových karů.

Nebria jockischi hoepfneri Dejean, 1826 – Boh.: Jizerské hory, Bílý Potok pod Smrkem env. (5157), 29.V.1998 - 1 ex. na břehu Hájeného potoka v nadmořské výšce 600 m (VO).
Druh štěrkových břehů horských a podhorských toků, západně od Krkonoš vzácný (cf. Hůrka 1996).

Nebria picicornis (Fabricius, 1792) – Mor.: Ostrava-Hrabová (6275), 21.V.1999 - 3 ex. ve štěrku na břehu řeky Ostravice (P. Boža lgt. et coll., S det.); Raškovice (6376), 19.VIII.1999 - 60 ex. (RS).
Velmi lokální druh zachovalých štěrkopískových břehů řek.

Nebria livida (Linnaeus, 1758) – Boh.: Valy pr. Přelouč (5959), 5.V.2000 - 4 ex. (KL); Mor.: Únanov (7162), 6.IX.1991 - 2 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.).
Druh neznečištěných písčitých břehů stojatých i tekoucích vod.

Nebria salina Fairmaire et Laboulbène, 1854 – Boh.: Plzeň-Bolevec (6246), 24.IX.1998 - 1 ex. pod kusem kůry na písčité ploše lesní velkoškolky nad rybníkem Stržený (T); Ejpovice (6247), 16.V.1999 - 2 ex., 28.V.1999 - 3 ex., 3.VI.1999 - 1 ex., 14.IX.1999 - 1 ex. a 19.IX.1999 - 5 ex. pod kameny v kaolinovém lomu cca 1 km západně od obce (T); Kyšice - Ejpovice (6247), 12.IX.1999 - 3 ex. (RS); Kyšice (6247), 19.IX.2001 - 10 ex. (KL).
V hliništi v Ejpovicích druh žije na vlhkých místech s jílovitou půdou. Poprvé v Čechách zde byla nalezena stálá a poměrně početná populace tohoto druhu. Dřívější nálezy byly spíše jednotlivé a náhodné.

Notiophilus germinyi Fauvel in Grenier, 1863 – Boh.: Čermná nad Orlicí (5962), 5.V.1999 - 2 ex. (M. Nešpořík lgt. et coll., P det.); Mor.: Javorník (7171), 26.VI.1998 - 3 ex. na ruderálu na okraji lomu (L).
Lokální druh zachovalých otevřených suchých stanovišť, například stepí a vřesovišť.

Notiophilus laticollis Chaudoir, 1850 – Mor.: Čejč (7067), 17.VI.1998 - 1 ex. na úhoru ve vinicích (L); Uherský Brod (6971), 21.VI.1998 - 6 ex. (RS); Pouzdřany (7065), 15.V.1999 - 1 ex. (M. Nešpořík lgt. et coll., P det.).
Xerofilní, velmi lokální druh sprašových a vápnitých půd s řídkou nízkou vegetací.

Notiophilus rufipes Curtis, 1829 – Boh.: Praha-Troja (5852), 9.VI.1997 - 2 ex. na křovinaté stráni pod bohnickým sídlištěm (VE); Praha-Troja, Sklenářka (5852), 9.VI.1997 - 5 ex. ve vysazeném dubovém lese na štěrkopískové terase (VE); Praha-Divoká Šárka (58-5951-52), 10.VI.1998 - 1 ex. a 23.IX.1998 - 5 ex. při západním úpatí Nebušické skály, na mechu v dubovém lese (VE); Praha-Lochkov, PP Slavičí údolí (5952), 23.V. - 29.VI.1999 - 2 ex. v zemní pasti (VO); Praha-Lochkov, PP Lochkovský profil (5952), 9.VI.1999 - 2 ex. na okraji zbytku dubohabrového lesa (MO); Žloukovice (5949), 21.-25.VI.1999 - mnoho ex. na volné půdě nebo pod slabou vrstvou listí v okolí kořenových náběhů dubů (MO); Husinec, vrch Červená skála (5852), 3.V.2000 - 5 ex. pod listím v březovém lemu skalní stepi (VO), 6.VIII.2000 - 5 ex. tamtéž (MO); Větrušice, Velký vrch (5852), 3.V.2000 a 6.VIII.2000 - celkem 12 ex. pod listím v dubo-akátovém lese a 3.V.-3.VI.2000 - 1 ex. v zemní pasti tamtéž (MO et VO); Suchomasty env., Voskop (6050), 8.V.2001 - 6 ex. v dubovém lese v předpolí lomu Čertovy schody (MO et VO), 25.VIII.2001 - 1 zcela immaturní ex. tamtéž (MO); Mor.: Znojmo env., Šobes (7162), 19.IV.88 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det); Lukov - Nový Hrádek (7161), 20.VIII.1995 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.); Uherský Brod (6771), 14.VI.1997 - 9 ex. a 13.VII.1997 - 5 ex. na okraji dubového háje, v úvozové cestě v listí, suti a hlíně (L); Sedlec-Mušlov (7266), 1.V.1999 - 1 ex. (RS); Uherský Brod (6771), 17.VI.1999 - 6 ex. pod spadaným listím na okraji listnatého háje (L); Vranov nad Dyjí, Ledové sluje (7160), 8.IX.1999 - 2 ex. (VO), 6 ex. v dubovém lese (MO).
Druh teplomilných hájů a druhotně vinic, v Čechách lokálně v teplejších oblastech. V poslední době jsou nálezy tohoto druhu poměrně časté, pravděpodobně vzrůstá početnost populací.

Carabus menetriesi pacholei Sokolář, 1911 – Boh.: Novohradské hory, Baronův Most (7354), VI.-VII.1998 - 1 ex. na přechodovém rašeliništi (P. Sedláček); Novohradské hory, Huťský rybník env. (7354), VI.-VII.1998 - 1 ex. na přechodovém rašeliništi (P. Sedláček);

Novohradské hory, Terčí Dvůr (7353), VI.-VII.1998 - 1 ex. na přechodovém rašeliništi (P. Sedláček); Šumava, Dobrá (7149), 10.VII.1998 - 2 ex. na vlhké rašelinné louce (A. Pavlíčko lgt. et coll., MJ).
Tyrfobiont, reliktní druh s výskytem na horských rašeliništích.

Carabus nitens Linnaeus, 1758 – Boh.: Hora Svatého Šebestiána (5445), 10.V.2000 - 9 ex. (KL).
Reliktní druh, s velmi lokálním výskytem na písčinách, vřesovištích a rašeliništích. Na mnoha lokalitách již úplně vymizel.

Carabus problematicus problematicus Herbst, 1786 – Boh.: Bělá pod Bezdězem (54-5554), 17.-18.X.1998 - 2 ex. na vřesovišti při okraji lesa na střelnici Vrchbělá (VE); Kamenice nad Lipou env., Pelec (6656), 10.-18.IX.1999 - 2 ex. pod kameny na okraji lesa (S).
Lesní druh, s poměrně lokálním výskytem v lesích středních poloh.

Carabus variolosus Fabricius, 1787 – Mor.: Hrubý Jeseník, rašeliniště Skřítek (6068), 21.VIII.1997 - více ex. a 25.VIII.1997 - více ex. pod dřevy v bažinách (ML); Bílé Karpaty, Strání (7272), VI.1998 - 5 ex. (RS); Třemešná (5771), 8.V.1999 - několik ex. u podhorského potoka (ML); Bílé Karpaty, PR Sidonie (6974), 7.-21.VIII.1999 - 1 ex. (RS); Bílé Karpaty, Chladný vrch (6974), 7.VIII.-4.IX.1999 - 2 ex. (RS).
Reliktní lesní druh, vázaný na zachovalé bukové lesy.

Carabus irregularis irregularis Fabricius, 1792 – Mor.: Vranov nad Dyjí, Braitava (7160), 5.X.1988 - 2 ex., 4.II.1989 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.).
Reliktní lesní druh, vázaný na zachovalé bukové lesy.

Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792) – Boh.: Višňová-Poustka, Poustecká obora (5056), 9.-30.VI.2001 - 1 ex. v zemní pasti na břehu vypuštěného rybníka v nadmořské výšce 280 m (VO); Mor.: Třemešná, Černý důl (5771), 8.V.1999 - 1 ex. pod kamenem u potoka (ML); Bílé Karpaty, Chladný vrch (6974), 7.VIII.-10.X.1999 - 23 ex. (RS); Bílé Karpaty, Okrouhlá (6974), 7.VIII.-10.X.1999 - 24 ex. (RS); Bílé Karpaty, PR Sidonie (6974), 7.VIII.-10.X.1999 - 32 ex. (RS).
Reliktní lesní druh, vázaný především na zachovalé bukové lesy.

Cicindela germanica Linnaeus, 1758 – Mor.: Šumice (6972), 21.VII.1998 - 2 ex. na světlo, 21.VII.1999 - 3 ex. na světlo (RS).

Lokální druh teplejších stanovišť s volnou hlinitou půdou a řídkou vegetací. Nálezy na světlo potvrzují několik starších nepublikovaných údajů o noční aktivitě tohoto druhu. I když je často pozorována denní aktivita imag, ve dne nebyl let nikdy zaznamenán.

Cicindela arenaria viennensis Schrank, 1781 – Mor.: Bzenec (7069), 7.VI.1997 - více ex. v pískovně (ML).
Druh s velmi lokálním výskytem na izolovaných písčitých stanovištích.

Blethisa multipunctata multipunctata (Linnaeus, 1758) – Boh.: Mantov (6345), 30.V.1998 - 1 ex. v rákosí na břehu rybníka Metálka cca 1 km jihovýchodně od obce (T); Novozámecký rybník (5353), 25.V.1999 - 1 ex. na bahnitém břehu (KP), Novozámecký rybník pr. Jestřebí (5353),12.V.2001 - 4 ex. na podmáčené louce (VE); Mor.: Podivín (7167), 10.V.1997 - 3 ex. (RS).
Lokální druh vázaný především na vegetací zarostlé břehy neznečištěných vod, častější bývá i u vod s kolísavou hladinou.

Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 – Boh.: Slatina pod Hazmburkem (5550), 1.IX.1998 - 1 ex. na malé mokřině pod hrází nádrže (VE); Mor.: Mikulčice (7268), 17.V.1998 - 1 ex. (RS); Lanžhot (7367), 8.V.2000 - 1 ex. na zamokřené louce u řeky Dyje (L).
Nehojný druh s výskytem na různých typech vegetací zarostlých břehů stojatých vod.

Elaphrus aureus aureus P. W. J. Müller, 1821 – Boh.: Litoměřice (5450), 24.IV.2000 a 16.V.2000 - mnoho ex. na zastíněných místech na bahnitém břehu Labe (MO); Roudnice nad Labem (5551), 27.V.2001 - mnoho ex. na hlinitopísčitém břehu Labe (VE); Mor.: Bzenec-Přívoz (7069), 2.V.1997 - 17 ex. a 3.V.1998 - 1 ex. (RS).
V Čechách lokální druh písčitých a hlinitopísčitých břehů neznečištěných řek, výskyt u Labe signalizuje zlepšení kvality vody v řece.

Dyschirius agnatus Motschulsky, 1844 – Boh.: Krňovice (5861), 8.V.1994 - 3 ex. u řeky Orlice (MO, P. Bulirsch revid.).
V Čechách lokální druh písčitých a hlinitopísčitých břehů vod.

Dyschirius angustatus (Ahrens, 1830) – Boh.: Nučničky (54-5551), 3.VI.1999 - 4 ex. v pískovně (MO); Milovice-Mladá (5755), 26.V.2000 - 2 ex. v malé opuštěné pískovně (MO et VO); Mor.: Bzenec-Přívoz (7069), 18.V.1997 - 3 ex. a 1.VI.1997 - 6 ex. v jemném písku na břehu řeky Moravy (L), 24.V.1997 - 10 ex. (RS).
Druh otevřených, písčitých a hlinitopísčitých stanovišť i dále od větších řek, v Čechách s velmi lokálním výskytem.

Dyschirius bonellii Putzeys, 1846 – Mor.: Bořetice (7267), 10.V.1997 - 6 ex. na vinicích a úhorech na místech s obnaženou sprašovou půdou (L); Čejč (7067), 10.V.1997 - 2 ex. (RS).
Vzácný reliktní druh vázaný na sprašové a vápencové stepi. Potvrzení stálého výskytu na zdejších lokalitách.

Dyschirius digitatus (Dejean, 1825) – Boh.: Krňovice (5861), 8.V.1994 - 4 ex. u řeky Orlice (MO, P. Bulirsch revid.); Mor.: Bzenec-Přívoz (7069), 2.V.1997 - 2 ex. (RS).
V Čechách lokální druh s vazbou na neznečištěné písčité a štěrkopískové břehy vod.

Dyschirius intermedius Putzeys, 1846 – Boh.: Hostěnice (5550), 26.V.1994 a 19.VI.1994 - celkem 12 ex. u řeky Ohře (MO); Mor.: Bzenec-Přívoz (7069), 28.V.2000 - 2 ex. na břehu řeky Moravy (L).
Nehojný druh zachovalých břehů vod.

Dyschirius laeviusculus Putzeys, 1846 – Mor.: Ždánice (6968), 1.VI.1997 - 1 ex. na mokřině v poli (L).
Vzácný, lokální druh, nalézaný na dvou velmi odlišných typech stanovišť: na nížinných slaniskách a na štěrkopískových březích podhorských toků. Uvedený nález je proto velmi pozoruhodný, snad by mohlo jít o zasolené místo.

Dyschirius politus politus (Dejean, 1825) – Boh.: Provodín (5353), 3.-10.VI.1998 - 9 ex. v pískovně (CH); Roudnice nad Labem (5551), 27.V.2001 - 2 ex. na písčitém břehu Labe (VE); Mor.: Lanžhot (7367), 8.V.2000 - 1 ex. na písčité lavici na břehu řeky Dyje (L).
Lokální druh vázaný především na písčité břehy.

Aptinus bombarda (Illiger, 1800) – Mor.: Zadní Hamry, Ledové sluje (7161), 24.IV.-18.VI.1994 - 1 ex. v zemní pasti na okraji lesa v nadmořské výšce 300 m (J. Růžička lgt. et coll., MO det.); Brno-Hády (6766), 11.V.1999 - 2 ex. v prosevu v Quercetu (BE); Bílé Karpaty, PR Sidonie (6974), 7.VIII.-10.X.1999 - 4 ex. (RS).
Velmi lokální druh lesů pahorkatin a podhůří.

Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 – Boh.: Českomoravská vysočina, Radostínské rašeliniště (6361), 24.VIII.1997 - 2 ex. (P); Břehyňský rybník (5454), 5.VI.1999 - 1 ex. na rašelině (CH); Kejžlice env., PR Kamenná trouba (6458), 13.-14.VII.2001 - 3 ex. v močálu u rybníka v nadmořské výšce 460 m společně s 19 ex. *Patrobus atrorufus* (Stroem, 1768)(VO); Polesí env., PR Krčil (6757), 14.VII.2001 - 19 ex. v porostu *Sphagnum* sp. v nadmořské výšce 670 m (BR et VO lgt. et coll., VO det.), 14.VII.-9.X.2001 - 5 ex. v zemních pastích (A. Kůrka lgt., VO det. et coll.); Božejov env., PP Hrachoviště (6656), 15.VII.2001 - 10 ex. v porostu *Sphagnum* sp. v nadmořské výšce 570 m (BR et VO lgt. et coll., VO det.).
Reliktní druh rašelinišť a kyselých půd.

Patrobus australis J. Sahlberg, 1875 – Boh.: Habartice - Černousy (4956), 26.VII.1994 - 1 ex., 1.VII.1995 - 4 ex. a 22.VII.1995 - 1 ex. u bezejmenného rybníka na státní hranici s Polskem (VO, MO revid.).
Velmi lokální, reliktní druh mokřadů s chladným mikroklimatem. Uvedené nálezy jsou první ze severních Čech.

Thalassophilus longicornis (Sturm, 1825) – Boh.: Újezd u Chocně (5963), 26.II.1995 - 1 ex. (J. Voda lgt. et coll., P det.); Plzeň-Bolevec (6246), 1.V.1998 - 1 ex. pod kusem ztvrdlé rašeliny na okraji kaluže v areálu lesní velkoškolky nad rybníkem Stržený (T); Mor.: Ostrava-Hrabová (6275), 18.IV.1999 - 2 ex. na štěrkovém břehu řeky Ostravice (K).
Reliktní druh vázaný výhradně na zachovalé štěrkové břehy toků.

Perileptus areolatus (Creutzer, 1799) – Mor.: Ostrava-Hrabová (6275), 21.V.1999 - 10 ex. ve štěrku na břehu řeky Ostravice (P. Boža lgt. et coll., S det.).
Reliktní druh výhradně vázaný na zachovalé štěrkové břehy toků.

Epaphius rivularis (Gyllenhal, 1810) – Boh.: Břehyňský rybník (5454), 24.VI.1995 - 4 ex., 27.VII.1996 - 2 ex., 12.VIII.1997 - 2 ex. a 26.VII.1998 - 5 ex. v rašeliništi (Z); Břehyňský rybník (5454), 8.VII.1997 - 3 ex. a 5.VI.1999 - 14 ex. na rašelině (CH), 13.VI.2001 - 14 ex. (KL); Staré Sedliště (6242), 29.VI.1997 - 3 ex. pod vegetací na břehu rybníka Mělký cca 1,5 km východně od obce (T); Mantov (6345), 30.V.1998 - 3 ex. pod vegetací v rákosí na břehu rybníka Metálka cca 1 km jihovýchodně od obce (T).
Velmi lokální reliktní druh rašelinišť a podmáčených kyselých půd.

Trechus amplicollis Fairmaire, 1859 – Boh.: Nová Ves (5862), 27.III.1994 - 1 ex. v bažině u rybníka v nadmořské výšce 276 m (J. Jelínek lgt. et coll., P det.); Mor.: Jeseníky, rašeliniště Skřítek (6068), 30.IX.2001 - 20 ex. (VO).
Lokální reliktní druh rašelinišť a podmáčených půd v horách a podhůří, v nižších polohách se nalézá jen velmi ojediněle, zřejmě splaven z vyšších poloh.

Trechus austriacus Dejean, 1831 – Boh.: Praha-Lysolaje (5852), 27.IX.1999 - 12 ex. pod kameny na navážce v pískovně (VE), 19.IX.2001 - 1 ex. (KL); Mor.: Břeclav-Poštorná (7267), 23.V.1995 - 2 ex. ve zbytcích pilin a kůry (Z); Krnov - Vrbina (5972), 23.IV.1999 - více ex. na vlhkém ruderálu pod deskou ve společnosti *Bembidion schuppelii* Dejean, 1831 (ML).
Skrytě žijící a jen lokálně nalézaný druh. Příležitostně žije synantropně na skládkách, rumištích, ruderálech a podobných místech.

Trechus montanellus Gemminger et Harold, 1868 – Mor.: Jeseníky, Karlova Studánka (5969), 27.IX.1997 - 5 ex. (P); Hrubý Jeseník, rašeliniště Skřítek (6068), 18.VIII.1998 - 7 ex. ve smrkové hrabance na cestičce 100 m od rašeliniště (J. Říha lgt. et coll., MO det.).
Lokální montánní druh, uvedené nálezy potvrzují výskyt na dvou z několika mála známých lokalit.

Trechus obtusus obtusus Erichson, 1837 – Boh.: Praha-Radotín, Lahovská (6052), 30.VII.-3.IX.1999 - 1 ex. v zemní pasti (MO); Milovice-Mladá (5755), 14.VI.2000 - 1 ex. a 10.IX.2000 - 2 ex. (MO); Mor.: Lukov, Klaperův potok (7161), 10.VIII.1995 - 2 ex. (M. Škorpík et MO lgt. et coll., VO et MO det.).
Druh rozmanitých vlhkých stanovišť. Z Moravy byl dosud znám pouze jediný nález (cf. Moravec & Scholz 1992). V případě nálezu z Radotína jde o náhodný výskyt makropterního exempláře na xerotermní lokalitě.

Trechus pulchellus Putzeys, 1846 – Mor.: Lukov, Klaperův potok (7161), 10.VIII.1995 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det., MO revid.).
Jižní Morava je novou, dosud neevidovanou oblastí výskytu tohoto sudetokarpatského druhu.

Trechus rubens (Fabricius, 1792) – Boh.: Korunka (5962), 8.V.1999 - 5 ex. (J. Jelínek lgt. et coll., P det.); Višňová-Poustka, Poustecká obora (5056), 9.VI.2001 - 5 ex. na břehu vypuštěného rybníka pod dřevy (VO); Vyskytná-Sedliště env., PR Kladinský potok (6558), 14.VII.2001 - 3 ex. na hlinitém břehu potoka v nadmořské výšce 540 m (VO).
Spíše podhorský a horský druh, v nižších polohách se nalézá jen vzácně na bahnitých místech a rašeliništích.

Lasiotrechus discus discus (Fabricius, 1792) – Boh.: Praha-Uhříněves, Netluky (5953), 19.VIII.-12.IX.1999 - 1 ex. v zemní pasti v mokřině v polích (MO et VO lgt., MO det. et coll.); Smiřice (5760), 1.VII.2000 a 5.X.2000 - 2 ex. pod vegetací na louce u potoka Trotina (MO et VO); Mor.: Šumice (6972), 19.VII.1998 - 32 ex., 20.VII.1998 - 24 ex., 21.VII.1998 - 4 ex. a 22.VII.1998 - 2 ex., vše na světlo (RS); Čejč (7067), 22.VII.1998 - 2 ex. na světlo (RS); Bzenec-Přívoz (7069), 3.VII.1999 - 21 ex. na světlo (RS); Bylnice (6974), 5.VIII.1999 - 2 ex. na světlo (RS).
Skrytě žijící mikrokavernikol, častěji bývá sbírán jen v náplavech a odchytem na světlo.

Trechoblemus micros (Herbst, 1784) – Boh.: Černousy (5056), 17.VII.1999 - 1 ex. na okraji travnatého porostu na naplavené písčině říčky Smědé (BR); Jizerské hory, Bedřichov (5256), 2.VII.2000 - 1 ex. v zemní pasti (R. Čtvrtečka lgt., VO det., coll. Severočeské muzeum v Liberci); Zahrádky (5353), 22.VII.2001 - 1 ex. na vlhké louce pod vegetací a 1 ex. na okraji pole ve vlhké hlíně (MO et VO); Mor.: Pouzdřany (7065), 28.VIII.1998 - 1 ex. v noře králíka (Z).
Skrytě žijící mikrokavernikol, častěji sbírán bývá jen v náplavech nebo v podzemních prostorách.

Paratachys (?)***caspius*** (Kolenati, 1845) – Mor.: Mikulčice (7268), 3.V.1987 - 4 ex. (RS); Bzenec - Přívoz (7069), 31.V.1998 - 2 ex. na břehu řeky Moravy (L).
V jižních oblastech Moravy lokálně nevzácný druh vlhčích hlinitopísčitých stanovišť. Druhová příslušnost taxonu dosud není vyjasněna, viz Hůrka (1996).

Paratachys fulvicollis (Dejean, 1831) – Mor.: Šumice (6972), 30.V.1999 - 1 ex. na bahnitém dně vypuštěného rybníka (L); Moravský Písek (7069), 6.VI.1999 - 1 ex. na bahně na mokřině v nivě řeky Moravy (L).
Vzácný, skrytě žijící halofilní druh, sbíraný jen ojediněle, většinou na bahně vypuštěných rybníků nebo na světlo.

Paratachys micros (Fischer von Waldheim, 1828) – Boh.: Žloukovice (5949), 15.-23.VII.1995 - 1 ex. a 1.-11.VII.1998 - 1 ex. ve štěrkopísku u řeky Berounky (MO); Filipovka (5056), 2.VI.1997 - 1 ex. (R. Čtvrtečka lgt., MO det., coll. Severočeské muzeum v Liberci); Praha-Troja (5852), 3.VI.1997 - 37 ex. na štěrkopískovém břehu Vltavy, pozorováno více ex. (VE); Litoměřice, Písečný ostrov (5450), 14.V.2000 - mnoho ex. na štěrkovém břehu v rozbité regulaci řeky Labe (MO); Chvatěruby (5752), 3.VI.2000 - 2 ex. na malé pláži u řeky Vltavy spolu s *Elaphropus diabrachys* a *E. parvulus* (MO et VO) a 2.VII.2000 - 1 ex. tamtéž (MO); Ejpovice (6246), 7.IX.2000 - 6 ex. v hliništi kaolinového lomu (VE); Mor.: Krnov-Vrbina (5972), 14.IV.1999 - 2 ex. ve štěrku u řeky Opavy (ML).
Reliktní druh zachovalejších štěrkových a písčitých břehů. Nálezy v hliništi svědčí o jisté adaptabilitě na druhotná stanoviště.

Elaphropus diabrachys Kolenati, 1845 – Boh.: Horšovský Týn (6443), 29.VI.1999 - 1 ex. v zámeckém parku (J. Lahoda lgt. et coll., T det.); Praha-Radotín, Lahovská (6052), 3.IX.1999 - mnoho ex. na navážce štěrku (VO et MO); Praha-Lahovice (6052), 11.IX.1999 - několik ex. na fragmentu štěrkového břehu Berounky (VO et MO); Milovice-Mladá, Traviny (5755), 26.V.2000 - 5 ex. na ruderální kamenité ploše (BR et VO lgt. et coll., VO det.); Ejpovice (6246), 7.IX.2000 - 1 ex v hliništi kaolinového lomu (VE).
Expanzivní, dnes široce rozšířený druh, častý i na druhotných štěrkovitých lokalitách mimo břehy řek. Nálezy z Horšovského Týna a Ejpovic jsou první známé nálezy ze západních Čech.

Elaphropus parvulus (Dejean, 1831) – Mor.: Nízký Jeseník, Kružberk (6172), 3.VIII.1997 - 4 ex. na ruderálu na okraji cesty (S); Krnov-Vrbina (5972), 14.IV.1999 - více ex. ve štěrku slepého ramene řeky Opavy (ML).
Lokálně někdy i hojný druh písčitých a štěrkovitých stanovišť.

Elaphropus walkerianus (Sharp, 1913) – Boh.: Hradec Králové, Plachta (5761), 8.V.1998 - 5 ex. (P) a 3 ex. (MA), 1.V.1999 - 4 ex. na hlinitém břehu rybníčku (S), 12.V.2001 - 4 ex. na vlhkém břehu tůně (L), 29.V.2001 - 2 ex. (KL).
Nálezy potvrzují stálý výskyt na dosud jediné lokalitě v České republice (cf. Mikát & Hájek 1999).

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) – Boh.: Záměl (5863), 22.V.1994 - 1 ex. (J. Jelínek lgt. et coll., P det.); Praha-Lysolaje (5852), 27.IX.1999 - 1 ex. pod kamenem na navážce v pískovně (VE); Mor.: Mikulčice (7268), 15.V.1998 - 2 ex. (RS); Šumice (6972), 20.VII.1998 - 1 ex. na světlo (RS).
Skrytě žijící druh vázaný na tlející rostlinný materiál.

Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) – Boh.: Bělá pod Bezdězem (54-5554), 25.V.1998 - 1 ex. v travnaté vegetaci na střelnici Vrchbělá (KP).
V Čechách jen velmi lokální druh volných hlinitopísčitých stanovišť.

Ocys quinquestriatus quinquestriatus (Gyllenhal, 1810) – Boh.: Kratonohy (5859), 19.IX.1999 - 2 ex. na skládce cihel (P); Nové Mlýny pr. Vlašim (6355), 21.-23.VII.2001 -

1 immaturní ex. na bílé zdi domu v údolí řeky Blanice (J. Růžička lgt. et coll., MO det.). Skrytě žijící a jen lokálně nalézaný druh. Žije převážně synantropně na skládkách cihel, zbořeništích, ve sklepech a na podobných místech.

Bembidion litorale (Olivier, 1791) – Boh.: Krňovice (5861), 8.V.1994 - více ex. u řeky Orlice (MO); Černousy (4956), 23.VIII.1998 - více ex. na břehu řeky Smědé (MO).
V Čechách velmi lokální druh zachovalých písčitých břehů.

Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792) – Boh.: Bělá pod Bezdězem (54-5554), 9.VIII.1995 - 6 ex. (Z), 25.V.1998 - masově v travnaté vegetaci na střelnici Vrchbělá (KP); Ralsko - Kuřivody (5454), 14.VI.2000 - 2 ex. (MO).
Druh přírodně zachovalých oblastí, v Čechách znám jen z několika lokalit, především z volných písčitých půd v bývalých vojenských územích.

Bembidion obliquum Sturm, 1825 – Boh.: Kamenice nad Lipou-Pravíkov env. (6656), 16.IX.1999 - 2 ex. na břehu menšího rybníčku (S); Mor.: Krnov - Vrbina (5972), 9.IV.1999 - 1 ex. na vlhké louce (ML); Třemešná (5771), 24.IV.1999 - 1 ex. vyšlapán na bažinaté louce (ML).
Hygrofil, nalézaný zejména na mokřadech s kyselým podkladem a rašeliništích. Na Moravě je známo jen málo lokalit, v Čechách je v některých oblastech hojný.

Bembidion minimum (Fabricius, 1792) – Boh.: Prameny (5942), 9.VI.1997 - 1 ex. na břehu meandrujícího Pramenského potoka v nadmořské výšce 685-690 m (H); Ralsko - Kuřivody (5454), 26.V.2000 - 1 ex. u periodické louže na stepi (VO); Mor.: Šumice (6972), 20.VII.1998 - 1 ex. a 21.VII.1998 - 1 ex. na světlo (RS); Čejč (7067), 22.VII.1998 - 27 ex. na světlo (RS).
Hygrofilní druh, v Čechách nalézán jen velmi lokálně.

Bembidion tenellum tenellum Erichson, 1837 – Mor.: Šumice (6972), 20.VII.1998 - 1 ex. na světlo (RS).
Hygrofilní, velmi lokální druh, s častějším výskytem na slaných půdách.

Bembidion fumigatum (Duftschmid, 1812) – Mor.: Čejč (7067), 22.VII.1998 - 2 ex. na světlo (RS).
Hygrofil, lokální druh na zachovalých mokřadech s bohatou vegetací.

Bembidion humerale Sturm, 1825 – Boh.: Nová Ves (5962), 5.V.1999 - 2 ex. (M. Nešpořík lgt. et coll., P det.); Doksy env., Swamp (5454), 14.V.2000 - 2 ex. a 21.V.2001 - 7 ex. (KL).
Reliktní druh rašelinných stanovišť.

Bembidion millerianum Heyden, 1883 – Boh.: Jizerské hory, Kořenov (5258), 31.VII.1998 - 5 ex. na břehu Jizery (VO); Mor.: Raškovice (6376), 3.VII.1999 - 4 ex. a 19.VIII.1999 - 1 ex. (RS).
V Čechách velmi lokální druh štěrkových břehů podhorských toků, výskyt v Jizerských horách potvrzen poprvé od roku 1945 (cf. Fassati 1946).

Bembidion doderoi Ganglbauer, 1892 – Boh.: Peklo nad Metují (5663), 1.VI.1996 - 1 ex. v údolí Olešenky (J. Jelínek lgt. et coll., P det.); Mor.: Bílé Karpaty, Strání (7272), 22.VI.1987 - 3 ex. (RS).
Na stinných březích potoků skrytě žijící podhorský lesní druh. V Čechách jde teprve o druhou známou lokalitu tohoto druhu, dosud byl znám jen z Brandýsa nad Orlicí (Benedikt & Těťál 1994).

Bembidion prasinum (Duftschmid, 1812) – Mor.: Bzenec-Přívoz (7069), 3.VII.1999 - 1 ex. na světlo (RS).
Velmi lokální druh zachovalých štěrkových břehů podhorských i nížinných toků. Přílet na světlo nebyl dosud pozorován.

Bembidion ascendens K. Daniel, 1902 – Boh.: Šumava, Prášilský potok (68-6946), 4.VII.2001 - 7 ex. (KL); Mor.: Raškovice (6376), 3.VII.1999 - 22 ex. a 19.VIII.1999 - 6 ex. (RS); Vlárský průsmyk (6974), VIII.1999 - 2 ex. (RS).
Velmi lokální druh zachovalých štěrkopískových břehů toků.

Bembidion atrocoeruleum Stephens, 1828 – Boh.: Oloví - Kraslice (5741), 30.V.1998 - 1 ex. a 28.VI.1998 - 1 ex. na štěrkopísčitém břehu říčky Svatavy mezi Olovím a Kraslicemi (H); Černousy (4956), 23.VIII.1998 - 1 ex. na štěrkovém břehu říčky Smědé (H), 1 ex. tamtéž (MO); Černousy - Višňová-Předlánce (5056), VII.-VIII.1999 - 6 ex. v naplaveninách říčky Smědé (BR).
Lokální druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion conforme Dejean, 1831 – Mor.: Raškovice (6376), 3.VII.1999 - 35 ex. a 19.VIII.1999 - 59 ex. (RS).
Velmi lokální reliktní druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion varicolor (Fabricius, 1803) – Mor.: Raškovice (6376), 3.VII.1999 - 48 ex. a 19.VIII.1999 - 5 ex. (RS); Vlárský průsmyk (6974), VIII.1999 - 1 ex. (RS); Dolní Bečva (6575), 7.IX.1999 - 3 ex. na štěrkopísčitém břehu Bečvy (VE).
Druh zachovalých štěrkopískových břehů řek.

Bembidion monticola monticola Sturm, 1825 – Boh.: Prameny (5942), 9.VI.1997 - 1 ex. na břehu meandrujícího Pramenského potoka v nadmořské výšce 685-690 m (H); Poutnov (5942), 17.V.1998 - 4 ex. na štěrkopísčitém břehu říčky Teplé (H); Bernartice (5361), 6.VI.1998 - 3 ex. na štěrkopísčitém břehu potoka Ličná (VO); Velké Petrovice pr. Police nad Metují (5463), 8.X.1998 - 4 ex. u řeky Metuje v nadmořské výšce 420 m (MO); Mor.: Ostrava-Hrabová (6275), 18.IV.1999 - 2 ex. a 25.V.1999 - 1 ex. na štěrkovém břehu řeky Ostravice (K); Raškovice (6376), 3.VII.1999 - 1 ex. a 19.VIII.1999 - 6 ex. (RS).
Lokální druh zachovalých štěrkopískových břehů podhorských toků.

Bembidion modestum (Fabricius, 1801) – Boh.: Černousy (4956), 23.VIII.1998 - mnoho ex. na břehu řeky Smědé (MO); Mor.: Bzenec-Přívoz (7069), 2.V.1997 - 6 ex. (RS).
V Čechách v současnosti velmi lokální druh vázaný na neregulované břehy vod. Z mnoha lokalit již úplně vymizel.

Bembidion dalmatinum Dejean, 1831 – Mor.: Popovice (6971), 8.VI.1997 - 7 ex. u potůčku ve strži (ML).
Druh mokřin v teplomilných listnatých lesích. Potvrzení stálého výskytu na uvedené lokalitě.

Bembidion milleri kulti Fassati, 1942 – Mor.: Bystřice pod Lopeníkem (7072), 9.V.1997 - 6 ex. (RS).
Druh vázaný na volné jílovité půdy, téměř výhradně je nalézán v cihelnách, hliništích a lomech.

Bembidion cruciatum veselyi Fassati, 1958 – Mor.: Jeseníky, Kouty nad Desnou (5868), 27.IX.1997 - 2 ex. (P); Raškovice (6376), 3.VII.1999 - 71 ex. a 19.VIII.1999 - 32 ex. (RS).
Lokální druh zachovalých štěrkopískových břehů podhorských toků.

Bembidion fluviatile Dejean, 1831 – Boh.: Hostěnice (5550), 19.VI.1994 - 2 ex. u řeky Ohře (MO); Mor.: Bzenec-Přívoz (7069), 2.V.1997 - 3 ex., pozorováno více ex. (RS).
Lokální druh volných, neznečištěných písčitých a hlinitopísčitých břehů vod.

Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1824 – Mor.: Bohuslavice pr. Kyjov (6968), 10.-11.IX.1997 - 15 ex. na xerotermní stráni na okraji hlinitého pole, z toho 2 ex. immaturní, všechny ex. brachypterní (VE); Mikulov - Anenský vrch (7165), 22.V.1999 - několik ex. pod kameny na svahu (ML).
Lokální reliktní druh stepních oblastí.

Pterostichus cursor (Dejean, 1828) – Mor.: Lanžhot env., Cahnov (7367), 13.III.1999 - 1 ex. (RS); Úvaly (7266), 7.V.2000 - 2 ex. na zarostlých březích rybníčku (L).
Halofil, lokálně na vegetací porostlých březích zachovalých mokřadů jižní Moravy.

Pterostichus leonisi Apfelbeck, 1904 – Boh.: Praha-Královice (5953), 25.III.2000 - 1 ♂ pod předmětem na divoké skládce nedaleko staré silážní jámy (VO, MO revid.); Praha-Modřany (6052), 2.IV.2001 - 1 ♂, 1 ♀ pod kůrou ležícího dřeva na břehu tůní u Vltavy (VE); Mor.: Břeclav - Pohansko (7267), 6.IV.1997 - 1 ex. pod kůrou padlého kmene na zatopených loukách (L); Kobylí (7067), 24.VIII.1997 - 1 ex. pod suchou vegetací na vojtěškovém poli (L); Lanžhot env., Cahnov (7367), 7.III.1999 - 1 ex. (RS); Uherský Brod (6771), 29.IX.1999 - 1 ex. v zemi pod suchým plevelem na rumišti u polního hnojiště (L).
Halofil, šířící se zejména na druhotných stanovištích. V případě pražských nálezů jde o třetí, čtvrtý a pátý nález z Čech (cf. Resl 1992, Veselý & Těťál 1998). V jižních částech Moravy je sbírán častěji.

Pterostichus negligens (Sturm, 1824) – Boh.: Lužické hory, vrch Studenec (5152), 21.VI.-28.X.1998 - 1 ex. v pasti v suti (J. Růžička) a 1 torzo v pasti v suti (MO).
Reliktní, skrytě žijící druh suťových polí, od pahorkatin do hor.

Pterostichus gracilis gracilis (Dejean, 1828) – Boh.: Zahrádky (5353), 10.VI.2001 - 1 ex. v bažině (VO); Mor.: Ostrava, Heřmanické rybníky (6176), VII.1986 - 1 ex. (F. Jaskula lgt. et coll., MO det.); Lanžhot env., Cahnov (7367), 13.III.1999 - 1 ex. a 27.III.1999 - 1 ex. (RS).
Zejména v Čechách velmi lokální a vzácný druh zachovalých mokřadů. Z mnoha lokalit již úplně vymizel.

Pterostichus piceolus latoricaensis Pulpán, 1965 – Mor.: Lanžhot env., Cahnov (7367), 7.III.1999 - 1 ex. (RS), 13.III.1999 - 2 ex. pod kůrou padlého kmene v zaplaveném lužním lese kolem Dyje (L), 1 ex. (RS), 27.III.1999 - 3 ex. (RS).
Druh se vyskytuje pouze v blízkosti řek s přirozeným vodním režimem a zachovalými lužními porosty. Nálezy potvrzují stálý výskyt na uvedené lokalitě (cf. Veselý 1992, Veselý & Těťál 1998).

Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 – Boh.: Brandýs nad Orlicí (5963), 20.IV.1997 - 1 ex. (M. Nešpořík lgt. et coll., P det.); Jizerské hory - Horní Maxov (5257), 1.-2.VII.1997 - více ex. vyšlapáno v bažinné vegetaci (ML); Jizerské hory, Rašeliniště Jizery (5157), 1.-2.VII.1997 - více ex. vyšlapáno v bažinné vegetaci (ML); Mor.: Strání (7072), 7.VI.1997 - 3 ex. na zastíněných místech v nánosu listí a bahna u horského potůčku (L); Hrubý Jeseník, rašeliniště Skřítek (6068), 21.VIII.1997 - více ex. a 25.VIII.1997 - více ex. v rašelinné vegetaci (ML); Šumava, Stožec (7148), 7.IV.1998 - 2 ex. na rašelinné louce (MJ); Šumava, PP Multerberské rašeliniště (7350), 1.IV.1999 - 1 ex. na rašeliništi (MJ).
Další údaje o rozšíření tohoto méně známého, chladnomilného hygrofilního druhu.

Pterostichus elongatus elongatus (Duftschmid, 1812) – Mor.: Hlohovecký rybník (7266), 15.VI.1998 - 2 ex. na břehu (CH); Úvaly (7266), 7.V.2000 - více ex. na zarostlých březích rybníčku (L).
Na Moravě velmi lokální druh zachovalých mokřadů.

Pterostichus macer macer (Marsham, 1802) – Boh.: Ejpovice (6247), 16.V.1999 - 1 ex. a 19.IX.1999 - 1 ex. pod kameny v kaolinovém lomu cca 1 km západně od obce (T).
Dříve na polích s jílovitou půdou místy hojný druh, který na mnoha místech již zcela vymizel.

Pterostichus caspius (Ménétriés, 1832) – Mor.: Břeclav, Boří les (7267), 5.IV.1997 - více ex. a 27.VI.1997 - více ex. pod starými pařezy (ML); Bylnice (6974), 26.VI.1998 - 3 ex. na pile (Z), 15.V.1999 - 9 ex. (RS).
Tento zavlečený a aklimatizovaný druh je celkem hojný na skládkách kůry od Bylnice po Vlárský průsmyk. Tato skutečnost dobře dokumentuje možnosti pasívního šíření brachypterního lesního druhu v současné době.

Pterostichus rufitarsis cordatus Letzner, 1847 – Mor.: Beskydy, PR Mionší (6478), 30.VIII.2000 - 2 ex. (J. Vávra lgt. et coll., MO det.).
Vzácný a lokální reliktní lesní druh, nalézaný především v zachovalých horských bukových porostech.

Pterostichus illigeri sudeticus Gerhardt, 1909 – Boh.: Novohradské hory, vrch Kamenec (7453-54), 15.VIII.1995 - 3 ex. v nadmořské výšce 1000-1076 m (MO); Novohradské hory, vrch Lovčí hřbet (7354), 16.VIII.1995 - 5 ex. v nadmořské výšce 950 m (MO); Novohradské hory, Kraví hora (7254), 23.-24.VIII.1997 - 14 ex., z toho 3 ex. immaturní, v trouchnivém dřevě a pod dřevem v horské smrčině v nadmořské výšce 850-950 m (VE).
Horský lesní druh, v České republice je rozšířen pouze v Novohradských horách.

Molops elatus (Fabricius, 1801) – Mor.: Brno-Hády (6766), 11.V.1999 - 2 ex. v prosevu v Quercetu (BE).
Lokální lesní druh, nalézaný častěji v suťových lesích pahorkatin a podhůří.

Platyderes rufus (Duftschmid, 1812) – Boh.: Kamenice nad Lipou env., Pelec (6656), 15.IX.1999 - 1 ex. pod kamenem na okraji světlého lesa (S); Mor.: Dobelice - Kocourky (6963), 8.IV.1995 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.).
Lesní až lesostepní, v Čechách jen velmi lokální druh.

Calathus cinctus Motschulsky, 1850 – Boh.: Roudnice nad Labem (5551), 1.VII.1998 - 1 ex. (J. Kohout lgt. et coll., MO det.); Lipník-Mladá (5755), 14.VI.2001 - 3 ex. (KL).
Xerofilní druh, v Čechách s lokálním výskytem v teplých oblastech.

Dolichus halensis (Schaller, 1783) – Boh.: Roudnice nad Labem (5551), 17.VI.1998 - 2 ex. (J. Kohout lgt. et coll., MO det.); Slatina pod Hazmburkem (5550), 21.VII.1998 - 1 ex. na světlo (MO); Lipník-Mladá (5755), 14.VI.2001 - 8 ex. (KL).
V Čechách teprve od počátku devadesátých let opět častěji nalézaný polní druh.

Olisthopus rotundatus (Paykull, 1790) – Boh.: Loučky, Jalový dvůr (5742), 13.V.1997 - 9 ex. na vřesovišti na písku, okraje vřesu (H); Lomnice (5741), 2.V.1998 - 14 ex. pod vřesem na zarustající cestě podél silnice (H); Bělá pod Bezdězem (54-5554), 2.-3.V.1998 - 1 ex. pod vřesem na střelnici Vrchbělá (VE); Plzeň-Bolevec (6246), 24.IX.1998 - 3 ex. pod kameny podél cesty pod areálem lesní velkoškolky nad rybníkem Stržený (T); Ejpovice (6247), 3.VI.1999 -

2 ex. a 14.IX.1999 - 7 ex. pod kameny v kaolinovém lomu cca 1 km západně od obce (T); Kyšice - Ejpovice (6247), 12.IX.1999 - 2 ex. (RS); Milovice-Mladá (5755), 18.VIII.2000 - 1 ex. na stepi (VO), 10.IX.2000 - 1 ex. na stepi (MO observ.), 18.VIII.-10.IX.2000 - 1 ex. v zemní pasti na stepi (MO et VO lgt., MO det. et coll.); Kyšice (6247), 19.IX.2001 - 3 ex. (KL); Mor.: Bystřice pod Lopeníkem (7072), 22.VI.1997 - 7 ex. a 5.IX.1998 - 3 ex. (RS).
Lokální druh, rozšířený spíše v pahorkatinách a v podhůří na hlinitých a písčitých půdách, často v hliništích a lomech.

Sericoda quadripunctata (De Geer, 1774) – Mor.: Valašská Bystřice - Hlaváčky (6575), 13.VII.1998 - 2 ex. ve zbytcích ohniště na pasece (S); Lopeník (7072), 27.V.2000 - více ex. ve vlhkém popelu po pálení klestí na lesní mýtině (L).
Podhorský lesní druh s vazbou na lesní spáleniště.

Platynus livens (Gyllenhal, 1810) – Boh.: Písty (5550), 23.VIII.1994, 22.X.1994, 26.XI.1994 a 19.II.1995 - mnoho ex. pod kůrou topolů, exemplář ze srpna jsou immaturní a byly nalezeny na dně bezvodého kanálu (MO); Velký Osek (5857), 30.III.1997 - 14 ex. v lužním lese v Libickém luhu (H); Kostelec nad Ohří (55-5650), 1.XI.1997 - 1 ex. v lužním lese (H); Praha-Hostivař (5953), 7.X.1997 - 1 immaturní ex. ve vrbovně v PP Meandry Botiče (J. Strejček), 20.III.1999 - 1 ex. pod kůrou ležícího dřeva (VE); Týnec nad Labem (6958), 27.XII.1998 - 1 ex. pod kůrou vrby na okraji močálu s rákosinami a vlhkými loukami (H); Novozámecký rybník pr. Jestřebí (5353), 10.IX.2000 - 7 ex. pod kůrou a v trouchnivém dřevě (VE).
Charakteristický druh lužních lesů, v Čechách jen s lokálním výskytem.

Platynus longiventris Mannerheim, 1825 – Mor.: Šumice (6972), 19.VII.1998 - 1 ex. na světlo (RS); Lanžhot env., Cahnov (7367), 7.III.1999 - 3 ex. (RS).
Lokální druh zachovalých lužních porostů, který je schopen, jak vyplývá z nálezu v Šumicích, přeletů na delší vzdálenosti.

Agonum afrum (Duftschmid, 1812) – Boh.: Mantov (6345), 30.V.1998 - 3 ex. v rákosí rybníka Metálka cca 1 km jihovýchodně od obce (T).
Hojný druh rozmanitých typů mokřadů, v České republice teprve nedávno odlišený od komplexu druhů určovaných dříve jako *A. moestum* (Duftschmid, 1812). První spolehlivě určené nálezy ze západních Čech.

Agonum angustatum Dejean, 1828 – Mor.: Dobré Pole (7165), 28.IV.1996 - 1 ♂ (P, VE det); Bzenec-Přívoz (7069), 2.V.1997 - 1 ♂, 1 ♀ u řeky Moravy (M. Nešpořík lgt. et coll., VE det.); Sedlec (7266), 3.V.1997 - 1 ex. na slanisku (M. Nešpořík lgt. et coll., VE det.); Lanžhot (7367), 15.VII.1997 - 3 ex. (KL lgt. et coll., VE det.); Uherský Brod (6771), 25.IV.1998 - více ex., 28.IV.1998 a 2.V.1998 - více ex. na mokřině v polích, v kypré vysýchající půdě mezi vegetací (L), 26.IV.1998 - 2 ex., 5.V.1998 - 46 ex. a 2.V.1999 - 2 ex. (RS); Dubňany (7068), 20.V.1998 - 2 ex. na břehu Jarohněvického rybníka (L); Šumice (6972), 8.V.1999 - 1 ex. (RS); Uherský Brod (6972), 15.VIII.1999 - 3 ex. na mokřině v polích u říčky Nivničky (H); Mutěnice env. (70-7168), 17.-18.VIII.2000 - 1 na světlo u mokřin (F. Fiala lgt., VE det. et coll.).
Hygrofilní druh rozmanitých typů mokřadů. Často bývá nalézán na slaniskách a nezastíněných březích s řidší vegetací. Rozšířený a poměrně hojný je v jihozápadní části Slovenska. Jde rovněž o druh v České republice teprve nedávno odlišený od komplexu druhů určovaných dříve jako *A. moestum.* Nový druh pro Moravu a Českou republiku.

Agonum ericeti (Panzer, 1809) – Boh.: Jizerské hory, Klečové louky (5157), 1.-2.VII.1997 - více ex. vyšlapáno (ML); Jizerské hory, Na čihadle (5157), 1.-2.VII.1997 - více ex. vyšlapáno (ML); Jizerské hory, Rašeliniště Jizery (5157), 1.-2.VII.1997 - více ex. vyšlapáno (ML).
Tyrfobiont s lokálním výskytem na horských a podhorských rašeliništích, v nižších polohách velmi vzácný.

Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) – Boh.: Hradec Králové, Plachta (5861), 22.VII.1992 - 1 ex. na světlo (M. Mikát lgt. et coll., P det.).
Bionomie druhu není dosud dostatečně známa. Jde o velmi pohyblivý druh, který bývá sbírán nejčastěji na světlo nebo náhodně při přeletech na rozmanitých stanovištích. Původně jde snad o druh lesních mokřin.

Agonum lugens (Duftschmid, 1812) – Boh.: Týnec nad Labem (6958), 19.VIII.1999 - 1 ex. na okraji močálu s orobincem (H); Mor.: Čejč (7067), 22.VII.1998 - 1 ex. na světlo (RS).
Charakteristický druh zachovalých lužních porostů. Z Čech byly dosud uváděny jen čtyři lokality: Praha (Lokaj 1870), Stříbřec - Nová řeka (Hůrka 1979), Litomyšl (Pičman 1982) a Lobkovice (Pičman 1986).

Agonum viridicupreum viridicupreum (Goeze, 1777) – Mor.: Ždánice (6968), 20.-21.V.1998 - 2 ex. na mokřině v poli (VE); Uherský Brod (6771), 19.V.1999 - 1 ex. a 22.V.1999 - 1 ex. mezi řídkou vegetací na bahně na mokřině v poli (L).
Hygrofilní druh rozmanitých typů mokřadů, v Čechách pravděpodobně již vyhynulý. Na Moravě bývá nalézán na nezastíněných březích s nezapojenou vegetací v dosahu větších řek. Nálezy na polních mokřinách dokumentují jeho schopnost vykonávat přelety na delší vzdálenosti a vyhledávat nová stanoviště.

Europhilus gracilis (Sturm, 1824) – Mor.: Bzenec-Přívoz (7069), 8.V.1998 - 1 ex. v močálu (K).
Lokální druh mokřadů na kyselých půdách, na Moravě je známo jen nemnoho lokalit.

Amara concinna Zimmermann, 1831 – Boh.: Postřekov (6442-43), 17.VIII.1996 - 1 ex. (P. Zahradník lgt. et coll., MA det.).
Na zaplavovaných loukách, i jinde v okolí zachovalých břehů vod. Druhý doložený nález v Čechách. Dosud pouze na uvedené lokalitě (cf. Těťal 1992).

Amara anthobia A. Villa et G. B. Villa, 1833 – Boh.: Praha-Troja (5852), 9.VI.1997 - 5 ex. na stráni pod bohnickým sídlištěm (VE), Praha-Troja, Podhoří (5852), 5.V.1998 - 1 ex. na suché stráni (H); Mor.: Čejč (7067), 4.IV.1999 - 1 ex. na sprašové stepi u pole (K); Pouzdřany (7065), 2.V.1999 - 1 ex. na okraji pole pod hroudami a plevelem (L); Čejč (7067), 20.V.1999 - 1 ex. pod dřevem ve větrolamu (ML); Hlohovecký rybník (7266), 2.VI.2001 - 10 ex. (KL).
V Čechách sbírán dosud jen v Praze. Nálezy ukazují na početnější populaci na nejteplejších pražských lokalitách v Troji. Předchozí nálezy zde byly dosud jen jednotlivé. Je možné, že sem byl v minulosti zavlečen se sazenicemi vinné révy.

Amara famelica Zimmermann, 1831 – Boh.: Slatina pod Hazmburkem (5550), 22.VIII.1998 - 1 ex. v rozpukaném bahně na břehu rybníka (H); Bělá pod Bezdězem (54-5554), 17.-18.X.1998 - 5 ex. na vřesovišti na střelnici Vrchbělá (VE), 14.VIII.1999 - 1 ex. (CH), 24.III.2000 - 2 ex. a 26.IV.2000 - 8 ex. (KL); Čermná nad Orlicí (5962), 8.VI.1999 - 1 ex. na vřesovišti (M. Nešpořík lgt. et coll., P det.).

Velmi lokální druh kyselých půd, častěji se nalézá na vřesovištích. Nález na bahnitém, mírně zasoleném břehu rybníka je proto velmi pozoruhodný.

Amara lucida (Duftschmid, 1812) – Mor.: Havraníky (7162), 9.IX.1999 - 1 ex. (VO), 2 ex. na okraji vinice (MO); Uherský Brod (6971), 5.VI.2001 - 2 ex. na úhoru pod plevelem (L).
Lokální druh lehkých až písčitých půd teplejších oblastí.

Amara makolskii Roubal, 1923 – Boh.: Husinec, vrch Červená skála (5852), 3.V.2000 - 2 ex. pod listím v březovém lemu skalní stepi (MO et VO); Milovice-Mladá (5755), 14.VI.2000 a 10.IX.2000 - celkem 15 ex. v duboborovém lese s břízou a vřesem (MO et VO), 13.V.-14.VI.2000 - 1 ex. v zemní pasti tamtéž (MO et VO lgt., VO det. et coll.); Břehyňský rybník (5454), 9.X.2000 - 1 ex. (KL); Mor.: Dubňany (7068), 4.IV.1998 - 1 ex. na písčité lesní cestě (L).
Lokální druh lesních a hájových stanovišť s březovými porosty.

Amara spreta Dejean, 1831 – Mor.: Sedlec-Mušlov (7266), 1.V.1999 - 3 ex. (RS).
Lokální a nehojný psamofilní druh.

Amara brunnea (Gyllenhal, 1810) – Boh.: Praha-Hloubětín (5853), 15.VI.1998 - 2 ex. a 18.VI.1998 - 25 ex. v březovém háji na pískovcové stráni u cihelny (VE); Soos (5840), 25.IV.1999 - 2 ex. v březovém lese na zanikajícím vřesovišti (H); Nová Ves (5962), 5.VI.1999 - 2 ex. (M. Nešpořík lgt. et coll., P det.); Mělice (5959), 19.VI.1999 - 6 ex. (J. Jelínek lgt. et coll., P det.); Praha-Lysolaje, Housle (5852), 25.VI.1999 - 10 ex. pod listím na pískovcovém svahu na jižním horním okraji rokle, 8 ex. immaturních, pozorováno více ex. (VE); Hradčany (5454), 28.VIII.1999 - 2 ex. pod kusy dřev na vátém písku u rybníka Držák (KP); Milovice-Mladá (5755), 14.VI. a 10.IX.2000 - 48 ex. v duboborovém lese s břízou a vřesem (MO et VO), 13.V.-14.VI.2000 - 3 ex. v zemní pasti tamtéž (MO et VO lgt., VO det. et coll.); Husinec, vrch Červená skála (5852), 6.VIII.2000 - 2 ex. pod listím v březovém lemu skalní stepi (MO et VO); Břehyňský rybník (5454), 9.X.2000 - mnoho ex. (KL); Zahrádky (5353), 12.VIII.2001 - 5 ex. pod listím v borovém lese s břízou (MO et VO), 12.VIII.-2.IX.2001 - 1 ex. v zemní pasti na terase Bobřího potoka (MO et VO lgt., MO det. et coll.).
Lokální druh lesních a hájových porostů s břízami, nejčastěji na lehkých, sypkých, nebo písčitých půdách.

Amara infima (Duftschmid, 1812) – Boh.: Bělá pod Bezdězem (54-5554), 17.-18.X.1998 - 22 ex. na vřesovišti na střelnici Vrchbělá, 11 ex. immaturních, pozorováno více ex. (VE).
Na vřesovištích lokálně někdy i hojný druh.

Amara praetermissa (C. R. Sahlberg, 1827) – Boh.: Krkonoše, Luční hora (5260), 26.VII.1995 - 1 ex. (J. Říha lgt. et coll., H det.); Zaječice pr. Jirkov (5546), 31.V.2000 - 7 ex. pod listím ve svahu zářezu silnice (MO); Mor.: Bystřice pod Lopeníkem (7072), 22.VI.1997 - 25 ex. a 5.IX.1998 - 8 ex. (RS).
Velmi lokální druh, zejména lesních světlin a vřesovišť, v horách častěji na loukách nad hranicí lesa.

Amara gebleri Dejean, 1831 – Boh.: Železné hory - Kaňkovy hory, Lhotka env., PR Lichnice (6159), 10.VII.1999 - 1 ex. sesmýkán z nitrofilní ruderální vegetace na okraji lesa (M. Fiala, MJ revid.); Mor.: Lukov - Gáliš (7161), 14.IX.1995 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.).
Lokální druh vlhčích stanovišť, typický zejména pro okolí vodních toků v podhůří.

Zabrus spinipes spinipes (Fabricius, 1798) – Mor.: Mikulov, Růžový vrch (7165), 9.IX.1998 - 1 ex. pod kamenem na úpatí stepního svahu (L); Skalice, Stříbrný vrch (7063), 3.IV.1999 - 7 ex. mrtvých na poli (M. Škorpík, VO et MO); Úvaly (7266), 27.V.2001 - 1 ex. na okraji pole v sousedství vápencové stepi (L).
Reliktní stepní brachypterní druh, nejčastěji nalézaný v oblastech s vinicemi.

Callistus lunatus (Fabricius, 1775) – Boh.: Praha-Lysolaje (5852), 30.VIII.1999 - 4 ex. v pískovně na hlinitém odvalu s třtinou křovištní (*Calamagrostis epigejos* (L.)) (VE), 19.IX.2001 - 3 ex. na hlinitém svahu (KL); Mor.: Bohuslavice pr. Kyjov (6968), 10.-11.IX.1997 - 2 ex. na xerotermní stráni, při okrajích polí a na mezích (VE); Javorník (7171), 26.VI.1998 - 2 ex. na ruderálu na okraji lomu (L); Mikulov, Růžový vrch (7165), 16.VIII.1999 - 2 ex. na okraji stepi (H).
Lokální druh. Častěji na erodovaných jílovitých, sprašových a vápencových půdách v pahorkatinách. V Čechách je dnes nepoměrně vzácnější než na Moravě.

Chlaenius spoliatus spoliatus (Rossi, 1790) – Boh.: Hradec Králové, Plachta (5861), 13.VI.1997 - 1 ex. (M. Mikát lgt. et coll., P det.); Slatina pod Hazmburkem (5550), 21.VII.1998 - 2 ex. na zasoleném břehu umělé nádrže (MO), 22.VIII.1998 - 1 ex. v rozpukaném bahně na břehu nádrže (H); Mor.: Mikulčice (7268), 17.V.1998 - 1 ex. (RS); Ostrava-Hrabová (6275), 21.V.1999 - 1 ex. ve štěrku na břehu řeky Ostravice (P. Boža lgt. et coll., S det.); Uherský Brod (6971), 8.V.2001 - 1 ex. a 10.VI.2001 - 6 ex. na bahně zarůstající polní mokřiny (L).
V Čechách i v severní části Moravy velmi vzácný hygrofilní druh, nalézaný většinou při přeletech nebo na příležitostných stanovištích. Na jižní Moravě je místy hojný.

Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781) – Boh.: Provodín (5353), 23.VIII.1998 - 1 ex. v pískovně (MO); Ejpovice (6246), 7.IX.2000 - 7 ex. v hliništi kaolinového lomu (VE).
Nehojný druh, nalézaný především u neznečištěných vod s volnými hlinitými nebo písčitými břehy.

Chlaenius tristis (Schaller, 1783) – Boh.: Staré Sedliště (6242), 29.VI.1997 - 1 ex. na zarostlém břehu rybníka Mělký cca 1,5 km východně od obce (T); Slatina pod Hazmburkem (5550), 22.VIII.1998 - 1 ex. v bažince s rákosem a orobincem (H), 1 ex. v mokřině pod hrází nádrže (MO); Novozámecký rybník pr. Jestřebí (5353), 12.V.2001 - 1 ex. (KL); Mor.: Únanov (7162), 15.VIII.1995 - 1 ex. v kaolince (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.); Vranov nad Dyjí, Ledové sluje (7160), 6.VI.1997 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.); Mikulčice (7268), 17.V.1998 - 1 ex. (RS); Čejč (7067), 22.VII.1998 - 1 ex. na světlo (RS).
Druh zachovalých mokřadů, mimo jižní Moravu jen lokálně a vzácně se vyskytující.

Oodes gracilis A. Villa et G. B.Villa, 1833 – Boh.: Novozámecký rybník pr. Jestřebí (5353), 19.II.2001 - 2 ex. (VO); Zahrádky (5353), 13.V.2001 - 1 ex. v nivě Bobřího potoka (VO); Provodín, Lysé kameny (5353), 5.IX.2001 - 1 ex. (KL); Mor.: Lednice (7166), 14.II.1998 - 3 ex. (RS); Úvaly (7266), 7.V.2000 - 1 ex. na zarostlých březích rybníčku (L).
Druh zachovalých mokřadů a slatin, vzácně nalézaný i v lužních lesích.

Licinus depressus (Paykull, 1790) – Boh.: Praha-Radotín, Lahovská (6052), 29.VI.-3.IX.1999 - 6 ex. v zemních pastech (MO et VO); Kamenec pr. Radnice (6147), 24.VII.1999 - 1 ex. (V. Dongres lgt. et coll., T det.); Praha-Uhříněves, Netluky (5953), 19.VIII.1999 - 1 ex. na okraji mokřiny v polích (MO); Kozomín (5752), 2.VII.-6.VIII.2000 - 1 ex. v zemní pasti na ruderálu u silnice (MO et VO lgt., MO det. et coll.).

Druh široké škály stanovišť, chybí na ruderálech v primárním stádiu sukcese. Výskytuje se většinou jednotlivě, je predátorem menších druhů měkkýšů. Častější výskyt pozorovaný v posledních letech by snad mohl souviset s invazním šířením některých druhů plžů.

Badister unipustulatus Bonelli, 1813 – Boh.: Písty (5550), 23.VIII.1994, 26.XI.1994 a 19.II.1995 - mnoho ex. (MO); Litoměřice (5450), 19.V.1996 - 1 ex. v detritu u řeky Labe (MO).
Charakteristický druh zachovalých lužních porostů, v Čechách již jen velmi lokální.

Badister dilatatus (Chaudoir, 1837) – Boh.: Mantov (6345), 30.V.1998 - 4 ex. v rákosí na břehu rybníka Metálka cca 1 km jihovýchodně od obce (T).
Hygrofil vázaný na břehy vod s bohatou pobřežní vegetací.

Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) – Boh.: Podhorní Újezd (5658), 9.VII.1992 - 12 ex. (P); Mor.: Bílé Karpaty, Okrouhlá (6974), 4.IX.1999 - 1 ex. (RS).
Lokální druh vlhčích luk, pastvin a okolí vod, častější v pahorkatinách a v podhůří.

Anisodactylus signatus (Panzer, 1797) – Boh.: Ejpovice (6247), 19.IX.1999 - 1 ex. v kaolinovém lomu cca 1 km západně od obce (Z. Doležal lgt. et coll., T det.).
Druh vázaný na volné plochy s nezapojenou vegetací. Nejčastěji na ruderálech, výsypkách, okrajích polí a na písčitých půdách. První známý nález v západních Čechách.

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) – Boh.: Slatina pod Hazmburkem (5550), 22.VIII.1998 - 2 ex. v rozpukaném bahně na břehu nádrže (H); Mor.: Děhylov (6175), 10.VII.1996 - 1 ex. pod kusem kůry na břehu Poštovního rybníka (S).
Vlhkomilný druh, žijící na loukách i na dalších stanovištích v dosahu větších řek. Příležitostně migruje i na rozmanitá stanoviště v širokém okolí, charakteristický bývá pro dna vypuštěných rybníků. Poslední známý (nepublikovaný) nález z Čech pochází z roku 1963: Frymburk (6748), 16.VII.1963 - 1 ex. (M. Reška lgt.)(Pulpán 1993). Potvrzení současného výskytu v Čechách.

Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828) – Mor.: Havraníky env. (7162), 9.IX.1999 - 2 ex. v prosevu vřesu (MO).
Callunobiont, na Moravě jen na několika lokalitách.

Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812) – Boh.: Svinary (5761), 12.VIII.1998 - 1 ex. (M. Mikát lgt. et coll., P det.); Černousy, V Poli (5056), 19.VIII.2000 - 26 ex. na světlo (VO); Zahrádky (5353), 22.VII.2001 - 1 ex. na okraji pole u rybníka Jílek (VO); Mor.: Štramberk (6474), 14.VIII.1997 - 3 ex. na světlo (S); Čejč (7067), 22.VII.1998 - 1 ex. na světlo (RS); Bylnice (6974), 5.VIII.1999 - 2 ex. na světlo (RS).
Široce rozšířený druh rozmanitých stanovišť, pro skrytý způsob života v zemi sbírán hlavně na světlo, někdy i ve větším počtu.

Acupalpus interstitialis Reitter, 1884 – Mor.: Dobelice - Kocourky (6963), 8.V.1998 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.); Skalice - Kocourky (6963), 8.V.1998 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.).
Lokální xerofilní druh, rozšířený především v oblastech s vinicemi.

Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – Mor.: Dubňany (7068), 27.V.1999 - 1 ex. a 10.VI.1999 - 2 ex. mezi orobincem na vysýchající mokřině na písčinách (L); Uherský Brod (6971), 8.V.2001 - 1 ex. na bahně polní mokřiny (L).
Hygrofil, vázaný na vegetací porostlé břehy stojatých vod.

Acupalpus maculatus (Schaum, 1860) – Boh.: Zálší u Chocně (6063), 17.IV.1994 - 2 ex. (J. Jelínek lgt. et coll., P det.); Louny env., Černodoly (5548), 29.VI.1997 - 1 ex. na světlo

na západním svahu Velkého vrchu (VE); Mor.: Čejč (7067), 22.VII.1998 - 3 ex. na světlo (RS); Moravský Písek (7069), 6.VI.1999 - 4 ex. na bahně mokřiny v nivě řeky Moravy (L). Halofil, vyhledávající hlinité a jílovité břehy mokřin s řidší vegetací. V Čechách dosud velmi vzácný a lokální druh.

Acupalpus suturalis Dejean, 1829 – Mor.: Němčičky (7067), 18.V.1996 - 1 ex. (P. Boža lgt. et coll., S det.).

Vegetací zarostlé břehy mokřin na slaniskách a subhalofilních stanovištích. Druh byl doposud zařazován mezi halobionty. V České republice znám pouze z Moravy. Moravské nálezy, stejně jako většina nálezů na Slovensku naznačují, že půjde spíše o druh halofilní. Z Moravy druh poprvé uvádí Resl (2000) na základě nálezů z roku 1998. Třetí známý moravský nález.

Anthracus longicornis (Schaum, 1857) – Mor.: Mikulčice (7268), 3.V.1997 - 10 ex. a 17.V.1997 - 2 ex. (RS); Šumice (6972), 8.V.1999 - 1 ex. (RS).

Lokální druh zachovalých mokřadů, slanisek a subhalofilních lokalit.

Ophonus ardosiacus (Lutschnik, 1922) – Mor.: Mikulov, Růžový vrch (7165), 9.IX.1998 - 10 ex. v dozrávajících okolících mrkve (*Daucus carota* (L.)), 22.VIII.1999 - 32 ex. (RS).

Velmi lokální xerofilní druh. Nález potvrzuje stálý výskyt na uvedené lokalitě a zároveň potvrzuje dosud pouze předpokládanou potravní vazbu na semena *Daucus carota*.

Ophonus diffinis (Dejean, 1829) – Boh.: Slatina pod Hazmburkem (5550), 21.VII.1998 - 2 ex. na světlo a 14.VIII.2000 - 1 ex. na světlo (MO); Praha-Šeberov, Hrnčířské louky (5953), 11.VIII.1998 - 1 ♂ na světlo na louce u rybníka Brůdek (VE); Most-Třebušice (5447), 6.V.2001 - 4 ex. na rekultivované výsypce (VO); Praha-Běchovice (5953), 20.IX.2001 - 1 ♂, 2 ♀♀ v podvečer v úborech *Daucus carota* na zrušeném poli jižně od pískovcového vršku (VE); Mor.: Šumice (6972), 19.VII.1998 - 1 ex. na světlo, 20.VII.1998 - 5 ex. na světlo a 22.VII.1998 - 1 ex. na světlo (RS); Bylnice (6974), 5.VIII.1999 - 1 ex. na světlo (RS).

Xerofilní druh stepních oblastí, v Čechách byl doposud znám jen z několika lokalit. Okolnosti nálezů z posledních let potvrzují domněnku o šíření druhu i do méně xerotermních oblastí, a to i na zcela druhotná stanoviště.

Ophonus stictus Stephens, 1828 – Boh.: České středohoří, Písečný vrch (5548), 16.VII.1997 - 1 ex. pod převislou travou v drobném kamení (MA); Lipník (5755), 2.VII.1998 - 4 ex. (Z); Mor.: Brod nad Dyjí (7165), 3.VIII.1997 - stovky ex., většinou immaturních, mezi drobnými oblázky na zpustlé vinici (MA); Ždánice (6968), 20.-21.V.1998 - 1 ♀ na okraji pole (VE).

Lokální druh různých otevřených stanovišť, v poslední době je nalézán opět častěji, zřejmě v důsledku omezení chemizace v zemědělství. Pozorování masového výskytu je však naprosto ojedinělé.

Ophonus cordatus (Duftschmid, 1812) – Boh.: Tmaň env., Na Voskopě (6050), 14.VII.1999 - 2 ex. na vápencové suti (VO); Suchomasty env., Voskop (6050), 8.V.2001 - 10 ex. pod kameny na skalnaté stepi v předpolí lomu Čertovy schody, 24.VIII.2001 - 3 ex. v noci v úborech *Daucus* sp. společně s velmi hojným *Ophonus puncticeps* Stephens, 1828 (MO et VO); Mor.: Mutěnice (7068), 21.VI.1997 - 1 ex. na vinici pod hroudami a vegetací ve spraši (L).

Lokální druh vápnitých a sprašových xerotermních lokalit, typický zejména pro lomy a xerotermní pastviny. Na Moravě je nepoměrně vzácnější než v Čechách. Nálezy potvrzují dosud pouze předpokládanou potravní vazbu na semena *Daucus carota*.

Ophonus melleti (Heer, 1837) – Boh.: Jičín (5558), 31.VIII.2001 - 1 ex. pod *Daucus* sp. společně se 3 ex. *O. rupicola* (Sturm, 1818) a 26 ex. *O. puncticeps* (VO).
Xerofilní, v teplejších oblastech poměrně častý druh. Z Jičínska dosud nebyly známé údaje o výskytu.

Ophonus subsinuatus Rey, 1886 – Mor.: Uherský Brod (6771), 3.V.1997 - 1 ♂ (L); Ždánice (6968), 17.VI.1997 - 1 ex. na poli pod plevelem (O. Luža lgt. et coll., L det.).
Málo známý druh, který je v posledních letech nalézán jen zřídka, buďto na světlo, nebo náhodně.

Cryptophonus tenebrosus centralis (Schauberger, 1929) – Boh.: Hradec Králové (5861), 4.X.1995 - 1 ex. (T. Popelka lgt. et coll., P det.); Louny env., Černodoly (5548), 29.VI.1997 - 3 ex. na světlo na západním svahu Velkého vrchu (VE); Slatina pod Hazmburkem (5550), 21.VII.1998 - 2 ex. na světlo (MO); České středohoří, vrch Oblík (5548), 11.VIII.1999 - 7 ex. na okraji pole na jihovýchodním úpatí, v porostu tořice rolní (*Torilis arvensis* (Huds.) (VE); Praha-Radotín, Lahovská (6052), 3.IX.1999 - 2 ex. pod trsy *Daucus carota* (L.) (MO et VO lgt. et coll., MO det.); Slatina pod Hazmburkem (5550), 14.VIII.2000 - 1 ex. na světlo (MO); Suchomasty env., Voskop (6050), 24.-25.VIII.2001 - více ex. v noci v úborech *Daucus* sp., ve dne v zemi v porostech *Daucus* sp. v předpolí lomu Čertovy schody (MO et VO); Milovice-Mladá (5755), 26.V.2000 - 1 ex. na ruderálu v porostu *Daucus* sp. (MO); Mor.: Mikulov (7165), 22.VIII.1999 - 3 ex. (RS); Uherský Brod (6971), 24.IX.2000 - 1 ex. na úhoru v zemi pod vegetací (L).
V Čechách byl považován donedávna za vzácnější druh xerotermních lokalit, v posledních letech početnost jeho populací stoupá a podobně jako *O. diffinis* se šíří i na ruderálních stanovištích.

Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774) – Boh.: Krkonoše, Harrachovy kameny nad Kotelní jámou (5259), 15.VII.1999 - 1 ex. v nadmořské výšce 1420 m (J. Říha).
Pozoruhodný nález velmi hojného druhu nižších a středních poloh ve značné nadmořské výšce. Pravděpodobně jde o přeletující exemplář.

Pseudoophonus calceatus (Duftschmid, 1812) – Mor.: Hukvaldy (6375), 4.VIII.1998 - 1 ex. pod světlem na parkovišti (K).
Mimo teplé oblasti jen sporadicky se vyskytující xerofilní druh.

Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) – Boh.: Vonoklasy (6051), 11.V.1997 - 2 ex. (P. Šrůta lgt., MO det., coll. Okresní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi); Bulovka - Bulovský vrch (5056), 24.IV.1998 - 1 ex. na luční cestě pod kusem lepenky (BR); Nadryby (6147), 25.IV.1998 - 3 ex. pod kameny a hroudami na okraji pole na úpatí vrchu Chlum cca 1 km východně od obce (T); Vysoké Chvojno (5861), 12.-20.V.1998 - 1 ex. v zemní pasti (M. Mikát lgt. et coll., P det.); Kadaň env., Blzeňský vrch (5645), 27.III.1999 - 5 ex. na okraji lomu (H); Česká Lípa-Lada (5353), 3.V.1999 - 1 ex. na betonovém chodníčku (KP); Praha-Lochkov, PP Lochkovský profil, 9.VI.1999 - masový výskyt na okraji pole (MO et VO); Děčín, Pastýřská stěna (5251), 10.IV.2000 - 1 ex. (M. Chochel lgt. et coll., MO det.); Husinec, vrch Červená skála (5852), 3.V.2000 - 1 ex. pod trávou na malé stepi (MO); Zahrádky, 22.VII.2001 - 1 ex. na okraji pole po deštích (VO).
V poslední době opět častěji se objevující druh přechodných stanovišť, okrajů polí a úhorů.

Harpalus affinis (Schrank, 1781) – Boh.: Krkonoše, Vysoké Kolo (5259), 10.VII.1999 - 1 ex. v nadmořské výšce 1490 m (J. Říha).

Pozoruhodný nález hojného druhu nižších a středních poloh ve značné nadmořské výšce. Pravděpodobně jde o přeletující exemplář.

Harpalus albanicus Reitter, 1900 – Mor.: Mikulov (7165), 22.VIII.1999 - 1 ex. (RS); Čejč (7067), 19.V.2001 - 1 ex. (KL).

Druh stepních oblastí s vinicemi, v České republice vzácně jen na jižní Moravě.

Harpalus cupreus fastuosus Faldermann, 1835 – Mor.: Břeclav - Pohansko (7267), 6.IV.1997 - 1 ex. pod kůrou padlého kmene na zatopených loukách (L).

Druh žijící především na zaplavovaných loukách a pastvinách. Pátý nález na jižní Moravě. (cf. Veselý & Těťál 1998).

Harpalus distinguendus distinguendus (Duftschmid, 1812) – Boh.: Ejpovice (6247), 14.IX.1999 - 1 ex. a 19.IX.1999 - 2 ex. pod kameny v kaolinovém lomu cca 1 km západně od obce (T).

Hojný druh, žijící především na druhotných stanovištích. První známé nálezy na Plzeňsku a druhá známá lokalita v západních Čechách.

Harpalus flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783) – Boh.: Hradčany (5454), 28.VIII.1999 - 8 ex. pod kusy dřev na vátém písku u rybníka Držák (KP).

Psamobiont vázaný na volné váté písky. Potvrzení výskytu na uvedené lokalitě.

Harpalus froelichi Sturm, 1818 – Boh.: Žloukovice (5949), 15.-23.VII.1995 - 1 ex. na světlo (MO); Slatina pod Hazmburkem (5550), 21.VII.1998 - 8 ex. na světlo (MO).

Xerofilní druh, v Čechách mimo písčité oblasti poměrně vzácný a lokální.

Harpalus hirtipes (Panzer, 1797) – Mor.: Bzenec-Přívoz (7069), 7.IX.1997 - 1 ex. pod dřevem v písku na pasece (L).

Psamobiont vázaný na volné váté písky. Potvrzení výskytu na uvedené lokalitě.

Harpalus modestus Dejean, 1829 – Boh.: Roudnice nad Labem (5551), 29.III.1998 - 1 ex., 28.IV.1998 - 1 ex. a 4.IV.1999 - 1 ex. (J. Kohout lgt. et coll., MO det.); Praha-Hloubětín (5853), 18.VI.1998 - 1 ex. na jižním, xerotermním okraji bývalé cihelny (VE); Mor.: Sedlec-Mušlov (7266), 1.V.1999 - 1 ex. (RS).

Xerofilní druh, mimo písčité oblasti poměrně velmi vzácný a lokální.

Harpalus picipennis (Duftschmid, 1812) – Boh.: Milovice-Mladá (5755), 18.VIII.2000 - 1 ex. (MO); Mor.: Čejč (7067), 3.IV.1999 - 1 ex. pod kamenem na stepi (ML).

Xerofilní druh, mimo větší písčité oblasti poměrně velmi vzácný a lokální.

Harpalus politus Dejean, 1829 – Boh.: Pardubice (5960), 30.IV.1998 - 1 ex. na letišti (T. Popelka lgt. et coll., P det.); Kadaň, Zlatý vrch (5645), 9.IV.1999 - 1 ex. (P. Krásenský lgt. et coll., MO det.); České středohoří, Bečovský vrch (5548), 30.IV.2001 - 1 ex. a 22.V.2001 - 3 ex. (KL); České středohoří, vrch Raná (5548), 23.VI.2001 - 15 ex. v noci smýkáním na stepi (J. Preisler lgt., VO det. et coll.), pozorovány další desítky ex. (J. Preisler et R. Škoda observ.).

Stepní druh, známý z xerotermních oblastí Českého krasu a Českého středohoří. Z východních Čech nebyl dosud znám.

Harpalus progrediens Schauberger, 1922 – Boh.: Doksany, PR Loužek (5550), 16.IV.1994, 12.V.1994 a 19.VI.1994 - celkem 6 ex. pod listím na světlině v lužním lese (MO), 15.V.2001 - několik ex. pod listím na světlině v lužním lese (D. W. Wrase); Mor.: Ostrava-Hrabová (6275), 18.IV.1999 - 1 ex. na břehu řeky Ostravice (K).

Lokální druh zachovalých zaplavovaných luk a lužních porostů v okolí vodních toků.

Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) – Boh.: Bělá pod Bezdězem (54-5554), 24.VII.1998 - 2 ex. na střelnici Vrchbělá, noční sběr na písčinách (VE).
Xerofilní druh, rozšířený v teplejších oblastech, často na písčinách. Na Českolipsku vzácný druh.

Harpalus solitaris Dejean, 1829 – Boh.: Loučky, Jalový dvůr (5742), 2.V.1998 - 1 ex. na vřesovišti na písku (H); Jizerské hory, Josefův Důl env. (5157), 30.VII.1998 - 2 ex. v nadmořské výšce 850 m (VO); Radvanice (5462), 22.V.1999 - 1 ex. (A. Hamet lgt. et coll., P det.); Šumava, Filipova Huť pr. Modrava (6947), 17.-24.VII.1999 - 2 ex. pod kusy dřev na pasece (KP).
V horách na lesních světlinách místy nevzácný druh, v nížinách se vyskytuje jen velmi lokálně a vzácně.

Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923 – Boh.: Litoměřice (5450), 18.V.1996 - 1 ex. pod listím u řeky Labe (MO); Praha-Troja, Podhoří (5852), 5.V.1998 - 2 ex. na suché stráni (H); Pardubice (5960), 18.V.1998 - 1 ex. na letišti (T. Popelka lgt. et coll., P det.); Praha-Lochkov, PP Lochkovský profil, 9.VI.1999 - 1 na okraji pole (MO); Malý Bor pr. Stvolínky (5352), 5.VI.1999 - 1ex. na písčité louce pod trávou (MO); Lipník-Mladá (5755), 9.V.2001 - 1 ex. (KL); Mor.: Dubňany (7068), 4.IV.1998 - 1 ex. při okraji lesní cesty pod vegetací v písku (L), 3.V.1998 - 4 ex. (RS).
Velmi lokální druh, častější na písčinách, místy se nachází i ve světlých suťových lesích.

Harpalus zabroides Dejean, 1829 – Mor.: Čejč (7067), 22.VII.1998 - 3 ex. na světlo (RS).
Lokální, skrytě v zemi žijící druh, vzácně se vyskytuje především na spraŠových půdách nejteplejších oblastí.

Polistichus connexus (Fourcroy, 1785) – Boh.: Slatina pod Hazmburkem (5550), 22. VIII.1998 - 1 ex. v puklinách bahna na břehu nádrže spolu s *Diachromus germanus* (Linnaeus, 1758)(MO); České středohoří, vrch Raná (5548), 11.IV.2000 - 1 ex. a 12.IV.2001 - 4 ex. (KL); České středohoří, vrch Oblík (5548), 30.IV.2001 - 1 ex. (KL); České středohoří, vrch Radobýl (5450), 18.IX.2001 - 1 ex. (KL); Mor.: Šumice (6972), 21.VII.1998 - 1 ex. na světlo (RS).
Druh vázaný především na volné vysýchavé jílovité půdy, v jejichž puklinách žije. Lokálně na stepích, početněji na loukách a pastvinách v okolí řek s přirozeným vodním režimem. Na Moravě mnohem vzácnější než v Čechách.

Perigona nigriceps (Dejean, 1831) – Boh.: Vysoké Chvojno (5961), 28.VII.1994 - 1 ex. (J. Jelínek lgt. et coll., P det.); Žloukovice (5949), 15.-23.VII.1995 - 7 immaturních ex. v hromadě pilin na lesní cestě (MO); Svojanov (6364), 9.VII.1999 - 1 ex. (T. Staněk lgt. et coll., P det.); Mor.: Lednice (7166), 28.VIII.2000 - 1 ex. v prosevu zbytku plodnice *Polyporus* sp. u paty dubu (P. Štourač).
Skrytě žijící druh vázaný na tlející rostlinný materiál.

Masoreus wetterhalli (Gyllenhal, 1813) – Boh.: Větrušice, Velký vrch (5852), 2.VII.2000 - 2 ex. pod listím a trávou na okraji dubo-akátového lesa (MO et VO), 2.VII.-6.VIII.2000 - 1 ex. v zemní pasti tamtéž (MO et VO lgt., MO det. et coll.).
Reliktní xerofilní druh, žijící zejména na skalních stepích a písčinách.

Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) – Boh.: Lipník (5755), 3.VI.1995 - 6 ex. oklep, 21.V.1996 - 5 ex. oklep (Z); Dolní Jelení (5962), 6.VIII.1996 - 1 ex. (M. Nešpořík lgt. et coll., P det.); Liberec-Ruprechtice (5256), 10.V.1997 - 1 ex. (VO); Ralsko - Kuřivody (5454), 14.VI.2000 - 1 ex. pod trávou na druhotné stepi (MO); Mor.: Vranov nad Dyjí, Ledové sluje (7160), 30.VI.1993 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.); Lukov, Klaperův

potok (7161), 3.VII.1993 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.); Čížov (7161), 26.IV.1994 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.); Čejč (7067), 4.IV.1999 - 1 ex. smykem (K). Druh rozmanitých, většinou však přírodně zachovalých stanovišť. V posledních letech se objevuje i v místech, kde nebyl po dlouhou dobu pozorován.

Lebia marginata (Fourcroy, 1785) – Mor.: Vranov nad Dyjí, Ledové sluje (7160), 12.VI.1991 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.); Znojmo, Kraví hora (7162), 30.VI.1993 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.).

Velmi lokální xerofilní druh, potvrzení výskytu na Znojemsku (cf. Veselý & Těťál 1998).

Demetrias imperialis (Germar, 1824) – Mor.: Šumice (6972), 21.VII.1998 - 1 ex. na světlo (RS).

Druh větších rákosin, na vhodných místech hojný. Přílet na světlo byl ale dosud pozorován jen zcela ojediněle.

Paradromius longiceps (Dejean, 1826) – Boh.: Litoměřice, Střelecký ostrov (5450), 2.III.1994 - 2 ex. pod kůrou tenkých větviček suchých jilmů na břehu Labe (MO); Doksany - PR Loužek (5550), 12.V.1994 - 1 ex. v pobřežní rákosině řeky Ohře (MO); Litoměřice env. (5450), 2.IX.1995 - 1 ex. v náplavu Labe při povodni (MO); Břehyňský rybník (5454), 6.-7.IX.1997 a 7.-8.V.2000 - 6 ex. v rákosinách (MO et VO); Černožice, potok Jordán (5661), 17.VIII.2000 - 1 ex. v rákosí u rybníka (MO); Zahrádky, PR Novozámecký rybník (5353), 12.VIII.2001 - 11 ex. v porostu rákosu (MO et VO).

Skrytě žijící druh rozsáhlejších rákosin a lužních porostů v nížinách a pahorkatinách.

Dromius angustus Brullé, 1834 – Boh.: Nižbor env. (5950), 4.I.1997 - 2 ex. pod kůrou jedlí (*Abies alba* Mill.) (J. Plocha lgt. et coll., MA det.).

V Čechách velmi lokální druh, nalézaný zejména v zachovalých lesních porostech.

Dromius kuntzei Polentz, 1939 – Mor.: Doubravy (6882), 25.XII.1997 - 1 ex. (RS); Hukvaldy (6375), 30.XII.1998 - 1 ex. pod kůrou jírovce (*Aesculus* sp.) v oboře (K).

Vzácný a lokální druh v lesních porostech pahorkatin.

Dromius quadraticollis A. Morawitz, 1862 – Boh.: Litoměřice (5450), 28.XII.1991 - 1 ex. pod kůrou javoru (*Acer* sp.) u řeky Labe (MO); Mor.: Hukvaldy (6375), 30.XII.1998 - 1 ex. pod kůrou jírovce (*Aesculus* sp.) v oboře (K).

V Čechách velice lokální a vzácný druh, ve Slezsku je mnohem rozšířenější.

Philorhizus crucifer crucifer (Lucas, 1846) – Boh.: Krušné hory, Nakléřov - Panenská (5249), 24.IX.1995 - 1 ex. ve vřesu v nadmořské výšce 600 m (MO); Kotouň (6548), 20.III.1998 - 1 ex. (J. Kohout lgt. et coll., MO det.); Nadryby (6147), 25.IV.1998 - 1 ex. pod kameny a hroudami na okraji pole na úpatí vrchu Chlum cca 1 km východně od obce (T); Roudnice nad Labem (5551), 4.IV.1999 -1 ex. a 21.V.1999 - 1 ex. (J. Kohout lgt. et coll., MO det.).

Xerofilní druh s dosud nepříliš známým rozšířením, dříve zaměňován za *P. notatus* (Stephens, 1828). Nález z Krušných hor je značně překvapivý, neboť dosavadní nálezy byly z teplejších oblastí.

Philorhizus quadrisignatus (Dejean, 1825) – Boh.: Březhrad (5860), 13.I.1995 - 1 ex. pod kůrou javoru (*Acer* sp.) u řeky Labe (MO); Mor.: Hukvaldy (6375), 30.XII.1998 - asi 10 ex. pod kůrou jírovce (*Aesculus* sp.) v oboře (K); Podmolí - Šobes (7161), 10.V.1998 - 1 ex. sesmýkán (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.).

Velice lokální a vzácný druh, v Čechách hlavně v okolí Labe a Vltavy.

Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) – Boh.: Korunka (5962), 27.V.1998 - 1 ex. (M. Nešpořík lgt. et coll., P det.); Mor.: Svatý kopeček pr. Mikulov (7165), 12.X.1994 - 2 ex. v prosevu listí pod křovinami (MO).

Druh žije na rozmanitých stanovištích, nejpočetnější populace bývají v lužních porostech. Z Čech jde o první spolehlivě určený nález, v České republice byl dosud nalézán jen na jižní Moravě. Nový druh pro Čechy.

Syntomus pallipes Dejean, 1825 – Boh.: Litoměřice (5450), 2.V.2000 - více ex. pod topolovým listím na ruderálu u Labe (MO); Chvatěruby (5752), 3.VI.2000 - mnoho ex. pod listím na okraji akátového lesíka (MO et VO).

V Čechách lokální a vzácný xerofilní druh, rozšířený v nížinách podél Labe a Vltavy.

Microlestes fissuralis Reitter, 1901 – Boh.: Praha-Radotín, Lahovská (6052), 29. VI.1999 - 1 ex. a 3.IX.1999 - 2 ex. na stepi (MO et VO lgt. et coll., MO det.); Mor.: Svatý kopeček pr. Mikulov (7165), 12.X.1994 - 1 ex. v prosevu listí pod křovinami (MO); Čejč (7067), 10.V.1997 - 1 ex. (RS).

Lokální xerofilní druh, v posledních letech se objevuje početněji i na druhotných stanovištích (rumiště, náspy), především v blízkosti přírodně zachovalých lokalit.

Cymindis angularis Gyllenhal, 1810 – Boh.: Větrušice, Velký vrch (5852), 6.VIII.2000 - 4 ex. pod listím a trávou na okraji dubo-akátového lesa (MO et VO); Milovice-Mladá (5755), 10.IX.2000 - 1 ex. na písčité stepi (VO); Mor.: Znojmo, Kraví hora (7162), 12.VIII.1995 - 1 ex. (M. Škorpík lgt. et coll., VO det.).

Xerofilní brachypterní druh přírodně zachovalých lokalit.

Cymindis cingulata Dejean, 1825 – Boh.: Ještědský hřbet, hora Ještěd (5256), 13.VII.1994 - 2 ex. v zemní pasti ve vrcholové suti v nadmořské výšce 1000 m (R. Čtvrtečka lgt., VO det., coll. Severočeské muzeum v Liberci). Nález byl v roce 1997 publikován pod jménem *Cymindis humeralis* (Fourcroy, 1785)(Čtvrtečka 1997). Mor.: Adamov env., Josefské údolí (6665), 12.IV.1999 - 1 ex. v prosevu v Quercetu (BE).

Velmi lokální a jednotlivě nalézaný druh. Převážně v horských a podhorských oblastech.

Cymindis macularis Mannerheim in Fischer von Waldheim, 1824 – Boh.: Bělá pod Bezdězem (54-5554), 25.VII.1998 - 3 ex. na střelnici Vrchbělá, na písčině s vřesem, z toho 2 ex. immaturní (VE), 29.IV.1999 - 2 ex. na střelnici Vrchbělá (CH), 14.VII.2000 - 1 ex. (KL).

Psamobiont vázaný na volné váté písky. Druh zde žije v prostoru bývalé střelnice na převátých pískovcových pískách. Pravděpodobně z téže lokality (Bělá pod Bezdězem) jej uvádí již Lokay (1906): „Na druhé obč. schůzi 20. února demonstruje MUDr. E. Lokay *Cymindis macularis*, kterou ulovila choť Dra Lokaye v Bělé pod Bezdězem". Dosud poslední známé nálezy z Čech pocházely z roku 1965 ze Zvěřínku u Nymburka (L. Daněk lgt.)(Pulpán 1993). Potvrzení výskytu v Čechách.

Cymindis vaporariorum (Linnaeus, 1758) – Boh.: Doksy (5454), 8.III.1997 - 4 ex. ve dřevě (CH), 9.III.1997 - 1 ex. (Z), 25.XII.1997 - 15 ex. ve dřevě (CH); Doksy env. (5454), 1.XI.1997 - 4 ex. pod kusy dřev ve vřesu (KP), 20.III.1999 - 4 ex. pod kusy dřev ve vřesu (KP); Česká Lípa-Žiznikov (5353), 24.II.1997 - 1 ex. ve dřevě (CH), 27.IX.1998 - 7 ex. ve dřevě (CH).

Reliktní a velmi lokální druh zachovalých lokalit, v chladnějších polohách na kyselých půdách.

ERRATA

V předchozí zprávě (Veselý & Těťál 1998) došlo ke dvěma omylům, které zde uvádíme na pravou míru:

„*Bembidion modestum* (Fabricius, 1801) - Slov.: Závod env. (7467), 28.V.1993 - 1 ex. pod vegetací a spadaným listím na písčitém okraji lesa (T)" (Veselý & Těťál 1998: 109). Údaj se týká druhu *Harpalus modestus* Dejean, 1829.

Elaphropus diabrachys Kolenati, 1845: tento druh byl sbírán v Čechách ještě před uvedeným rokem 1983 (viz Veselý & Těťál 1998: 106-107), a to v Hradci Králové (5761), VII.1970 - 1 ex. (J. Pulpán) a v Třebkově (6650), 7.-12.IX.1979 - 10 ex. (MO lgt., MO et J. Pulpán det. et coll.), viz Moravec (1986). Nepřesnost vznikla v důsledku toho, že Soustružník (1984) publikoval svůj nález z roku 1983 (třetí v Čechách) jako první.

LITERATURA

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1988). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni*, 6-7: 13-31 (in Czech, German title).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk za rok 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1989 und der Nachtrag zu den Funden im Jahre 1988). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni*, 8: 19-40 (in Czech, German summary).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1990 and supplement of prior period collections). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni, Series Carabidologica*, 1: 9-40 (in Czech, English summary).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1991 and supplementary data of prior period collections). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni, Series Carabidologica*, 2: 15-30 (in Czech, English summary).

ČTVRTEČKA R. 1997: Fauna brouků (Coleoptera) Ještědského hřbetu. *Sborník Severočes. Muz. - Přír. Vědy* (Liberec), 20: 39-62. (in Czech)

DOSTÁL J. 1989: *Nová květena ČSSR 1, 2.* Academia Praha, 1548 pp (in Czech).

FARKAČ J. & FASSATI M. 1999: Subspecific taxonomy of Leistus montanus from Central Europe (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). *Acta Soc. Zool. Bohem.*, 63: 407-425.

FASSATI M. 1946: K otázce výskytu některých horských Bembidií v Čechách. (De distributione geographica sp. Bembidiorum in Bohemia). *Čas. Čs. Společ. Entomol.*, 43: 65-69. (in Czech, Latin abstr.).

HŮRKA K. 1979: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Carabidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 66: 345.

HŮRKA K. 1996: *Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky*. Kabourek, Zlín, 565 pp (in English and Czech).

LOKAJ E.1870: Seznam brouků českých. *Archiv pro Přírodnické Proskoumání Čech Vydávané od Obou Komitétů pro Výskum Zemský*, 1: 7-77 (in Czech).

LOKAY E. 1906: Věstník 1906. *Čas. Čes. Společ. Entomol.*, 3: II (in Czech).

MIKÁT M. & HÁJEK J. 1999: Druhý příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) přírodní památky „Na Plachtě" v Hradci Králové. (The second contribution to the knowledge of the beetle fauna (Coleoptera) in the Nature Monument „Na Plachtě" (Hradec Králové, Czech Republic)). *Acta Musei Reginaehradecensis Ser. A.*, 27: 129-149 (in Czech, English abstr.).

MORAVEC P. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Carabidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 83: 155.

MORAVEC P. & SCHOLZ T. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Carabidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 89: 390.

PIČMAN Z. 1982: K faunistice střevlíkovitých brouků Československa 3. (Zur Faunistik der Carabiden Tschechoslowakei (Coleoptera) 3.). *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 18: 117-118 (in Czech, German summary).

PIČMAN Z. 1986: K faunistice střevlíkovitých brouků Československa 4. (Zur Faunistik der Carabiden Tschechoslowakei (Coleoptera) 4.). *Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 22: 61-62 (in Czech, German summary).
PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana*, 32 (Suppl.): 1-115 (in Czech, English abstr.).
PULPÁN J. 1993: *Prodromus střevlíkovitých brouků Československa.* [*Prodromus of the ground-beetles of Czechoslovakia*]. Unpubl. msc., dep. in coll. P. Veselý, Praha.
RESL K. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Carabidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 89: 390-391.
RESL K. 2000: Faunistic records from the Czech Republic - 104. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana*, 36: 175.
SOUSTRUŽNÍK J. 1984: Příspěvek k poznání střevlíkovitých brouků Trojské kotliny (Coleoptera, Carabidae). (Carabids of the Troja basin (Coleoptera, Carabidae)). *Gazella* (Praha), 3: 97-106 (in Czech, English summary).
TĚŤÁL I. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Carabidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 89: 391.
VESELÝ P. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Carabidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 89: 391.
VESELÝ P. & TĚŤÁL I. 1998: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska v letech 1992-96 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from Bohemia, Moravia and Slovakia in the years 1992-96 and supplementary data on earlier records). *Klapalekiana*, 34: 99-131 (in Czech, English summary).

SUMMARY

Records of rare species, species and species with incompletely known distribution for the Czech Republic as well as unusual records are given. Notes on biology and distribution of some species are presented.

The number in parentheses after the locality name represents the grid mapping square code used for faunistic research in the Czech Republic (Pruner & Míka 1996). The following abbreviations are used: Boh. - Bohemia; Mor. - Moravia; PP - Nature Monument; PR - Nature Reserve. Abbreviations of collectors and determinators are listed in "Zkratky jmen sběratelů, determinátorů a majitelů sbírek". Abbreviation of the collector's name (in parentheses) without further details means "the collector lgt., det. and coll.".

The following records are particularly interesting: *Trechus obtusus obtusus* - the second record from Moravia; *Trechus pulchellus* - the first known locality in southern Moravia; *Bembidion doderoi* - the second known locality in Bohemia; *Pterostichus leonisi* - confirmation of its present occurrence in Bohemia; *Pterostichus piceolus latoricaensis* - confirmation of its present occurrence in Moravia and the Czech Republic; *Platyderes rufus* - confirmation of its present occurrence in Bohemia; *Agonum angustatum* - new species for the Czech Republic; *Amara concinna* - confirmation of its present occurrence in Bohemia; *Diachromus germanus* - the first record in Bohemia since 1963; *Acupalpus suturalis* - the second known locality in Moravia and the Czech Republic; *Harpalus cupreus fastuosus* - confirmation of its present occurrence in Moravia and the Czech Republic; *Syntomus obscuroguttatus* - new species for Bohemia; *Cymindis macularis* - the first record in Bohemia since 1965.