Published December 31, 2002

Klapalekiana, **38**: 263-265, 2002
ISSN 1210-6100

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 156

Coleoptera: Staphylinidae

Omaliinae: Omaliini

Hypopycna rufula (Erichson, 1840). Bohemia centr.: Praha-Troja (5852), 5.X.1997, 1 ♂, 1 ♀, Sieben am Fusse einer alten Esche (*Fraxinus* sp.) im Tal Haltýře; 29.XI.1997, 2 ♂♂, 1 ♀, Sieben am Ufer des Flusses Vltava. Alle Ex. P. Štourač lgt., T. Jászay (1 Ex.) et P. Štourač (4 Ex.) det., coll. P. Krásenský, S. Snäll (Tumba, Schweden) et P. Štourač; Královice (5953), 9.II.-25.III.2000, 1 ♀, im Bodenfall, P. Moravec & P. Vonička lgt., P. Štourač det., coll. P. Moravec (Litoměřice). Nach Herman (2001a) aus Britannien, Frankreich, Italien, Österreich, Kroatien, Algerien und Tunesien bekannt, nach Köhler & Klausnitzer (1998) auch in Deutschland gefunden. Neue Art für die Fauna der Tschechischen Republik.

Oxytelinae: Oxytelini

Platystethus* (*Platystethus*) *degener Mulsant et Rey, 1878. Bohemia bor., Doksany (5551), 1.IV.2001, 1 ♂, im Sand am Ufer des Flusses Ohře, P. Štourač lgt., det. et coll. Herman (2001b) führt diese Art aus Europa, den Kanarischen Inseln, Türkei, Indien und USA an, nach Lohse (1989a) auch in der ehemaligen Tschechoslowakei (ohne nähere Angaben) nachgewiesen. Bestätigung des Vorkommens und erste konkrete Angabe aus der Tschechischen Republik.

Staphylininae: Staphylinini

Quedius* (*Raphirus*) *semiaeneus (Stephens, 1833). Moravia bor., Hutisko-Solanec (6575), X.1996, 1 ♀, K. Orszulik (Frýdek-Místek) lgt. et coll., L. Hromádka det., P. Štourač revid. Diese weit verbreiterte Art ist von Nachbarländern aus Deutschland (Schülke & Uhlig 1988), Polen (Burakowski et al. 1980) und der Slowakei (Majzlan 1999) bekannt, von Smetana (1993) mit Fragezeichen auch aus Mähren erwähnt. Bestätigung des Vorkommens und erste konkrete Angabe aus der Tschechischen Republik.

Tachyporinae: Tachyporini

Tachyporus atriceps Stephens, 1832. Moravia mer., Lednice (7166), 28.VIII.2000, 1 ♂, Sieben des Moders und Laubes am Fusse einer alten Eiche (*Quercus* sp.), P. Štourač lgt., det. et coll., L. Hromádka revid. Verbreiterung (Herman 2001c): Marokko, Algerien, Tunesien, Europa, Russland, Kaukasus, Türkei. Nach Boháč (1993) in der Tschechischen Republik nur aus Böhmen (ohne nähere Angaben) bekannt. Neue Art für die Fauna von Mähren.

Aleocharinae: Homalotini

Placusa* (*Placusa*) *incompleta Sjöberg, 1934. Bohemia bor., Krkonoše, Špindlerův Mlýn (5259), 1000 m, 18.VII.1994, 1 ♀, auf dem Fichtenstamm (*Picea* sp.); Bohemia centr., Louňovice (6054), 6.VI.1999, 1 ♂, unter der Rinde eines Fichtenstammes; Bohemia mer. occ., Šumava, Srní env., Antýgl (6947), 23.VI.1999, 1 ♀, von Fichtenästen abgeklopft. Alle P. Štourač lgt., det. et coll., S. Snäll revid. Diese nordische Art ist nach Burakowski et al. (1981) außer Skandinavien auch in Deutschland, Polen und Österreich verbreitert. Neue Art für die Fauna der Tschechischen Republik.

Aleocharinae: Bolitocharini

Pseudomicrodota jelineki (Krása, 1914). Moravia mer., Lednice (7166), 8.V.2001, 1 ♀, Sieben am Fusse einer alten Eiche (*Quercus* sp.), P. Štourač lgt., det. et coll. Verbreiterung dieser sehr seltenen Art nur wenig bekannt; Benick & Lohse (1974) führen sie außer Böhmen und der Slowakei aus Niederdonau, Frankreich und Schweden an, auch nach Likovský (1993) in der Tschechischen Republik nur aus Böhmen (ohne nähere Angaben) bekannt. Neue Art für die Fauna von Mähren.

Aleocharinae: Callicerini

Cadaverota hansseni (Strand, 1943). Bohemia bor. occ., Chomutov env., Bezručovo údolí Tal (5546), 3.V.2001, 1 ♀, Sieben des Laubes am Waldquellgebiet, P. Krásenský lgt., det. et coll.; Bohemia centr., Zvánovice (6054), 4.IX.1994, 1 ♂, im alten Täubling (*Russula* sp.), P. Štourač lgt., det. et coll. S. Snäll revid.; Bohemia mer. occ., Šumava, Stachy env., Homole Berg (6947), 27.VI.1994, 1 ♀, am Ufer des Waldbaches, P. Štourač lgt., det. et coll. Verbreiterung dieser Art nur wenig bekannt. In Deutschland aus Bayern (Benick & Lohse 1974) und aus Niedersachsen und dem östlichen Teil des Landes (Lohse 1989b) gemeldet, Benick & Lohse (1974) fügen noch Schlesien und das Alpengebiet (ohne nähere Angaben) hinzu. Nach Burakowski et al. (1981) kommt *C. hansseni* auch in Polen und in Südnorwegen vor. Neue Art für die Fauna der Tschechischen Republik.

Atheta* (*Datomicra*) *nigra (Kraatz, 1856). Moravia mer., Lednice (7166), 28.VIII.2000, 1 ♀, in Resten eines unbestimmten alten Löcherpilzes (Polyporales) im Sand am Fusse einer alten Eiche (*Quercus* sp.), zusammen mit *Bisnius palmi* Smetana, 1954 (H. Schillhammer det.), *Quedius vexans* Eppelsheim, 1881 (Staphylinidae), *Tenebrio opacus* Duftschmid, 1812 (Tenebrionidae) und einigen weiteren weniger seltenen Koleopteren, P. Štourač lgt., det. et coll. Verbreiterung (Burakowski et al. 1981): Britische Inseln, Fennoskandien, Mitteleuropa. Likovský (1993) führt diese Art nur aus Böhmen (ohne nähere Angaben) an. Neue Art für die Fauna von Mähren.

Acrotona* (*Strigota*) *obfuscata (Gravenhorst, 1802). Bohemia bor.: Kadaň env., Želinský meandr Naturschutzgebiet (5645), V.2001, 1 ♀; Doksany (5551), 31.V.2002, 2 ♂♂. Die Exemplare wurden in beiden Fällen im Sand am Ufer des Flusses Ohře gefunden. Alles P. Krásenský lgt., P. Štourač det., coll. P. Krásenský et P. Štourač. Verbreiterung (Burakowski et al. 1981): Britische Inseln, Dänemark, Schweden, Südfinnland, Mitteleuropa, Westsibirien. Nach Jászay & Boháč (1994) aus der Slowakei bekannt. Neue Art für die Fauna der Tschechischen Republik.

Acrotona* (*Strigota*) *sylvicola (Kraatz, 1856). Bohemia bor., Doksany (5551), 1.V.2001, 2 ♂♂, 2 ♀♀, im Sand am Ufer des Flusses Ohře, P. Štourač lgt. et det.; 31.III.2002, 2 ♂♂, 2 ♀♀, an derselben Stelle wie oben, P. Krásenský lgt. et det., coll. P. Krásenský et P. Štourač. Nach Burakowski et al. (1981) von Nord- und Mitteleuropa bis nach Sibirien verbreitert, in der Tschechischen Republik nach Likovský (1993) bisher nur aus Mähren (ohne nähere Angaben) bekannt. Neue Art für die Fauna von Böhmen.

BENICK G. & LOHSE G. A. 1974: Staphylinidae: Aleocharinae: Callicerini (Athetae), pp. 72-221. In: FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas 5.* Goecke & Evers, Krefeld, 379 pp. – BOHÁČ J. 1993: Staphylinidae: Tachyporinae, pp. 50-52. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Fol. Heyrovskyana*, Suppl. 1: 3-172 (in English and Czech). – BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŃSKA J. 1980: *Chrząszcze - Coleoptera, Staphylinidae 2. Katalog Fauny Polski. Cz. 23, T. 7.* PWN, Warszawa, 272 pp (in Polish). – BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŃSKA J. 1981: *Chrząszcze - Coleoptera, Staphylinidae 3 (Aleocharinae). Katalog Fauny Polski. Cz. 23, T. 8.* PWN, Warszawa, 330 pp (in Polish). – HERMAN L. H. 2001a: Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the second Millennium. I. Introduction, history, biographical sketches and Omaliine group. *Bull. American Mus. Natur. Hist.*, 265: 1-649. – HERMAN L. H. 2001b: Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the second Millennium. III. Oxyteline group. *Bull. American Mus. Natur. Hist.*, 265: 1067-1806. – HERMAN L. H. 2001c: Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the second Millennium. II. Tachyporine group. *Bull. American Mus. Natur. Hist.*, 265: 651-1066. – JÁSZAY T. & BOHÁČ J. 1994: Nové a zaujímavé nálezy drobčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) na Slovensku. *Zborn. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy*, 11: 33-49 (in Slovak). – KÖHLER F. & KLAUSNITZER B. 1998 (eds): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. *Entomol. Nachr. Berichte*, Beiheft 4: 1-185. – LIKOVSKÝ Z. 1993: Staphylinidae: Aleocharinae, pp. 52-62. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Fol. Heyrovskyana*, Suppl. 1: 3-172 (in English and Czech). – LOHSE G. A. 1989a: Ergänzungen und Berichtigungen zu Freude-Harde-Lohse "Die Käfer Mitteleuropas", Band 4 (1964), 23. Familie: Staphylinidae (Piestinae bis Tachyporinae), pp. 121-183. In: LOHSE G. A. & LUCHT W. H. (eds): *Die Käfer Mitteleuropas, I. Supplementband mit Katalogteil.* Goecke & Evers, Krefeld, 346 pp. – LOHSE G. A. 1989b: Ergänzungen und Berichtigungen zu Freude-Harde-Lohse "Die Käfer Mitteleuropas", Band 5 (1974) Staphylinidae (Hypocyphtinae bis Aleocharinae), pp. 185-240. In: LOHSE G. A. & LUCHT W. H. (eds): *Die Käfer Mitteleuropas, I. Supplementband mit Katalogteil.* Goecke & Evers, Krefeld, 346 pp. – MAJZLAN O. 1999: Faunistic records from Slovakia. Coleoptera. *Entomol. Probl.*, 30: 60. – SCHÜLKE M. & UHLIG M. 1988: Faunistisch neue und bemerkenswerte Kurzflügelarten aus der DDR (Coleoptera, Staphylinidae, Micropeplinae - Tachyporinae). *Entomol. Nachr.*, 32: 1-15. – SMETANA A. 1993: Staphylinidae: Staphylininae, pp. 47-50. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Fol. Heyrovskyana*, Suppl. 1: 3-172 (in English and Czech).

Petr ŠTOURAČ, Taussigova 1169, CZ-182 00 Praha 8 – Kobylisy, Tschechische Republik
Pavel KRÁSENSKÝ, Zahradní 5194, CZ-430 04 Chomutov, Tschechische Republik