PŘÍSPĚVEK K FAUNISTICE SEKÁČŮ (OPILIONIDEA) SLOVENSKA

Vladimír Šilhavý

V roce 1965 mi byl z entomologického oddělení Moravského muzea v Brně předán k zpracování menší materiál sekáčů ze sběrů Dr.P.Lauterera a prof.Dr.S.Hrabě te, celkem 73 kusů. V kolekci jsou tyto druhy:

1. *Lugubrostoma lugubre* (MÜLLER), 1 mas subadult. Vihorlat, okolí Morského oka (fagetum) 23. – 28.VI.1956, Lauterer leg.
2. *Nemastoma kochi* NOW., 1 mas, 1 fem. (subad.) Dtto, Lauterer leg.
3. *Mitostoma chrysomelas* (HERMANN), 1 fem. Dtto, Lauterer leg.
4. *Astrobunus laevipes* (CANESTRINI), 1 mas Nové Mesto n. Váhom, VIII.1956, Lauterer leg.
5. *Mitopus morio* (FABR.) 1 ex. Vihorlat, Sninsky kamen, 23.VI.1956, Hrabě leg. 40 ex., většinou dospělí, obojího pohlaví, Vihorlat, okolí Morského oka (fagetum), 23. – 28.VI.1956, Lauterer leg.
6. *Dacinius horridus* (PANZ.), 3 ex. subad. Nové Mesto n. Váhom, VIII.1956, Lauterer leg.
7. *Gyas annulatus* (OLIV.), 2 fem. Vihorlat, Sninsky kamen, 23.VI.1956, Hrabě leg.
8. *Leiobunum rotundum* (LATR.), 1 mas, 1 fem. Nové Mesto n. Váhom, VIII.1956, Lauterer leg.
9. *Platybunus bucephalus* C.L.K., 2 mas, 2 fem. Kouty n.D., 1 mas Vihorlat, okolí Morského oka, 23. – 28.VI.1956, Lauterer leg.
10. *Phalangium opilio* L., 3 mas, 3 fem. Nové Mesto n. Váhom, VIII.1956, Lauterer leg.
11. *Opilio saxatilis* C.L.KOCH, 2 mas, 2 fem. Dtto, VIII.1956, Lauterer leg.
12. *Opilio dinaricus* ŠILHAVÝ, 1 mas Vihorlat, okolí Morského oka (fagetum), 23. – 28.VI.1956, Lauterer leg. Podle údajů RAFALSKÉHO (1962) je tento druh rozšířen na území Evropy od Litvy až

po Jugoslávii. Zjištěn dosud v Litvě, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Pumunsku, Bulharsku a Jugoslávii, na území Československa předtím nalezen nebyl. V materiálu z pohoří Vihorlatu je dospělý samec fixovaný krátce po posledním svlékání, s měkkou kutikulou. Penis je přesto dostatečně chitinovaný, aby bylo možné přesné určení. Tento významný nález, který vyplňuje mezeru v zeměpisném rozšíření druhu a je přírůstkem pro faunu sekáčů naší republiky, přesto nepřekvapil, protože výskyt druhu *C.dinaricus* byl na našem území předpokládán (ŠILHAVÝ,1966).

Zusammenfassung

BEITRAG ZUR FAUNISTIK DER WEBERKNECHTE (OPILIONIDEA) DER SLOWAKEI

Im Material der Weberknechte von Moravské museum in Brünn (aus den Sammlungen von Prof.Dr.S.Hrabě und Dr.P.Lauterer) habe ich insgesammt 12 Arten festgestellt, die hier aufgezählt wurden. Am wichstigsten ist der Fund von *Opilio dinaricus* ŠILHAVÝ in der Ostslowakei, Vihorlat-Gebirge, Umgebung von Morské oko – See, 23.–28.VI.1956, Lauterer leg., der die erste Lokalität dieser Art in der Tschechoslowakei darstellt.

Literatura

GRUBER J., 1964: Kritische und ergänzende Beobachtungen zur Opilionidenfauna Oesterreichs (Arachnida), Zeitschr. der Arbeitsgemeinschaft oesterr. Entomologen, 16: 1–5. PAFALSKI J., 1962: Opilio dinaricus Šilhavý, a Little Known Species of Harvestmen (Opiliones). Studia Soc.Sci.Torunensis, 6: 121–132. ŠILHAVÝ V., 1956: Sekáči (Opilionidea), Fauna ČSR, 7: 274 p.Nakl. ČSAV, Praha. ŠILHAVÝ V., 1966: Fragmenta opilionidologica II (Arachn., Opilionidea). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 2: 104–105.