Published November 15, 2004

Klapalekiana, **40**: 123-138, 2004
ISSN 1210-6100

Několik zajímavějších nálezů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z území České republiky – 3. část

Several interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic – part 3

Jaroslav KALÁB

Jinačovice 119, CZ-664 34 Kuřim

Faunistics, Coleoptera, Carabidae, Czech Republic, Moravia

Abstract. Faunistic records of 69 less common or rare species of the family Carabidae from the Czech Republic (Moravia) are given.

ÚVOD

Práce volně navazuje na předchozí dva příspěvky (Kaláb 2000, 2002) a uvádí přehled nálezů 69 méně hojných až vzácných nebo jen lokálně hojnějších druhů střevlíkovitých brouků z území České republiky (z Moravy) z roku 2003.

MATERIÁL A METODIKA

U jednotlivých druhů jsou záznamy o nálezech řazeny podle stoupajících čísel mapových čtverců. Každý záznam obsahuje tyto údaje: obec (město) ke které je nález vztažen (nejedná se o katastr!) a vzdálenost místa nálezu od této obce případně přesný název naleziště, číslo mapového čtverce (viz Pruner & Míka 1996) a nadmořskou výšku. Následuje datum nálezu, počet kusů a poznámky o charakteru biotopu. Faunistické a bionomické poznámky u jednotlivých druhů se vztahují k situaci na území ČR.

Systematické řazení taxonů a nomenklatura jsou podle Hůrky (1996). Jména nominotypických ssp. jsou vzhledem k mnoha změnám (viz Löbl & Smetana 2003) u všech taxonů vypuštěna.

Pokud není uvedeno jinak, všechny uvedené druhy sbíral (případně pozoroval) autor zprávy. Materiál determinovali: PB - Petr Bulirsch (Praha), neuvedeno - autor zprávy.

Samci *Trechus obtusus* Erichson, 1837, *Bembidion subcostatum javurkovae* Fassati, 1944, *Pterostichus rhaeticus* Heer, 1837, *Badister collaris* Motschulsky, 1844, *B. dilatatus* Chaudoir, 1837, *B. peltatus* (Panzer, 1797) a *Microlestes fissuralis* (Reitter, 1900) byli determinováni podle vypreparovaných genitálií, samice *Pterostichus rhaeticus* Heer, 1837 podle sklerotizované části 8. ventritu (vše viz Hůrka 1996). U těchto druhů jsou proto u jednotlivých nálezů uvedeny vedle celkových počtů zjištěných jedinců i počty samců a samic.

Dokladový materiál je uložen ve sbírce autora. Pokud byli někteří jedinci pouze pozorováni, je to vždy uvedeno.

V práci jsou používány následující zkratky: PP - přírodní památka; PR - přírodní rezervace; Z, J, ... - západně, jižně, ... od ... .

PŘEHLED DRUHŮ

Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793). Moravia: Benešov - 1,5 km S (6466), 660 m, 17.VI.2003 - 1 ex., podmáčená louka; Benešov - 2 km VSV, PR Pavlovské mokřady (6466), 650 m,

17.VI.2003 - 6 ex. (z toho 5 ex. pozorováno), podmáčená louka/olšina, rašeliniště; Černovice - 250 m SV, PR Ploník (6564), 640 m, 5.VI.2003 - 1 ex. (pozorován), břeh lesního rybníka, rašeliniště; Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 11 ex. (z toho 10 ex. pozorováno), nezastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 1 ex. (pozorován), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Lechovice - 750 m SV, PR Lechovický močál (v návrhu, 7163), 200 m, 14.VIII.2003 - 11 ex. (z toho 9 ex. pozorováno), částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 1 ex. (pozorován), nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu. Lokální druh vlhkých biotopů na kyselých půdách.

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784). Moravia: Hnanice - 1,5 km SSZ, břehy řeky Dyje (7161), 240 m, 2.IX.2003 - 1 krovka, částečně zastíněný, štěrkopísčitý až písčitý břeh řeky, místy s porosty nižší vegetace.
V ČR velmi vzácný druh, na polích a stepích nížin.

Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758). Moravia: Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 12 ex. (z toho 6 ex. pozorováno), 9.VII.2003 - 14 ex. (pozorováno), 17.VII.2003 - 6 ex. (pozorováno), 6.VIII.2003 - 2 ex. (pozorovány), nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.-31.VII.2003 - 6 ex. (z toho 1 ex. pozorován a 2 ex. immaturní), z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu.
Vzácný druh, od nížin do hor u vod na velmi vlhkých, vegetací hojně zarostlých místech.

Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792. Moravia: Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 4 ex., 9.VII.2003 - 7 ex., 17.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu.
Vzácnější vlhkomilný druh, od nížin do hor na rostlinami hojně zarostlých, podmáčených biotopech.

Dyschirius chalceus Erichson, 1837. Moravia: Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (=Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 9 ex. (1 ex. - PB), 1.VII.2003 - 22 ex., 6.VIII.2003 - 2 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu.
Velmi vzácný halobiont vázaný na slaniska v nížinách, z území ČR je známo jen několik málo recentních lokalit.

Dyschirius chalybeus gibbifrons Apfelbeck, 1899. Moravia: Miroslav - 2,5 km VJV, PP Miroslavský rybník (v návrhu, 7063), 210 m, 12.VIII.2003 - 4 ex., z větší části nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 1 ex., hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Dubňany - 1,5 km SSZ, SV břeh Jarohněvického rybníka (7068), 170 m, 13.VIII.2003 - 4 ex., nezastíněné a nezarostlé, jílovitohlinité břehy/dno vyschlé části rybníka; Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 9.VII.2003 - 2 ex. (1 ex. - PB), 17.VII.2003 - 1 ex., 6.VIII.2003 - 12 ex. (z toho 1 ex. immaturní), nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km

Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.-31.VII.2003 - 1 ex., z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 2 ex., 5.VII.2003 - 3 ex., 10.VII.2003 - 4 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Vzácný druh mokřadů a slanisek, v ČR pouze v nížinách jižní Moravy.

Dyschirius politus (Dejean, 1825). Moravia: Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 9 ex. (1 ex. - PB), 1.VII.2003 - 7 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu.
Na území ČR celkem vzácný druh, břehy vod a slaniska nížin a pahorkatin.

Dyschirius rufipes (Dejean, 1825). Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 24.IV.2003 - 1 ex. (PB), vápencový lom.
Vzácný druh; suchá, nezastíněná stanoviště nížin a pahorkatin, v ČR pouze na Moravě.

Perileptus areolatus (Creutzer, 1799). Moravia: Nosislav - 200 m SZ, PP Nosislavská zátočina, levý břeh řeky Svratky (6965), 180 m, 19.VIII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, nezarostlý, štěrkopísčitý břeh řeky; Hnanice - 1,5 km SSZ, břehy řeky Dyje (7161), 240 m, 2.IX.2003 - 21 ex., částečně zastíněný, nezarostlý nebo jen řídce porostlý, štěrkopísčitý břeh řeky; Krhovice - 150 m J, PR Meandry Dyje (v návrhu, 7163), břehy řeky Dyje, 190 m, 26.VIII.2003 - 22 ex., částečně zastíněný, jen řídce porostlý, štěrkopísčitý břeh řeky.
Vzácnější a lokální druh, od nížin do podhůří na přirozených březích tekoucích vod.

Trechus obtusus Erichson, 1837. Moravia: Hnanice - 1,5 km SSZ, břehy řeky Dyje (7161), 240 m, 2.IX.2003 - 2 ex. (1 ♂, 1 ♀), 5.IX.2003 - 17 ex. (5 ♂♂, 12 ♀♀), částečně zastíněný, štěrkopísčitý až písčitý břeh řeky, místy s porosty nižší vegetace.
V Čechách dosti široce rozšířený vlhkomilný druh, z Moravy dosud publikovány pouze dvě lokality (Moravec & Scholz 1992, Veselý et al. 2002).

Lasiotrechus discus (Fabricius, 1792). Moravia: Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 17.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu.
Vzácnější, skrytě žijící vlhkomilný druh, od nížin do podhůří.

Elaphropus diabrachys Kolenati, 1845. Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 28.V.2003 - 7 ex., 18.VI.2003 - 3 ex., vápencový lom; Brno-Slatina - J okolí, vrch Švédské valy (6866), 250 m, 20.VI.2003 - 1 ex. (immaturní), umělý vrch (stará navážka slévárenských písků), osluněná vrcholová plošina s ruderální vegetací; Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 4.VI.2003 - 3 ex., 6.VI.2003 - 6 ex., 13.VI.2003 - 1 ex., 20.VI.2003 - 1 ex. (immaturní), pískovna; Nosislav - 200 m SZ, PP Nosislavská zátočina, levý břeh řeky Svratky (6965), 180 m, 19.VIII.2003 - 3 ex., částečně zastíněný, písčitý až štěrkopísčitý břeh řeky, na písčité části s porosty nižší vegetace; Vranovice - 250 m JV (7065), 170 m, 30.IV.2003 - 2 ex., suchý, osluněný okraj cesty; Hnanice - 1,5 km SSZ, břehy řeky Dyje (7161), 240 m, 2.IX.2003 - 24 ex. (z toho 6 ex. immaturních), částečně zastíněný, nezarostlý nebo jen řídce porostlý, štěrkopísčitý břeh řeky; Krhovice - 150 m J, PR Meandry Dyje (v návrhu, břehy řeky Dyje, 7163), 190 m, 26.VIII.2003 - 3 ex., částečně zastíněný, štěrkopísčitý až písčitý břeh řeky.
Nehojný expanzivní druh.

Elaphropus parvulus (Dejean, 1831). Moravia: Hnanice - 1,5 km SSZ, břehy řeky Dyje (7161), 240 m, 2.IX.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, nezarostlý nebo jen řídce porostlý, štěrkopísčitý břeh řeky.
Nehojný druh písčitých půd, často v lomech, pískovnách atd.

Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812). Moravia: Únanov - 1,5 km JJZ (7162), 310 m, 20.-21.VIII.2003 - 49 ex., opuštěný kaolínový lom, sušší až polovlhká, osluněná až částečně zastíněná místa.
Vzácnější druh, na vlhčích, spíše nezastíněných hlinitopísčitých biotopech.

Bembidion laticolle (Duftschmid, 1812). Moravia: Únanov - 1,5 km JJZ (7162), 310 m, 20.-21.VIII.2003 - 76 ex. (z toho 2 ex. immaturní), opuštěný kaolínový lom, výhradně polovlhká, osluněná, nezarostlá až řídce porostlá místa, patrně pozůstatky vyschlých tůněk a kaluží.
Velmi vzácný a lokální vlhkomilný druh, v ČR pouze na Moravě, na zachovalých březích vod v nížinách.

Bembidion pygmaeum (Fabricius, 1792). Moravia: Únanov - 1,5 km JJZ (7162), 310 m, 20.-21.VIII.2003 - 139 ex., opuštěný kaolínový lom, sušší až polovlhká, osluněná až částečně zastíněná místa.
Vzácný druh, polovlhká nezastíněná stanoviště nížin až podhůří.

Bembidion doris (Panzer, 1797). Moravia: Huštěnovice - 1 km V (6870), 180 m, 29.VII.2003 - 23 ex., fragment lužního lesa, zastíněný, hlinitopísčitý až písčitý, jen velmi řídce porostlý břeh rybníka, místy s nánosy napadaného listí; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 1 ex., hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 1 ex., 10.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Na Moravě vzácnější vlhkomilný druh, na mokřadech nížin až podhůří.

Bembidion fumigatum (Duftschmid, 1812). Moravia: Miroslav - 2,5 km VJV, PP Miroslavský rybník (v návrhu, 7063), 210 m, 12.VIII.2003 - 1 ex., z větší části nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Oleksovice - 2 km SV, vodní nádrž Oleksovice - S břeh (7063), 205 m, 27.VIII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Suchohrdly u Miroslavi - 1,7 km V, PP Suchohrdelský rybník (v návrhu, 7064), 200 m, 12.VIII.2003 - 45 ex. (z toho 2 ex. immaturní), nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 10 ex., nezastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 37 ex. (z toho 1 ex. immaturní), hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 1 ex., 25.IX.2003 - 3 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 5 ex., 28.VIII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Lechovice - 750 m SV, PR Lechovický močál (v návrhu, 7163), 200 m, 14.VIII.2003 - 10 ex., částečně zastíněný,

písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 9.VII.2003 - 3 ex., 17.VII.2003 - 22 ex. (z toho 5 ex. immaturních), 6.VIII.2003 - 20 ex. (z toho 1 ex. immaturní), nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.-31.VII.2003 - 135 ex. (z toho 20 ex. immaturních), z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Úvaly - 750 m SV, břehy/dno Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 15 ex., částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 3 ex., 5.VII.2003 - 3 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.

Vzácnější halofilní druh, mokřady a slaniska nížin a pahorkatin.

Bembidion neresheimeri J. Müller, 1930. Moravia: Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 2 ex. (z toho 1 ex. immaturní), nezastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 21 ex. (z toho 3 ex. immaturní), hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 7 ex. (z toho 1 ex. immaturní), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Lechovice - 750 m SV, PR Lechovický močál (v návrhu, 7163), 200 m, 14.VIII.2003 - 8 ex. (z toho 2 ex. immaturní), částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.VII.2003 - 2 ex., z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 3 ex., 5.VII.2003 - 9 ex., 10.VII.2003 - 10 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.

Vzácný a lokální halofilní druh, přirozené mokřady a slaniska nížin.

Bembidion milleri kulti Fassati, 1942. Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 24.IV.2003 - 3 ex., 18.VI.2003 - 22 ex. (z toho 15 ex. immaturních), vápencový lom, vlhčí místa poblíž periodické tůně; Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 20.VI.2003 - 1 ex. (immaturní), 24.VI.2003 - 1 ex, pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací.

Celkem vzácný druh vázaný na volné jílovité půdy, nalézaný především v cihelnách a lomech.

Bembidion stephensi Crotch, 1869. Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 24.IV.2003 - 1 ex., vápencový lom, vlhčí místa poblíž periodické tůně.

Na Moravě vzácný, v Čechách poněkud hojnější druh, nejčastěji na vlhkých jílových půdách.

Bembidion subcostatum javurkovae Fassati, 1944. Moravia: Nosislav - 200 m SZ, PP Nosislavská zátočina, levý břeh řeky Svratky (6965), 180 m, 19.VIII.2003 - 4 ex. (2 ♂♂, 2 ♀♀), částečně zastíněný, písčitý až štěrkopísčitý břeh řeky, na písčité části s porosty nižší vegetace.

Vzácný a lokální druh vázaný na zachovalé, hlinité až hlinitopísčité břehy vod, od nížin do podhůří, v ČR pouze na jižní Moravě.

Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1823. Moravia: Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 4.VI.2003 - 1 ex., 6.VI.2003 - 1 ex. (pozorován), 20.VI.2003 - 2 ex. (pozorovány), pískovna,

suché, osluněné plochy s ruderální vegetací; Brno-Slatina - J okolí, vrch Švédské valy (6866), 250 m, 30.V.2003 - 5 ex. (z toho 3 ex. pozorovány), 20.VI.2003 - 7 ex. (pozorováno), umělý vrch (stará navážka slévárenských písků), osluněná vrcholová plošina s ruderální vegetací; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 1 ex., hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu. Vzácný a lokální stepní druh. Atypický a zřejmě zcela náhodný je uvedený nález druhu v rákosině na břehu Troskotovického dolního rybníka, je zde možné uvažovat o vlivu abnormálně teplého a suchého počasí v létě roku 2003.

Pterostichus longicollis (Duftschmid, 1812). Moravia: Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 4.VI.2003 - 4 ex., 6.VI.2003 - 2 ex., 10.VI.2003 - 3 ex., 20.VI.2003 - 1 ex., 24.VI.2003 - 1 ex., pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací (8 ex.), osluněný, řídkou vegetací porostlý břeh tůně (3 ex.).

Pouze lokálně hojný druh nezastíněných biotopů.

Pterostichus cursor (Dejean, 1828). Moravia: Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 9.VII.2003 - 2 ex., 17.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Úvaly - 750 m SV, břehy/dno Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 3 ex., částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu.

Vzácný a lokální halofilní druh, zachovalé mokřady a slaniska nížin, v ČR pouze na jihu Moravy.

Pterostichus gracilis (Dejean, 1828). Moravia: Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 17.VII.2003 - 2 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 10.VII.2003 - 2 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.

Vzácnější a lokální druh zachovalých mokřadů nížin a pahorkatin.

Pterostichus rhaeticus Heer, 1837. Moravia: Benešov - 2 km VSV, PR Pavlovské mokřady (6466), 650 m, 17.VI.2003 - 2 ex. (1 ♂, 1 ♀), podmáčená louka/olšina, rašeliniště; Buková - 500 m S, PP Rašeliniště v Klozovci (6466), 650 m, 3.IX.2003 - 6 ex. (3 ♂♂, 3 ♀♀, z toho 1 ♂, 2 ♀♀ immaturní), částečně zastíněný mokřad, rašeliniště; Černovice - 250 m SV, PR Ploník (6564), 640 m, 5.VI.2003 - 4 ex. (4 ♂♂), břeh lesního rybníka, rašeliniště.

Lokální druh rašelinišť a mokřadů na kyselých půdách, především v pahorkatinách a horách.

Pterostichus elongatus (Duftschmid, 1812). Moravia: Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 25.IX.2003 - 2 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 6.VIII.2003 - 1 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu.

Velmi vzácný a lokální vlhkomilný druh, v ČR pouze na jihu Moravy, zachovalé mokřady a slaniska nížin.

Molops elatus (Fabricius, 1801). Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 28.V.2003 - 1 ex., vápencový lom.

Vzácnější druh, v lesích i na otevřených biotopech.

Platyderus rufus (Duftschmid, 1812). Moravia: Rozdrojovice - 1 km JV (6765), 350 m, 26.IV.2003 - 2 ex., suché travnaté meze; Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 4.VI.2003 - 1 ex., 20.VI.2003 - 1 ex., 24.VI.2003 - 1 ex., pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací.

V ČR celkem vzácný druh preferující spíše sušší biotopy, na stepích i v sušších lesích.

Dolichus halensis (Schaller, 1783). Moravia: Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 10.VI.2003 - 1 ex. (pozorován), 20.VI.2003 - 23 ex. (pozorováno), 24.VI.2003 - 11 ex. (pozorováno), pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m,17.VII.2003 - 1 ex. (pozorován), nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu.
Pouze lokálně hojný druh polí a mezí nížin a pahorkatin.

Platynus krynickii (Sperk, 1835). Moravia: Ivaň - 2,5 km VJV, staré říční rameno na levém břehu Svratky (7065), 170 m, 2.IV.2003 - 1 ex., břeh říčního ramene, lužní les.
Vzácný a lokální druh zachovalých močálů, v ČR jen na Moravě v nížinách.

Agonum lugens (Duftschmid, 1812). Moravia: Oleksovice - 2 km SV, vodní nádrž Oleksovice - S břeh (7063), 205 m, 27.VIII.2003 - 5 ex. (z toho 1 ex. immaturní), částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Suchohrdly u Miroslavi - 1,7 km V, PP Suchohrdelský rybník (v návrhu, 7064), 200 m, 12.VIII.2003 - 1 ex., nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 7 ex. (z toho 3 ex. immaturní), hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 1 ex., 25.IX.2003 - 1 ex. (immaturní), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 4 ex., 28.VIII.2003 - 5 ex. (z toho 2 ex. immaturní), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Lechovice - 750 m SV, PR Lechovický močál (v návrhu, 7163), 200 m, 14.VIII.2003 - 2 ex., částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 9.VII.2003 - 15 ex. (z toho 1 ex. immaturní), nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.VII.2003 - 7 ex. (z toho 4 ex. immaturní), z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Úvaly - 750 m SV, břehy/dno Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 2 ex., částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 3 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
V Čechách velmi vzácný, na Moravě místy hojnější druh, v nížinách na zachovalých vlhkých biotopech.

Agonum viridicupreum (Goeze, 1777). Moravia: Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 1.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu.
Vzácný vlhkomilný druh, na mokřadech nížin až podhůří.

Europhilus gracilis (Sturm, 1824). Moravia: Benešov - 2 km VSV, PR Pavlovské mokřady (6466), 650 m, 17.VI.2003 - 7 ex., podmáčená louka/olšina, rašeliniště; Černovice - 250 m SV, PR Ploník (6564), 640 m, 5.VI.2003 - 13 ex., břeh lesního rybníka, rašeliniště.
Na Moravě vzácný a lokální, v Čechách místy poněkud hojnější druh močálů na kyselých půdách a rašelinišť.

Amara sabulosa (Audinet-Serville, 1821). Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 28.V.2003 - 1 ex. (immaturní), vápencový lom; Brno-

Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 4.VI.2003 - 24 ex. (z toho 6 ex. immaturních), 13.VI.2003 - 2 ex., pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací.
Vzácnější druh nezastíněných suchých biotopů.

Amara equestris (Duftschmid, 1812). Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 28.V.2003 - 1 ex., vápencový lom; Pouzdřany - 1,2 km VSV (7065), 230 m, 21.V.2003 - 1 ex., rozhraní pole/step.
Vzácnější druh nezastíněných suchých biotopů.

Amara convexiuscula (Marsham, 1802). Moravia: Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 10.VI.2003 - 2 ex., 20.VI.2003 - 4 ex., pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací; Brno-Slatina - J okraj (6866), 240 m, 30.V.2003 - 4 ex., okraj města, osluněná travnatá plocha/ /ruderál; Brno-Slatina - J okolí, vrch Švédské valy (6866), 250 m, 30.V.2003 - 7 ex. (z toho 1 ex. immaturní), umělý vrch (stará navážka slévárenských písků), osluněná vrcholová plošina s ruderální vegetací.
Dříve vzácnější druh, který se v posledních desetiletích šíří na druhotných stanovištích (ruderály, výsypky, ...), od nížin do pahorkatin.

Amara gebleri Dejean, 1831. Moravia: Hnanice - 1,5 km SSZ, břehy řeky Dyje (7161), 240 m, 5.IX.2003 - 4 ex., částečně zastíněný, štěrkopísčitý až písčitý břeh řeky, místy s porosty nižší vegetace.
Vzácnější druh, zejména na vlhčích biotopech v okolí toků, od nížin do hor.

Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758). Moravia: Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (7068), 190 m, 16.VII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Spíše jednotlivě se vyskytující druh vlhkých biotopů nížin a pahorkatin.

Callistus lunatus (Fabricius, 1775). Moravia: Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 20.VI.2003 - 1 ex., pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací; Ivaň - 2,5 km VJV, cesta podél hráze kolem řeky Svratky - levý břeh (7065), 170 m, 3.IV.2003 - 1 ex., částečně osluněný okraj cesty.
Dosti vzácný druh nezastíněných suchých biotopů.

Chlaenius spoliatus (Rossi, 1790). Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 24.IV.2003 - 1 ex., vápencový lom, vlhčí místa poblíž periodické tůně; Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 6.VI.2003 - 1 ex., 13.VI.2003 - 5 ex. (pozorováno), pískovna, osluněný, řídkou vegetací porostlý břeh tůně; Dubňany - 1,5 km SSZ, SV břeh Jarohněvického rybníka (7068), 170 m, 13.VIII.2003 - 1 ex., nezastíněné a nezarostlé, jílovitohlinité břehy/dno vyschlé části rybníka; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 9.VII.2003 - 3 ex. (z toho 2 ex. pozorovány), nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu.
V ČR celkem vzácný, pouze místy na jižní Moravě poněkud hojnější vlhkomilný druh.

Chlaenius tristis (Schaller, 1783). Moravia: Huštěnovice - 1 km V (6870), 180 m, 29.VII.2003 - 4 ex. (z toho 3 ex. pozorovány), fragment lužního lesa, zastíněný, hlinitopísčitý až písčitý, jen velmi řídce porostlý břeh rybníka, místy s nánosy napadaného listí; Suchohrdly u Miroslavi - 1,7 km V, PP Suchohrdelský rybník (v návrhu, 7064), 200 m, 12.VIII.2003 - 5 ex. (z toho 4 ex. pozorovány), nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 1 ex., nezastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 6 ex. (pozorováno), hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu;

Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 3 ex. (z toho 2 ex. pozorovány), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 16 ex. (z toho 14 ex. pozorováno), 28.VIII.2003 - 8 ex. (pozorováno), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 13 ex. (z toho 11 ex. pozorováno), 9.VII.2003 - 19 ex. (pozorováno), 17.VII.2003 - 12 ex. (pozorováno), 6.VIII.2003 - 6 ex. (pozorováno), nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.-31.VII.2003 - 5 ex. (z toho 4 ex. pozorovány), z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Úvaly - 750 m SV, břehy/dno Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 7 ex. (z toho 6 ex. pozorováno), částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Celkem jednotlivě a dosti lokálně se vyskytující druh zachovalejších mokřadů nížin až podhůří.

Oodes gracilis A. Villa et G. B. Villa, 1833. Moravia: Miroslav - 2,5 km VJV, PP Miroslavský rybník (v návrhu, 7063), 210 m, 12.VIII.2003 - 2 ex. (z toho 1 ex. immaturní), z větší části nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Oleksovice - 2 km SV, vodní nádrž Oleksovice - S břeh (7063), 205 m, 27.VIII.2003 - 5 ex. (z toho 1 ex. immaturní), částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Suchohrdly u Miroslavi - 1,7 km V, PP Suchohrdelský rybník (v návrhu, 7064), 200 m, 12.VIII.2003 - 11 ex. (z toho 2 ex. immaturní), nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 8 ex. (z toho 2 ex. immaturní), nezastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 27 ex. (z toho 2 ex. immaturní), hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 25.IX.2003 - 2 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 28.VIII.2003 - 5 ex. (z toho 1 ex. immaturní), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Vracov - Z okraj obce, Z břeh rybníka Rašelina (7069), 195 m, 28.VIII.2003 - 6 ex. (z toho 1 ex. immaturní), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, místy s porosty rákosu; Lechovice - 750 m SV, PR Lechovický močál (v návrhu, 7163), 200 m, 14.VIII.2003 - 9 ex., částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 6.VIII.2003 - 28 ex. (z toho 1 ex. immaturní), nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.-31.VII.2003 - 6 ex. (z toho 3 ex. immaturní), z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu.
Vzácný a lokální hygrofilní druh, přirozené mokřady a slaniska nížin.

Licinus cassideus (Fabricius, 1792). Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 24.IV.2003 - 1 ex., 18.VI.2003 - 2 ex. (z toho 1 ex. immaturní - pozorován), vápencový lom.
Vzácný a lokální stepní druh, v nížinách na vápnitých a sprašových půdách.

Licinus depressus (Paykull, 1790). Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 18.VI.2003 - 2 ex. (z toho 1 ex. immaturní - pozorován), vápencový lom; Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 13.VI.2003 - 1 ex., 20.VI.2003 - 5 ex. (z toho 1 ex. immaturní a 3 ex. pozorovány), 24.VI.2003 - 4 ex. (z toho 3 ex. pozorovány), pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací; Oleksovice - 100 m JZ, PP Oleksovické vřesoviště (7163), 250 m, 27.VIII.2003 - 1 ex., opuštěná pískovna, suchá, osluněná plošina s porosty vřesu, pod trsem vřesu.
Celkem vzácný, spíše jednotlivě se vyskytující druh, zejména na suchých, nezastíněných biotopech.

Badister unipustulatus Bonelli, 1813. Moravia: Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 2 ex. (z toho 1 ex. immaturní), hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 5 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 9.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.VII.2003 - 3 ex., z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Úvaly - 750 m SV, břehy/dno Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 3 ex., částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 3 ex., 5.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Vzácnější druh zachovalejších nížinných mokřadů.

Badister collaris Motschulsky, 1844. Moravia: Huštěnovice - 1 km V (6870), 180 m, 29.VII.2003 - 5 ex. (2 ♂♂, 3 ♀♀), fragment lužního lesa, zastíněný, hlinitopísčitý až písčitý, jen velmi řídce porostlý břeh rybníka, místy s nánosy napadaného listí; Miroslav - 2,5 km VJV, PP Miroslavský rybník (v návrhu, 7063), 210 m, 12.VIII.2003 - 4 ex. (2 ♂♂, 2 ♀♀), z větší části nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Oleksovice - 2 km SV, vodní nádrž Oleksovice - S břeh (7063), 205 m, 27.VIII.2003 - 2 ex. (1 ♂, 1 ♀), částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Suchohrdly u Miroslavi - 1,7 km V, PP Suchohrdelský rybník (v návrhu, 7064), 200 m, 12.VIII.2003 - 6 ex. (3 ♂♂, 3 ♀♀ , z toho 1 ex. immaturní), nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 1 ex. (1 ♀), nezastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 8 ex. (1 ♂, 7 ♀♀), hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 44 ex. (22 ♂♂, 22 ♀♀), 25.IX.2003 - 1 ex. (1 ♀), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 49 ex. (23 ♂♂, 26 ♀♀, z toho 8 ex. immaturních), 28.VIII.2003 - 43 ex. (19 ♂♂, 24 ♀♀, z toho 7 ex. immaturních), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Vracov - Z okraj obce, Z břeh rybníka Rašelina (7069), 195 m, 28.VIII.2003 - 1 ex. (1 ♂), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, místy s porosty rákosu; Lechovice - 750 m SV, PR Lechovický močál (v návrhu, 7163), 200 m, 14.VIII.2003 - 10 ex. (3 ♂♂, 7 ♀♀), částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Rakvice -

1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 4 ex. (3 ♂♂, 1 ♀), 1.VII.2003 - 2 ex. (1 ♂, 1 ♀), 9.VII.2003 - 7 ex. (2 ♂♂, 5 ♀♀), 17.VII.2003 - 13 ex. (10 ♂♂, 3 ♀♀), 6.VIII.2003 - 3 ex. (1 ♂, 2 ♀♀), nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi *JZ* břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.-31.VII.2003 - 61 ex. (26 ♂♂, 35♀♀, z toho 23 ex. immaturních), z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Úvaly - 750 m SV, břehy/dno Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 4 ex. (4 ♀♀), částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 5.VII.2003 - 1 ex. (1 ♂), 10.VII.2003 - 2 ex. (2 ♂♂), nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Pouze lokálně hojnější vlhkomilný druh, na zachovalejších mokřadech nížin.

Badister dilatatus Chaudoir, 1837. Moravia: Miroslav - 2,5 km VJV, PP Miroslavský rybník (v návrhu, 7063), 210 m, 12.VIII.2003 - 1 ex. (1 ♂), z větší části nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Suchohrdly u Miroslavi - 1,7 km V, PP Suchohrdelský rybník (v návrhu, 7064), 200 m, 12.VIII.2003 - 21 ex. (11 ♂♂, 9 ♀♀, z toho 2 ex. immaturní), nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 15 ex. (8 ♂♂, 7 ♀♀, z toho 2 ex. immaturní), nezastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 26 ex. (10 ♂♂, 16 ♀♀), hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 3 ex. (1 ♂, 2 ♀♀), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 12 ex. (5 ♂♂, 7 ♀♀), 28.VIII.2003 - 1 ex. (1 ♂), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Lechovice - 750 m SV, PR Lechovický močál (v návrhu, 7163), 200 m, 14.VIII.2003 - 1 ex. (1 ♀), částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 3 ex. (3 ♀♀), 9.VII.2003 - 6 ex. (6 ♂♂), 17.VII.2003 - 6 ex. (2 ♂♂, 4 ♀♀), nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.-31.VII.2003 - 6 ex. (3 ♂♂, 3 ♀♀), z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Úvaly - 750 m SV, břehy/dno Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 1 ex. (1 ♀), částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 2 ex. (2 ♂♂), 5.VII.2003 - 2 ex. (1 ♂, 1 ♀), 10.VII.2003 - 2 ex. (2 ♂♂), nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Pouze lokálně hojnější vlhkomilný druh, na zachovalejších mokřadech nížin a pahorkatin.

Badister peltatus (Panzer, 1797). Moravia: Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 3 ex. (2 ♂♂, 1 ♀), 5.VII.2003 - 3 ex. (3 ♀♀), nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Vzácný vlhkomilný druh, na zachovalejších mokřadech nížin.

Trichocellus placidus (Gyllenhal, 1827). Moravia: Benešov - 2 km VSV, PR Pavlovské mokřady (6466), 650 m, 17.VI.2003 - 2 ex., podmáčená louka/olšina, rašeliniště; Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 1 ex., nezastíněný,

písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Dosti rozšířený, i když spíše jednotlivě se vyskytující vlhkomilný druh.

Acupalpus brunnipes (Sturm, 1825). Moravia: Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 2 ex., nezastíněné, jen řídce porostlé, polovlhké písčité místo mezi polem a rákosinou na břehu rybníka.
Vzácný a lokální druh, od nížin do pahorkatin na nezastíněných březích vod, často na písčitém podkladu.

Acupalpus exiguus Dejean, 1829. Moravia: Miroslav - 2,5 km VJV, PP Miroslavský rybník (v návrhu, 7063), 210 m, 12.VIII.2003 - 1 ex., z větší části nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 10.VII.2003 - 2 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Nepříliš hojný vlhkomilný druh, zachovalejší mokřady nížin a pahorkatin.

Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812). Moravia: Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 9.VII.2003 - 2 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Úvaly - 750 m SV, břehy/ /dno Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 2 ex., částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Vzácnější vlhkomilný druh, mokřady a slaniska nížin.

Acupalpus maculatus (Schaum, 1860). Moravia: Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 5 ex. (z toho 1 ex. immaturní), částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 15 ex., 1.VII.2003 - 3 ex., 9.VII.2003 - 5 ex., 17.VII.2003 - 3 ex., 6.VIII.2003 - 2 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.-31.VII.2003 - 3 ex., z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Úvaly - 750 m SV, břehy/dno Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 4 ex., částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 15 ex., 5.VII.2003 - 33 ex., 10.VII.2003 - 2 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Vzácný vlhkomilný druh, mokřady a slaniska nížin, v ČR zejména na jižní Moravě.

Anthracus consputus (Duftschmid, 1812). Moravia: Huštěnovice - 1 km V (6870), 180 m, 29.VII.2003 - 1 ex., fragment lužního lesa, zastíněný, hlinitopísčitý až písčitý, jen velmi řídce porostlý břeh rybníka, místy s nánosy napadaného listí; Suchohrdly u Miroslavi - 1,7 km V, PP Suchohrdelský rybník (v návrhu, 7064), 200 m, 12.VIII.2003 - 2 ex. (z toho 1 ex. immaturní), nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 1 ex. (immaturní),

nezastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Dubňany - 1,5 km SSZ, SV břeh Jarohněvického rybníka (7068), 170 m, 13.VIII.2003 - 6 ex. (z toho 3 ex. immaturní), nezastíněné a nezarostlé, jílovitohlinité břehy/dno vyschlé části rybníka; Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 8 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 4 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Lechovice - 750 m SV, PR Lechovický močál (v návrhu, 7163), 200 m, 14.VIII.2003 - 9 ex. (z toho 3 ex. immaturní), částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 4 ex., 1.VII.2003 - 1 ex., 9.VII.2003 - 9 ex., 17.VII.2003 - 12 ex. (z toho 6 ex. immaturních), 6.VIII.2003 - 10 ex. (z toho 1 ex. immaturní), nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.VII.2003 - 3 ex. (z toho 1 ex. immaturní), z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Úvaly - 750 m SV, břehy/dno Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 1 ex., částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 3 ex. (z toho 1 ex. immaturní), 5.VII.2003 - 1 ex.,10.VII.2003 - 4 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.

Pouze lokálně hojnější vlhkomilný druh, na mokřadech nížin a pahorkatin.

Ophonus diffinis (Dejean, 1829). Moravia: Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 13.VI.2003 - 1 ex., 20.VI.2003 - 1 ex. (immaturní), 24.VI.2003 - 1 ex. (immaturní), pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací; Úvaly - 750 m SV, břehy/dno Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 2 ex., částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu.

Vzácný druh, na nezastíněných, spíše suchých a teplých stanovištích nížin.

Cryptophonus tenebrosus centralis (Schauberger, 1929). Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 24.IV.2003 - 1 ex., vápencový lom; Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 10.VI.2003 - 1 ex. (immaturní), 13.VI.2003 - 1 ex. (immaturní), 20.VI.2003 - 4 ex. (z toho 3 ex. immaturní), pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací.

Vzácný a lokální druh xerotermních lokalit.

Harpalus hospes Sturm, 1818. Moravia: Pouzdřany - 1 km S (7065), 230 m, 21.V.2003 - 1 ex., terasy, vinice, zbytky stepních strání.

V ČR pouze na jižní Moravě, vzácně a lokálně na nezastíněných, suchých stanovištích nížin.

Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812). Moravia: Rozdrojovice - 1 km JV (6765), 350 m, 26.IV.2003 - 12 ex., suché travnaté meze.

Vzácnější druh nezastíněných, spíše sušších biotopů nížin a pahorkatin.

Harpalus caspius roubali Schauberger, 1928. Moravia: Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 24.IV.2003 - 3 ex., 28.V.2003 - 5 ex., 18.VI.2003 - 7 ex., vápencový lom.

Nehojný druh xerotermních biotopů nížin až podhůří.

Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758). Moravia: Mikulovice - 0,5 km VJV, PP Mikulovické jezero (7062), 350 m, 20.VIII.2003 - 3 ex. (pozorovány), nezastíněný, písčitohlinitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Suchohrdly u Miroslavi - 1,7 km V, PP Suchohrdelský rybník (v návrhu, 7064), 200 m, 12.VIII.2003 - 2 ex., nezastíněný, hlinitý až písčitohlinitý břeh

rybníka, na větší části s porosty rákosu; Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 5 ex., nezastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 2 ex., hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Milotice - 1 km SV, PR Písečný rybník (= Milotický rybník, 7068), 190 m, 16.VII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Oleksovice - 2 km SV, vodní nádrž Oleksovice - S břeh (7063), 205 m, 27.VIII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Oleksovice - 2,5 km SV, PR Oleksovická mokřina (7063), 205 m, 27.VIII.2003 - 1 ex. (pozorován), částečně zastíněný mokřad, místy s porosty rákosu; Hnanice - 1,5 km SSZ, břehy řeky Dyje (7161), 240 m, 5.IX.2003 - 2 ex. (z toho 1 ex. pozorován), částečně zastíněný, štěrkopísčitý až písčitý břeh řeky, místy s porosty nižší vegetace; Lechovice - 750 m SV, PR Lechovický močál (v návrhu, 7163), 200 m, 14.VIII.2003 - 27 ex. (z toho 14 ex. pozorováno), částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Úvaly - 750 m SV, břehy Úvalského rybníka (7266), 200 m, 24.VII.2003 - 1 ex., částečně zastíněné, písčitohlinité až jílovité břehy/dno vyschlého rybníka, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 10.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.

V Čechách vzácný, na Moravě místy hojnější druh. Vedle výskytu na vlhkých biotopech se v ČR šíří druhotně i na nezastíněná suchá stanoviště - stepi, suché meze a úhory.

Demetrias monostigma Samouelle, 1819. Moravia: Benešov - 2 km VSV, PR Pavlovské mokřady (6466), 650 m, 17.VI.2003 - 2 ex. (pozorovány), podmáčená louka/olšina, rašeliniště; Buková - 500 m S, PP Rašeliniště v Klozovci (6466), 650 m, 3.IX.2003 - 2 ex. (z toho 1 ex. pozorován), částečně zastíněný mokřad, rašeliniště; Černovice - 250 m SV, PR Ploník (6564), 640 m, 5.VI.2003 - 1 ex. (pozorován), břeh lesního rybníka, rašeliniště; Rozdrojovice - 1 km JV (6765), 350 m, 26.IV.2003 - 1 ex. (pozorován), suché travnaté meze; Brno-Maloměřice - SV okraj, vrch Hády - JZ svah, Růženin lom (6766), 350-400 m, 28.V.2003 - 2 ex. (pozorovány), vápencový lom, břeh tůně, rákosina/porosty travin; Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 6.VI.2003 - 1 ex. (pozorován), pískovna, osluněný, řídkou vegetací porostlý břeh tůně; Mikulovice - 0,5 km VJV, PP Mikulovické jezero (7062), 350 m, 20.VIII.2003 - 1 ex., nezastíněný, písčitohlinitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Hnanice - 1,5 km SSZ, břehy řeky Dyje (7161), 240 m, 2.IX.2003 - 1 ex., 5.IX.2003 - 1 ex. (pozorován), částečně zastíněný, štěrkopísčitý až písčitý břeh řeky, místy s porosty nižší vegetace; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 3 ex., 9.VII.2003 - 2 ex., 17.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 3 ex., 5.VII.2003 - 2 ex. (pozorovány), nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.

Pouze lokálně hojnější druh vlhkých biotopů, který se podobně jako *D. atricapillus* může druhotně vyskytovat i na suchých nezastíněných stanovištích (stepi, suché meze, úhory).

Demetrias imperialis (Germar, 1824). Moravia: Oleksovice - 2 km SV, vodní nádrž Oleksovice - S břeh (7063), 205 m, 27.VIII.2003 - 2 ex., částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 4 ex., nezastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003

- 1 ex., hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Vlkoš - 1,3 km JJV (7069), 195 m, 23.VII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, hlinitopísčitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 3 ex., 17.VII.2003 - 3 ex., 6.VIII.2003 - 1 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 31.VII.2003 - 1 ex., z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 5.VII.2003 - 2 ex., 10.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Jen lokálně dosti hojně u vod v rákosinách, od nížin do pahorkatin.

Paradromius longiceps (Dejean, 1826). Moravia: Oleksovice - 2 km SV, vodní nádrž Oleksovice - S břeh (7063), 205 m, 27.VIII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh vodní nádrže, na větší části s porosty rákosu; Šumice - 1,7 km JV, PR Šumický rybník (= Šumický horní rybník, 7064), 190 m, 5.VIII.2003 - 8 ex. (z toho 1 ex. immaturní), nezastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Troskotovice - 1,5 km V až VSV, PP Troskotovický dolní rybník (7064), 190 m, 7.VIII.2003 - 3 ex., hlinitý až písčitohlinitý, z větší části nezastíněný břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Lechovice - 750 m SV, PR Lechovický močál (v návrhu, 7163), 200 m, 14.VIII.2003 - 1 ex., částečně zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu; Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m,17.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu; Sedlec - 1,5 km Z až ZSZ, břehy Nového rybníka a přilehlý mokřad mezi JZ břehem rybníka a státní hranicí (7265-66), 185 m, 30.VII.2003 - 1 ex., z větší části zastíněný, písčitohlinitý břeh rybníka, nezastíněný mokřad, obojí na větší části s porosty rákosu; Poštorná - 2 km J, PR Františkův rybník (7267), 160 m, 3.VII.2003 - 1 ex., 10.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný, písčitý až hlinitopísčitý břeh rybníka, na větší části s porosty rákosu.
Vzácnější, skrytě žijící druh, v nížinách u vod v rákosinách.

Philorhizus sigma (Rossi, 1790). Moravia: Rakvice - 1,5 km VSV, Trkmanský Dvůr (= Trkmanice) - JZ až J okolí (7167), 165 m, 25.VI.2003 - 2 ex., 9.VII.2003 - 1 ex., nezastíněný mokřad, slanisko, na větší části s porosty rákosu.
Na území ČR spíše vzácný druh, v nížinách až podhůří na vlhkých biotopech v okolí vod.

Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812). Moravia: Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 4.VI.2003 - 3 ex., 6.VI.2003 - 1 ex., pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací.
Pouze lokálně hojný druh písčitých biotopů v nížinách až podhůří; často v lomech, pískovnách apod.

Syntomus pallipes Dejean, 1825. Moravia: Brno-Slatina - 1,5 km JZ (6865), 240 m, 13.VI.2003 - 1 ex., pískovna, suché, osluněné plochy s ruderální vegetací; Vranovice - 250 m JV (7065), 170 m, 30.IV.2003 - 1 ex., suchý, osluněný okraj cesty; Únanov - 1,5 km JJZ (7162), 310 m, 20.-21.VIII.2003 - 4 ex., opuštěný kaolínový lom, sušší, osluněná až částečně zastíněná místa.
Vzácnější druh, zejména na otevřených suchých biotopech nížin a pahorkatin.

Microlestes fissuralis (Reitter, 1901). Moravia: Únanov - 1,5 km JJZ (7162), 310 m, 20.-21.VIII.2003 - 3 ex. (2 ♂♂, 1 ♀, všechny ex. immaturní), opuštěný kaolínový lom, sušší, osluněná až částečně zastíněná místa.
Vzácný druh, sušší biotopy nížin a pahorkatin.

LITERATURA

HŮRKA K. 1996: *Carabidae of the Czech and Slovak Republics. (Carabidae České a Slovenské republiky)*. Kabourek, Zlín, 565 pp (in English and Czech).

KALÁB J. 2000: Několik zajímavějších nálezů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z území České republiky. (Several interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic). *Klapalekiana*, 36: 261-274 (in Czech, English summary).

KALÁB J. 2002: Několik zajímavějších nálezů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z území České republiky – 2. část. (Several interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic – part 2). *Klapalekiana*, 38: 173-184 (in Czech, English summary).

LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2003: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1: Archostemata – Myxophaga – Adephaga*. Apollo Books, Stenstrup, 819 pp.

MORAVEC P. & SCHOLZ T. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Carabidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 89: 387-391.

PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana*, 32 (Suppl.): 1-115 (in Czech, English abstr.).

VESELÝ P., RESL K. & TĚŤÁL I. 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 1997-2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 1997-2001 with supplementary pre-1997 data). *Klapalekiana*, 38: 85-109 (in Czech, English summary).

SUMMARY

The paper presents results of my faunistic research carried out in Moravia in 2003. It gives data on the occurrence of 69 rare or less common, or only locally common species.

The records are listed by ascending values of grid mapping square codes used for faunistic research in the Czech Republic (e.g. 7069, see Pruner & Míka 1996). Each record includes the name of a nearby village (city) including the distance, grid mapping square code and altitude above sea level, followed by collection date, number of specimens and remarks on the biotope.

The following abbreviations are used in the text: PP - Natural Monument, PR - Natural Reserve, Z - west of, V - east of, S - north of, J - south of. I have identified all specimens except those indicated by: PB that were identified by Petr Bulirsch (Praha).

The following records are particularly interesting:

1. Record of *Trechus obtusus* in the environs of Hnanice. In Moravia, this species has been published from only two localities so far (Moravec & Scholz 1992, Veselý et al. 2002).
2. Record of *Dyschirius chalceus* in the environs of Trkmanský Dvůr. Only a few recent localities of this very rare halobiont species are known from the Czech Republic.
3. Records of *Dyschirius chalybeus gibbifrons*, *Bembidion laticolle* and *Pterostichus elongatus*. In the Czech Republic, these very rare and locally distributed hygrophilous species are known only from a few localities in the southern lowland parts of Moravia.