EUPITHECIA ORPHNATA BOHATSCH A EUPITHECIA EGENARIA /HS./ (LEP. GEOMETRIDAE) V ČESKOSLOVENSKU

Jaroslav Wichra

Při spolupráci s p. prof. Hrubým na Prodromu Lepidopter Slovenska jsem revidoval mnoho sporných údajů o různých druzích a právě rod *Eupithecia* nám působil velké starosti pro obtížnost určování. Měl jsem několik jedinců, které jsme společně určili jako druh *E. orphnata* Bohatsch, a prof. Hrubý doporučil publikaci, poněvadž běželo o novinku pro Československo. Čekal jsem však na to, až budu moci doložit toto určení preparátem genitálií, které je u mnoha druhů *Eupithecia* naprosto nutné. Letos můj spolupracovník Ing. Marek z Brna rozbor genitálií uvedených sporných exemplářů provedl a potvrdil dřívější určení.

E. orphnata Bohatsch byla dříve považována za formu druhu *E. subumbrata* (Den. et Schniff.)= *scabiosata* (Bkh.), je to však naprosto samostatný druh. Je znám z většiny států v Evropě. Na Slovensku zjištěn nebyl, na Moravě ho zjistil Ing. Marek jako novinku, kterou bude příležitostně publikovat. České lokality: Bojov 13. 6. 1947, 5. 6. 1950, 20. 6. 1950 3 ♂ leg. K. Proksch; Kokořín 28. 6. 1967 1 ♂ leg. J. Wichra. Nový druh pro Československo.

Druh *Eupithecia egenaria* (HS.) uvedl jako novinku pro ČSSR M. Kudla 1965 z Moravy, Hrubá Voda 9. 6. 1964. V Čechách jsem chytil jeden exemplář v Srbsku 26. 5. 1946. Na Slovensku nebyl doposud tento druh zjištěn. Motýl byl srovnán s jedinci z Bad Blankenburg (Německo), leg. Dr. Steuer ve sbírce J. Šmelhause a dále s exemplářem z Moravy, který chytil Ing. J. Marek. Nový druh pro Čechy. Vzhledem k svému rozšíření v okolních státech se dá i u nás předpokládat výskyt na mnoha dalších lokalitách.

Zusammenfassung

EUPITHECIA ORPHNATA BOHATSCH UND EUPITHECIA (HS.) IN DER TSCHECHOSLOWAKEI (LEP. GEOMETRIDAE).

Die Art *E. orphnata* Bohatsch wurde als neu für die Tschechoslowakei festgestellt: Bojov und Kokořín in Zentralböhmen. Die Richtigkeit der

Bestimmung wurde auf Grund der Genitalienprüfung von Ing. J. Marek, Brünn, festgestellt.

Die Art *E. egenaria* (HS.), die bereits von Mähren bekannt war, habe ich in Böhmen bei Srbsko 26. Mai 1946 gefangen. Bestimmung von J. Marek und J. Šmelhaus, mit den Exemplaren von Dr. Steuer verglichen.

Literatura

Hrubý K., 1964: Prodromus Lepidopter Slovenska. Bratislava. Hering M., 1932: Die Schmetterlinge nach ihren Arten dargestellt. Leipzig. Sterneck, J., 1929: Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens. Karlsbad. Skala H., 1913: Die Lepidopterenfauna Mährens. Verh. Nat. Ver. Brünn, *51* : 154-160. Skala H., 1936: Zur Lepidopterenfauna Mährens und Schlesiens, Brünn. Kudla M., 1965: Zprávy Československé společnosti entomologické *1*, 5-6:15. Błeszyński St., 1965: Klucze do oznaczania owadów Polski. Geometridae, Hydriomeninae Warszawa.