

přehlížením vhodných biotopů s výskytem živné rostliny. Štíhlenku *M. rufescens* jsme celkem zaznamenali na území Čech v 19 polích a na Moravě a ve Slezsku v 6 polích síťového mapování, a to až na výjimky všude tam, kde jsme zároveň potvrdili výskyt početnější populace živné rostliny (více než 10-15 rostlinných jedinců), včetně tří lokalit na území hlavního města Prahy. Sběrnou metodou byl smyk nebo oklep živných rostlin, jen v jednom případě projev detritu na ploše výskytu populace živné rostliny. Významnou skutečností je, že kromě čtyř všech nových zaznamenaných lokalit leží v maloplošných a/nebo velkoplošných chráněných územích. Zdá se, že štíhlenka *M. rufescens* bude na území Čech a Moravy dosti rozšířená všude tam, kde rostou její živné rostliny z rodu *Circaea*. Populace živných rostlin jsou však v naší krajině roztroušeny většinou značně ostrůvkovitě a nejčastěji se vyskytují v dobře zachovalých lužních a suťových lesích v chráněných přírodních územích.

Published June 30, 2005

Klapalekiana, 41: 75-76, 2005
ISSN 1210-6100

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 181

Coleoptera: Curculionidae

Apion (Aspidapion) validum Germar, 1817. Bohemia or., Sloupnice (6163b), 1 ♀ (undated), J. Havelka leg. et det., P. Špryňar revid. 2004, ex coll. A. Sobota (depon. in coll. Západočeské muzeum in Plzeň). Bohemia mer., České Budějovice, Mladé, Javorová street (7052b), v.2000, 6 ex. (more specs. observed), D. Čudan leg., P. Kresl det. 2003, 1 spec. coll. P. Kresl (K. Schön revid. 2003), 5 specs. coll. D. Čudan (in July 2004 the occurrence of this species was not confirmed at the same place – D. Čudan 2004, pers. comm.). Bohemia centr., Lysá nad Labem, Žižkova street (5755c), inflorescence of *Alcea rosea* (= *Althaea rosea*), 1.ix.2003, 2 ♂♂, 3 ♀♀, Z. Navrátilová & P. Špryňar leg., P. Špryňar det. et coll.; 26.ix.2004, 22 ♂♂, 15 ♀♀, P. Špryňar leg., det. et coll. The specimens from Lysá nad Labem were collected on the host plant together with the currently expanding *Apion (Rhopalapion) longirostre* Olivier, 1807, which was found in Bohemia only in 1999 for the first time (Strejček 2001). Larvae of *A. validum* live in seeds and fruits of *Alcea rosea* and pupate at the same place (e. g. Scherf 1964). Other host plants of this species may include *Althaea officinalis* and *Malva sylvestris* (Dieckmann 1977). *A. validum* is distributed in southern and central Europe, the Near East and central Asia (Dieckmann 1977), in central Europe being known from Germany, Poland, Slovakia, Austria, Switzerland and the Czech Republic (Smreczyński 1965, Dieckmann 1977, Lohse 1981, Strejček 1993, Köhler & Klausnitzer 1998). Specimens of *A. validum* are occasi-

onally introduced into central Europe, mostly with seeds of the host plant (Dieckmann 1977). Lokaj (1869: 57, 1870: 56) mentioned *A. validum* as rather common on meadows, below mosses and below dead leaves in the surroundings of Prague. Fleischer (1930: 440, 1933: 246) noted that it “lives everywhere” [“je všude”], which could perhaps mean that it occurred in all parts of the former Czechoslovakia (i. e. Bohemia, Moravia, Slovakia and the Transcarpathian Russia). Havelka (1965: 68) mentioned “two older specimens from Bohemia” without a more detailed information. All these records from Bohemia were later seen as unconfirmed and Dieckmann (1977), Lohse (1981) and Strejček (1993) recorded *A. validum* from the Czech Republic only from Moravia. Nevertheless, Strejček (2001: 107) recently pointed out that Lokaj’s (1869, 1870) records are unconfirmed but probable. First reliable records for Bohemia.

DIECKMANN L. 1977: Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera—Curculionidae (Apioninae). *Beitr. Entomol.*, 27: 7-143. – FLEISCHER A. 1930: *Přehled brouků fauny československé republiky*. Moravské museum zemské, Brno, 485 pp (in Czech). – FLEISCHER A. 1933: *Přehled brouků fauny Československé republiky* (Pokračování.). *Čas. Morav. Zem. Mus.*, 28-29: 1-288b (in Czech). – HAVELKA J. 1965: Příspěvek k poznání Coleopter Slovenska, 2. část. (Beitrag zur Kenntnis der Coleopteren der Slowakei, 2. Teil). *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov.*, 11: 55-106 (in Czech, German summary). – KÖHLER F. & KLAUSNITZER B. (eds.) 1998: Verzeichnis der Käfer Deutschlands. *Entomol. Nachr. Ber.*, Beiheft 4: 1-185. – LOHSE G. A. 1981: 5. Unterfamilie: Apioninae, pp. 127-183. In: FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. (eds.): *Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 10*. Goecke & Evers, Krefeld, 310 pp. – LOKAJ E. 1869: Verzeichniss der Käfer Böhmens. *Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen*, 1, Sect. 4: 7-77. – LOKAJ E. 1870: Seznam brouků českých. *Arch. Přírod. Proskoumání Čech*, 1, Sect. 4: 7-76 (in Czech). – SCHERF H. 1964: Die Entwicklungsstadien der mitteleuropäischen Curculioniden (Morphologie, Bionomie, Ökologie). *Abhandl. Senckenbergischen Naturforsch. Ges.*, 506: 1-335. – SMRECZYŃSKI S. 1965: *Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. XIX. Coleoptera. Zesz. 98a. Curculionidae*. PWN, Warszawa, 80 pp (in Polish). – STREJČEK J. 1993: Curculionidae, pp. 135-152. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Fol. Heyrovskyana*, Suppl. 1: 3-172 (in English and Czech). – STREJČEK J. 2001: *Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Sv. 2. (Catalogue of beetles (Coleoptera) from Prague. Vol. 2.)*. Praha, 142 pp (in Czech, German and English summaries).

Pavel ŠPRYŇAR, Na novíně 14, CZ-141 00 Praha 4, Czech Republic;
e-mail: sprynar@natur.cuni.cz