DALŠÍ PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ MOTÝLÍ FAUNY JIŽNÍCH ČECH

Josef Levý, František Lehečka, František Krampl, Miloslav Samec

Uveřejnujeme nálezy nových druhů a nové lokality druhů již hlášených. Sbírali jsme hlavně v okolí Písku (Písek, Červená n. Vlt., Orlík n. Vlt.). V červnu r. 1967 jsme lovili na světlo také v údolí Otavy na Jistci, 15 km severně od Písku, a v červenci tr. též v otavském údolí u Borečnice. Navazujeme na článek J. Levého (1948) a všímáme si opět jen druhů, u kterých jsou ve Sterneckově Prodromu uvedeny lokality. Užíváme zkratek sběratelů: Levý - Le, Lehečka - Lh, Krampl - Kr, Samec - Sa, V průzkumu nám pomáhali chlapci z Husovy základní devítileté školy v Písku: Jan Vejmělek - Ve, Petr Toman - To, Jan Sokolík - So. V závorce uvádíme již známá naleziště. Dokladový materiál je v našich sbírkách. Děkujeme p. ing. J. Markovi z Brna za determinaci a kontrolu některých Geometrid a p. ing. K. Spitzerovi za zapůjčení některých prací a za sdělení některých jeho vlastních nálezů.

Písecko je celkem dobře prozkoumáno. Zajímavá jsou údolí Otavy a Vltavy, kde bylo zjištěno více teplomilných druhů. Po napuštění Orlické přehrady se údolí obou řek ochladila, nebot vodní hladina dostoupila u Orlíku n. Vlt. výše 70 m a na Červené n. Vlt. 40 m. To má na výskyt některých druhů nepříznivý vliv. Některé vrchy v okolí Písku dosahují nadmořské výšky přes 600 m. Velké plochy jsou zalesněny. Převládá jehličnatý a smíšený les.

Pontia daplidice (L.) V okolí Písku na jetelištích a na polích s kvetoucí vojtěškou. Některá léta hojnější. Jarní generace nezjištěna. VII, VIII. Písek Le, Lh, Sa, Klatovy Sa (Klučenice, Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice, Nové Hrady, Nová Bystřice, Příbram, Netolice, Jindř. Hradec).

Colias palaeno (L.) subs. *europome* (Esp.) Psí Koryto, Kovářov u Lipna, Soumarský most (Hartmanice, Modrava, Lenora, Nové Hrady, Jindř. Hradec, Červené blato, Dobrá voda, Dívčí Kámen, Příbraz, Borkovice, Veselí n. Luž., Třeboň, Čes. Budějovice, Jezerní slať u Horní Kvildy. Stachy.). - *C. crocea* (Fourc.) Jen v některých letech hojnější, na stejných lokalitách jako *P. daplidice* (L.): Písek (Klučenice, Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice, Nové Hrady, Bechyně, Netolice, Tábor, Pelhřimov).

Hipparchia briseis (L.) Na omezených lokalitách. Písek Lh, Ve (Klučenice, Orlík n. Vlt. Le, Šumava Soffner, Babice u Netolic Kudrna, Rábí u Horažďovic Ebenhöh, Zahořany Ebenhöh).

Satyrus dryas (Scop.) Pravděpodobně zalétlý kus ulovil u Ražic Lehečka (Kamenný Újezd, Adolfov Čes. Budějovice).

Maniola lycaon (Rott.) Byl chytán u Slabčic okr. Písek řed. Károu a u Písku Vejmělkem. (Písek, Vodňany, Soběslav, Tábor.)

Coenonympha tullia (Mull.) Vejmělek ulovil 1 kus na bažinaté louce v Hůrkách u Písku. (Čes. Budějovice, Nové Hrady, Jindř. Hradec, Třeboňsko, Mrtvý luh, Soumarský most).

Apatura iris (L.) Na mnohých místech v okolí Klučenic, Orlíka n. Vlt. a Písku. Housenky na Salix caprea L. V některých letech hojnější. (ryb. Prelát, Lipno n. Vlt., Loučovice Ebenhöh, okolí Netolic Kudrna.) *A. illa* (Den. et. Schiff.) U Písku celkem hojný. Housenky na Populus a Salix. (Trhové Sviny, Jiříkovo Údolí u Šalmanovic Ebenhöh, Peklo, Třebínka, Krtelský les, Brusný les u Netolic Kudrna).

Limenitis populi (L.) Housenky a kukly na osikách. Klučenice, Lašovice, Písek, Kaplice. (Nový Rychnov, Dražíč, Trhové Sviny, Bezdrev, Mrhal, Olešnice, Hodějovice, Spolí, Jiříkovo údolí.) *L. camilla* (L.) Ve vltavském údolí před zátopou. Červená n. Vlt. Lh (Orlík n. Vlt. Le).

Neptis coenobita subs. *innominata* (Lew.) Sterneck v Podromu uvádí Hůrka u Písku (lgt. Krejčí). Lehečka tam chytil 1 kus 16. 6. 1926. (Hůrka u Písku, Nové Hrady, Lišov, Třeboň, Jindř. Hradec, Strážn. Než. Griesbach u Nové Bystřice, , Veselí n. Luž., Čes. Budějovice, Trhové Sviny, Soběslavská blata, Zlatá stoka; Spolský potok, Lužnice od Třeboně k Soběslavi, Horusický rybník, Rožmberský rybník, Jemšina, Příbraz).

Melitaea dictynna (Rott.) Na vlhkých lukách. Písek (Klučenice, Netolice, Čes. Budějovice, Trhové Sviny, Jindř. Hradec, Veselí n. Luž.).

Brenthis ino (Rott.) Lehečka zjistil tohoto perletovce na bažinaté louce u Údraže, okr. Písek, v druhé polovině června. Na Mrtvém luhu a u Soumarského mostu nevzácný. (Netolice, ryb. Mnich, Polečnice u Čes. Krumlova Kudrna, Prachatice Poláček, Spolský potok, Sv. Trojice, ryb. Prelát, Křišťanovice u Prachatic Ebenhöh.) - *B. phryxa* (Brgstr.) Písek (Klučenice, Netolice, Orlík n. Vlt. Rožmitál, Čes. Budějovice, Hodějovice, Rančice, Jankov, Kleť, Veselí n. Luž.

Argynnis paphia (L.) f. valesina (Esp.) Písek, Orlík n. Vlt., Klučenice (Třeboň, Poříč, ryb. Prelát, Týn n. Vlt.).

Strymon spini (F.) Píšek Lh. Vzácný. (Sušice, Čes. Budějovice.) - *S. w-album* (Knoch.) Písek Lh. Vzácný. (Hluboká, Zvíkov Ebenhöh). - *S. ilicis* (Esp.) Tohoto ostruháčka ulovil Lehečka v Hůrkách u Písku. Není znám žádný nález z jižních Čech, Sterneck uvádí nejbližší nález v údolí Berounky, - *S. pruni* (L.) Na trnkách někdy hojný. Písek Lh, Sa (Klučenice Le, Borkovice, Veselí n. Luž. Brčák).

Lycaena alcyphron (Rott.) Lehečka chytil 1 motýla 28. VI. 1948 u Vltavy v Podolí I. u Písku a 6. VII. 1959 na Šumavě u Zátoně. (Písek Maloch, Hartmanice Soffner, Pošlák u Vyššího Brodu, Dobrá Voda u Nových Hradů, Mrtvý luh Ebenhöh, vlhké louky mezi Netolicemi a Lužicemi, ryb. Mnich Kudrna, Stachy Voldřich.) - *L. hippothoe.* (L.) Písek Kr. Vzácně. (Klučenice, Milevsko, Netolice, Veselí n. Luž.).

Plebejus idas (L.) Písek, Klučenice, Orlík n. Vlt. Vzácnější než *P. argus* (L.)

Aricia astrarche (Brgstr.) Písek Le, Sa (Orlík n. Vlt, Prachatice, Čes. Budějovice, Trocnov, Tábor, Záhořany, Vyšenské kopce u Čes. Krumlova, Babice.).

Vacciniina optilete (Knoch.) Kovářov u Lipna Le, Mrtvý luh, Soumarský most, Červené blato (Veselí n. Luž. Brčák).

Polyommatus amandus (Schn.) Písek, Červená n. Vlt., Podolí I. (Klučenice, Nové Hrady, Jindř. Hradec, Veselí n. Luž., Písecká Smoleč, Rančické údolí, Netolice, vrch Peklo). - *P. dorylas* (Den. et Schiff.) (= *argester* /Brgstr./). Vzácný. Klučenice Le, Písek Kr (Trhové Sviny, Vyšenské kopce Ebenhöh).

Eumedonia chiron (Rott.) Nehojný na různých lesních pasekách a vlhkých loukách. Písek Le, Sa, Kr (Kratochvíle Kudrna).

Glaucopsyche alexis (Poda.) Na lesních lukách a pasekách nehojný. Písek, Podolí I. (Klučenice, Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice, Hluboká n. Vlt., Vyšenské kopce, Písecká Smoleč).

Scoliantides orion (Pall.) Na suchých stráních. Lehečka ho zjistil u Písku a Zvíkova (České Budějovice, Dívčí Kámen).

Maculinea teleius (Brgstr.) Vlhké louky. Nevzácný. Písek (Klučenice, Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice, Adolfov, Velešín, Hartmanice, Prachatice, Nové Hrady, Jindřichův Hradec, Rožmberk, Tábor, Trhové Sviny, Netolice, Rudolfov, Zvíkov, Veselí n. Luž.). - *M. nausithous* (Brgstr.) Na bažinatých lukách. Písek Lh, Kr, Le, Bohumilice u Vimperka Lh (Nové Hrady, Jindř. Hradec, Rožmberk, Netolice).

Carcharodus alceae (Esp.) Na suchých místech. Vzácný. Písek Lh, Kr, Sa (Klučenice, Kleť).

Pyrgus serratulae (Rmbr.) Na suchých teplých stráních ve dvou gen. Písek (Klučenice, Čes. Budějovice, Pacova hora u Chýnova).

Carterocephalus palaemon (Pall.) Písek, Červená n. Vlt. Hojný. (Modrava, Nové Hrady, Žofínský prales, ryb. Prelát, Netolice, vrch Peklo, Veselí n. Luž.).

Adopaea acteon (Rott.) Na sušších loukách a pasekách. 10. a 16. IX. 1965, Písek Kr. (Orlík n. Vlt., Klučenice, Písecká Smoleč).

Thermophila meliloti (Esp.) Na lesních pasekách a u lesních cest dosti hojný. Písek (Klučenice, Čes. Budějovice, Adolfov, Nové Hrady).

Zygaena ephialtes (L.) f. medusa (Pall.) Vzácně. Písek Le (Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice); f. peucedani (Esp.) a f. athamanthae (Esp.) Hojnější. Písek, Červená n. Vlt. (Klučenice, Orlík n. Vlt., Milín, Čes. Budějovice, Sušice, Veselí n. Luž., Šumava).

Agrumenia carniolica (Scop.) Klučenice Le, Písek (Orlík, Milín, Adolfov, Čes. Budějovice, Hořepník u Pelhřimova, Veselí n. Luž.).

Dysauxes ancilla (L.) Vzácný. 14. 8. 1963 Orlík n. Vlt. Le, 5. VIII. 1963 Písek Kr. Nález z jižních Čech uvádí jen Baťa (1921) - Velešín. u Čes. Budějovic.

Roeselia stringula (Den. et Schiff.) Přilétá ku světlu, jednotlivě. Červená n. Vlt. Le, Kr. (Písek, Černický rybník u Čes. Budějovic.)

Celama confusalis (H. S.) Dosti hojný v listnatých lesích v dubnu a začátkem května. Písek Le, Kr (Čes. Budějovice Baťa). Z jižních Čech nejsou hlášeny jiné nálezy.

Acherontia atropos (L.) V roce 1967 více nálezů, nalezeny též housenky na bramborách. Klučenice, Orlík n. Vlt., Písek (Strakonice, Veselí n. Luž.).

Celerio lineata (F.) var. *livornica* (Esp.) Začátkem srpna 1952 přilétali mi tito lišajové po několik dní ke světlu na Benecku v Krkonoších. Celkem asi 40 kusů čistých, právě vylíhlých. 17. VIII. 1952 přilétla ke světlu na Červené n. Vlt. 1 olétaná samička. Benecko, Červená n. Vlt. Le (Horní Dvořiště Baťa).

Hemaris fuciformis (L.) Písek Sa, Lh, Vzácný. (Veselí n. Luž. Brčák).

Harpyia bicuspis (Bkh.) Jednotlivě. V., VI. Housenky na Salix caprea. Písek, Nová Ves u Písku Kr (Klučenice, Orlík n. Vlt., Prachatice, Čes. Budějovice.). - *H. furcula* (Cl.) V., VI. Vzácný. Písek Le (Soběslav Brčák).

Cerura erminea (Esp.) Z jižních Čech není dosud hlášen žádný nález. Sterneck považuje nálezy v Čechách za velkou vzácnost. 29. VI. 1965 přilétl 1 sameček ke světlu v Písku, Lehečka Emil zjistil tento druh

v Lenoře. Ing. Spitzer ulovil 1 samečka 20. VI. 1964 u Libořez, Kuneč 1 samičku 2. VI. 1961 v okolí Třeboně. Písek Le, Lenora Lehečka Emil, Libořezy Spitzer, Třeboň Kuneš.

Hybocampa terrifica (Den. et Schiff.) /= *milhauseri* (F.)/ Každým rokem přilétne několik kusů ke světlu, květen. V jižních Čechách dosud nezjištěna. Nejbližší lokalita údolí Berounky. Orlík n. Vlt.: 19. VI. 1965 Le, Písek: 31. V. 1952, 29. V. 1954, 30. V. 1964, 17. V. 1966 Le; 27. V. 1964, 14. V. 1966 Kr.

Pheosia gnoma (F.) /= *dictaeoides* (Esp.)/ V., VI. Nehojný. Písek Le, Lh, Sa (Česká Kubice, Lenora, Čes. Budějovice, Veselí n. Luž.).

Notodonta phoebe (Sieb.) Klučenice, Orlík n. Vlt. (Písek, Čes. Budějovice, Horní Dvořiště).

Leucodonta bicoloria (Den. et Schiff.) Tento vzácný hřbetozubec byl u Písku objeven před několika roky. V., VI. Písek, Červená n. Vlt. (Nové Hrady, Čes. Budějovice, Veselí n. Luž.).

Odontosia carmelita (Esp.) Nehojný. IV., V. Písek, Červená n. Vlt. (Prachatice, Drahonice u Vodňan, Čes. Budějovice, Nová Bystřice).

Clostera anastomosis (L.) Sterneck uveřejňuje Malochův nález u Písku. Výskyt tohoto druhu potvrzuje Lehečka - 11. 7. 1949. Písek Lh (Písek, Čes. Budějovice, Nové Hrady, Blatná).

Tethea fluctuosa (Hb.) V březových porostech. Červená n. Vlt. (Písek, Čes. Budějovice, Borkovice, Stachy, Veselí n. Luž.) - *T. duplaris* (L.) Hojná ve dvou generacích. Borečnice u Písku (Písek, Čes. Budějovice, Borkovice, Chýnov u Tábora, Veselí n. Luž.).

Dasychira abietis (Den. et Schiff.) Vzácná. Červená n. Vlt. Kr, Podolí I. Kr (Klučenice, Orlík n. Vlt., Písek, Vidov, Soběslav, Nové Hrady, Kout na Šumavě, Veselí n. Luž.).

Arctornis l-nigrum (Müll.) Hojná. Ke světlu přilétají jen samci. Písek, Nová Ves u Písku, Červená n. Vlt. (Hluboká). 24. VI. 1967 chycena na světlo první samička Sa.

Trichiura crataegi (L.) Celkem vzácný. VIII., IX. Housenky na Prunus spinosa, Salix caprea, Betula. Písek (Klučenice, Orlík n. Vlt., Sušice, Nové Hrady, Jindř. Hradec, Čes. Budějovice).

Poecilocampa populi (L.) Hojný. Písek (Klučenice, Orlík n. Vlt., Sušice, Čes. Budějovice, Doudleby).

Cosmotriche lunigera (Esp.) Celkem hojný ve dvou časových obdobích. Červená n. Vlt., Podolí I. Le, Kr (Klučenice, Orlík n. Vlt., Písek, Příbram, Rožmitál, Klatovy, Česká Kubice, Čes. Budějovice, Jindř. Hradec, Bechyně, Modrava, Šumava).

Epicnaptera tremulifolia (Hb.) Vzácný. Písek: 13. V. 1948 Le, 27. V. 1964 Kr. Orlík n. Vlt.: e. l. 15. V. 1951 Teska. (Prachatice, Čes. Budějovice, Třeboň).

Lemonia dumi (L.) Na lukách podél řeky Blanice i jinde v říjnu. Lehečka vypěstoval motýly z vajíček, která nakladla chycená samička. Část motýlů se vylíhla druhým rokem, ze zbývajících kukel imaga třetím rokem. Písek Le, Lh, Kr, Heřmaň, Vrcovice Lh. (Nové Hrady, Čes. Budějovice, Soběslav, Borkovice, Dráchov, Jindř. Hradec, Kamenný Újezd, Malíkov, Člunek, Veselí n. Luž.).

Platypteryx harpagula (Esp.) Vzácný. Podolí I. 2. VII. 1963 Le, Písek, 5. VII. 1964 Kr, Borečnice u Písku, 1. 7. 1967 Kr. Nový druh pro jižní Čechy. Sterneck uvádí nejbližší místo Karlštejn.

Platypteryx binaria (Hufn.) Nehojný druh, ve dvou generacích. Písek (Nové Hrady, Čes. Budějovice, Hluboká n. Vlt.).

Nudaria mundana (L.) Písek Kr. (Orlík n. Vlt., Psí Koryto, Čes. Budějovice, Adolfov, Lenora, Sušice, Blatná.)

Comacla senex (Hb.) Krampl a Samec je lovili v Písku. Z jižních Čech hlášen jediný nález z Českého Vrbného (Baťa). Písek: 4. 8. 1963, 14.-16. 7. 1964, 15. 7. 1965 Kr.

Miltochrista miniata (Forst.) Písek Le, Kr. (Hluboká n. Vlt. Baťa, Nové Hrady Baťa.).

Hypocrita jacobaeae (L.) Housenky hromadně na Senecio jacobaea. Klučenice, Orlík n. Vlt., Písek (Březnice, Tábor, Čes. Budějovice, Stráž n. Než., Veselí n. Luž., Šumava).

Cochlidion avellana (L.) Přilétá ke světlu, housenky na dubech. Hojný. Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt. (Klučenice, Písek, Čes. Budějovice, Veselí n. Luž.).

Heterogenea asella (Den. et Schiff.) 1 kus přilétl 29. VI. 1967 ke světlu v Písku Le (Hluboká n. Vlt. Baťa). Z jižních Čech jsou známy jen uvedené lokality.

Fumaria casta (Pall.) Velmi hojný. Vaky na stromech, patnících a sloupech. Písek, Červená n. Vlt., Podolí I. (Čes. Budějovice, Stráž n. Než., Veselí n. Luž.).

Sterrhopteryx hirsutella (Hb.) Samečci přilétají ke světlu. Písek Le, Kr, Borečnice u Písku Le, Kr, Nová Ves u Písku Kr. (Borkovice, Veselí n. Luž.).

Acanthopsyche atra (L.) = *opacella* (H. S.) Krampl nalezl vaky na kmenech stromů a na sloupech. V květnu se líhly jen samičky. Písek Kr. (Čes. Budějovice, Stráž. n. Než.).

Talaeporia tubulosa (Retz.) Vaky hojně na bucích i na jiných stromech, často parazitovány. Písek Kr, To, Ve, Červená n. Vlt., Podolí I. Kr.

Bembecia hylaeiformis (Lasp.) Krampl nalezl 1 párek v kopule na listu maliníku na Kleti. (Klučenice, Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice, Nové Hrady, Bělčice u Blatné, Veselí n. Luž.).

Aegeria tipuliformis (Cl.) Písek (Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice, Veselí n. Luž.).

Dipsosphecia scopigera (Scop.) V bylinném porostu na suchých místtech dosti hojná od konce června do poloviny srpna. Klučenice Le, Písek Kr, Ve, Podolí I. Kr. Nový druh pro jižní Čechy. Jsou známy nálezy ze stř. Čech.

Euxoa obelisca (Den. et. Schiff.) Nehojná. Písek (Klučenice, Orlík n. Vlt., Lázně sv. Markéty, Čes. Budějovice).

Scotia cinerea (Den. et. Schiff.) Nehojná. Červená n. Vlt., Podolí I Le, Kr (Klučenice, Písek, Sušice, Čes. Budějovice, Třeboň, Jindř. Hradec, Pošumaví). - *S. clavis* (Hufn.) /= *corticea* (Hb.)/ Orlík n. Vlt. Le, Podolí I. Le, Kr. (Klučenice, Písek, Červená n. Vlt., Čes. Budějovice, Jindř. Hradec.). - *S. crassa* (Hb.) Vzácná. Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt. Le (Klučenice Le, Písek Le, Sa, Třeboň Brčák).

Ochropleura signifera (Den. et. Schiff.) 11. 6. 1948 na Červené n. Vlt. Le. (Klučenice Le). Od té doby se neobjevila. - *O. praecox* (L.) Orlík n. Vlt. 6. VIII. 1948 Le. Na písčité pastvině (Čes. Budějovice, Stachy). - *O. candelisequa* (Den. et. Schiff.) Levý chytil několik jedinců na světlo na lesní pasece ve vltavském údolí 23. 7, 1935. Nový druh pro jižní Čechy.

Eugnorisma depuncta (L.) Nehojná až vzácná. Písek Le, Kr (Orlík n. Vlt., Lázně sv. Markéty, Adolfov).

Rhyacia simulans (Hufn.) Písek Le, Kleť, Kr. (Klučenice, Klet, Čes. Budějovice, Veselí n. Luž., Jindř. Hradec).

Noctua comes (Hb.) Housenky zjara na různých křovinách. Písek (Klučenice, Horní Dvořiště). - *N. interposita* (Hb.) Krampl ulovil na světlo 1 exemplář 12. 8. 1966, Písek. Nový druh pro jižní Čechy. Z Čech je znám nález Wichry u Radotína a Bariczkův z Karlštejna. - *N. janthina* (Den. et. Schiff.) Nehojný druh. Písek Le, Kr. (Horní Dvořiště, Jindř. Hradec).

Opigena polygona (Den. et. Schriff.) U Písku hojná v letech 1965 a 1966 v srpnu a září. Písek Le, Kr, Sa, Hluboká n. Vlt. Kr. (Jankov u Čes. Budějovic, Jindř. Hradec, Čes. Budějovice, Stachy, Šumava).

Eugraphe sigma (Den. et. Schiff.) Červená n. Vlt. Le, Kr (Písek, Koloděj n. Luž., Nové Hrady, Čes. Budějovice, Březnice).

Paradiarsia glareosa (Esp.) Písek, Červená n. Vlt. Le. Vzácná. (Orlík n. Vlt., Klučenice Le, Sušice Soffner, Dolní Hamry Ebenhöh, Mrtvý luh Novák, Spitzer).

Amathes triangulum (Hufn.) Hojná. Červená n. Vlt. (Klučenice, Orlík n. Vlt., Písek, Čes. Budějovice, Nové Hrady, Jindř. Hradec).- *A. ashworthii* (Doubl.) subs. *candelarum* (Stgr.) Jen několik jedinců přilétne v červnu nebo v červenci ke světlu. Červená n. Vlt. Le (Klučenice, Orlík n. Vlt. Le, Písek Le, Kr, Čes. Budějovice, Rančické údolí Patočka, Jindř. Hradec Spitzer.). - *A. rhomboidea* (Esp.) Písek Le, Kr, Sa (Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice, Vidov, Veselí n. Luž.).

Eurois occulta (L.) Červená n. Vlt. Le, Kr, Kleť Kr (Písek, Čimelice, Hluboká n. Vlt., Čes. Budějovice, Dráchov, Borkovice, Veselí n. Luž.).

Hadena texturata (Alp.) subs. *silbernageli* Tykač. 7. VI. 1964 ulovil Krampl 1 samečka u Písku. V roce 1966 se nám podařilo ulovit opět několik jedinců na Červené n. Vlt. 2 samičky nakladly vajíčka. V červenci 1967 se vylíhla imaga. Písek Kr (Červená n. Vlt. Le, Kr, Klučenice Le).

Mamestra suasa (Den. et Schiff.) /= *dissimilis* (Knoch)/. Hojná. Klučenice, Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt. (Písek, Čes. Budějovice, Jindř. Hradec, Veselí n. Luž.). - *M. aliena* (Hb.) Vzácná. Orlík n. Vlt. Le, Písek, Červená n. Vlt. Le, Kr, Podolí I. Le. (Klučenice, Rančické údolí, Sušice, Šumava: otavské údolí.). - *M. glauca* (Hb.) Vzácná. Červená n. Vlt. Le. (Klučenice, Čes. Budějovice, Libořezy) - *M. dysodea* (Den. et. Schiff.) /= *spinaciae* (View.)/ Červená n. Vlt., Písek Le. (Orlík n. Vlt. Písek, Čes. Budějovice, Horní Dvořiště).

Hadena lepida (Esp.) Nehojná. Čimelice Le, Písek Le, Kr, Sa, Červená n. Vlt. Le, Kr. (Klučenice, Čes. Budějovice, Františkov.). - *H. filigramma* (Esp.) subs. *xanthocyanea* (Hb.) Vzácná. Písek Le, Kr, Nová Ves u Písku Kr. (Klučenice Le, Čes. Budějovice, Hodějovice Patočka).- *H. albimacula* (Bkh.) Nová Ves u Písku Kr. (Klučenice, Hodějovice, Prachatice). - *H. compta* (Den. et Schiff.) Červená n. Vlt., Borečnice u Písku (Klučenice, Orlík n. Vlt., Písek, Čes. Budějovice, Jindř. Hradec.). - *H. confusa* (Hufn.) /= *nana* (Roth.)/. Písek, Orlík n. Vlt. (Klučenice, Červená n. Vlt., Písek, Čes. Budějovice, Jindř. Hradec, Veselí n. Luž.). - *H. bicruris* (Hufn.) Orlík n. Vlt., Kovářov u Lipna (Klučenice, Písek, Červená n. Vlt., Prachatice, Čes. Budějovice).

Lasionycta proxima (Hb.) Písek Le. (Červená n. Vlt., Horní Dvořiště, Stachy).

Orthosia populi (Strom.) /=*Monima populeti* (Tr.)/ 1 sameček uloven 10.4.1932 při nočním lovu na jívách u Klučenic a 1 kus 16.IV.1963 v okolí Jindř. Hradce. Klučenice Le, Jindř. Hradec Spitzer. Nový druh pro jižní Čechy. - *O. munda* (Den. et. Schiff.) Nejrannější přímočarnice. Hojná. Při pěstování vylíhlo se mnoho forem immaculata Stdgr. Písek. (Nové Hrady, Čes. Budějovice Patočka, Libořezy Povolný, Spitzer, Marek, Jindř. Hradec, Třeboň Spitzer).

Mythimna turca (L.) 6.6.1966, Hluboká n. Vlt. Kr. (Jindř. Hradec Spitzer). V jižních Čechách jsou známy jen tyto dva nálezy. - *M. straminea* (Tr.) V červenci 1956 a 1964 chyceno několik kusů na světlo. Písek Le, Kr. Nejbližší známé lokality jsou Čes. Budějovice a Bolevec u Plzně.

Leucania obsoleta (Hb.) 6.6.1966 přilétlo asi 5 kusů na světlo na Hluboké n. Vlt. Kr. (Písek Maloch, Čes. Budějovice, Nové Hrady). - *L. comma* (L.) Písek, Hluboká n. Vlt. (Klučenice, Orlík n. Vlt. Červená n. Vlt., Modrava, Čes. Budějovice.).

Cucullia lucifuga (Den. et Schiff.) Housenka nalezena na polní cestě. Motýl se vylíhl 13.7.1949. Písek Le. (Čes. Budějovice, Jindř. Hradec). - *C. chamomillae* (Den. et Schiff.) Brzy zjara. Orlík n. Vlt. Le, Písek, Le, Kr. (Klučenice, Čes. Budějovice, Veselí n. Luž.).

Callierges ramosa (Hb.) 28.6.1967 uloven 1 kus v údolí Otavy u Borečnice u Písku Kr. (Červená n. Vlt. Le, Kr).

Brachionycha nubeculosa (Esp.) Vzácný. III., IV. Písek Lh. (Horní Dvořiště).

Cleoceris viminalis (F.) Sterneck se domnívá, že v jižních Čechách tento druh schází. Písek Le, Kr, Červená n. Vlt. Kr, Strážný Le. (Lázně sv. Markéty, Horní Dvořiště, Stachy).

Polyximis flavicincta (Den. et. Schif.) Nehojná. Písek Le, Sa. Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice, Sušice, Horní Dvořiště, Nové Hrady, Dráchov, Borkovice, Soběslav, Jindř. Hradec, Veselí n. Luž.).

Conistra erythrocephala (Den. et. Schiff.) Vzácná. Písek Kr. (Klučenice, Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice).

Dasycampa rubiginea (Den. et Schiff.) Nevzácná, na jaře. Písek, Orlík n. Vlt. (Klučenice, Hluboká n. Vlt., Jindř. Hradec)..

Agrochola humilis (Den. et Schiff.) Vzácná. Krampl našel housenku na kvetoucí jívě - e.l. 29. VIII. 1965. Vejmělek ulovil dva kusy na vnadidlo 14.10.1966. Písek Kr, Ve. Sterneck v Prodromu uvádí z jižních Čech jen nález z Bechyně.

Parastichtis suspecta (Hb.) /= *iners* (Tr.)/ Krampl chytil tento druh 16. 7. 1964 u Písku. Z jižních Čech hlášen jen nález z Jindř. Hradce (Spitzer).

Cirrhia aurago (Den. et Schiff.) V říjnu 1966 přilétla večer jedna samička do bytu Sokolíkovi a druhou chytil téhož roku na vnadidlo Vejmělek. Písek So, Ve. (Hluboká n. Vlt.). - *C. citrago* L. Klučenice, Čimelice, Týn n. Vlt. (Orlík n. Vlt., Písek, Hluboká n. Vlt.).

Apatele cuspis (Hb.) 14. 7. 1939, Klučenice Le (Soběslav, Veselí n. Luž.). - *A. alni* (L.) Písek. Vzácná. (Klučenice, Lenora, Rudolfov u Čes. Budějovic, Soběslav, Jindř. Hradec).

Dasechaeta alpium (Osb.) Nehojná. Orlík n. Vlt., Písek, Nová Ves u Písku, Jistec, Borečnice u Písku. (Vráž u Písku, Klučenice, Čes. Budějovice, Horní Dvořiště, Třeboň).

Cryphia raptricula (Den. et. Schiff.) Písek. (Čes. Budějovice, Povltaví, Jindř. Hradec, Radouňka, Vidov, Soběslav.). - *C. ereptricula* (Tr.) Písek. (Klučenice, Horní Dvořiště, Stachy).

Mormo maura (L.) Přilétá ke světlu i na vnadidlo. Vzácná. Písek Le, Sa, To. (Březnice, Čes. Budějovice, Jindř. Hradec).

Apamea sublustris (Esp.) Nehojná. Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt., Písek. (Klučenice, Hartmanice, Čes. Budějovice.). - *A. crenata* (Hufn.) /= *rurea* (F.)/. Typická forma vzácnější než f. alopecurus Esp. Klučenice, Orlík n. Vlt., Písek, Kleť (Veselí n. Luž.). - *A. rubrirena* (Tr.) V jižních Čechách zjistil tento druh Soffner u Modravy a Wichra u Stachů. Tento boreo-alpinský druh se vyskytuje na Šumavě, na Benecku v Krkonoších Le. U Písku byl zjištěn v červenci 1964 na vrchu Jarníku, 587 m n.m. a U Honzíčka, přes 500 m n.m. Ke světlu přilétlo několik exemplářů. Písek: 9. VII. 1964, 11. 7. 1964 Le, 27. VII. 1964, 3. VII. 1964, 11. 7. 1964 Kr. Kleť: 4. 7. 1966 Kr. (Modrava, Stachy). - *A. remissa* (Hb.) Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt., Písek. Nehojná. (Klučenice, Čes. Budějovice, Stachy). - *A. anceps* (Den. et Schiff.) /= *sordida* (Bkh.)/ Hojný. Orlík n. Vlt., Písek, Kovářov u Lipna (Příbram, Čes. Budějovice, Klučenice). - *A. scolopacina* (Esp.) Krampl nalezl housenku na květu třeslice u Písku. Orlík n. Vlt. Le (Klučenice, Písek).

Oligia ophiogramma (Esp.) Celkem vzácná. Orlík n. Vlt. Le. (Klučenice, Písek, Čes. Budějovice, Jindř. Hradec).

Miana furuncula (Den. et. Schriff.) /= *bicoloria* (Vill.) Orlík n. Vlt. (Klučenice, Písek, Čes. Budějovice, Sušice, Veselí n. Luž.).

Amphipoea oculea (L.) Hojnější než *fucosa*. Klučenice, Orlík n. Vlt. Písek. - *A. fucosa* (Fr.) Klučenice, Orlík n. Vlt., Písek, Paseky, Psí Koryto, Čes. Budějovice, Nové Hrady.

Celaena leucostigma (Hb.) Nová Ves u Písku Kr (Písek Le, Kr, Chýnov u Tábora, Čes. Budějovice Patočka, Jindř. Hradec Spitzer, Veselí n. Luž. Brčák, Hodějovice Patočka, Kardašova Řečice Šach.). V září sedaly můry na květy rákosu.

Hydraecia micacea (Esp.) V září. Orlík n. Vlt. Le, Písek Le, Sa. (Červená n. Vlt., Čes. Budějovice, Nové Hrady, Jindř. Hradec.).

Hyppa rectilinea (Esp.) Vzácná. Orlík n. Vlt. Le, Červená n. Vlt. Le, Kr. (Modrava, Horní Dvořiště, Nové Hrady, Jindř. Hradec, Koroseky, Veselí n. Luž., Stachy).

Auchmis comma (Den. et Schiff.) / *Rhizedra detersa* (Esp.)/. 1 kus 26. 6. 1966, Vyšenské kopce u Čes. Krumlova Kr. (Orlík n. Vlt., Krumlov).

Caradrina selini (Boisd.) Nevzácný druh. Červená n. Vlt. Le, Kr. (Klučenice, Orlík n. Vlt., Písek, Sušice, Šumava, Rožmberk, Hodějovice, Jindř. Hradec).

Athetis palustris (Hb.) Na vlhkých loukách. Orlík n. Vlt. Le, Písek, Le, Kr, Červená n. Vlt. Le. (Klučenice, Čes. Budějovice, Horní Dvořiště, České Vrbné.).

Ipimorpha retusa (L.) Písek, Červená n. Vlt. (Klučenice, Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice, Tábor, Jindř. Hradec, Veselí n. Luž.). - *I. subtusa* (Den. et Schiff.) Písek Le, Kr. (Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice). Vzácnější než *retusa* L.

Meristis trigramica (Hufn.) f. bilinea (Hb.) Velmi vzácná. Písek Le, Kr (Klučenice Le).

Cosmia pyralina (View.) Dosti hojná. Orlík n. Vlt., Čimelice, (Klučenice, Písek, Čes. Budějovice, Jindř. Hradec).

Enargia paleacea (Esp.) Nehojná. Písek Le, Kr. (Prachatice, Vidov, Hodějovice).

Rhizedra lutosa (Hb.) Koncem září a začátkem října 1961 přilétlo několik exemplářů ke světlu na jižním okraji Písku. Písek Le (Klučenice, Čes. Budějovice, Horní Dvořiště).

Nonagria typhae (Thnbg.) Přilétaly velmi vzácně v údolí Otavy u Písku. Jedna samička byla chycena na Alšově nám. v Písku, v září. 1 samička f. fraterna (Tr.) přilétla ke světlu 31. VII. 1961. Písek Le, Sa. (Čes. Budějovice Baťa, Jindř. Hradec Spitzer, Veselí n. Luž. Brčák).

Archanara algae (Esp.) V srpnu v údolí Otavy přilétají vzácně ke světlu. Písek Le. (Roudné Patočka, Veselí n. Luž., Borkovice Brčák, Soběslav Balatý, Třeboň Kuneš, Radouňka Spitzer).

Chloridea peltigera (Den. et Schiff.) Mediterránní druh. Červenec 1958. Písek Le. (Horní Dvořiště Baťa).

Chloridea scutosa (Den. et Schiff.) V srpnu 1952 přilétlo několik exemplářů ke světlu. Písek Le. V jižních Čechách nebyla zjištěna. Sterneck uvádí okolí Prahy. V novější době Kuklv u Poděbrad, Pouchov u Hradce Králové.

Acontia lucida (Hufn.) 1 sameček přilétl ke světlu 31. VIII. 1954, Písek Le. Podle Sternecka nejbližší lokalita je Loděnice a okolí Prahy. Nový druh pro jižní Čechy.

Nycteola revayana (Scop.) Písek Le, Kr, Ražice Le. (Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice, Nové Hrady). Imago od března do září. Housenky na mladých dubech.

Earias chlorana (L.) Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt., Borečnice u Písku (Písek, Čes. Budějovice).

Pseudoips bicolorana (Fuessly) Housenky na dubech. Písek Le, Kr, Sa, Lh. (Klučenice, Čes. Budějovice, Sušice).

Panthea coenobita (Fuessly) Červená n. Vlt., Vyšší Brod. Celkem hojný. Orlík n. Vlt.,) Písek, Příbram, Velešín, Horní Dvořiště, Nová Bystřice, Kleť, Dráchov, Stachy, Jindř. Hradec, Veselí n. Luž.).

Chrysaspidia bractea (Den. et Schiff.) Tento horský druh je rozšířen i v nízkých polohách a tam nevzácný, avšak nehojný. Orlík n. Vlt., Strážný Le, Písek Le, Lh, Sa, Kr, Borečnice u Písku To, Mrtvý luh Kr (Příbram, Rožmitál, Prachatice, Sušice, Kleť, Šumava: otavské údolí, Borová Lada u Kvildy, Třeboň, Jindř. Hradec).

Autographa pulchrina (Haw.) Dosti hojná. Písek Le, Lh, Sa, Kr, Nová Ves u Písku Kr (Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt., Čes. Budějovice, Nové Hrady, Jindř. Hradec).

Minucia lupnaris (Den. et Schiff.) Vzácná. Písek Le, Hluboká n. Vlt., Kr (Klučenice, Čes. Budějovice, Tábor).

Prodotis stolida (Den. et Schiff.) Písek Le. Viz Levý 1967.

Lygephila pastinum (Tr.) Vzácná. Červená n. Vlt. Le, Vyšenské kopce u Čes. Krumlova Kr (Písek, Čes. Budějovice, Kleť, Sušice, Chýnov u Tábora.). - *L. viciae* (Hb.) Orlík n. Vlt., Písek Klučenice, Červená n. Vlt., Písek, Adolfov, Kleť, Veselí n. Luž.). - *L. craccae* (Den. et Schiff.) Vzácná. Orlík n. Vlt. Le, Červená n. Vlt. Kr, Písek Le, Kr, Sa. (Klučenice, Čes. Budějovice).

Rivula sericealis (Sc.) Všude hojná. Klučenice, Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt. (Písek, Čes. Budějovice, Veselí n. Luž, Nové Hrady).

Herminia barbalis (Cl.) Červen. Nehojná. Orlík n. Vlt. Le, Písek Le, Sa (Písek, Čes. Budějovice, Veselí n. Luž.).

Zanclognatha tarsipennalis (Tr.) Vzácná. Písek Le, Kr, Sa (Klučenice, Červená n. Vlt. Le). Odjinud z jižních Čech není hlášena. Podle Šternecka nejbližší naleziště okolí Prahy. - *Z. tarsicrinalis* (Knoch.) Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt. Hojná. (Písek, Čes. Budějovice, Borkovice, Veselí n. Luž.). - *Z. grisealis* (Den. et Schiff.) Nehojná. Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt. Le, Kr, Nová Ves u Písku Kr (Písek, České Budějovice, Borkovice, Radouňka).

Trisateles emortualis (Den. et. Schiff.) Nehojná. Písek Le, Kr, Sa, Červená n. Vlt. Le, Kr (Hluboká, Nové Hrady).

Hypena obsitalis (Hb.) /= *obesalis* (Tr.)/. Vzácná. Kovářov u Lipna Le (Klučenice, Prachatice, Antigl, Čes. Budějovice, Nové Hrady, Horní Dvořiště).

Brephos notha (Hb.) Vzácná. 1 kus 21. III. 1954, Písek Le (Čes. Budějovice).

Jodis lactearia (L.) Nehojná. Housenky našel Krampl na bříze. Písek Le, Kr, Sa (Čes. Budějovice, Písek).

Calothisanis amata (L.) f. effusaria Klem. Velmi vzácná. Krampl chytil 1 exemplář 5. 8. 1962. Písek Kr. Šterneck uvádí pouze 1 kus z Frýdlandu.

Cosymbia quercimontaria Bastelb. 3 kusy přilétly ke světlu na Červené n. Vlt.: 28. VI. 1967, 2. VII. 1967, 10. 8. 1966 Kr. Šterneck v Prodromu zaznamenává 1 samečka z Chebu a více kusů z Mladé Boleslavi. Nový druh pro jižní Čechy. - *C. trilinearia* (Brkh.) /= *linearia* (Hb.)/. Nehojný. Písek Le, Kr, Lh (Hluboká n. Vlt., Jankov u Českých Budějovic).

Scopula flaccidaria (Zell.) Tento orientální druh ulovil Krampl 15. VII. 1963 u Písku. Šterneck ho v Prodromu neudává. Uvádíme jako nový druh pro jižní Čechy. Neznáme jinou lokalitu v Čechách.

Sterrha pallidata (Den. et Schiff.) Vzácný. 5. 6. 1964 chycen u Písku Le (Čes. Budějovice). - *S. sylvestraria* Hb. /= *straminata* (Tr.)/. Nehojný. Klučenice, Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt. Le, Písek Le, Kr. (Čes. Budějovice, Adolfov). - *S. inquinata* (Sc.) /= *herbariata* (F.)/. Žije v domácnostech, také přilétá ke světlu. Orlík n. Vlt. (Klučenice, Písek, Čes. Budějovice). - *S. emarginata* (L.) Nehojná. Orlík n. Vlt., Písek (Čimelice, Paseky, Písek, Čes. Budějovice, Adolfov, Třeboň).

Larentia clavaria (Haw.) V září, celkem vzácná. Písek Le, Kr (České Budějovice, Nové Hrady, Sušice).

Ortholitha mucronata (Scop.) a *O. plumbaria* (F.) Oba druhy se vyskytují v okolí Písku, Orlíku n. Vlt. Klučenic, Červené n. Vlt. První druh je vzácnější.

Chesias legatella (Den. et Schiff.) /= *spartiata* (Fuessly)/. 1 kus 1. X. 1962 u Písku Kr (Klučenice, Čes. Budějovice.).

Anaitis praeformata (Hb.) Orlík n. Vlt., Kovářov u Lipna Le (Písek, Rožmberk, Šumava).

Acasis viretata (Hb.) Pouze jediný kus ulovil Krampl 27. V. 1964 u Písku. Podle Sternecka se tento druh vyskytuje jednotlivě a vzácně ve dvou generacích. Nejbližší naleziště Karlštejn a Bory u Plzně. Nový druh pro jižní Čechy.

Mysticoptera sexalata (Retz.) Jednotlivě. Písek, Červená n. Vlt. Le, Kr, Nová Ves u Písku Kr (Čes. Budějovice, Hodějovice, Jindř. Hradec).

Operophtera fagata (Scharf.) Dosti hojná v listnatých lesích. Písek (Čes. Budějovice, Nové Hrady, Jindř. Hradec).

Calocalpe cervinalis (Scop.) Na jaře přilétá ke světlu. Orlík n. Vlt. Le (Písek, Čes. Budějovice, Kleť, Horní Dvořiště, Nové Hrady.).

Philereme vetulata (Den. et Schiff.) Nehojná. Písek, Borečnice u Písku Le, Kr (Čes. Budějovice, Sušice, Nové Hrady, Tábor, Šumava: otavské údolí). - *P. transversata* Hufn. Nehojná. Písek Le, Kr, Sa (Orlík n. Vlt., Velešín, Sušice).

Eustroma reticulata (Den. et Schiff.) Nevzácná. Písek Le, Kr, Sa (Písek Srdínko, Šumava, Čes. Budějovice, Velešín, Adolfov).

Lygris testata (L.) Nehojná. Písek (Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt., Čes. Budějovice, Rožmberk, Třeboň, Jindř. Hradec). - *L. mellinata* (F.) /= *associata* (Bkh.)/. Tento eurosibiřský druh se vyskytuje jednotlivě. Písek Le, Sa Červená n. Vlt. Le, Kr, Borečnice u Písku Kr. Podle Sternecka jsou známy nálezy z Krče a Čes. Lípy. Nový druh pro jižní Čechy.

Thera stragulata (Hb.) Vzácný. Písek Kr, Sa (Klučenice, Orlík n. Vlt., Drahonice, Čes. Budějovice, Prachatice /. - *T. firmata* (Hb.) Vzácný. Písek Le, Červená n. Vlt. Kr. (Klučenice, Čes. Budějovice, Nové Hrady, Sušice./.

Dystroma citratum (L.) Vzácně. Písek Le, Strážný Le. (Klučenice, Orlík n. Vlt., Čes. Budějovice, Kašperské Hory, Nové Hrady/..

Xanthorhoe designata (Hufn.) Písek (Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt., Čes. Budějovice, Adolfov, Nové Hrady, Prachatice /.

Calostigia didymata (L.) Vzácná. Klučenice 19. VII. 1937 Le, Písek: 11. VII. 1964, 4. a 7. VIII. 1965. Kr, (Strážný: 7. VIII. 1958 Le (Vidov Patočka). - *C. parallelolineata* (Retz.) VIII., IX. Písek (Orlík n. Vlt., Tábor, Čes. Budějovice, Nové Hrady.).

Lampropteryx suffumata (Den. et Schiff.) V jarních měsících velmi hojná. Červená n. Vlt. (Písek, Šumava, Čes. Budějovice, Hodějovice).

Euphyia picata (Hb.) Vzácná. Písek Le, Kr (Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt., Tábor, Hluboká n. Vlt./. - *E. molluginata* (Hb.) Písek, Červená n. Vlt. (Písek Maloch, Čes. Budějovice, Sušice, Šumava: otavské údolí/.

Ecliptoptera capitata (H. S.) Dosti hojná v V., VI. Červená n. Vlt. Le, Kr (Písek, Jince, Adolfov u Čes. Budějovic).

Electrophaes rubidata (Den. et Schiff.) Nehojná. Podolí, Červená n. Vlt. Le, Kr (Klučenice, Písek, České Budějovice, Hartmanice, Šumava: otavské údolí /.

Melanthia procellata (Den. et Schiff.) Vzácná. Čes. Budějovice Sa, Písek Le (Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt., Nové Hrady /.

Epirrhoe tristata (L.) Písek, Červená n. Vlt., Strážný, Orlík n. Vlt. (Čes. Budějovice, Prachatice, Hartmanice). - *E. luctuata* (Hb.) Písek (Červená n. Vlt., Adolfov, Nové Hrady.). - *E. rivata* (Hb.) Písek, Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt. (Klučenice, Čes. Budějovice, Sušice).

Perizoma albulata (Den. et Schiff.) Libín Le, hojný. Písek Kr, jednotlivě. Sterneck považuje tento druh za dosti rozšířený zvláště v okolí Prahy.

Earophila badiata (Den. et Schiff.) Časně zjara; housenky na šípku. Nevzácná. Orlík n. Vlt., Písek (Klučenice, České Budějovice).

Discoloxia blomeri (Curt.) Krampl ulovil tento vzácný eurosibiřský druh 27. VI. 1964 U Honzíčka (přes 500 m n.m.) u Písku. V roce 1928 chytil několik exemplářů Baťa na Hluboké n. Vlt. Odjinud z jižních Čech není znám žádný nález. Podle Sternecka žije na různých, klimaticky rozdílných místech, což potvrzují nálezy z jižních Čech.

Asthena albulata (Hufl.) Jistec u Písku Le, Sa, Ve (Klučenice, Písek, Velešín, Kašperské Hory, Nové Hrady).

Eupithecia tenuiata (Hb.) Housenky v jehnědách jív. Několik kusů přilétlo ke světlu. Orlík n. Vlt. Le, Písek Le, Kr (Klučenice Le, Šumava, Sušice Soffner, Doubravice Patočka). - *E. pini* (Retz.) /= *togata* (Hb.)/. Jen několik exemplářů. Písek, Červená n. Vlt. Le, Kr (Klučenice, Kleť, Vacíkov u Březnice, Čepičná). - *E. plumbeolata* (Haw.) Orlík n. Vlt., Čimelice Le, Červená n. Vlt. Le, Kr (Klučenice, Písek, Šumava, Modrava, Srní, Prachatice, Čes. Budějovice). - *E. laquearia* (H. S.) Vzácná. Orlík n. Vlt., Písek Le (Klučenice Le, Čes. Budějovice, Jankov Baťa, Borkovice Rychlík, Stachy Voldřich, Wichra). - *E. venosata* (F.) Červená n. Vlt. Kr (Klučenice, Orlík n. Vlt., Písek, Sušice, Železná Ruda). - *E. egenaria* (H. S.) Tento druh objevil na Olomoucku p. Kud-

la. Koch ve„Wir bestimmen Schmetterlinge IV"uvádí, že se vyskytuje v lipových alejích nebo na lípách osaměle stojících. Joukl píše, že se vyskytuje na některých místech stř. Evropy bez udání přesných lokalit. Levý ulovil 24.- 28.5.1964 celkem 6 kusů, další pak 8.6.1966 a 4.6. 1967 u Písku. Krampl zde ulovil 1 exemplář 14.5.1966. Uvedený druh je nový pro jižní Čechy. Determinoval ing. Marek - *E. extraversaria* (H.S.) Červená n. Vlt. Le (Klučenice Le, Písek Srdínko, Le.). - *E. expallidata* (Guén.) 16.8.1947, Červená n. Vlt. Le, 13.8.1966, Písek Le (Kleť Baťa, Sušice Soffner.). - *E. subumbrata* (Den. et Schiff.) Červená n. Vlt. Le, Kr, Kovářov u Lipna Le (Klučenice, Písek, Bechyně, Čes. Budějovice, Sušice, Hluboká n. Vlt.). - *E. subnotata* (Hb.) 1 kus ulovil Kraml 16. VII. 1965 u Písku. Tím se potvrzuje Srdínkův nález tohoto druhu u Písku. Z jižních Čech není známo jiné naleziště. - *E. sinuosaria* Evers. Sterneck ji v Prodromu neuvádí. Tento eurosibiřský druh je podle Hrubého rozšířen ve východní Evropě a proniká dále na západ. Byl zjištěn ve východních Čechách. Nejbližší naleziště Březnice Šmelhaus. Na Písecku se objevil v posledním desetiletí. Orlík n. Vlt. 3.7.1951 Teska, Písek: 6. VI. 1961, 23.7.1964, 29.6.1966 Kr, 3.7. 1964, 8. VII. 1963, 27. VI. 1964 Le, Kovářov u Lipna Le. Nový druh pro jižní Čechy. - *E. distinctaria* (H.S.) Písek Le, Červená n. Vlt. Le, Kr (Klučenice, Orlík n. Vlt., Horní Dvořiště). - *E. indigata* (Hb.) Vzácná. 14.5.1966, Písek Kr (Klučenice, Orlík n. Vlt., Jankov, Nové Hrady, Šumava: Modrava). - *E. nanata* (Hb.) Dosti hojná. Červená n. Vlt. Le, Kr (Klučenice, Orlík, Písek, Psí Koryto, Čes. Budějovice, Suchdol). -*E. innotata* (Hufn.) Písek Le (Klučenice, Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt., Lázně sv. Markéty, Čes. Budějovice, Nové Hrady). - *E. sobrinata* (Hb.) Písek Le, Kr (Klučenice, Orlík n. Vlt., Červená n. Vlt. Lázně sv. Markéty, Čes. Budějovice, Šumava, Sušice, Kašperské Hory). - *E. lariciata* (Fr.) Písek, Le, Červená n. Vlt. Le, Kr, Kleť Kr (Písek, Sušice, Modrava, Nové Hrady, Hodějovice, Planá n. Luž., Luka p. Medníkem.).

Chloroclystis coronata (Hb.) 27.6.1964, 13. VII. 1965, 13. VII. 1966 - Písek Le, 29. VI. 1967, Písek Kr, 13. VI. 1964; Nová Ves u Písku Kr. (Čes. Budějovice Baťa). V roce 1919 porpvé zjištěn Baťou v Čechách. - *Ch. rectangulata* (L.) Hojná v ovocných sadech. Písek, Červená n. Vlt. (Klučenice, Písek, Nové Hrady).

Horisme tersata (Den. et. Schiff.) Celkem vzácná. Písek Le, Kr, Sa, Červená n. Vlt. Le, Kr (Klučenice, Hluboká n. Vlt., Kleť, Hartmanice, Nové Hrady).

Abraxas sylvata (Scop.) Písek: 20.- 28.6.1964 Kr, Borečnice u Písku, 1.7.1967, Holubov pod Kletí 24.VI.1967 Le (Klučenice Le, Doubravice Patočka).

Bapta pictaria (Curt.) Na trnkách zjara. Písek. (Klučenice, Sušice).- *B. bimaculata* (F.) Písek (Písek Maloch, Budějovice Baťa, Borkovice Brčák, Doubravice, Vidov Patočka). - *B. punctata* (F.) /= *temerata* (Hb.)/. Hojná. Písek (Klučenice, Trocnov, Doubravice, Borkovice).

Anagoga pulveraria (L.) Vzácná. Písek Le, Kr, Borečnice Le, Kr (Červená n. Vlt., Kleť, Nové Hrady, Železná Ruda.).

Pungeleria capreolaria (F.) V roce 1967 byl na některých místech hojný. Písek Le, Kr (Čes. Budějovice, Klet, Prachatice, Sušice, Stachy).

Ennomos quercinaria (Hufn.) Písek Le, Kr, Sa (Čes. Budějovice, Adolfov, Třeboň, Kašperské Hory). - *E. alniaria* (L.) Písek Le, Sa, Červená n. Vlt. Le, Kr (Klučenice, Orlík n. Vlt. Čes. Budějovice).

Selenia lunaria (Den. et. Schiff.) Orlík n. Vlt., Písek (Klučenice, Čes. Budějovice, Písek Srdínko).

Colotois pennaria (L.) V roce 1964 a 1965 vyskytl se tento druh v píseckých lesích velmi hojně. zalétal i do ulic. Písek (Nové Hrady, Čes. Budějovice, Písek Maloch).

Semiothisa signaria (Hb.) Vyskytuje se jen na několika malých lesních lokalitách, kde je celkem hojný. (Písek Srdínko, Čes. Budějovice, Šumava).

Erannis aurantiaria (Esp.) Nevzácný v říjnu. Písek (Klučenice, Čes. Budějovice, Hartmanice).

Poecilopsis isabellae Hesl.- Har. 15.III.1968 našel Krampl sedícího samečka na buku v lese u Vrcovic u Písku. V okolí nálezu roste několik modřínů. Je zajímavé, že v Čechách je znám tento druh z oblasti Krkonoš (Haase 1937), ze stř. Čech (oblast Unhošt-Křivoklát (Grosse 1938, Brčák 1948, Brůžková 1948-1950, Slabý 1951), z blízkosti Prahy (Černošice, Roblín, Krč Šmelhaus), České Lípy (Michel) a z okolí Plzně, avšak z území jižně od Prahy a z velké části Českomoravské vysočiny není hlášen žádný nález. Nový druh pro jižní Čechy.

Lycia hirtaria (Cl.) Písek (Písek Maloch, České Budějovice, Nové Hrady).

Biston stratarius (Hufn.) Orlík n. Vlt. Le (Písek, Čes. Budějovice, Kašperské Hory).

Boarmia rhomboidaria (Den. et. Schiff.) Orlík n. Vlt., Písek Le (Klučenice Le, Sušice Soffner.). - *B. ribeata* (Cl.) Hojný druh. Orlík n. Vlt., Podolí I., (Klučenice, Hluboká n. Vlt., Čes. Budějovice, Prachatice,

Jindř. Hradec). - *B. maculata* Stdgr. var. *bastelbergeri* Hirschke. Hojný druh. Písek (Lázně sv. Markéty, Prachatice, Jankov). - *B. arenaria* (Hufn.) /= *angularia* (Thnbg.)/ Krampl ulovil 1 samečka na Kleti 4. VII. 1966. Z jižních Čech známé naleziště jen Trocnov (Bařa). - *B. punctinalis* (Scop.) Červená n. Vlt. Le, Kr (Klučenice, Orlík, Písek, Čes Budějovice, Nové Hrady).

Pachycnemia hippocastanaria (Hb.) Písek Le, Kr (Klučenice Le, Čes. Budějovice Bařa, Kardašova Řečice a Jindř. Hradec Spitzer, Borkovice Brčák, Sušice Soffner).

Gnophos furvata (Den. et. Schiff.) 5. VIII. 1954 přilétlo několik exemplářů ke světlu na Červené n. Vlt., Le (Tábor, Čes. Budějovice).

Lithina chlorosata (Scop.) /= *petraria* (Hb.)/. Vzácná. Písek: 29. V. 1954, 28. V. 1967 Le, 18. V. 1966 Kr (Červená n. Vlt. Le, Stráž n. Než. a Němá Strouha Zavadil).

Aspilates gilvaria (Den. et Schiff.) Písek (Klučenice, Orlík n. Vlt., Písek Maloch a Srdínko, Sušice Soffner).

Zusammenfassung

WEITERER BEITRAG ZUR KENNTNIS DER SCHMETTERLNINGSFAUNA SÜDBÖHMENS

In unserem Beitrag veröffentlichen wir Funde von neuen Arten und Lokalitäten der schon von Sudböhmen gemeldeten Arten. Wir sammelten in der Nähe von Písek, Červená n. Vlt., Orlík n. Vlt., Jistec, Borečnice u.a. Das Píseker Gebiet ist ziemlich gut durchforscht. Interessant ist das Otava- und Moldautal, wo mehrere wärmeliebende Arten vorkommen. Nach dem Anlass der Talsperre Orlík sind beide Täler kälter geworden, denn die Wasseroberfläche hat bei Orlík die Höhe von 60-70 m, bei Červená von 40-50 m Höhe erreicht, wodurch das Vorkommen einiger Arten ungüstig beeinflusst wird. Einige Hügel in der Nähe von Písek erreichen die Höhe über 600 m. Grosse Flächen sind bewaldet, es überwiegt Nadel- und gemichter Wald. Wir ıschtützen uns auf die Forschungsarbeiten von Bařa, Brčák, Spitzer.

Wir haben folgende für Südböhmen neue Arten festgestellt: *Strymon ilicis* (Esp.), *Cerura erminea* (Esp.), *Hybocampa terrifica* (Den. et.

Schiff.), *Platypteryx herpagula* (Esp.), *Dipsosphecia scopigera* (Scop.), *Ochropleura candalisequa* (Den. et Schiff.), *Noctua interposita* (Hb.), *Orthosia populi* (Ström.), *Chloridea scutosa* (Den. et Schiff.), *Acontia lucida* (Hufn.), *Cosymbia quercimontaria* Bastelb., *Scopula flaccidaria* (Zell.), *Acasis viretata* (Hb.), *Lygris mellinata* (F.), *Poecilopsis isabellae* Hes. - Har., *Eupithecia sinuosaria* Evers. und *Eupithecia egenaria* (H. S.).

LITERATURA

Adámek, A., Výskyt *Poecilopsis isabellae* Harr. na Olomoucku. Ent. listy *2:* 8-9. Baťa, L., 1922: Další příspěvek k motýlí fauně jižních Čech. Časopis Čs. spol. ent., *19:* 83. Baťa. L., 1927: Další nálezy lepidopter v jižních Čechách. Časopis Čs. spol. ent., *24:* 81-85. Brčák, J., 1946: Příspěvek k faunistice lepidopter jižních Čech. Časopis Čs. spol. ent., *43:* 75. Brčák, J., 1948: Biocenologické studie Macrolepidopter na rašeliništi SZ od Veselí n. Luž. v již. Čechách. Entomol. listy, *11:* 92-111. Brčák, J., 1948: Poznámky k ekologii a fenologii píďalky *Poecilopsis isabellae* Harr. Časopis Čs. spol. ent., *45:* 77. Brůčková, B., 1948-1950: O českých druzích rodu *Poecilopsis* Harr. Sborník Ent. odd. Nár. muzea, *26:* 365 Ebenhöh, J., 1965: Příspěvek k poznání jihočeské fauny Rhopalocer. Sborník Jihočes. muzea v Čes. Budějovicích - Přírodní vědy, *5:* 84-87. Hašek, J., 1952: Píďalka *Poecilopsis isabellae* Harr. původce žíru na modřínu. Časopis Čs. spol. ent., *49:* 239-240. Hladký, J., 1966: Doplněk k výskytu některých Noctuid v ČSSR v r. 1965. Zprávy Čs. spol. ent., *2:* 92-93. Hrubý, K., 1952: Rozlišování našich druhů *Oporinia* Hübn. Časopis Čs. spol. ent., *49:* 135-145. Hrubý, K., 1951: Noví a vzácní motýlové v severovýchodních Čechách. Časopis Čs. spol. ent., *48:* 80-85. Hrubý, K., 1953: Další zpráva o významnějších nálezech motýlů v severovýchodních Čechách. Ročenka Čs. spol. ent., *50:* 56-61. Hrubý, K., 1964: Prodromus Lepidopter Slovenska. Bratislava. Joukl, H. A., 1910: Motýlové a housenky střední Evropy. Praha. Koch, M., 1958-1964: Wir bestimmen Schmetterlinge. Berlin. Kudrna, O., 1957: K poznání motýlů jižních Čech. Časopis Čs. spol. ent., *54:* 401. Kudrna, O., 1959: Fauna Rhopalocer okolí Netolic. Sborník Jihoč. muzea v Čes. Budějovicích - Přírodní vědy., *2:* 133-138. Lehečka, E., 1966: *Dasy-*

polia templi Thnbg. na Šumavě. Zprávy Čs. spol. ent., *2:* 53-55. Levý, J., 1949: Příspěvek k motýlí fauně jihočeské. Časopis Čs. spol. ent., *45:* 78-89, 156-161. Levý, J., 1967: Vzácný nález z motýla *Prodotis stolida* F. v Čechách. Zprávy Čs. spol. ent., *3:* 28-*29.* Marek, J. - Spitzer, K. - Starý, J., 1964: *Noctua interpozita* Hb. v Československu. Časopis Čs. spol. ent., *61:* 190-193. Marek, J. - Starý, J., 1966: Příspěvek k faunistice můrovitých Československa. Zprávy Čs. spol. ent., *2:* 77-92. Michel, J., 1934: Wie sammelt man Tephroclystien. Natur und Heimat, 4. Heft. Nosek, J. - Povolný, D., 1954: Významný škůdce modřínu *Poecilopsis isabellae* Harr. Zool. a ent. listy, *3:* 13-36. Paclt, J., 1949: Fragmenta entomologica. Ent. listy, *12:* 61-65. Patočka, J., 1942: O několika nových nebo zajímavějších lepidopterách v okolí Čes. Budějovic. Časopis Čs. spol. ent., *38:* 143.]Patočka, J., 1943: Příspěvek k české faunistice lepidopter. Časopis Čs. spol. ent., *39:* 125-126. Patočka, J., 1945: Další příspěvek k lepidopterologickému výzkumu jižních Čech, Časopis Čs. spol. ent., *42:* 73-82. Patočka, J., 1946: Další zajímavé nálezy lepidopter z okolí Čes. Budějovic. Ent. listy, *9:* 101-105. Patočka, J., 1953 Můrky rodu *Sarrothripus* - škůdci topolů. Zool. a ent. listy, *2:* 76-88. Povolný, D. - Spitzer, K. - Marek, J., 1965: Versuch einer zoozönologischen Auswertung der Noctuidenfauna des südböhmischen Hochmoores bei Libořezy. Acta faun. ent.: Mus. Nat. Pragae, *11:* 245-264. Schwarz, R., 1935: I. příspěvek k poznání fauny Lepidopter Československa. Časopis Čs. spol. ent., *32:* 63-65. Schwarz, P., 1937: II. příspěvek k poznání fauny lepidopter Československa. Časopis Čs. spol. ent., *34:* 39-40. Slabý, O., 1951: Píďalka Poecilopsis isabellae Harr. a otázky spojené s jejím výskytem. Časopis Čs. spol. ent., *48:* 90-94. Soffner, J., 1928: O Tephroclystiích okolí sušického. Časopis Čs. spol. ent., *25:* 33-40. Spitzer, K., 1958: K výskytu a bionomii *Neptis coenobita* Stoll. subs. *innomonata* Lewis v jižních Čechách. Časopis Čs. spol. ent., *55:* 298-299. Spitzer, K., 1960: K výskytu motýlů v jihových. Čechách. Časopis Čs. spol. ent., *37:* 91-92. Spitzer, K., 1962: Příspěvek k poznání můrovitých okolí Jindř. Hradce. Časopis Čs. spol. ent., *59:*285-289. Spitzer, K., 1966: Předběžná entomogeografická charakteristika fauny lepidopter jižních Čech. Slezské muzeum. II. ent. symposium - Opava: 327-335. Spitzer, K., 1967: Doplňky k výzkumu fauny Noctuid jižních Čech. Sborník Jihoč. muzea v Čes. Budějovicích, *7:* 1-7. Spitzer, K. - Ebenhöh, J., 1967: Glaciální relikty z čeledi Noctuidae (Lep.) nové pro faunu Šumavy. Zpravodaj 5. Krajská stř. st. pam. péče a ochrany

přírody v Čes. Budějovicích a v Plzni. Sterneck, J. 1929: Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens. Karlovy Vary. Šmelhaus, J., 1965: *Eupithecia impurata* Hb. zjištěna v Čechách a další poznámky o rodu *Eupithecia*. Zprávy Čs. spol. ent., *1:* 7-10. Troníček, E., 1947: Příspěvek k poznání vakonoše *Sterrhopteryx standfussi* H. S. Časopis Čs. spol. ent., *54:* 135-143. Voldřich, M., 1942: Poznámka k Prodromu Čech. Čas. Čs. spol. ent., *39:* 16. Weiss, D., 1966: Zpráva o výskytu perletovce mokřadního *(Clossiana aphirape* Hb.) na Šumavě. Zprávy Čs. spol. ent., *2:* 103-104. Wichra, J., 1949: Nová naleziště vzácnějších druhů motýlů v Čechách. Časopis Čs. spol. ent., *56:* 173-180. Wichra, J., 1965: Další nálezy vzácných Lepidopter v Československu. Zprávy Čs. spol. ent., *1:* 5-11.

Vyšlo 28 dubna 1969