Published June 30, 2006

Klapalekiana, **42**: 193-194, 2006
ISSN 1210-6100

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 205

Coleoptera: Staphylinidae

Oxytelinae: Oxytelini

Bledius* (*Astycops*) *tibialis Heer, 1839. Moravia mer., Mikulov env. (7266), 17.V.2004, 1 ♀, beim Tümpel in der Sandgrube Mušlov, P. Štourač lgt., det. et coll. Herman (2001) führt *B. tibialis* aus Algerien, Europa, Aserbaidschan, der Türkei, Afghanistan und der Mongolei an, in der ehemaligen Tschechoslowakei kommt diese Art nach Boháč (1993) nur in der Slowakei vor. Von den Nachbarländern ist sie weiter aus Deutschland (Köhler & Klausnitzer 1998), Österreich (Scheerpeltz 1968) und ein alter Fund auch aus Polen (Burakowski et al. 1979) bekannt. Neue Art für die Fauna der Tschechischen Republik.

Paederinae

Scopaeus* (*Hyposcopaeus*) *debilis Hochhuth, 1851. Moravia mer., Mikulov env. (7266), 17.V.2004, 2 ♂♂, unter Steinen in der Sandgrube Mušlov, P. Štourač lgt. et det., coll. L. Hromádka (Praha) et P. Štourač. Verbreitung nach Burakowski et al. (1979): Nordafrika, Südeuropa, der südöstliche Teil Mitteleuropas, Kaukasus, Iran und die Umgebung des Kaspischen Meeres. Im Verzeichnis der Käfer (Boháč 1993) ist diese Art als *S. scitulus* Baudi di Selve, 1857 aus Böhmen, Mähren und der Slowakei nur mit Fragezeichen angeführt, etwas später (Jászay & Boháč 1994) wurde das Vorkommen von *S. scitulus* in der Slowakei bestätigt. Unter dem Namen *S. scitulus* ist auch ein alter, bisher nicht bestätigter Fund aus Polen (Burakowski et al. 1979) bekannt. Ein Fund von *S. debilis* in Mähren (Paskau) wurde von Reitter (1909) erwähnt. Bestätigung des Vorkommens und rezente Angabe aus der Tschechischen Republik.

Aleocharinae: Pronomaeini

Pronomaea korgei Lohse, 1974. Moravia mer.: Pouzdřany (7065), 5.V.1992, 1 ♀, unter einem Stein am Weinberg, 9.V.2001, 1 ♀, beim Sieben von altem Heu am Steppenabhang; Kobylí (7067), 6.V.1992, 1 ♀, unter einem Stein in einer kleinen Sandgrube; Hlohovec (7266), 10.V.2001, 1 ♂, im Schotter am Ufer des Teiches Nesyt. Alle Exemplare P. Štourač lgt., det. et coll. Nach Lohse (1974) ist diese Art von Südosteuropa in nordwestliche Richtung (bis nach Belgien) verbreitet, von den Nachbarländern nur aus Deutschland (Köhler & Klausnitzer 1998) und der Slowakei (Likovský 1993) bekannt. Aus der Tschechischen Republik führt Likovský (1993) diese Art im Verzeichnis der Käfer nur aus Böhmen an. Neue Art für die Fauna von Mähren.

Aleocharinae: Oxypodini

Meotica* (*Meotica*) *filiformis (Motschulsky, 1860). Moravia mer., Dobré Pole (7165), 16.V.2004, 1 ♀, am Salzboden bei einem kleinen Teich. Nach Boháč & Matějíček (2003) aus Nord-, West- und Mitteleuropa bekannt. Aus der ehemaligen Tschechoslowakei führt Likovský

(1993) diese Art unter den gegenwärtigen Synonymen *M. capitalis* Mulsant et Rey, 1873, *M. apicalis* Benick, 1954 und *M. bohemica* Benick, 1954 nur aus Böhmen an. *M. filiformis* kommt auch in Deutschland (als *M. capitalis* in Köhler & Klausnitzer (1998)) und unter dem Namen *M. apicalis* in Österreich (Scheerpeltz 1968) vor. Neue Art für die Fauna von Mähren.

Ocalea concolor Kiesenwetter, 1847. Moravia bor., Nové Zámky (6268), 24.7.2001, 1 ♂, 1 ♀, im Anspülicht des Flusses Morava (zusammen mit *O. rivularis* Miller, 1851), O. Nakládal lgt., P. Štourač det., coll. O. Nakládal (Víska u Litovle) et P. Štourač. Nach Burakowski et al. (1981) kommt diese Art in Mitteleuropa, Frankreich, Norditalien, dem ehemaligen Jugoslawien, den Niederlanden und Dänemark vor. Verbreitung in den Nachbarländern: Deutschland (Köhler & Klausnitzer 1998), Österreich (Scheerpeltz 1968), Polen (Burakowski et al. 1981). Nach Likovský (1993) in der Tschechischen Republik nur aus Böhmen bekannt. Neue Art für die Fauna von Mähren.

BOHÁČ J. 1993: Staphylinidae: Oxytelinae, pp. 42-44; Paederinae, pp. 45-47. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Fol. Heyrovskyana*, Suppl. 1: 3-172 (in English and Czech). – BOHÁČ J. & MATĚJÍČEK J. 2003: *Katalog brouků (Coleoptera) Prahy (Catalogue of the beetles (Coleoptera) of Prague). Svazek – volume 4. Čeleď drabčíkovití – Staphylinidae.* Self-published, Praha, 256 pp (in Czech, English summary). – BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŃSKA J. 1979: *Chrząszcze – Coleoptera, Staphylinidae 1. Katalog Fauny Polski. Cz. 23, T. 6.* PWN, Warszawa, 310 pp (in Polish). – BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŃSKA J. 1981: *Chrząszcze – Coleoptera, Staphylinidae 3 (Aleocharinae). Katalog Fauny Polski. Cz. 23, T. 8.* PWN, Warszawa, 330 pp (in Polish). – HERMAN L. H. 2001: Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the second Millennium. III. Oxyteline group. *Bull. American Mus. Natur. Hist.*, 265: 1067-1806. – JÁSZAY T. & BOHÁČ J. 1994: Nové a zaujímavé nálezy drobčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) na Slovensku. *Zbor. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy*, 40: 33-49 (in Slovak, English abstr.). – KÖHLER F. & KLAUSNITZER B. 1998 (eds): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. *Entomol. Nachr. Berichte*, Beiheft 4: 1-185. – LIKOVSKÝ Z. 1993: Staphylinidae: Aleocharinae, pp. 52-62. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Fol. Heyrovskyana*, Suppl. 1: 3-172 (in English and Czech). – LOHSE G. A. 1974: Staphylinidae: Aleocharinae: Pronomaeini, p. 21. In: FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. (eds): *Die Käfer Mitteleuropas 5.* Goecke & Evers, Krefeld, 379 pp. – REITTER E. 1909: *Fauna Germanica. Bd. 2.* K. G. Lutz Verlag, Stuttgart, 392 pp. – SCHEERPELTZ O. 1968: *Catalogus Faunae Austriae 15fa. Coleoptera – Staphylinidae.* Springer-Verlag, Wien, 279 pp.

Petr ŠTOURAČ, Taussigova 1169, CZ-182 00 Praha 8 – Kobylisy,
Tschechische Republik; e-mail: stourac@chello.cz