

VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ TAHU LIŠAJŮ *HERSE CONVULVULI* [L.], *ACHERONTIA ATROPOS* [L.] A *DAPHNIS NERII* [L.]
NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA V ROCE 1967.

Miloslav Soldát

Již čtyři roky přijímám a ověřuji hlášení nálezů tří druhů tažných lišajů *Herse convolvuli* (L.), *Acherontia atropos* (L.) a *Daphnis nerii* (L.). Výzvy na jednotlivé roky byly publikovány v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců a v posledních dvou letech i v tomto časopise. [Soldát 1966, 1967.] Od členů Čs. společnosti entomologické je hlášení poměrně málo. Jsem přesvědčen, že skutečných zjištění jmenovaných druhů bylo podstatně více. Protože i v letech 1968 a 1969 tato akce pokračovala, prosím, aby mi členové sdělili nálezy uvedených druhů lišajů za toto období a sledovali jejich tah i nadále, aby celkový přehled byl co nejúplnější.

Přehled za rok 1967 [i= imago, p= pupa, l= larva]

1. <i>Herse convolvuli</i> (L.)	l	p	i	summa
Bohemia	-	1	23	24
Moravia	-	3	12	15
Slovakia	-	-	5	5
Československo	-	4	40	44

Boh.: 1 i Borovnice, okres Benešov, J.Krejčí; 1 i Březnice u Bechyně, okres Tábor, V.Zahrádka; 1 i Dobřichovice, okres Praha-západ, M.Klímeš; 1 i Dymokury, okres Nymburk, J.Tvrď; 1 i Chotěboř, okres Havl.Brod, J.Křivský; 2 i Krásné u Hor.Bradla, okres Chrudim, J.Výborný; 1 i Mělník [okolí], K.Černý; 1 i Praha, B.Zmrzlý; 1 i Rudná, okres Praha-Beroun, P.Holeček; 5 i Sezimovo Ústí; okres Tábor, M.Žit; 4 i Soběšín u Č.Šternberka, okres Kutná Hora, V.Felix; 3 i Stráž n.N., okres Jindřichův Hradec, J.Dostál, L.Fical, J.Kaštánek; 1 p Veleliby, okres Nymburk, J.Košina; 1 i Všechlapy, okres Nymburk, J.Košina.

Mor.: 1 i Brno, V. Emer; 1 i Brodek u Konice, okres Prostějov, V. Jurů; 1 i Dukovany, okres Třebíč, H. Rakovčík; 1 i Havířov, okres Ostrava, D. Petráš; 2 i Hovězí u Vsetína, V. Holáň; 2 i Libhošť, okres Nový Jičín, V. Pístecký; 2 p Pozořice, okres Brno, J. Havlíček; 2 i Tvarožná Lhota, okres Hodonín, F. Bačík, Š. Spáčil; 1 p dtto J. Tomeček; 2 i Vsetín, V. Holáň.

Slov.: 1 i Dubice, okres Martin, P. Kontsek; 1 i Martin, P. Kontsek; 3 i Sliepkovce, okres Michalovce, K. Krušek.

2. <i>Acherontia atropos</i> (L.)	l	p	i	summa
Bohemia	1	1	6	8
Moravia	1	-	1	2
Slovakia	-	-	2	2
Československo	2	1	9	12

Boh.: 1 i Budyně n.O., okres Litoměřice, J. Vaněk; 1 i Loucká, okres Litoměřice, K. Pěnkava; 1 i Praha, V. Fiřtík; 1 i Soběšín u Č. Šternberka, okres Kutná Hora, V. Felix; 1 l, 1 i Třeboutice p. Křešice, okres Litoměřice, A. Haladová; 1 i Veleliby, okres Nymburk, J. Košina; 1 p Životice, okres Příbram, A. Vošahlíková.

Mor.: 1 l Havířov, okres Ostrava, D. Petráš; 1 i Zádveřice, p. Vizovice, J. Bužek.

Slov.: 2 i Sliepkovce, okres Michalovce, Krist. Krušek, F. Wichera.

3. <i>Daphnis nerii</i> (L.)	l	p	i	summa
Bohemia	-	-	2	2
Moravia	-	-	-	-
Slovakia	-	-	-	-
Československo	-	-	2	2

Boh.: 1 i Brandýs n.O., okres Vysoké Mýto, T. Růžička; 1 i Dobřichovice, okres Praha-západ, E. Bariczek.

Zusammenfassung

ERGEBNISSE DER BEOBACHTUNGEN VON SCHWÄRMERWANDER- FALTEN *HERSE CONVULVULI* (L.), *ACHERONTIA ATROPOS* (L.) UND *DAPHNIS NERII* (L.) IN DER TSCHECHOSLOWAKEI IM JAHRE 1967

Die Funde der genannten Arten im Jahre 1967 sind aus den Tabellen sowie aus der Aufzählung einzelner Fundorte ersichtlich.
Adresa autora - Anschrift des Verfassers: M.Soldát, Vilémovská
15, Praha 6.