Published September 15, 2008 Klapalekiana, **44**: 27-28, 2008
ISSN 1210-6100

Megatoma (*Megatoma*) *ruficornis* Aubé, 1866 (Coleoptera: Dermestidae: Megatominae) na Slovensku a Ukrajině

Megatoma (*Megatoma*) *ruficornis* Aubé, 1866 (Coleoptera: Dermestidae: Megatominae) in Slovakia and the Ukraine

Vladimír KALÍK[1)] & Jiří HÁVA[2)]

[1)] Na Okrouhlíku 837, CZ-530 03 Pardubice, Czech Republic
[2)] Únětice u Prahy 37, CZ-252 62 Praha – západ, Czech Republic;
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz

Faunistics, Coleoptera, Dermestidae, *Megatoma ruficornis*, Slovakia, Ukraine

Abstract. *Megatoma* (*Megatoma*) *ruficornis* Aubé, 1866 (Coleoptera: Dermestidae: Megatominae) is recorded from the Ukraine for the first time and its occurence is confirmed in Slovakia.

Druh *Megatoma* (*Megatoma*) *ruficornis* Aubé, 1866 je znám z Francie, Řecka, Maďarska, Itálie, bývalé Jugoslávie a Turecka (Mroczkowski 1968), Kréty (Háva 2003) a Slovenska (bez konkrétních údajů, Háva 2007). Výskyt tohoto druhu na Slovensku byl v seznamu československých brouků (Kalík 1993) uveden jako nejistý, a to (s označením „S ?“), na základě ojedinělého nálezu bez přesnější lokalizace. Háva (2001) tento druh ze svého seznamu vyloučil s odůvodněním, že se jedná o druh jihoevropský, zasahující pouze do Maďarska. Dodatečně zde uvádíme konkrétní údaj dokladového materiálu, na základě kterého lze výskyt na Slovensku považovat definitivně za prokázaný.

Studovaný materiál: „Vihorlat, Hungaria, coll. Nekolný, ii / [19]06“, 1 ♂, Megatoma pici Kalík = M. ruficornis Aubé, V. Kalík det. 1980, coll. V. Kalík (in Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart, Germany); „Mukačevo, v. [19]35, [A.] Pfeffer leg.“, 1 ♀, V. Kalík det., coll. Moravské zemské muzeum (Brno).

Lokalizace „Vihorlat, Hungaria“ (nyní Slovensko) odpovídá sběru z doby Rakousko-Uherska. Jde o samce sbíraného před rokem 1918 Nekolným, jehož sbírka byla prostřednictvím firmy E. Reittera získána Moravským zemským muzeem v Brně. Spolu s dokladem z bývalé Podkarpatské Rusi (nyní Ukrajina) nedaleko slovenské lokality představuje nejsevernější a nejvýchodnější nález v Evropě a ukazuje na možnost trvalého výskytu tohoto druhu v této oblasti. Jedná se o nový údaj pro Ukrajinu a první konkrétní údaj pro Slovensko.

POĎĚKOVÁNÍ. Autoři by rádi poděkovali Pavlu Lautererovi (Moravské zemské muzeum, Brno) za zapůjčení dokladového materiálu.

LITERATURA

HÁVA J. 2001: Seznam československých brouků (Coleoptera: Dermestidae). Check-list of Czech and Slovak Beetles (Coleoptera: Dermestidae). *Studie a Zprávy Okresního muzea Praha – východ*, 14: 75-79 (in Czech, English abstr.).

HÁVA J. 2003: World catalogue of the Dermestidae (Coleoptera). *Studie a Zprávy Okresního muzea Praha – východ*, Suppl. l: 1-196.
HÁVA J. 2007: Dermestidae, pp. 57, 299-320. In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea and Cucujoidea.* Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.
KALÍK V. 1993: Dermestidae, pp. 84-85. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Folia Heyrovskyana*, Suppl. 1: 3-172 (in Czech and English).
MROCZKOWSKI M. 1968: Distribution of the Dermestidae (Coleoptera) of the world with a catalogue of all known species. *Annales Zoologici*, 26: 15-191.

SUMMARY

Megatoma (*Megatoma*) *ruficornis* Aubé, 1866, is known from France, Greece, Hungary, Italy, former Yugoslavia and Turkey (Mroczkowski 1968), Crete (Háva 2003), and Slovakia (without detailed data, Háva 2007). Its occurrence in Slovakia was initially regarded as uncertain by Kalík (1993), based on a unique finding without detailed locality data. Háva (2001) excluded this species from his list, stating that it is a South-European species. Here we present the first detailed data from Slovakia and the first data from the Ukraine. Both specimens come from the first half of the 20th century and represent the northeastern limit of the distribution of the species.