PŘÍSPĚVEK K ROZŠÍŘENÍ BRVUŠEK [MYMARIDAE, CHALCIDOIDEA, HYMENOPTERA] NA JIŽNÍ MORAVĚ

Vilém Rezek

Při smýkání chalcidek na jižní Moravě v letech 1952-54, hlavně v okolí Břeclavi a v Pavlovských kopcích, věnoval jsem větší pozornost druhům čeledi brvuškovití [Mymaridae]. Uvádím zde seznam druhů, nalezišť a dat. Kde u data není uveden počet kusů, sesmýkal jsem jeden kus chalcidky.

1. *Anagrus atomus* [L.]. Poštorenský háj 29. 6. 1953.
2. *Anaphes fuscipennis* Hal. Kančí obora u Břeclavi 15. 5. 1954.
3. *Anaphes flavipes* Forster. Poštorenský háj 29. 6. 1953.
4. *Doriclytus vitripennis* Forster. Poštorná 2. 5. 1953.
5. *Erythmelus goochi* Enock. Bulhary 9. 8. 1953.
6. *Lymaenon terebrator* [Forster]. Poštorenský háj 18. 7. 1953; Bulhary 9. 8. 1953; Kančí obora u Břeclavi 2. 7. 1952 a 1. pol. září 1953.
7. *Lymaenon litoralis* [Hal.]. Kančí obora u Břeclavi 21. 7. 1952 dva kusy; Svatý kopeček u Mikulova 17. 7. 1952, dva kusy; Milovice 9. 8. 1953.
8. *Lymaenon sulphuripes* [Forster]. Poštorenský háj 16. 5. 1953 7 kusů, 17. 5. 1953 8 kusů, 19. 6. 1953 8 kusů, 16. 7. 1953 1 kus, 18. 7. 1953 1 kus, 20. 7. 1953 2 kusy; Břeclav 25. 5. 1953 1 kus, 6. 7. 1953 6 kusů; Klentnice 2. 8. 1952 1 kus; Kančí obora u Břeclavi 8. 7. 1953 2 kusy; Svatý kopeček u Mikulova 17. 7. 1952 1 kus; Charvatská Nová Ves 19. 5. 1953 9 kusů.

Pozn. Nejhojnější druh brvušek v okolí Břeclavi. Z uvedených dat zatím vyplývá, že se vyskytuje ve výše uvedené oblasti souvisle od polovice května do začátku srpna. Nápadný byl jeho velice hojný výskyt v Poštorenském háji. Biotop, na němž jsem druh smýkal, tvořil dubový les se souvislým podrostem jediného druhu trávy. Nápadný na tomto biotopu byl také hojný výskyt chalcidky *Tetramesa* sp. Zdá se, že *Lymaenon sulphuripes* cizopasí v tomto

druhu chalcidky nebo u hmyzu, jehož vývoj probíhá v druhu trávy podrostu.

9. *Lymaenon chrysis* Debauche. Ladná u Břeclavi 10. 8. 1953
10. *Ooctonus maior* Forster. Poštorenský háj 27. 7. 1952
11. *Ooctonus heterotomus* Forster. Poštorenský háj 18. 7. 1953, 3 kusy.
12. *Parallelaptera panis* Enock. Bulhary 9. 8. 1953.
13. *Polynema fumipennis* Walk. Klentnice 2. 8. 1952; Břeclav 6. 7. 1953: Bulhary 9. 8. 1953: Lednické rybníky 27. 7. 1953.
14. *Stephanodes similis* [Forster]. Poštorenský háj 19. 6. 1953.

Zusammenfassung

BEITRAG ZUR KENNTNISS DER VERBREITUNG DER FAMILIE MYMARIDAE [HYMENOPTERA, CHALCIDOIDEA] IN SÜDMÄHREN.

Bei chalcidologischen Sammelexkursionen in Südmähren, hauptsächlich in der Umgebung von Břeclav und in den Pavlovské kopce, in 1952 - 1954 wurden 14 Arten der Familie Mymaridae gekätschert. Die Namen der Arten sowie die Fundorte sind im tschechischen Text angeführt.