Published November 10, 2009 Klapalekiana, **45**: 121–122, 2009
ISSN 1210-6100

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 277

Coleoptera: Staphylinidae

Scaphidiinae

Scaphisoma boreale Lundblad, 1952. Bohemia centr., Lány (5849), 3.vi.2007, 1 ♂, von einem Löcherpilz (*Fomes fomentarius*) abgeklopft, K. Rébl lgt. et coll.; Lány (5949), 30.iii.2008, 1 ♂, beim Sieben vom Moder einer Weißbuche (*Carpinus* sp.) in einem thermophilen Eichenwald, K. Rébl lgt., P. Štourač coll. Beide Exemplare P. Štourač det. Verbreitung nach Löbl (2004): Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Russland (mittel- und nordeuropäischer Teil, West- und Ostsibirien), Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. Die Art fehlt im Staphylinidenverzeichnis der Tschechischen Republik (Boháč et al. 2007), im „Catalogue of Palaearctic Coleoptera" (Löbl 2004) ist sie aber ohne nähere Angaben hieraus angeführt. Erste detaillierte Angabe aus der Tschechischen Republik.

Pselaphinae

Plectophloeus fleischeri Machulka, 1929. Bohemia centr., Jevany (6054), 23.v.2008, 1 ♀, beim Sieben vom Moder und Detritus am Fuße eines alten Fichtenstockes (*Picea* sp.), P. Štourač lgt., det. et coll. Verbreitung nach Löbl & Besuchet (2004): Deutschland, Montenegro, Österreich, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine. In der Tschechischen Republik nach Boháč et al. (2007) nur aus Mähren bekannt. Neue Art für die Fauna von Böhmen.

Proteininae

Proteinus abditus Assing, 2007. Bohemia centr., Žloukovice (5949), 14.x.2000, 1 ♂, auf einem Stäubling (*Lycoperdon* sp.), P. Štourač lgt., det. et coll. Die Art *Proteinus crenulatus* Pandellé, 1867 wurde von Assing (2007) nach ausführlichem Studium des Aedoeagus in fünf Arten geteilt: *P. crenulatus* (weitverbreitet in Europa), *P. abditus* (Deutschland, Rumänien), *P. hamatus* Assing, 2007 (N-Spanien, SW-Frankreich), *P. tronqueti* Assing, 2007 (Korsika) und *P. angulatus* Assing, 2007 (S-Italien, S-Griechenland). Neue Art für die Fauna der Tschechischen Republik.

Tachyporinae

Lordithon bimaculatus (Schrank, 1798). Bohemia mer. occ., Šumava Gebirge, Stachy env. (6947), Homole Berg, 1000 m, 26.vi.1994, 1 ♂, aus einem alten Pilz (Agaricales) ausgeklopft, P. Štourač lgt., det. et coll.; Bohemia centr., Ruda (5849), 12.viii.2007, 1 ♂, auf einem jungen Exemplar von *Polyporus squamosus*, K. Rébl lgt. et coll., P. Štourač det. Lan-

ge Zeit verkannte Art, nähere Angaben und Bestimmungsmöglichkeiten in der Gruppe von mitteleuropäischen *Lordithon*-Arten wurden erst von Schülke (2000) angeführt. Verbreitung nach Smetana (2004a): Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Georgien, Italien, Kasachstan, Kirgisien, Kroatien, Österreich, Slowakei, Spanien. Neue Art für die Fauna der Tschechischen Republik.

Aleocharinae

Hydrosmecta eximia (Sharp, 1869). Bohemia mer. occ., Šumava Gebirge, Stožec env. (7148), 21.vi.2004, 1 ♂, auf der Unterseite eines Steines an einer seichten Stelle des Flüßchens Studená Vltava, P. Štourač lgt. et coll., J. Vogel det. Verbreitung nach Smetana (2004b): Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Irland, Niederlande, Österreich, Schweiz. Neue Art für die Fauna der Tschechischen Republik.

Atheta (***Atheta***) ***boletophila*** (Thomson, 1856). Bohemia centr., Lány (5849), 3.vi.2007, 1 ♂, von einem Löcherpilz (*Fomes fomentarius*) abgeklopft, K. Rébl lgt. et coll., P. Štourač det.; dieselbe Lokalität, 31.viii.2007, 2 ♂♂, 1 ♀, auf einem reifenden Exemplar von *Laetiporus sulphureus*, K. Rébl lgt., P. Štourač det., K. Rébl et P. Štourač coll. Verbreitung nach Smetana (2004b): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland (mittel- und nordeuropäischer Teil), Schweden, Schweiz, Tschechische Republik. Nach Boháč et al. (2007) hierzulande bisher nur aus Mähren bekannt. Neue Art für die Fauna von Böhmen.

DANKSAGUNG. Für die Artbestimmung von *Hydrosmecta eximia* danken wir herzlich Herrn J. Vogel (Görlitz).

ASSING V. 2007: Proteinus crenulatus – a complex of five species (Coleoptera: Staphylinidae: Proteininae). *Beitr. Entomol.,* 57: 355-366. – BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J. & ROUS R. 2007: Check-list of staphylinid beetles (*Coleoptera, Staphylinidae*) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. *Čas. Slez. Muz. Opava* (A), 56: 227-276. – LÖBL I. 2004: Staphylinidae: Scaphidiinae, pp. 495-504. In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp. – LÖBL I. & BESUCHET C. 2004: Staphylinidae: Pselaphinae, pp. 272-329. In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp. –SCHÜLKE M. 2000: Untersuchungen zur Systematik und Taxonomie der Gattung Lordithon Thomson, 1859 (Coleoptera: Staphylinidae, Tachyporinae). *Koleopterologische Rundschau,* 70: 87-111. – SMETANA A. 2004a: Staphylinidae: Tachyporinae, pp. 330-352. In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp. – SMETANA A. 2004b: Staphylinidae: Aleocharinae, pp. 353-494. In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.

Petr ŠTOURAČ, Taussigova 1169, CZ-182 00 Praha 8 – Kobylisy;
e-mail: stourac@chello.cz
Karel RÉBL, Žižkovo náměstí 976, CZ-271 01 Nové Strašecí;
e-mail: karel.rebl@zukolin.cz