Published November 10, 2009

Klapalekiana, **45**: 83–116, 2009
ISSN 1210-6100

Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2002–2006 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období

Interesting findings of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from the Czech Republic in the years 2002–2006 with supplementary earlier data

Petr VESELÝ[1)], Květoslav RESL[2)], Jiří STANOVSKÝ[3)], Jan FARKAČ[4)], František GRYCZ[5)], Ludvík KAŠPAR[6)], Rudolf KMECO[7)], Tomáš KOPECKÝ[8)], Václav KŘIVAN[9)], Radek LÁSKA[10)], Adolf MIKYŠKA[11)], Roman MLEJNEK[12)], Pavel MORAVEC[13)], Oto NAKLÁDAL[14)], Jaroslav PROUZA[15)], Jan ŘÍHA[16)], Pavel VONIČKA[17)] & Miroslav ZÚBER[18)]

[1)] Tálínská 1030, CZ-198 00 Praha 9 – Kyje; e-mail: vesely.ptr@tiscali.cz
[2)] CZ-687 31 Šumice 299; e-mail: kvetoslav.resl@tiscali.cz
[3)] Na výspě 18, CZ-704 00 Ostrava – Výškovice; e-mail: stanovsky.j@seznam.cz
[4)] Česká zemědělská universita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 1176, CZ-165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: farkac@fld.czu.cz
[5)] Nerudova 10, CZ-370 04 České Budějovice; e-mail: gryczak@seznam.cz
[6)] Havířská 1986, CZ-470 01 Česká Lípa; e-mail: kaspar.ludvik@tiscali.cz
[7)] Vítězná 584, CZ-784 01 Litovel; e-mail: kmeco@papcel.cz
[8)] Mánesova 712, CZ-500 02 Hradec Králové; e-mail: kopido@seznam.cz
[9)] Správa Národního parku Podyjí, Na vyhlídce 5, CZ-669 01 Znojmo; e-mail: krivan@nppodyji.cz
[10)] Partyzánů 1938, CZ-688 01 Uherský Brod; e-mail: radomir.laska@tiscali.cz
[11)] Jiráskova 275, CZ-290 01 Poděbrady; e-mail: adolfmikyska@email.cz
[12)] Jana Zajíce 865, CZ-530 12 Pardubice; e-mail: antroherpon@atlas.cz
[13)] Jezuitská 6, CZ-412 01 Litoměřice; e-mail: pavel.moravec@nature.cz
[14)] Česká zemědělská universita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, CZ-165 21 Praha 6 – Suchdol; e-mail: nakladal@fld.czu.cz
[15)] Čajkovského 918, CZ-500 09 Hradec Králové; e-mail: jaroslav.prouza@centrum.cz
[16)] Českobratrská 60, CZ-415 01 Teplice; e-mail: rihovi1@volny.cz
[17)] Severočeské muzeum, Masarykova 11, CZ-460 01 Liberec; e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz
[18)] Bradlec 45, CZ-293 06 Kosmonosy; e-mail: miroslav.zueber@skoda-auto.cz

Faunistics, Coleoptera, Carabidae, Central Europe, Bohemia, Moravia, Czech Republic, Austria

Abstract. We present new faunistic records of 212 rare or little known species of the family Carabidae from the Czech Republic obtained from 18 private collections. Notes on the biology and habitats of most of species are included. The following records are particularly interesting: *Bembidion velox* (Linné, 1761), *Agonum dolens* (C. R. Sahlberg, 1827) and *Agonum monachum* (Duftschmid, 1812) (confirmation of recent presence in the Czech Republic), *Drypta dentata* (P. Rossi, 1790) and *Harpalus hirtipes* (Panzer, 1796) (confirmation of recent presence in Bohemia) and *Trechus pulchellus pulchellus* Putzeys, 1846 (first records from Austria).

ÚVOD

V příspěvku uvádíme přehled faunistických údajů o nových zajímavých nálezech 212 druhů střevlíkovitých brouků z území České republiky z let 2002 – 2006 a doplňky z let dřívějších, jak je připravili k publikaci autoři z řad Carabidologické sekce České společnosti entomologické. Navazujeme na dříve publikované přehledy zajímavých nálezů střevlíkovitých brouků (Benedikt & Těťál 1989, 1990, 1991, 1994; Veselý & Těťál 1998 a Veselý et al. 2002).

MATERIÁL A METODIKA

Oproti předchozím přehledům je nově použita nomenklatura i systematické řazení taxonů podle Löbla & Smetany (2003), pouze pojetí druhu *Pterostichus piceolus latoricaensis* Pulpán, 1965 bylo ponecháno dle Hůrky (1996) a druh *Amara makolskii* Roubal, 1923 je nadále považován za validní. V duchu předchozích příspěvků uvádíme i nálezy druhu *Rhysodes sulcatus* (Fabricius, 1787), který je v současném pojetí považován za zástupce samostatné čeledi Rhysodidae. V případě zásadní nomenklatorické či taxonomické změny je dříve používané jméno uvedeno v závorce.

Pokud není uvedeno jinak, rozumí se, že jednotliví autoři sbírali, případně pozorovali a determinovali uváděné exempláře sami a dokladový materiál je uložen v jejich sbírce. Údaje o nálezech každého druhu jsou řazeny nejprve podle zemí (Boh., Mor.), dále potom podle data nálezu. Lokalitám jsou přiřazena čísla mapových polí podle Prunera & Míky (1996).

Použité zkratky

a) zkratky jmen autorů: FA – Jan FARKAČ; GR – František GRYCZ; KA – Ludvík KAŠPAR; KM – Rudolf KMECO; KO – Tomáš KOPECKÝ; KR – Václav KŘIVAN; LA –Radomír LÁSKA; MI – Adolf MIKYŠKA; ML – Roman MLEJNEK; MO – Pavel MORAVEC; MO & VO – Pavel MORAVEC & Pavel VONIČKA; NA – Oto NAKLÁDAL; PR – Jaroslav PROUZA; RE – Květoslav RESL; RI – Jan ŘÍHA; ST – Jiří STANOVSKÝ; VE – Petr VESELÝ; VO – Pavel VONIČKA; ZU – Miroslav ZÚBER.

b) ostatní zkratky: AOPK ČR = Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky; Boh. = Bohemia; JMM Znojmo = Jihomoravské muzeum ve Znojmě; Mor. = Moravia; NP = národní park; NPR = národní přírodní rezervace; observ. = pozoroval; PP = přírodní památka; PR = přírodní rezervace; PŘÍLOHA II = druh uvedený v příloze II směrnice Rady Evropského společenství 92/43/EHS; revid. = revidoval; SJMK = Správa jeskyní Moravského krasu; ZP = zemní pasti; [§KO] = druh kriticky ohrožený dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.; [§O] = druh ohrožený dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.; [ČS/CR] = druh kriticky ohrožený dle Červeného seznamu bezobratlých (Farkač et al. 2005); [ČS/VU] = druh zranitelný dle Červeného seznamu bezobratlých (Farkač et al. 2005).

PŘEHLED NÁLEZŮ

Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) – Boh.: Hluboká nad Vltavou, vrch Baba, Stará obora (6952), 21.III.1998 – 1 ex. v dutině stromu (J. Růžička lgt. et coll., MO det.) (MO).

Velmi vzácný, vymírající druh vázaný na tlející dřevo. Potvrzení stálého výskytu na pravděpodobně jediné lokalitě v Čechách.

Leistus (***Leistus***) ***piceus piceus*** Frölich, 1799 – Boh.: Tachov – Stará Knížecí huť (6240), 27.VII.2001 – 3 ex. (M. Snížek lgt., KR det. et coll.) (KR). Mor.: Brumov – Bylnice env., Svatý Štěpán (6974), 5.VII.2000 – 1 ex. na kamenitém břehu potoka (GR).

Nehojný podhorský a horský druh, v podhůří na zachovalých vlhkých a stinných stanovištích.

Leistus (***Leistus***) ***terminatus*** (Panzer, 1793) – Boh.: Ralsko, Osečná – Obora Židlov (5355), 18.VII.2002 – 1 ex. v rákosině (KR); Ražice – NPR Řežabinec (6750), 25.V.2000 – 4 ex. v rákosině (KR), 26.V.2000 – 6 ex. pobíhajících po rákosu a 29.V.2005 – 3 ex. v porostu rákosu (GR). Mor.: Mladeč (6268), 15.VI.2001 – 2 ex. na břehu Moravy (KM).

Lokálně se vyskytující druh zachovalejších vlhčích a stinných stanovišť.

Leistus* (*Pogonophorus*) *montanus kultianus Farkač et Fassati, 1999 – Boh.: České středohoří – vrch Boreč (5449), 24.V.2004 – 12 ex. v suti mezi plochými kameny (GR); Labské pískovce, Holý vrch (5250), 10.VI.2005 – 6 immaturních ex. v suti (MO).

Lokálně se vyskytující a skrytě žijící druh suťových polí.

Leistus* (*Pogonophorus*) *rufomarginatus (Duftschmid, 1812) – Mor.: Lednice (7266), 1.IV.1989 – 1 ex. (Valenta lgt., KR det. et coll.) (KR); Pálava – Klentnice (7165), 29.IX.2000 – 1 ex. na křovinaté stráni (KR); Mašovice – PP Šafářka (7161), 26.VI.2001 – 2 ex. a 27.VI.2001 – 1 ex. na okraji lesa (M. Snížek lgt., KR det. et coll.) (KR); Bílé Karpaty, Nový Dvůr (7072), 20.IX.2003 – 1 ex. ve smrkovém lese (ML); Dolní Věstonice env., jeskyně Sprašovka (Netopýří jeskyně) (7165), 15.XII.2004–18.X.2005 – 5 ex. a 15.XII.2004 – 4.XI.2005 – 3 ex. v návnadové pasti v Kořenovém dómu (ML lgt. et det., SJMK Blansko coll.) (ML); Bystřice pod Lopeníkem (7072), 17.V.–3.VII.2005 – 1 ex. v zemní pasti v dubohabřině, 27.V.2005 – 1 ex. ve strži potoka (RE); Rapotice, Dolna (6863), VI.–IX.2005 – 3 ex. (FA).

Druh hájů a listnatých lesů, který se šíří i na druhotných a nelesních stanovištích.

Nebria* (*Eunebria*) *jockischi hoepfneri Dejean, 1826 – Mor.: Brumov – Bylnice env., Svatý Štěpán (6974), 5.VII.2000 – 2 ex. pod kameny v okolí potoků (GR); Strání – Květná (7172), 7.VII.2005 – 1 ex. na kamenitém břehu potoka (RE).

Lokální druh štěrkových břehů horských a podhorských toků.

Nebria* (*Eunebria*) *picicornis picicornis (Fabricius, 1801) – Mor.: Raškovice (6376), 22.V.2003 – 14 ex. vyhrabáno ze štěrku na břehu říčky Morávky (KA).

Velmi lokální druh zachovalých štěrkopískových břehů podhorských toků.

Nebria* (*Nebria*) *salina Fairmaire et Laboulbène, 1854 – Boh.: Ejpovice (6247), 20.IX.2002 – 5 ex. v kaolínovém lomu (MI).

Vlhkomilný druh vyhledávající volné jílovité půdy. Potvrzení stálého výskytu na lokalitě (cf. Veselý et al. 2002).

Nebria* (*Paranebria*) *livida livida (Linné, 1758) – Boh.: Halámky (7155), 24.VII.2005 více ex. v pískovně při kořenech pobřežních rostlin (GR); Nechranice (5646), 2.IX.2005 – 1 ex. na břehu Nechranické přehrady (P. Krásenský lgt. et coll., VO det.) (VO). Mor.: Ostrožská Nová Ves (6970), 22.V.2003 – 12 ex. na hlinitopísčitém břehu (KA); Vranov nad Dyjí – Vranovská pláž (7160), 10.IX.2005 – 2 ex. na písčitém břehu (KR).

Druh neznečištěných písčitých břehů stojatých i tekoucích vod.

Notiophilus germinyi Fauvel, 1863 – Boh.: Krkonoše, Studniční hora (5360), 23.VI.–4.VIII.2004 – 49 ex. v ZP cca 1500 m n.m. (J. Vaněk lgt. et coll., VO det.); Podbrahy, les Zelená bouda (5754), 5.VIII.–11.IX.2005 – 1 ex. v ZP, 180 m n.m. (MO & VO), 11.IX.2005 – 1 ex. ve vřesu (MO). Mor.: Záhorovice (6972), 10.IV.2005 – 2 ex. na okraji meze (RE).

Lokální druh zachovalých otevřených suchých stanovišť, např. stepí a vřesovišť. Uvedené nálezy dokládají širokou amplitudu jeho vertikálního rozšíření.

Notiophilus laticollis Chaudoir, 1850 – Mor.: Čejč (7067), 15.IV.2006 – 1 ex. na stepi (RE).

Xerofilní, velmi lokální druh teplých oblastí. Zejména na sprašových a vápnitých půdách s nezapojenou nízkou vegetací.

Notiophilus rufipes Curtis, 1829 – Boh.: Hluboká nad Vltavou env. (6952), 17.V.1996 – 1 ex. na hrázi rybníka (Holub lgt. et coll., GR det.); Choťovice env., Žehuňská obora (5857), 15.IV.2000 – 6 ex. v dubovém detritu na lesostepi, pozorováno více ex. (KO); Beroun, lom Kosov (6050), 30.V.–24.VI.2002 – 1 ex. v ZP (A. Kůrka lgt., VO det. et coll.) (MO);

Nižbor, NPR Vůznice (5949–50), 8.VIII.2005 – 2 immaturní ex. v dubohabrovém lese (MO). Mor.: Uherský Brod (6971), 14.VIII.2004 – 16 ex. na okraji lesa (GR); Pouzdřany (7065), 15.IX.2004 – 1 ex. na okraji pole a stepi (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR); Suchá Loz (7072), 21.V.–5.VII.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); Bořetice (7167), 20.V.2006 – 1 ex. na okraji lesa (RE).

Druh teplomilných hájů a lesostepí, druhotně i vinic, lokálně v teplejších oblastech.

Cylindera (***Cylindera***) ***germanica germanica*** (Linné, 1758) (=*Cicindela germanica germanica* (Linné, 1758)) – Boh.: Srbsko (6050), 31.V.2002 – 10 ex. na okraji pole u hranice NPR Karlštejn (MO & VO); Srbsko (6050), 1.VI.2002 – 12 ex. na úhoru nad obcí (ZU). Mor.: Malá Vrbka (7170), 17.VI.–19.VII.2003 – 2 ex., 19.VII.–17.VIII.2003 – 11 ex., 17.VIII.–18.IX.2003 – 1 ex., 8.VI.–6.VII.2004 – 1 ex., 6.VII.–8.VIII.2004 – 7 ex. a 8.VIII.–11.IX.2004 – 3 ex. v zemní pasti (RE); Ždánice – Barvínek (6967), 17.VII.2004 – pozorováno více ex. aktivujících na hlinitém úhoru při okraji lesa (VE); Šumice (6972), 20.VII.2004 – 1 ex. a 26.VI.2006 – 2 ex. na světlo (RE); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 2.VIII.2004 – 1 ex. a VIII.2005 – 3 ex. na poli (KR); Sudoměřice (7169), 4.VI.–17.VII.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); Bořetice (7167), 19.VI.2005 – 8 ex. na sprašovém úhoru mezi plevelem (LA), 29.VII.2005 – 1 ex. na okraji pole (RE); Vyškovec (7073), 23.VII.–21.VIII.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); NP Podyjí, Konice – Trauznické údolí (7162), 10.VIII.2005 – 1 ex. na břehu přehrady (KR); Trkmanský dvůr (7167), 21.VII.2006 – 1 ex. na světlo (RE).

Lokální druh teplejších stanovišť s volnou hlinitou půdou a řídkou vegetací. V Čechách velmi vzácný, na mnoha místech vymizel, na Moravě je častější. Srbsko je druhou recentní českou lokalitou tohoto druhu (cf. Rejsek 1999).

Cylindera (***Eugrapha***) ***arenaria vienensis*** (Schrank, 1781) (=*Cicindela arenaria vienensis* (Schrank, 1781)) [§O] – Boh.: Důl Bohumír pr. Radvanice (5462), 8.VIII.2004 – 1 ex. (J. Vávra lgt., FA det. et coll.) (FA). Mor.: Přímětice pr. Znojmo (7162), 30.VIII.2004 – 1 ex. v hliništi kaolínky (KR observ.).

Druh s velmi lokálním výskytem na izolovaných písčitých a jílovitopísčitých stanovištích.

Calosoma (***Calosoma***) ***inquisitor inquisitor*** (Linné, 1758) – Boh.: Hluboká nad Vltavou env. (6952), 23.V.1994 – 1 ex. sklepán ze smrku, 1.VI.1994 – 1 ex. na cestě (Holub lgt. et coll., GR det.) (GR).

Druh potravně vázaný na housenky motýlů žijící na stromech, nejčastěji na dubech. Z jižních Čech dosud nemnoho údajů.

Calosoma (***Calosoma***) ***sycophanta*** (Linné, 1758) – Mor.: Břeclav env., Valtice, PR Rendezvous (7266), 5.VII.2004 – 1 ex. na kmenu dubu (NA); Uherčice (7065), 1.V.2005 – 3 ex. vyhrabány na kraji pole, z toho 2 torza (GR).

Druh potravně vázaný na housenky motýlů žijící na stromech, nejčastěji na dubech. Výskytuje se lokálně v přírodně zachovalých oblastech.

Carabus (***Carabus***) ***arcensis arcensis*** Herbst, 1784 – Boh.: Děčín – Horní Oldřichov (5251), 4.VII.–12.IX.2004 – 4 ex. v ZP (MO & VO), 23.V.2006 – 1 ex. ve vřesu (MO); Holoubkov (6248), 18.VI.–19.VII.2006 – 2 ex. a 18.VIII.–16.IX.2006 – 2 ex., vše v ZP (MO & VO).

Velmi lokálně se vyskytující druh otevřených stanovišť, častěji na písčinách a vřesovištích.

Carabus (***Carabus***) ***menetriesi pacholei*** Sokolář, 1911 [PŘÍLOHA II, §KO, ČS/VU] – Boh., Vyšší Brod – Kapličky (7451), 15.V.2002 a 2.VI.2003 – více ex. v zemních pastech na rašeli-

ništi (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Křišťanov (7050), 21.IX.2003 – více ex. (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Zbytiny (7049), VI.–IX.2003 – hojně v zemních pastech na rašeliništi (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Světlík pr. Český Krumlov (7251), 28.V.2003 – 1 ex., 11.VI.2003 – 2 ex. v jihovýchodní části těženého rašeliniště a 10.VI.2005 – 2 ex. v zemní pasti na rašeliništi Bobovec 3,5 km JZ od obce Světlík (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Velké bahno pr. Černá v Pošumaví (7250), 10.VI.2005 – 8 ex. (M. Snížek lgt., GR det. et coll., 1 ex. in coll. VE) (GR); Novohradské hory – Pohoří na Šumavě env. (7354), 28.V.2005 – 1 ex. a 24.VI.2005 – 4 ex. v zemní pasti na rašeliništi Stodůlecký vrch (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Prameny env. (58–5942), 12.VI.2006 – více ex. v zemních pastech na nejzachovalejší části rašeliniště, 3 km SSV od obce Prameny (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Krušné hory, Božídarské rašeliniště, (55–5643), 20. a 27.V.; 4.,11.,17. a 26.VI.; 2.,9., 14.,21. a 30.VII.; 5.,12.,21. a 29.VIII.; 3.,9.,15. a 25.IX,; 1.,8.,15. a 22.X.2006 – více ex. do zemních pastí na rašeliništi severovýchodně od hory Špičák, v nadmořské výšce 1015 m. V rámci celoročního průzkumu prioritního druhu Natura 2000 organizovaného AOPK ČR bylo 472 odchycených jedinců označeno a znovu vypuštěno, opakovaně bylo odchyceno 148 ex. (FA).

Tyrfobiont, reliktní druh s výskytem na horských a podhorských rašeliništích. První nálezy tohoto druhu ze Slavkovského lesa.

Carabus (***Hemicarabus***) ***nitens*** Linné, 1758 [§KO, ČS/VU] – Boh.: Krušné hory, Moldava – Oldříš (5348), 7.V.2001 – 2 ex. v zemní pasti ve vřesu (RI); Hora Svatého Šebestiána (5445), 4.V.2004 – 1 ex. ve vřesu, 25.V.2005 – 6 ex. vyhrabáno na rašeliništi (KA).

Reliktní druh, s velmi lokálním výskytem na písčinách, vřesovištích a rašeliništích. Na mnoha lokalitách již úplně vymizel.

Carabus (***Hygrocarabus***) ***variolosus variolosus*** Fabricius, 1787 – Mor.: Velká Javořina (7072), 15.V.2003 – 1 ex. na vlhké louce pod dřevem (GR); Podbeskydská pahorkatina – vrch Maleník env., Nad jezírky (6472), 22.IX.2005 – 1 ex. ve dřevě u potoka a 1 ex. mrtvý pod dřevem, 380 m n.m. (ML).

Reliktní lesní druh vázaný na vlhká místa v zachovalých bukových lesích.

Carabus (***Limnocarabus***) ***clathratus auraniensis*** J. Müller, 1902 – [§KO, ČS/CR] – Mor.: Lanžhot – Soutok (7367), 26.IV.1998 – 3 ex. pod kůrou pařezu (GR).

Reliktní hygrofilní druh zachovalých lužních lesů. Potvrzení recentního výskytu na Moravě.

Carabus (***Limnocarabus***) ***clathratus clathratus*** Linné, 1761 – [§KO, ČS/CR] – Boh.: Čelákovice, U Sv. Václava (5854), 18.III.1972 – 1 ex. (Z. Černý observ. et det., ústní sdělení) (FA).

Reliktní hygrofilní druh zachovalých lužních lesů. Poslední známý údaj o výskytu v Čechách.

Carabus (***Mesocarabus***) ***problematicus problematicus*** Herbst, 1786 – Boh.: Lužické hory, vrch Studenec (5152), 6.VII.–16.X.1999 – 1 ex. v ZP v suti (J. Růžička lgt., MO det. et coll.) (MO); Jindřichův Hradec – Mutyněves (6856), VII.2000 – 1 ex. v zemní pasti (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Strmilov – Bořetín (6857), VII.2000 – 1 ex. (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Nové Hrady – Jakule (7154), IX.2000 – 1 ex. v zemní pasti (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Chlum u Třeboně (7055), IX.2000 – 1 ex. v zemní pasti (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Krušné hory, Moldava – Oldříš (5348), 7.V.2001 – 18 ex. v zemní pasti ve vřesu (RI); Javořická vrchovina, Rusko (6757), 29.IV., 15.V., 12.VI. a 11.VII.2003 – vždy 1 ex. (A. Jelínek lgt., H. Uhlíková det. et coll.) (FA); Studená – Rusko (6857), 11.VII.2003 – 1 ex.

v zemní pasti (A. Jelínek lgt. et coll., KR det.) (GR); Suchdol nad Lužnicí env. (7055), 23.V.2005 – více ex. v zemní pasti (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Rozvadov (6341), 13.V.–16.IX.2006 – 43 ex. v ZP (MO & VO); Přimda (6342), 13.V.–16.IX.2006 – 59 ex. v ZP (MO & VO); Ještědský hřbet, PR Velký Vápenný (5255), 20.VII.–13.X.2006 – 2 ex. v ZP (VO). Mor.: Zbinohy, vrch Skalky (6558), 3.VII.–4.VIII.2005 – 1 ex. (MO & VO).

Lesní druh, s poměrně lokálním výskytem zejména v lesích pahorkatin a středních poloh.

Carabus* (*Morphocarabus*) *scheidleri scheidleri Panzer, 1799 [§O] – Boh.: Javořická vrchovina, Rusko (6757), 13.V., 10.VI., 12.VI., 17.VI. a 11.VII.2003 – vždy 1 ex. (A. Jelínek lgt., H. Uhlíková det. et coll.) (FA).

Lokálně se vyskytující druh otevřených stanovišť, často na polích. Doplnění údajů o výskytu v jižních Čechách.

Carabus* (*Platycarabus*) *irregularis irregularis Fabricius, 1792 – Boh.: CHKO Blanský les – vrch Bulový (7151), 11.III.1995 – 2 ex. v pařezech (GR); NPR Žofínský prales (7354), 25.X.1995 – 2 ex. v pařezech (GR).

Reliktní lesní druh vázaný na zachovalé bukové lesy.

Carabus* (*Tachypus*) *auratus auratus Linné, 1761 – Boh.: Žďár (5250), 5.VI.2004 – 1 ex. aktivní na silnici (MO), 5.VI.–7.VIII.2004 – 5 ex. v zemních pastech (MO & VO); Libouchec (5250), 20.V.–2.VII.2006 – 4 ex. v zemních pastech (MO & VO).

V severních Čechách velmi lokálně se vyskytující druh otevřených stanovišť.

Carabus* (*Tachypus*) *cancellatus cancellatus Illiger, 1798 – Boh.: Kamenice nad Lipou – Částrov (6656), VI.2000 – více ex. (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Český Krumlov – Sloupenec (7251), 1.VII.1995 – více ex. v zemních pastech (GR lgt., M. Snížek det., GR et M. Snížek coll.) (GR); Frymburk – Posudov (7350), VI. 1999 – 1 ex. na okraji lesa a pole (V. Němec lgt., GR det. et coll.) (GR); Jindřichův Hradec (6855), VII.2000 – 1 ex. v zemní pasti (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Mirochov – Hajnice (7055), 7.VIII.2001 – 6 ex. v zemní pasti (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Stříbřec (6955), 5.IV.2002 – 1 ex. v zemní pasti (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR); Studená – Rusko (6857), 12.VI.2003 – 1 ex. v zemní pasti (Jelínek lgt. et coll., KR det.) (KR); Rychnov u Nových Hradů env. (7254), 28.V.2005 – 10 ex. v zemní pasti (M. Snížek lgt., det. et coll.) (GR).

Lokálně se vyskytující druh otevřených stanovišť, často na polích. Z jižních Čech dosud nemnoho údajů.

Cychrus attenuatus attenuatus (Fabricius, 1792) – Boh.: Lužické hory, vrch Studenec (5152), 6.VII.–16.X.1999 – 1 ex. v ZP v suti (J. Růžička lgt., MO det. et coll.); Krčkovice (5457), 29.VII.–3.VIII.2001 – 1 ex. (MO); Děčín – Horní Oldřichov (5251), 1.V.–10.X.2004 – 4 ex. v ZP (MO & VO); Čermná, Červený potok (5250), 5.VI.–10.X.2004 – 8 ex. v ZP (MO & VO); Jílové, vrch Výrovna (5250), 12.IX.2004 – 1 ex. v suťovém lese (MO), 7.VIII.–10.X.2004 – 2 ex. v ZP (MO & VO); Ještědský hřbet, PR Velký Vápenný (5255), 8.VI.–13.X.2006 – více ex. v ZP (VO). Mor.: Bílé Karpaty, Sv. Štěpán (6974), 16.VII.2003 – 1 ex., 400–450 m n.m. (MO).

Reliktní lesní druh, vázaný na zachovalejší lesy.

Blethisa multipunctata multipunctata (Linné, 1758) – Boh.: Horní Planá – Přední Zvonková (7250), 12.V.2001 – 1 ex. na břehu Lipenské přehrady u vřesoviště Borková, (Holub lgt. et coll., GR det.) (GR); Ejpovice env., Kokotský rybník (6247), 12.V.2004 – 1 ex. na bahnitém dně vypuštěného rybníka (ST); Halámky, PR Horní Lužnice (7155), 5.VIII.2004 – 1 ex. na

břehu tůně 1 km severně (KR); Majdalena, PR Meandry Lužnice (7055), 16.IX.2004 – 1 ex. na břehu tůně (KR). Mor.: Moravičany (6268), 18.V.1995 – 1 ex. PR Kačení louka (KM); Úvaly pr. Valtice (7266), 23.IV.2004 – 1 ex. a 30.IV.2005 – 1 ex. na břehu rybníka (RE); Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 22.V.2005 – 1 ex. v mokřadu (KR).

Lokální druh vázaný především na vegetací zarostlé břehy neznečištěných vod.

Elaphrus (***Elaphroterus***) ***aureus aureus*** P. W. J. Müller, 1821 – Boh.: Poděbrady (5856), 21.IV.2002 – 5 ex., 3.V.2002 a 4.V.2002 – více ex. na břehu slepého ramene Labe (MI); Velemyšleves (5547), 21.IV.2003 – více ex. na hlinitopísčitém břehu Chomutovky (MO & VO); Tetčiněves (5452), 29.V.2004 – 9 ex., (MO & VO) 8.VIII.2004 – 1 ex. (VO), vše na písčitém břehu Úštěckého potoka; Předměřice nad Jizerou (5754), 5.VI.2005 – 2 ex. na písčitém břehu Jizery (MO & VO); Káraný (5854), 6.V.2006 – 3 ex. na břehu při ústí řeky Jizery (MI). Mor.: Bzenec – Přívoz (7069), 18.V.2002 – 1 ex. (MI); Vyškovec (7073), 20.V.2005 – 23 ex. na písčitém břehu zastíněného potoka (RE); Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 22.V.2005 – 3 ex. na břehu řeky (KR); Starý Hrozenkov (7073), 3.VI.–16.VII.2006 – 8 ex. v zemní pasti na břehu potoka (RE).

Lokální druh písčitých a hlinitopísčitých břehů neznečištěných řek.

Elaphrus (***Neoelaphrus***) ***uliginosus*** Fabricius, 1792 – Boh.: Sezimovo Ústí (6654), 17.IV.2003 – 9 ex., 25.V.2003 – 3 ex. (MO & VO), 1.VII.–9.VIII.2003 – 1 ex. v ZP, 18.IV.2004 – 10 ex., vše v mokřadu u rybníka Ušák (MO & VO); Myslkovice (6754), 24.V.2003x – 1 ex. v mokřadu u rybníka Střevíc (MO & VO). Mor.: Podivín (7167), 2.V.2004 – 1 ex. na luční mokřině (RE), Břeclav env., Lednice, Prostřední rybník (7266), 13.V.2004 – 1 ex. (NA); Litovel env., Mladeč, NPP Třesín (6268), 14.VIII.2004 – 1 ex. na bažinaté louce (NA); Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 6.V.2006 – 2 ex. na okraji zamokřeného pole (VE).

Nehojný druh s výskytem na podmáčených, vegetací zarostlých břehů stojatých vod.

Aptinus bombarda (Illiger, 1800) – Mor.: Vranov nad Dyjí (7060), 12.VII.1994 – 1 ex. (KM); Brod nad Dyjí (7165), 1.V.1998 – 2 ex. (KM); Moravský kras, Blansko env. (6666), V. – IX.2002 – cca 300 ex. do zemních pastí (studenti Masarykovy university Brno lgt., L. Mikulenka et M. Zúber coll.) (ZU); Bílé Karpaty, Sv. Štěpán (6974), 16.VII.2003 – 1 ex. v listnatém lese, 400–450 m n.m. (MO); Úvaly pr. Valtice (7266), 7.V.–1.VI.2003 – 10 ex. v zemní pasti, 21.VI.2003 – 2 ex. pod kameny, 21.VI.–27.VII.2003 – 26 ex. v zemní pasti, 27.VII.2003 – 1 ex. pod kamenem, 2.V.–5.VI.2004 – 1 ex. v zemní pasti. V rámci průzkumu v Bílých Karpatech bylo v letech 2002–2006 do zemních pastí odchyceno několik set kusů. Z důvodu velkého počtu údajů je uveden jen výčet lokalit podle čísel mapových polí. 7071: Horní Němčí, Korytná; 7073: Vápenice, Starý Hrozenkov; 7072: Lubná, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice, Lopeník; 7169: Mlýnky; 7170: Malá Vrbka, Radějov, Šumárník, Čertoryje, Kobyla, Bukovina; 7171: Suchovské Mlýny, Nová Lhota, Petrušská dolina, Filipovské údolí, Vápenky; 7172: Strání – Květná; 6874: Nedašova Lhota, Návojná; 6974: Brumov – Bylnice; 6972: Rudimov, Přečkovice, Nezdenice, Komňa, Bojkovice; 6973: Rokytnice, Jestřabí, Kolelač, Štítná, Kochavec. Z výše uvedeného je zřejmé, že druh je v Bílých Karpatech a okolí podstatně hojnější než se předpokládalo, a to od dubin po pralesní bučiny (RE); Bílé Karpaty, PR Sidonie (6975), 3. VII.2006 – více ex. v zemních pastech (ST).

Lokální druh zachovalejších lesů pahorkatin a podhůří. Velikost kusů z lokality Úvaly je až 16 mm a je dost pravděpodobné, že na lesostepních lokalitách má druh jiného hostitele než v lesních biotopech.

Brachinus (***Brachinus***) ***crepitans*** (Linné, 1758) – Mor.: Ostrožská Nová Ves (6970), 21.VII.2003 – 1 ex. na světlo u břehu jezera při západním okraji pískovny; Hodonín – Pánov (7168), 17.VII.2004 – 9 ex. na světlo na písčině opuštěného vojenského cvičiště (VE).

Eurytopní a většinou hojný druh, na světlo však byl dosud chytán jen výjimečně.

Brachinus (***Brachinus***) ***elegans*** Chaudoir, 1842 (=*B. ganglbaueri advena* Schauberger, 1921) – Mor.: Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 6.V.2006 – 1 ex. na břehu mokřadu (VE).

Na jižní Moravě vzácný druh vlhkých stanovišť, zejména lužních porostů u řeky Dyje.

Brachinus (***Brachinus***) ***psophia*** Audinet-Serville, 1821 – Mor.: Znojmo, Havraníky (7162), 13.IV.2004 – 1 ex. na okraji pole 1 km východně (KR).

Znojemsko je novou oblastí výskytu tohoto druhu vázaného především na zaplavované louky a pastviny v okolí větších řek (cf. Veselý & Těťál 1998).

Dyschirius (***Dyschiriodes***) ***agnatus*** Motschulsky, 1844 – Boh.: Předměřice nad Jizerou (5754), 7.V.2005 – 1 ex. a 5.VI.2005 – 1 ex. (MO), 2.VII.2005 – 1 ex. (VO), 5.VIII.2005 – 7 ex. (MO & VO), vše na bahnitém a písčitém břehu Jizery. Mor.: Bzenec (7069), 17.VIII.2000 – cca 80 ex. v pískovně (ZU lgt. et coll., P. Bulirsch det.) (ZU).

Lokální druh zachovalých písčitých a hlinitopísčitých břehů vod.

Dyschirius (***Chiridysus***) ***chalceus*** Erichson, 1837 – Mor.: Trkmanský dvůr (7166), 13.V.2005 – 4 ex., 28.V.2005 – 4 ex. a 16.VII.2005 – 5 ex. (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR), 24.VII.2005 – 12 ex. na mokřině v poli, mezi řídkou vegetací na bahně (LA), 24.VII.2005 – 8 ex. na slanisku, 21.VII.2006 – 8 ex. na světlo (RE).

Halobiont. Na uvedené lokalitě žije největší známá populace v České republice.

Dyschirius (***Chiridysus***) ***intermedius*** Putzeys, 1846 – Boh.: Brloh env. (7051), IV.1997 – 1 ex. na břehu vypuštěného rybníka (Čudan lgt., GR det. et coll.) (GR); Černousy env. (4956), 8.V.2004 – 2 ex. na hlinitopísčitém břehu říčky Smědé (KA lgt. et coll., P. Bulirsch det.) (KA); Předměřice nad Jizerou (5754), 5.VI.2005 – 1 ex. (MO), 5.VIII.2005 – 8 ex. (MO), 11.IX.2005 – 4 ex. (VO), vše na hlinitém břehu Jizery; Dolany (5850), 27.VII.2006 – 2 ex. na hlinitém břehu Vltavy (VO); Lázně Libverda (5157), 16.V.2006 – 1 ex. na hlinitém břehu Libverdského potoka (VO). Mor.: Bzenec – Přívoz (7069), 1.VI.2003 – 1 ex. na bahnitopísčitém břehu Moravy (LA).

Nehojný druh zachovalých břehů vod.

Dyschirius (***Chiridysus***) ***nitidus nitidus*** (Dejean, 1825) – Boh.: Louňovice pr. Praha (6355), 28.V.2004 – 10 ex. na písčitohlinitém břehu rybníka (J. Gahai lgt. et coll., F. GR det., P. Bulirsch revid., 1 ex. in coll. GR, 1 ex. in coll. P. Bulirsch, 1 ex. in coll. VE) (GR).

V Čechách v současnosti velmi vzácný druh, žijící na bahnitých a hlinitých březích nížinných vod. Potvrzení recentního výskytu v Čechách.

Dyschirius (***Chiridysus***) ***politus politus*** (Dejean, 1825) – Boh.: Brloh env. (7051), IV.1997 – 1 ex. na břehu vypuštěného rybníka (Čudan lgt., GR det. et coll.); Doubrava (5855), 26.VI.2004 – 1 ex. a 5.VII.2004 – 1 ex. v pískovně (MI); Františkov – PP Pískovna u Dračice, (7155), 24.VI.2005 – 1 ex. v pískovně (KR); Františkov – PP Pískovna u Dračice (7155), 2.VII.2005 – 32 ex. ve staré pískovně na písčitém břehu tůňky (GR); Majdalena env. (7055), 28.V.2006 – 1 ex. na hlinitém břehu Lužnice (GR); Hluboká nad Vltavou – Munický rybník (6952), 21.VII.2006 – 1 ex. na světlo (GR); Třeboň – Opatovický rybník (7054), 22.VII.2006 – 1 ex. na světlo (GR); Dolany (5850), 27.VII.2006 – 1 ex. na hlinitém břehu Vltavy (VO). Mor.: Bzenec (7069), 17.VIII.2000 – 1 ex. v pískovně (ZU lgt. et coll., P. Bulirsch det.) (ZU); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 18.VII.2005 – 1 ex. na světlo

(KR); Břeclav – Františkův rybník (7267), 24.VII.2005 – 1 ex. na hlinitopísčitém břehu (RE); Hrabětice– Trávní dvůr (7264), 31.VIII.2005 – 2 ex. na břehu řeky Dyje (KR); Novosedly (7164), 3.–4.IX.2005 – 11 ex. v hliníku na okraji obce (MO); Rakvice – Trkmanský dvůr (7166), 12.VI.2006 – 1 ex. na mokřinách v polích na vysýchajícím bahně (LA), 21.VII.2006 – 2 ex. na světlo (RE).

Lokální druh vázaný především na písčité a hlinitopísčité břehy.

Dyschirius (***Dyschiriodes***) ***chalybeus gibbifrons*** Apfelbeck, 1899 – Mor.: Rakvice – Trkmanský dvůr (7167), 18.IV.2005 – 1 ex. v nezastíněném mokřadu (GR).

Halobiont, na Moravě velmi vzácně a lokálně.

Dyschirius (***Dyschirius***) ***angustatus*** (Ahrens, 1830) – Mor.: Bzenec – Přívoz (7069), 6.V.2004 – 1 ex. v pískovně (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR).

Druh písčitých a hlinitopísčitých otevřených stanovišť i mimo dosah řek.

Dyschirius (***Dyschirius***) ***digitatus*** (Dejean, 1825) – Boh.: Předměřice nad Jizerou (5754), 5.VI.2005 – 3 ex. (MO), 2.VII.2005 – 11 ex., 5.VIII.2005 – 27 ex. (MO & VO), 11.IX.2005 – 3 ex. (VO), vše na hlinitém a písčitém břehu Jizery.

V Čechách lokální druh s vazbou na neznečištěné písčité a štěrkopískové břehy vod.

Dyschirius (***Eudyschirius***) ***bonellii*** Putzeys, 1846 – Mor.: Čejč (7067), 30.III.2002 – 2 ex. na Mansonové stepi (KM); Bořetice (7067), 8.V.2006 – 1 ex. na stepní stráni ve vinici v trsech mateřídoušky (LA).

Vzácný reliktní druh vázaný na spraš ové a vápencové stepi.

Dyschirius (***Eudyschirius***) ***rufipes*** (Dejean, 1825) – Mor.: Čejč (7067), 29.V.1999 – 1 ex. na Mansonové stepi (KM).

Převážně jednotlivě nalézaný a skrytě žijící stepní druh.

Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) – Boh.: Milovice – Mladá (5755), 7.VII.2002 – 2 ex. společně s *Bembidion pygmaeum*, pozorováno více ex. (ZU); Halámky (7155), 24.VII.2005 – 15 ex. na rekultivované ploše v pískovně (GR). Mor.: Přímětice pr. Znojmo (7162), 25.VIII.2004 – 4 ex. v hliništi kaolínky (KR).

Velmi lokální druh volných vlhčích hlinitých a hlinitopísčitých stanovišť.

Bembidion (***Bembidion***) ***humerale*** Sturm, 1825 – Boh.: Košice (6654), 15.V.2004 – 1 ex. na podmáčené lesní cestě u rybníka Koberný (VO); Planá nad Lužnicí, Turovecký les (6654), 16.V.2004 – 1 ex. na podmáčené lesní cestě (VO).

Reliktní druh rašelinných stanovišť.

Bembidion (***Bembidionetolitzkya***) ***atrocaeruleum*** (Stephens, 1828) – Boh.: Příšovice (5456), 8.VI.2001 – 2 ex. (R. Čtvrtečka lgt., VO det., coll. Severočeské muzeum Liberec) (VO); Soumarský most (7048), 13.VII.2003 – 29 ex. na štěrkovém břehu Vltavy (RE); Kořenov (5258), 21.VIII.2003 – 9 ex. na štěrkopísčitém břehu Jizery v nadmořské výšce 600 m (MO & VO); Šumava, Borová Lada (7047), 13.VI.2004 – 8 ex. na břehu Teplé Vltavy (RI), 17 ex. (KA); Předměřice nad Jizerou (5754), 5.VIII.2005 – 1 ex. na štěrkopísčitém břehu Jizery (VO).

Lokální druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion (***Bembidionetolitzkya***) ***conforme*** Dejean, 1831 – Mor.: Raškovice (6376), 27.VIII.2003 – 6 ex. vyhrabáno ze štěrku na břehu říčky Morávky (KA), 18.VII.2005 – 2 ex. na břehu Morávky (KM).

Velmi lokální reliktní druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion (***Bracteon***) ***litorale*** (Olivier, 1790) – Boh.: Višňová – Předlánce (5056), 23.VII.2003, 12 ex. na březích říčky Smědé (ZU); Černousy env. (4956), 8.V.2004 – více ex. na

hlinitopísčitém břehu říčky Smědé (KA); Majdalena, NPR Stará řeka (7055), 14.V.2006 – 2 ex. na břehu Lužnice (GR); Majdalena env. (7055), 28.V.2006 – 2 ex. na břehu Lužnice (GR).

V Čechách velmi lokální druh zachovalých písčitých břehů.

Bembidion (***Bracteon***) ***velox*** (Linné, 1761) – Boh.: Litoměřice, Písečný ostrov (5450), 14.V.2000 – 1 ex. na nezastíněném písčitém břehu Labe (M. Jaroš lgt., det. et coll., MO revid.).

Druh zachovalých písčitých břehů, v České republice považován desítky let za vyhynulý. Na dolním toku českého Labe (Ústecký kraj) byl naposledy sbírán téměř před 100 lety. Nález může být důsledkem recentní expanze druhu na Labi v Sasku-Anhaltsku, kterou popisuje Gebert (2006). Potvrzení recentního výskytu v Čechách a v České republice.

Bembidion (***Chlorodium***) ***pygmaeum*** (Fabricius, 1792) – Boh.: Lipník (5755), 5.VII.2002 – 1 ex. a 7.VII.2002 – 4 ex. (ZU); Milovice – Mladá (5755), 7.VII.2002 – 6 ex. v písčité prohlubni na okraji pole, pozorováno několik desítek ex., 2.VII.2004 – 3 ex., pozorovány další ex. (ZU). Mor.: Přímětice pr. Znojmo (7162), 20.VIII.2004 – 3 ex., 25.VIII.2004 – 4 ex. a 30.VIII.2006 – 1 ex. v hliništi kaolínky (KR observ.).

Druh přírodně zachovalých oblastí, v Čechách je znám jen z několika lokalit, především z volných písčitých půd v bývalých vojenských územích.

Bembidion (***Diplocampa***) ***fumigatum*** (Duftschmid, 1812) – Boh.: Lysá nad Labem, NPR Hrabanovská Černava (5755), 4.VI.2002 – 1 ex. (J. Preisler lgt., VO det. et coll.) (VO); Myslkovice (6754), 15.V.2004 – 1 ex. v mokřadu u rybníka Střevíc (MO); Koštice (5649), 22.V.2005 – 2 ex. v rákosině ve staré pískovně (MO). Mor.: Lednice (7266), 24.X.2004 – 1 ex. v prosevu detritu u rybníka Pastviny (R. Škoda lgt., VO det. et coll.) (VO); NP Podyjí, Hnanice – Fládnitská chata (7162), 27.VII.2005 – 1 ex. na světlo (KR); Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 22.V.2005 – 7 ex. v mokřadu (KR); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 22.V.2005 – 1 ex. v rákosině (KR); Bořetice (7167), 21.VII.2006 – 1 ex. na světlo (RE); Trkmanský dvůr (7167), 21.VII.2006 – 2 ex. na světlo (RE).

Hygrofilní druh s lokálním výskytem na zachovalých mokřadech s bohatou bylinnou vegetací.

Bembidion (***Emphanes***) ***latiplaga latiplaga*** Chaudoir, 1850 – Boh.: Chabařovice (5349), 30.VI.2002 – 1 ex. ve slané rákosině pod skládkou chemického odpadu ve společnosti velmi hojného *B. minimum* (Fabricius, 1792) (MO).

Druh zachovalých písčitých a hlinitopísčitých břehů. Nejbližší stálý výskyt je znám z jižního Slovenska. Další podrobnosti o nálezu a rozšíření druhu ve střední Evropě viz Moravec et al. (2006).

Bembidion (***Emphanes***) ***tenellum tenellum*** Erichson, 1837 – Mor.: Novosedly (7164), 3.–4.IX.2005 – 2 ex. v hliníku na okraji obce (MO).

Hygrofilní, velmi lokální druh, s častějším výskytem na zasolených půdách.

Bembidion (***Euperyphus***) ***fluviatile fluviatile*** Dejean, 1831 – Boh.: Starý Kolín – pískovna Šamberk (5957), 9.VIII.2001 – 1 ex. (J. Gahai lgt., GR det. et coll.) (GR); Doubrava u Kostomlat (5855), 5.VII.2004 – 3 ex. u vody v pískovně (MI); Předměřice nad Jizerou (5754), 5.VIII.2005 – 2 ex. na strmém hlinitém břehu Jizery (MO & VO).

Lokální druh volných, neznečištěných písčitých a hlinitopísčitých břehů vod.

Bembidion (***Euperyphus***) ***testaceum testaceum*** (Duftschmid, 1812) – Mor.: Bzenec – Přívoz (7069), 3.VII.2005 – velmi hojně na štěrkové pláži na břehu Moravy (LA).

Druh zachovalých písčitých a štěrkových břehů.

Bembidion (***Eurytrachelus***) ***laticolle*** (Duftschmid, 1812) – Mor.: Přímětice pr. Znojmo (7162), 30.VIII.2006 – 1 ex. v hliništi kaolínky (KR observ.).

Druh zachovalých písčitých a hlinitopísčitých břehů. Druhá známá recentní lokalita na Moravě (cf. Veselý et Těťál 1998).

Bembidion (***Ocydromus***) ***modestum*** (Fabricius, 1801) – Boh.: Višňová – Předlánce (5056), 23.VII.2003 – 6 ex. na březích říčky Smědé (ZU); Doubrava u Kostomlat (5855), 5.VII.2004 – 1 ex. na břehu vody v pískovně (MI); Halámky (7155), 24.VII.2005 – 2 ex. v pískovně (GR); Majdalena env. (7055), 18.VI.2006 – 3 ex. na břehu Lužnice, pozorováno více ex. (GR). Mor.: Bzenec (7069), 2.VI.2001 a 1.VIII.2002 – desítky ex. u řeky Moravy (ZU); NP Podyjí, Podmolí – Devět mlýnů (7161), 22.VIII.2003 – 1 ex. na břehu řeky Dyje (KR).

V Čechách v současnosti velmi lokální druh vázaný na přirozené písčité a štěrkopískové břehy vod. Z mnoha lokalit již úplně vymizel.

Bembidion (***Peryphanes***) ***dalmatinum dalmatinum*** Dejean, 1831 – Mor.: Strání – Květná (7172), 22.V.2005 – 7 ex. na strmém břehu potoka (RE); Bystřice pod Lopeníkem (7072), 27.V.2005 – 10 ex. ve strži potoka (RE).

Velmi lokální druh vlhčích míst v listnatých lesích jihovýchodní Moravy.

Bembidion (***Peryphanes***) ***milleri milleri*** Jacquelin du Val, 1852 (=*B. milleri kulti* Fassati, 1942) – Boh.: Praha – Lysolaje (5852), 18.IV.2004 – 3 ex. v bývalé pískovně (MI). Mor.: Přímětice pr. Znojmo (7162), 10.V.2003 – 1 ex. v hliništi kaolínky (KR).

Druh vázaný na volné jílovité půdy, téměř výhradně je nalézán v cihelnách, hliništích a lomech.

Bembidion (***Peryphiolus***) ***monticola monticola*** Sturm, 1825 – Boh.: Frymburk – Vřesná (7351), 5.VII. 1994 – 1 ex. na písčitém břehu potoka (GR); Rychnov u Nových Hradů – Kamenná (7254), 20.VII.2003 – 1 ex. na písčitém břehu Svinenského potoka (KR); Arnoltice (5056), 11.VIII.2003 – 2 ex. na břehu Bulovského potoka (VO); Františkov (7155), 26.V.2005 – 10 ex. na písčitých březích řeky Dračice (GR); Předměřice nad Jizerou (5754), 5.VI.2005 – 1 ex. na štěrkopísčitém břehu Jizery (VO); Stvolínky – Sezímky (5352), 8.VIII.2006 – 1 ex. na hlinitém břehu Bobřího potoka společně s *B. stephensi* Crotch, 1866 (MO). Mor.: NP Podyjí, Podmolí – Lipinská louka (7161), 30.VI.2005 – 1 ex. na břehu řeky (KR).

Lokální druh zachovalých štěrkopískových břehů podhorských toků.

Bembidion (***Peryphus***) ***subcostatum javurkovae*** Fassati, 1944 – Mor.: Jestřabí (6973), 13.V.2006 – 11 ex. na břehu potoka (RE).

Lokální druh hlinitých a hlinitopísčitých břehů toků.

Bembidion (***Philochthus***) ***neresheimeri neresheimeri*** J. Müller, 1929 – Mor.: Pouzdřany env. (7065), 14.VI.1999 – 1 ex. (KO); Lechovice (7163), 14.V.2005 – 1 ex. v rákosině v Lechovickém močálu (J. Gahai lgt. et coll., GR. det.) (GR); Dobré Pole pr. Mikulov (7165), 17.V.2002 – 1 ex. na slanisku (MI); 3.IX.2005 – 2 ex. pod vegetací na břehu rybníka (MO); Hrabětice – Trávní Dvůr (7264), 6.V.2006 – 1 ex. na okraji mokřadu (VE).

Lokální druh slatin a subhalofilních mokřadů.

Bembidion (***Plataphus***) ***prasinum*** (Duftschmid, 1812) – Mor.: Bzenec – Přívoz (7069), 22.V.1999 – 1 ex. na břehu Moravy (KM), 18.VI.2006 – 8 ex. immaturních na štěrkovém břehu meandru Moravy (LA); Louky nad Olší (6177), 10.III.2002 – 13 ex. pod kůrou stromů na břehu Olše (LA).

Velmi lokální druh zachovalých štěrkových břehů podhorských i nížinných toků.

Bembidion (***Semicampa***) ***schueppelii*** Dejean, 1831 – Mor.: Vyškovec (7073), 20.V.2005 – 68 ex. na písčitém náplavu zastíněného potoka (RE); Bílé Karpaty, Lubná (7072),

31.V.2005 – 3 ex. na břehu zastíněného potoka (RE); Lopeník (7072), 3.VI.2005 – 1 ex. na břehu zastíněného potoka (RE).

Hygrofil. Nejčastěji na březích potoků a řek v podhůří.

Bembidion (***Sinechostictus***) ***doderoi*** Ganglbauer, 1891 – Mor.: Podbeskydská pahorkatina, Teplice nad Bečvou env., Hranická propast (6472), 28.III.2002 – 7 ex., 1.VI.2002 – 7 ex. a 14.IX.2002 – 4 ex. na svahu propasti v hloubce 20–69 m (ML lgt., PR det., SJMK Blansko coll.), 18.IV.2003 – 1 ex. v prosevu listí (ML lgt., J. Klouček det., SJMK Blansko coll.) (ML); Strání – Květná (7072), 7.VII.2003 – 2 ex., 22.V.2005 – 1 ex. a 7.VII.2005 – 1 ex. na břehu potoka (RE).

Skrytě žijící podhorský lesní druh. Nejčastěji na stinných vlhkých stanovištích, především na březích potoků.

Bembidion (***Sinechostictus***) ***millerianum*** Heyden, 1883 – Boh.: Kořenov (5258), 21.VIII.2003 – 4 ex. na štěrkopísčitém břehu Jizery 600 m n.m. (MO).

V Čechách velmi lokální druh štěrkových břehů podhorských toků, potvrzení stálého výskytu na uvedené lokalitě (cf. Veselý et al. 2002).

Bembidion (***Sinechostictus***) ***ruficorne ruficorne*** Sturm, 1825 – Mor.: Raškovice (6376), 22.V.2003 – 3 ex. a 27.VIII.2003 – 8 ex. vyhrabáno ze štěrku na břehu říčky Morávky (KA lgt. et coll., VE det.) (KA).

Lokální a vzácný druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Ocys quinquestriatus quinquestriatus (Gyllenhal, 1810) – Boh.: Bradlec (5555), 15.VI.2002 – 1 ex. u domu v hromadě prken (ZU).

Skrytě žijící a jen lokálně nalézaný druh. Žije převážně synantropně na skládkách cihel, zbořeništích, ve sklepech a na podobných místech.

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) – Boh.: Nové Hrady (7254), 25.VI.2005 – 1 ex. na skládce dřevního odpadu (P. Kučera lgt. et coll., GR det.) (GR). Mor.: Úvaly pr. Valtice (7266), 29.X.2004 – 1 ex. v detritu (RE).

Skrytě žijící druh vázaný na tlející rostlinný materiál.

Tachys (***Paratachys***) ***fulvicollis*** (Dejean, 1831) – Boh.: Praha – Prokopské údolí pr. Jinonice (5952), 9.VI.2004 – 1 ex. na světlo na okraji skalní stepi (VE); Praha – Císařský ostrov (5852), 23.VII.2004 – 1 ex. na světlo v areálu ÚČOV (VE); Veská (5961), 10.VIII.2004 – 1 ex. (Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR); Praha – Pitkovice (5953), 30.VII.2005 – 1 ex. na světlo na louce u Pitkovického potoka (VE).

Vzácný, skrytě žijící halofilní druh, sbíraný jen ojediněle, většinou na bahně vypuštěných rybníků nebo na světlo.

Tachys (***Paratachys***) ***micros*** (Fischer von Waldheim, 1828) – Boh.: Předměřice nad Jizerou (5754), 2.VII.2005 – 6 ex. (MO & VO), 5.VIII.2005 – 1 ex. (VO), vše na štěrkopísčitém břehu Jizery; Dolany (5850), 27.VII.2006 – 1 ex. na písčitém břehu Vltavy (MO).

Reliktní druh zachovalejších štěrkových a písčitých břehů.

Tachys (***Paratachys***) ***turkestanicus*** Csiki, 1928 (=*Paratachys ?caspius* Kolenati, 1845) – Mor.: Litovel (6369), 13.VI.1999 – 1 ex. v lužním lese u Moravy (KM).

Na jižní a střední Moravě lokální druh vlhčích, především otevřených hlinitopísčitých stanovišť.

Tachyura (***Tachyura***) ***diabrachys*** Kolenati, 1845 (=*Elaphropus diabrachys* Kolenati, 1845) – Boh.: Příšovice (5456), 8.VI.2001 – 6 ex. (R. Čtvrtečka lgt., VO det., coll. Severočeské muzeum Liberec) (MO); Lužické hory – vrch Tlustec (5254), 25.IV.2002 – 2 ex.

ve štěrku v čedičovém lomu (VE); Praha – Císařský ostrov (5852), 23.VII.2004 – 3 ex. a 29.VII.2005 – 1 ex. na světlo v areálu ÚČOV (VE); Předměřice nad Jizerou (5754), 2.VII.2005 – 7 ex. a 5.VIII.2005 – 18 ex. na štěrkopísčitém břehu Jizery (MO & VO); Nechranice (5646), 27.VII.2005 – 2 ex. na břehu Nechranické přehrady (P. Krásenský lgt. et coll., VO det.) (VO).

Dříve vzácný, dnes expanzivní, široce rozšířený druh, častý i na druhotných štěrkovitých lokalitách mimo břehy řek.

Tachyura (***Tachyura***) ***quadrisignata*** (Duftschmid, 1812) (=*Elaphropus quadrisignatus* (Duftschmid, 1812)) – Boh.: Praha – Císařský ostrov (5852), 23.VII.2004 – 2 ex. na světlo v areálu ÚČOV (VE).

Nevzácný druh vázaný na zachovalejší štěrkové břehy toků. Na světlo však byl dosud chytán jen výjimečně.

Tachyura (***Tachyura***) ***walkeriana walkeriana*** (Sharp, 1913) (=*Elaphropus walkerianus* (Sharp, 1913)) – Boh.: Hradec Králové (5861), 6.VI.2002 – 1 ex. v listí na břehu rybníčku „Na Plachtě“ (MI).

Nález potvrzuje stálý výskyt na jediné dosud známé lokalitě v České republice (cf. Mikát & Hájek 1999).

Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 – Boh.: Krkonoše, severní úpatí Studniční hory (5360), 4.–17.VIII.2004 – 8 ex. v ZP (J. Vaněk lgt. et coll., VO det.) (VO).

Reliktní druh rašelinišť a kyselých půd.

Perileptus areolatus areolatus (Creutzer, 1799) – Boh.: Višňová – Předlánce (5056), 23.VII.2003 – 7 ex. na březích říčky Smědé, pozorováno mnoho ex. (ZU); Předměřice nad Jizerou (5754), 5.VI.2005 – 1 ex. (VO), 2.VII.2005 – 27 ex. a 5.VIII.2005 – 9 ex. (MO & VO), vše na štěrkopísčitém břehu Jizery; Skryje (6048), 11.VIII.2005 – 5 ex. na štěrkopísčitých březích Berounky (MO); Branov (5949), 9.VIII.2005 – 4 ex. na štěrkopísčitých březích Berounky (MO); Žloukovice (5949), 12.–13.VIII.2005 – 2 ex. (MO). Mor.: Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 31.VIII.2005 – 3 ex. na břehu řeky Dyje (KR).

Reliktní druh vázaný výhradně na zachovalé štěrkové břehy toků.

Duvaliopsis pilosella stobieckii (Csiki, 1907) (=*Pseudanophthalmus pilosellus stobieckii* (Csiki, 1907)) – Mor.: Moravskoslezské Beskydy, Lysohorská hornatina, vrch Malchor (6476), 6.VII.2004 – 1 ex. pod zapadlým kamenem, 1175 m n.m., západní expozice (ML).

V pohořích západních Karpat lokálně rozšířený poddruh karpatského endogenního druhu.

Trechoblemus micros (Herbst, 1784) – Boh.: Litoměřice, Střelecký ostrov (5450), 11.8.2002 – 3 ex. u rozvodněného Labe (MO); Svitavská pahorkatina, Horní Újezd env., Propast na Cíkovské stráni (6163), 11.III.2004 – 1 ex. ve spodní etáži (ML lgt. et det., SJMK Blansko coll.) (ML); Litoměřice, Písečný ostrov (5450), 11.7.2004 – 1 ex. na částečně zastíněném písčitém břehu Labe (MO); Praha – Pitkovice (5953), 30.VII.2005 – 1 ex. na světlo na louce u Pitkovického potoka (VE); Rozvadov (6341), 17.VIII.–16.IX.2006 – 1 ex. v ZP (MO & VO). Mor.: Podbeskydská pahorkatina, Teplice nad Bečvou env., Zbrašovské aragonitové jeskyně (6472), 8.VIII.–9.X.2003 – 1 ex. v návnadové pasti v prostoře Za vodopádem (ML lgt. et det., SJMK Blansko coll.) (ML); Smrčná (6559), 30.IV.–4.VI.2005 – 1 ex. v ZP (MO & VO); Moravský kras, Josefov env., jeskyně Býčí skála (6666), 13.XII.2005 – 2 ex. a 29.XII.2005 – 2 ex. v Šenkově sifonu, 29.XII.2005 – 1 ex. v Dómu potápěčů (ML lgt. et det., SJMK Blansko coll.) (ML); Moravský kras, Ostrovská plošina, propast Manželský závrt (6666), 25.VIII.2005 – 1 ex. v hloubce 70 m, 10.XII.2005–10.XI.2006 – 2 ex. v návnadové

pasti v hloubce 30 m (ML lgt. et det., SJMK Blansko coll.) (ML); Štramberk env., propast Slámova sluj (6474), 17.VI.–11.XI.2006 – 2 ex. v návnadové pasti v hloubce 10 m (ML lgt. et det., SJMK Blansko coll.) (ML).

Skrytě žijící mikrokavernikol, častěji sbírán bývá jen v náplavech nebo v podzemních prostorách.

Trechus (***Epaphius***) ***rivularis*** (Gyllenhal, 1810) (=*Epaphius rivularis* (Gyllenhal, 1810)) – Boh.: Bor (7155), 10.VII.2001 – 1 ex. (KR lgt. et coll., MO det.) (MO); Břehyně – Břehyňský rybník (5454), 27.V.2005 – 1 ex. v rákosině (J. Gahai lgt. et coll., GR det., 1 ex. in coll. GR) (GR); Rozvadov (6341), 18.VII.2006 – 10 ex. a 18.VII.–17.VIII.2006 – 2 ex. v ZP na podmáčené zrašelinělé louce (MO & VO).

Velmi lokální reliktní druh rašelinišť a podmáčených rašelinných luk.

Trechus (***Trechus***) ***amplicollis*** Fairmaire, 1859 – Boh.: Kunratice (5056), 7.VII.2002 – 1 ex., 9.VI.–7.VII.2002 – 1 ex. v ZP, vše v porostu rašeliníku v zastíněném mokřadu, 280 m n.m. (VO). Mor.: Jeseníky – Černá stráň (5868), 27.VII.2002 – 2 ex. na rašeliništi, 1200 m n.m. (KM).

Lokální reliktní druh rašelinišť a podmáčených půd v horách a podhůří, v nižších polohách se nalézá jen velmi ojediněle.

Trechus (***Trechus***) ***austriacus*** Dejean, 1831 – Boh.: Český kras, Srbsko env., Srbské jeskyně (6050), 17.V.2003 – 1 ex. a 17.V.2003–7.II.2004 – 2 ex. v návnadové pasti v Dračím dómu (ML lgt. et det., SJMK Blansko coll.) (ML); Praha – Lysolaje (5852), 18.IV.2004 – 1 ex. v bývalé pískovně (MI); Praha – Nové Město, Karlov (5952), 14.X.2005 – 2 ex. v bývalé zahradě pod muzeem policie (VE). Mor.: Mikulovice (7062), 20.VIII.1991 – 1 ex. (Kraus lgt., KR det. et coll.) a IX.2004 – 8 ex. v zahradě (KR); Zaječí, vrch Kalvárie (7166), 17.X.2002 – 1 ex. (J. Vávra lgt. et coll., MO det.) (MO); Moravský kras, Josefov env., jeskyně Býčí skála (6666), 29.XII.2005 – 2 ex., 28.II.2006 – 1 ex. a 10.XI.2006 – 1 ex. v Dómu potápěčů, 29.XII.2005 – 1 ex. ve Velké chodbě a 10.XI.2006 – 1 ex. ve Zříceném dómu před štolou II (ML lgt., PR det., SJMK Blansko coll.) (ML).

Skrytě žijící a jen lokálně nalézaný druh. Častěji v podzemních prostorách. Příležitostně žije synantropně i na skládkách, rumištích, ruderálech a podobných místech.

Trechus (***Trechus***) ***obtusus obtusus*** Erichson, 1837 – Boh.: Český ráj, rašeliniště Vidlák (5457), 29.VII.–3.VIII.2001 – 1 ex. (MO). Mor.: Čížov (7161), 4.VIII.2002 – 1 ex. v obci (A. Reiter lgt., MO det., coll. JMM Znojmo) (MO); Jaroslavice, Meandry Dyje (7263), 20.IX.2002 – 1 ex. (A. Reiter lgt., MO det., coll. JMM Znojmo) (MO); Vranov nad Dyjí – Šafov, Šafovské rybníčky (7060), 22.IV.2004 – 1 ex. (KR lgt. et coll., MO det.); Hrabětice – Trávní dvůr (7164), 16.XII.2004 – 1 ex. (KR).

V převážné části Čech hojný vlhkomilný druh. Uvedené nálezy upřesňují východní hranici areálu rozšíření druhu v Čechách a na Moravě..

Trechus (***Trechus***) ***pulchellus pulchellus*** Putzeys, 1846 – Boh.: Bukovany (6450), 12.IX.1999 – 1 immaturní ex. (S. Urban lgt. et coll., MO det.) (MO); Krčkovice (5457), 29.VII.–3.VIII.2001 – 1 ex. (MO); Kateřinky – Vyklantice, PR Údolí potoka u Dolské myslivny (6456), 30.VIII.2002 – 1 ex., 690 m n.m. (MO). Mor.: Pávov, Ptačí vrch (6559), 4.VIII.2005 – 3 ex. a 10.IX.2005 – 2 ex. na lesním prameništi (MO). Austria: Thayatal, Hardegg (7161), 15.VIII.2001 – více ex. v prosevu v bučině (VO).

V severovýchodním pohraničí České republiky hojný lesní druh. Uvedené nálezy doplňují znalosti o jeho rozšíření ve vnitrozemí. Údaj z Příbramska (Bukovany) je velmi zají-

mavý a pravděpodobně souvisí s výskytem druhu na Českomoravské vrchovině. Nález od Hardeggu souvisí s již známým výskytem v NP Podyjí (Veselý et al. 2002). Nový druh pro Rakousko.

Trechus (***Trechus***) ***rubens*** (Fabricius, 1792) – Boh.: Košice (6654), 9.VIII.2003 – 1 ex. na světlo na louce u rybníka Koberný (MO); Žďár (5250), 5.VI.2004 – 1 ex. v bažině (VO); Novohradské hory, Pohoří na Šumavě (7354), 10.VI.2004 – 1 ex. ve feromonovém lapači (ST); Brod u Stříbra (6343), 17.V.2005 – 3 ex. na rašelinné louce u Výrovského potoka (VE). Mor.: Jeseníky – Černá stráň (5868), 28.VI.1998 – 8 ex. v prosevu listí, 700 m n.m. (KM); Moravský kras, Ostrovská plošina, Nová Amatérská jeskyně (6666), 12.II.2005 – 1 ex. v Rozlehlé chodbě (ML leg. et det., SJMK Blansko coll.) (ML); Moravský kras, Sloup env., Sloupsko-šošůvské jeskyně (6566), 8.IX.2005 – 1 ex. a 14.X.2005 – 2 ex. v ponoru Sloupského potoka (ML lgt., PR det., SJMK Blansko coll.), 14.X.–10.XII.2005 – 2 ex. v návnadové pasti (ML et J. Růžička lgt., PR det., SJMK Blansko coll.) (ML).

Spíše podhorský a horský druh, v nižších polohách se nalézá jen vzácně na březích vod, bahnitých místech a na rašeliništích. Z jeskyní nebyl dosud zaznamenán, jde zřejmě o mikroklimaticky podmíněný reliktní výskyt.

Trechus (***Trechus***) ***striatulus*** Putzeys, 1847 – Boh.: Krkonoše, Studniční hora (5360), 23.VI.–4.VIII.2004 – 28 ex. v ZP cca 1500 m n.m. (J. Vaněk lgt. et coll., VO det.) (VO); Teplice nad Metují env., Teplické skály (5462), 26.IX.2006 – 2 ex. v pseudokrasovém systému Poseidón II, v rozsedlině u Strážce Sibiře (ML lgt., PR det., SJMK Blansko coll.) (ML).

Horský chladnomilný druh, nejčastěji se vyskytující v alpínském pásmu, v Teplických skalách jde o unikátní mikroklimaticky podmíněný reliktní výskyt.

Thalassophilus longicornis (Sturm, 1825) – Boh.: Poněšice pr. Hluboká (6852), 13.VI.2004 – 1 ex. na štěrkovém břehu Kozlovského potoka západně od silnice, v nadmořské výšce 260 m (VE). Mor.: Jaroslavice, Meandry Dyje (7263), 30.VII.2002 – 1 ex. (A. Reiter lgt., MO det., coll. JMM Znojmo) (MO).

Reliktní druh výhradně vázaný na zachovalé štěrkové a štěrkopískové břehy toků.

Callistus lunatus lunatus (Fabricius, 1775) – Boh.: Praha – Lysolaje (5852), 18.IV.2004 – 1 ex. v pískovně (MI). Mor.: Čejč (7067), 30.III.2002 – 1 ex. na Mansonové stepi (KM); Hodonín (7168), 27.VII.2002 – 5 ex. v jílovitém hliništi cihelny (VE); Záhorovice (6972), 10.IV.2005 – 1 ex., 13.IV.2005 – 1 ex. a 16.IV.2006 – 2 ex. na okraji meze (RE); Mutěnice (7068), 22.V.2005 – 1 ex. na cestě na vinici (Třešňák lgt. et coll.) (GR).

Lokální druh. Častější v pahorkatinách na erodovaných jílovitých, sprašových a vápencových půdách. V Čechách je dnes nepoměrně vzácnější než na Moravě.

Chlaenius (***Chlaeniellus***) ***nitidulus*** (Schrank, 1781) – Boh.: Černousy (5056), 22.VIII.2003 – 1 ex. na břehu řeky Smědé (MO); Koštice (5649), 22.V.2005 – 1 ex. pod vegetací na vlhké louce spolu s *Ch. nigricornis* (Fabricius, 1787) (MO).

Nehojný druh, nalézaný především u neznečištěných vod s volnými hlinitými nebo písčitými břehy.

Chlaenius (***Chlaeniellus***) ***tristis tristis*** (Schaller, 1783) – Boh.: Suchdol nad Lužnicí, env. (7055), 30.VI.1997 – 1 ex. v bývalé pískovně (Holub lgt., GR det. et coll.) (GR); Ražice (6750), 6.V.2000 – 1 ex. vyšlapán u rybníka (Holub lgt., GR det. et coll.) (GR). Mor.: Litovel (6369), 28.VIII.1995 – 1 ex. v lužním lese u Moravy (KM); Moravičany – PR Kačení louka (6268), 14.VII.2001 – 1 ex. (KM).

Druh zachovalých mokřadů, mimo jižní Moravu jen lokálně a vzácně se vyskytující.

Chlaenius* (*Chlaenites*) *spoliatus spoliatus (Rossi, 1792) – Boh.: České Budějovice env., Závraty (7052), 7.VI.1997 – 1 ex. v rákosině u rybníka (KR lgt., GR det. et coll.) (GR); Nové Homole – Závratský rybník, (7052), 3.VIII.1997 – 1 ex. na břehu rybníka (KR); Běleč nad Orlicí env. (5861), 1.VIII.2001 – 1 ex. na břehu písníku u nivy řeky Orlice (KO). Mor.: Litovel (6369), 28.VIII.1995 – 2 ex. v lužním lese u Moravy (KM); Dyjákovičky – Ječmeniště (7262), 10.VIII.2000 – 1 ex. na světlo (KR); Bzenec – Přívoz (7069), 18.V.2002 – 1 ex. u řeky Moravy (MI); Trkmanský dvůr (7167), 21.VII.2006 – 1 ex. na světlo (RE).

V Čechách i v severní části Moravy vzácný hygrofilní druh. Na jižní Moravě je místy hojnější.

Masoreus* (*Masoreus*) *wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813) – Boh.: Mladá Boleslav – Radouč (5555), 27.V.2000 – 1 ex. (ZU); Lužnice pr. Třeboň – PR Slepičí vršek (6954), 12.VII.2001 – 1 ex. a 2.X.2002 – 1 ex. na písečném přesypu (KR), 18.VI.2006 – 1 ex. na písečném přesypu v kořenech travin (GR); Ražice – NPR Řežabinec (6750), 22.VII.2002x – 1 ex. na stepi (KR); Dačice, Toužín – PR Toužínská stráň (6958), VII.2002 – 1 ex. na stepi (KR observ.); Halámky (7155), 5.VIII.2002 – 1 ex. na písčitém podkladě (MI); Františkov – PP Pískovna u Dračice (7155), 24.VI.2005 – 1 ex. pod mechem na písku (KR), 1 ex. (GR). Mor.: Pouzdřany env. (7065), 20.IV.2000 – 1 ex. (KO); NP Podyjí, Znojmo – Kraví hora (7162), 8.VIII.2004 – 1 ex. vřesoviště (KR).

Reliktní xerofilní druh, žijící zejména na stepích a písčinách.

Drypta* (*Drypta*) *dentata (P. Rossi, 1790) – Boh.: Modrava (6946), VII.2003 – 1 ex. pod kamenem na břehu Modravského potoka v nadmořské výšce cca 1000 m (GR); Praha – Hostivař (5359), 7.XII.2006 – 1 ♂ v prosevu pod vegetací podél potoka Botiče (J. Strejček lgt. et det., coll. VE). Mor.: Uherský Brod (6971), 6.V.2003 – 2 ex. a pozorováno dalších cca 10 ex. při smyku (ZU).

Expanzívní druh především vlhčích stanovišť. Z Čech byl doposud znám pouze jediný publikovaný údaj: Kaplice env. (Kirchner 1858) a dva údaje nepublikované: Veselí nad Lužnicí, VIII.1963 – 1 ex., Čech lgt. et det., J. Pulpán revid. a Nymburk, bez data – 1 ex., Kulhánek lgt., coll. J. Roubal in Slovenské národné múzeum Bratislava, J. Pulpán revid. (Pulpán 1993). Potvrzení recentního výskytu v Čechách.

Amblystomus niger (Heer, 1841) – Mor.: Trkmanský dvůr (7166), 3.VIII.2005 – 1 ex. (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR).

Druh rozmanitých stanovišť, nalézaný od stepí a slanisek po teplejší listnaté lesy. Další údaj potvrzující recentní výskyt na Moravě (cf. Veselý & Těťál 1998).

Diachromus germanus (Linné, 1758) – Boh.: Novohradské Hory (7354), 31.VII.2004 – 2 ex. na dně vypuštěného rybníka Zlatá Ktíš (MI); Černousy (5056), 22.VI.2005 – 50 ex. na dně vypuštěného rybníka Dubák (VO). Mor.: Litovel (6369), 21.V.1995 – 1 ex. v lužním lese u Moravy (KM).

Vlhkomilný druh žijící nejčastěji na vlhkých loukách u větších řek. Příležitostně migruje i na rozmanitá stanoviště v širokém okolí, charakteristický bývá pro dna vypuštěných rybníků. V Čechách jde o potvrzení stálého výskytu (Veselý et al. 2002).

Harpalus* (*Cryptophonus*) *melancholicus melancholicus Dejean, 1829 (=*Cryptophonus melancholicus* Dejean, 1829) – Boh.: Bělá pod Bezdězem (54–5554), 15.VII.2005 – 1 immaturní ex. na světlo v cílovém prostoru bývalé střelnice Vrchbělá (VE).

Psamobiont, vázaný na volné váté písky.

Harpalus* (*Cryptophonus*) *tenebrosus Dejean, 1829 (=*Cryptophonus tenebrosus centralis* (Schauberger, 1929)) – Boh.: Beroun, lom Kosov (6050), 25.VIII.2002 – 4 ex. v porostu *Daucus carota* společně s velmi hojným *Ophonus puncticeps* Stephens, 1828 (MO); Tmáň (6050),

28.VIII.2004 – 9 ex. v zemi u kořenů *Daucus* (J. Gahai lgt. et coll., GR det., 2 ex. in coll. GR) (GR); Český Krumlov – Vyšné (7151), 18.VIII.2005 – 22 ex. v noci v úborech *Daucus carota* ve starém vápencovém lomu, více ex. pozorováno na holé zemi mezi rostlinami *Daucus* (GR). Mor.: Brod nad Dyjí (7165), 4.V.2001 – 1 ex. pod kamenem na pastvině (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR); Mikulov, lom na Turoldu (7165), 6.VIII.2002 – 6 ex. v okolících *Daucus* (MO); Mohelno, Mohelenská hadcová step (6863), 6.VIII.2004 – 1 ex. na světlo (M. Žemlička lgt., MO det. et coll.) (MO); Miroslav – Miroslavské kopce (7063), 12.V.2005 – 1 ex. na stepi (KR); NP Podyjí, Hnanice – Fládnitská chata (7162), 27.VII.2005 – 7 ex. na světlo (KR); NP Podyjí, Hnanice env. (7161), 13.VIII.2005 – 1 ex. v úboru *Daucus carota* (GR); Trkmanský dvůr (7167), 21.VII.2006 – 1 ex. na světlo (RE); Bořetice (7167), 21.VII.2006 – 4 ex. na světlo (RE).

V Čechách byl donedávna považován za vzácnější druh xerotermních lokalit, v posledních letech početnost jeho populací stoupá a podobně jako *O. diffinis* se šíří i na ruderálních stanovištích.

Harpalus* (*Harpalus*) *albanicus Reitter, 1900 – Mor.: Pouzdřany env. (7065), 24.IV.1994 – 1 ex. (KO); Pálava – Pavlov (7166), 28.IV.1996 – 2 ex. (KM); Uherčice env. (7065), 4.V.1996 – 1 ex. (KO); Milovice, Milovická stráň env. (7166), 24.IV.1999 – 1 ex. (KO); Mikulov – Anenský vrch (7165), 10.V.2003 – 1 ex. (KM); Znojmo – Cínová hora (7162), 15.IV.2004 – 1 ex. (KR); NP Podyjí, Podmolí – Šobes (7161), 14.VIII.2004 – 2 ex. na vinici (KR); Čejč (7067), 21.V.2005 – 1 ex. na vinici (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR).

Nehojný druh moravských vinařských oblastí.

Harpalus* (*Harpalus*) *autumnalis (Duftschmid, 1812) – Boh.: Bělá pod Bezdězem (54–5554), 24.IV.2002 – 1 ex. na písčině na bývalé střelnici Vrchbělá, 15.VII.2005 – 1 ex. aktivní v noci tamtéž (VE).

Psamobiont vázaný na volné písky různého typu.

Harpalus* (*Harpalus*) *flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783) – Mor.: Hodonín – Pánov (7168), 26.VII.2002 – 13 ex. v noci na písku na bývalém vojenském cvičišti (VE).

Psamobiont vázaný na volné váté písky.

Harpalus* (*Harpalus*) *flavicornis flavicornis Dejean, 1829 – Mor.: Tvarožná Lhota (7170), 22.IV.2006 – 1 ♀ na okraji pole (RE); Dyjákovičky – Ječmeniště (7262), 6.V.2006 – 1 ex. na okraji vinice (VE).

Na jižní Moravě, především ve vinařských oblastech sporadicky nalézaný xerofilní druh.

Harpalus* (*Harpalus*) *froelichi Sturm, 1818 – Boh.: Vlkov nad Lužnicí (6854), 3.VIII.2003 – 2 ex. na světlo (KR).

Xerofilní druh, v Čechách mimo písčité oblasti nehojný a lokální.

Harpalus* (*Harpalus*) *hirtipes (Panzer, 1796) – Boh.: Lovčice – PR Bludy (5858), 11.VIII.2004 – 1 ex. na světlo (M. Mikát lgt., PR det. et coll., VE revid.) (PR). Mor.: Hustopeče, Popice env. (7066), 30.IV.2004 – 1 ex. mezi vinicemi (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR); Rohatec (7160), 10.IX.2006 – 1 ex. na mýtině na vátých píscích pod kusem dřeva v písku (LA).

Psamobiont vázaný na volné váté písky. Poslední známý nález z Čech pocházel z roku 1971: Stará Boleslav, IX.1971, M. Reška lgt. (Pulpán 1993). Potvrzení recentního výskytu v Čechách.

Harpalus* (*Harpalus*) *hospes hospes Sturm, 1818 – Mor.: Pouzdřany (7065), 7.V.2004 3 ex. na terasovitém svahu (PR); Nosislav (6965), 29.IV.2005 – 1 ex. (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR).

Na jižní Moravě velmi lokální a sporadicky nalézaný xerofilní druh.

Harpalus (***Harpalus***) ***marginellus*** Gyllenhal, 1827 – Mor.: NP Podyjí, Vranov nad Dyjí – Braitava (7161), 14.VI.1995 – 1 ex. a 27.VI.1996 – 1 ex. v zemních pastech (A. Reiter lgt., KR det. et coll.) (KR); Strání – Velká Javořina (7072), 13.V.2003 – 1 ex. na lesní pasece v trsech ostřice kolem pařezu (GR); Bílé Karpaty – Kamenná bouda (7171), 22.V. 4. VII.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); Strání – Květná (7172), 22.V.–7.VII.2005 – 1 ex. v zemní pasti, 7.VII.2005 – 1 ex. na pasece (RE); Vápenky (7171), 22.V.–4.VII.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); Bílé Karpaty – Javořina (7172), 25.V.– 23.VII.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); Bílé Karpaty – Kamenná bouda (7171), 23.VII.2005 – 2 ex. pod dřevem na pasece (RE).

Lokální druh lesních světlin Bílých Karpat a Podyjí.

Harpalus (***Harpalus***) ***modestus*** Dejean, 1829 – Boh.: Záluží pr. Roudnice nad Labem (5551), 30.III.2005 – 1 ex. v letu za slunného dne (MO).

Xerofilní druh, mimo písčité oblasti poměrně velmi vzácný a lokální, let dosud nebyl pozorován.

Harpalus (***Harpalus***) ***neglectus neglectus*** Audinet-Serville, 1821 – Boh.: Milovice (5755), 4.VI.2000 – 1 ex. (J. Gahai lgt., PR det. et coll., VE revid.) (PR); Oseček (5856), 18.V.2002 – 1 ex. (J. Gahai lgt. et coll., PR det.) (PR).

Psamobiont vázaný na volné váté písky. Pozoruhodný je nález z Milovic, kde i přes intenzívní průzkum nebyl tento druh doposud nikdy nalezen.

Harpalus (***Harpalus***) ***politus politus*** Dejean, 1829 – Boh.: Staňkovice (5647), 22.IV.2003 – 1 ex., 16.V.2003 – 3 ex. (P. Krásenský lgt. et coll., MO det. et coll.) (MO).

Stepní druh, známý především z xerotermních oblastí Českého krasu a Českého středohoří.

Harpalus (***Harpalus***) ***progrediens*** Schauberger, 1922 – Boh.: Kralupy nad Vltavou (5751), 7.VI.2004 – 1 ex. na ruderálu 1 km severně (KR); Tušť – pískovna (7155), 9.VIII.2002 – 3 ex. v náplavu (KR); Studená – Rusko (6857), 11.VII.2003 – 1 ex. v zemní pasti (Jelínek lgt., KR det. et coll.) (KR); Staňkov – Staňkovský rybník (7055), 16.VIII.2004 – 1 ex. (KR). Mor.: Litovel (6369), 21.V.1995 – 1 ex. v lužním lese u Moravy (KM); Mladeč (6268), 1.IV.1996 – 1 ex. na břehu Moravy (KM); Mušov env. (7165), 6.VI.1996 – 1 ex. na podmáčené louce (KO); Břeclav – Pohansko env. (7367), 24.IV.2000 – 1 ex. na podmáčené louce (KO); NP Podyjí, Podmolí (7161), 3.V.2004 – 1 ex. v náplavu Dyje u silnice směr Lukov (KR).

Lokální druh zachovalých, nejčastěji zaplavovaných luk a lužních porostů v okolí vodních toků.

Harpalus (***Harpalus***) ***solitaris*** Dejean, 1829 – Boh.: Šumava, Modrava – Adamova hora (6946), 6.VIII.2003 – 1 ex. ve smrkovém lese (RI); Doksy (5453), 30.V.2004 – 1 ex. pod kusy dřev (KA lgt. et coll., VE det.) (KA); Pohoří na Šumavě env. (7354), 27.V.2005 – 1 ex. na lesní pasece (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR); Knížecí stolec (7150), 23.V.2006 – 15 ex. na pasece v zemi u kořenů suchých trsů travin v nadmořské výšce 1150 m (GR); Děčín – Horní Oldřichov (5251), 3.V.2006 – 1 ex. pod vřesem (MO). Mor.: Bílé Karpaty – Nový Dvůr (7072), 3.VII.2005 – 1 ex. v lomu Rasová (RE).

V horách na lesních světlinách místy nevzácný druh, v nižších polohách se vyskytuje jen velmi lokálně a vzácně.

Harpalus (***Harpalus***) ***xanthopus winkleri*** Schauberger, 1923 – Boh.: Sokoleč (5856), 30.III.2002 – 1 ex. v brázdách nedávno vysázeného lesa na písku (MI); Tábor – Měšice (6554), 17.IV.2003 – 1 ex. na mezi na okraji pole (MO); Zárybničná Lhota – Kozský (6654), 25.V.2003 – 2 ex. (MO & VO), 16.V.2004 – 1 ex. (MO), vše na okraji lesa a pole,

25.V.–1.VII.2003 – 1 ex. v ZP v lesíku (MO & VO); Brloh env. (7051), 9.VI.2003 – 1 ex. (Čudan lgt., GR det. et coll.) (GR). Mor.: Třebíč – Na Hájku (6761), 5.V.2000 – 1 ex. na okraji akátového lesa (KR lgt. et coll., GR det.) (KR); Dubňany (7068), 20.IV.2003 – 3 ex. na okraji písčité cesty v lese (RE); Bzenec (7069), 23.X. 2004 – 2 immaturní ex. pod mechem na padlých kmenech akátů a borovic v lese na písku (LA).

Velmi lokální druh, častější na písčinách a ve světlých suťových lesích.

Harpalus (***Harpalus***) ***zabroides*** Dejean, 1829 – Boh.: Sulejovice (5450), 25.VII.–26.VIII.2003 – 1 ex. v ZP na polní mezi u Vchynického potoka (MO). Mor.: Břeclav – Pohansko env. (7367), 5.–7.VIII.2000 – 1 ex. na světlo (KO); Úvaly pr. Valtice (7266), 1.V.2003 – 1 ex. a 2.V. 2004 – 2 ex. v zemi pod plevelem na rozhraní pole a akátového remízu (LA); Břeclav – Pohansko (7267), 17.VII.2005 – 1 ex. (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR).

Lokální, skrytě v zemi žijící druh, vzácně se vyskytuje především na sprašových půdách nejteplejších oblastí.

Harpalus (***Pseudoophonus***) ***calceatus*** (Duftschmid, 1812) (=*Pseudoophonus calceatus* (Duftschmid, 1812)) – Boh.: Liberec (5256), 27.VII.2001 – 1 ex. na světlo (VO); Brloh – PP Na Stráži (7151), 1.VIII.2003 – 2 ex. na světlo (KR), V.–VIII.2005 – 1 ex. na světlo (Čudan lgt. et coll., Křivan det.) (GR). Mor.: Mohelno, Mohelenská hadcová step (6863), 6.VIII.2004 – 1 ex. na světlo (M. Žemlička lgt., MO det. et coll.) (MO).

Mimo teplé oblasti jen sporadicky se vyskytující xerofilní druh.

Ophonus (***Metophonus***) ***gammeli*** (Schauberger, 1932) – Mor.: Horní Věstonice (7165), 11.IV.2000 – 1 ♂ pod dřevem v jírovcovém háji (Třešňák lgt. et coll., PR det.) a 22.IV.2006 – 1 ♂ v prosevu listí tamtéž (Třešňák lgt., GR det. et coll.) (GR).

Velice lokální a většinou i vzácný druh hájů jižní Moravy, především na vápencových půdách a spraších.

Ophonus (***Metophonus***) ***subsinuatus*** Rey, 1886 – Mor.: Ostrožská Nová Ves (6970), 10.VII.– 1.VIII.2002 – 3 ex. a 28.VI.2003 – 2 ex. ve světelném lapáku (F. Kopeček lgt., LA et F. Urbánek det. et coll.) (LA); Litovel – Víska (6368), 3.VIII.2002 – 1 ex. na světlo (KM); Trkmanský dvůr (7167), 21.VII.2006 – 3 ♂♂, 1 ♀ na světlo na slanisku (RE); Bořetice (7167), 21.VII.2006 – 1 ♂, 1 ♀ na světlo na stepi (RE).

Málo známý, zřejmě v zemi žijící druh. Veškeré nálezy z posledních 50 let jsou na světlo, nebo náhodné.

Ophonus (***Ophonus***) ***ardosiacus*** (Lutshnik, 1922) – Mor.: Pouzdřany (7065), 28.IV.2001 – 1 ex. v drnech na horním okraji pole (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR); Mikulov (7165), 6.VIII.2002 – desítky ex. v okolících *Daucus carota* v lomu na Turoldu (MO); Mikulov – Turold (7165), 18.IX.2002 – 3 ex. vyhrabány na posečené louce (RI); Uherčice (7065), 7.V.2004 – 2 ex. v drnech na horním okraji pole (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR); Ždánice – Barvínek (6967), 17.VII.2004 – 2 ex. v zemi na okraji slunečnicového pole a 2 ex. na přilehlém úhoru v místech rozrytých divokými prasaty (VE); Hnanice, Knížecí hora (7161), 6.IX.2004 – 8 ex. v suchých okolících *Daucus carota* (ST); NP Podyjí, Hnanice env. (7161), 15.IX.2004 – 1 ex. na úhoru (KR); NP Podyjí, Hnanice – Pod Hraběcí horou (7161), 16.IV.2005 – 1 ex. na úhoru (KR); Mušov (7165), 22.V.2005 – 1 ex. a 14.VIII.2005 – 1 ex. ve staré pískovně, pod kameny na rozhraní písku a travin (GR); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 18.VII.2005 – 1 ex. na světlo (KR); NP Podyjí, Hnanice – Fládnitská chata (7162), 27.VII.2005 – 2 ex. na světlo (KR); NP Podyjí, Hnanice – Šobes (7161), 13.VIII.2005 – 11 ex. v okolících *Daucus carota* a v zemi pod rostlinami (GR); NP Podyjí, Lukov env. (7161),

11.IX.2005 – 1 ex. na úhoru (KR); NP Podyjí – Hnanice, PP Horecký kopec (7261), 28.VIII.2006 – 1 ex. na úhoru (KR observ.) (KR).

Velmi lokální fytofágní druh xerotermních vápencových a sprašových lokalit jižní Moravy. Řada nových nálezů zejména ze Znojemska významně doplňuje dosavadní znalosti o oblasti jeho rozšíření (cf. Kaláb 2000). Ždánice jsou novou nejsevernější recentní lokalitou druhu na Moravě. V minulosti byl nalezen ještě severněji, a to v Boskovicích, odkud ho (pod jménem „*Harpalus rotundicollis* Fairm.“) jako nový druh pro Moravu uvádí Kittner (1867).

Ophonus (***Ophonus***) ***diffinis*** (Dejean, 1829) – Boh.: Velemyšleves (5547), 11.V.2003 – 1 ex. na okraji pole (MO), 14.IX.2003 – 1 ex. v porostu *Daucus carota* (VO); Škrle (5547), 24.IX.2004 – 4 ex. v půdních puklinách na cestě (MO & VO); České středohoří – Sutomský vrch (5449), 23.V.2004 – 1 ex. pod dřevem na louce při východním úpatí (VE); České středohoří – Písečný vrch (5548), 9.VI.2004 – 1 ex. na úhoru na západním úpatí vrchu (VE), 16.VIII.2004 – 1 ex. vyhrabán na stepi (KA); Praha – Pitkovice (5953), 30.VII.2005 – 3 ex. na světlo na louce u Pitkovického potoka (VE); Praha – Uhříněveská obora (5953), 5.VIII.2005 – 1 ex. pod kameny na polní cestě ve východní části obory (VE); Praha – Dubeč – PP Rohožník (5953), 11.VII.2006 – 7 ex. na světlo na jižním úpatí, 9.VIII.2006 – 2 ex. v porostu *Daucus carota* na okraji úhoru na jižním úpatí, pozorováno více ex., 19.IX.2006 – 4 ex. aktivní v noci tamtéž, z toho 1 pár při kopulaci. Ve východní a jižní části Prahy pokračuje pozoruhodná expanze tohoto druhu (VE). Mor.: Mušov (7165), 22.V.2005 – 1 ex. pod kameny na rozhraní pole a pískovny (GR); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 18.VII.2005 – 1 ex. na světlo (KR); Louka (7070), 13.VIII.2005 – více ex. pod kameny na pastvině a úhoru v porostu *Daucus carota* (GR).

Xerofilní druh stepních oblastí, který se v posledních asi 20 letech v Čechách rozšířil na řadu dalších lokalit, a to i na zcela druhotná stanoviště.

Ophonus (***Ophonus***) ***sabulicola*** (Panzer, 1796) – Mor.: Dolní Věstonice (7166), VIII.1992 – 2 ex. (KM).

Lokální xerofilní druh stepních oblastí, především na vápencových půdách a spraších.

Ophonus (***Ophonus***) ***stictus*** Stephens, 1828 – Boh.: Český Krumlov – Liščí vrch (7151), 23.IV.1995 – 1 ex., 20.V.1995 – 1 ex. v hromadě kamení; 8.VI.1995 – 1 ex. po dešti ve dřevě a 14.V.2005 – 1 ex. pod kamenem na obnažené půdě (GR). Mor.: Brod nad Dyjí (7165), 1.V.1998 – 6 ex. a 11.IX.1999 – 1 ex. (KM), 30.VII.2005 – více ex. v noci při žíru na okolících žebřice pyrenejské (*Libanotis pyrenaica* (L.)) (GR); Pouzdřany (7065), 16.V.2004 – 1 ex. v hromadě kamení pod hlohem (GR); Ždánice – Barvínek (6967), 17.VII.2004 – 6 ex. na úhoru v místech rozrytých divokými prasaty, 1 ex. immaturní (VE); Louka (7070), 13.VIII.2005 – 2 ex. pod kamenem na pastvině, spolu s *Ophonus diffinis* (GR).

Velmi lokální druh různých otevřených stanovišť v přírodně zachovalejších oblastech. Potravní vazba na *Libanotis pyrenaica* nebyla dosud pozorována.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***brunnipes*** (Sturm, 1825) – Boh.: Františkov, PP Pískovna u Dračice (7155), 26.V.2005 – hojně v pískovně u tůní na písku mezi kořínky trav (GR), 5.VI.2005 – více ex. v pískovně (KR); Halámky (7155), 24.VII.2005 – více ex. v pískovně v trsech rostlin (GR).

Velmi lokální druh podmáčených, spoře porostlých písčin.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***elegans*** (Dejean, 1829) – Mor.: Břeclav – Pohansko env. (7367), 24.IV.2000 – 6 ex. a 5.–7.V.2000 – 1 ex. v rákosině vysychající tůně v nivě řeky Dyje (KO); NP Podyjí, Hnanice – Fládnitská chata (7162), 27.VII.2005 – 1 ex. na světlo (KR);

Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 30.IV.2005 – 1 ex. v nezastíněném mokřadu (GR), 4.IX.2005 – 8 ex. v zasolených terénních depresích v poli spolu s hojným *A. maculatus* (MO); Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 6.V.2006 – 2 ex. na zamokřeném poli (VE).

Halobiont, na moravských slaniskách dosud místy častější. Při přeletech je občas nalézán i na subhalofilních lokalitách.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***luteatus*** (Duftschmid, 1812) – Boh.: Praha – Císařský ostrov (5852), 23.VII.2004 – 1 ex. na světlo v areálu ÚČOV (VE). Mor.: Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 8.IV.2005 – 1 ex. v mokřadu (KR); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 18.VII.2005 – 2 ex. na světlo (KR); Dyjákovičky – Ječmeniště (7262), 28.VII.2005 – 1 ex. na světlo (Stejskal lgt., KR det. et coll.) (KR); Dobré Pole (7165), 3.IX.2005 – 2 ex. pod vegetací na břehu rybníka (MO); NP Podyjí, Podmolí – Šobes (7161), 6.VII.2006 – 1 ex. na světlo (M. Žemlička lgt., MO det. et coll.) (MO).

Hygrofil, vázaný na vegetací porostlé břehy především stojatých vod. V Čechách velmi vzácný.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***maculatus*** (Schaum, 1860) – Boh.: Klikov (7155), VI.2000 – 1 ex. v pískovně (V. Němec lgt., GR det. et. coll.) (GR); Hradec Králové – Plachta (5861), 6.VI.2002 – 2 ex. ve vlhkém detritu na písečném podkladě (MI); Františkov, PP Pískovna u Dračice (7155), 4.VI.2003 – 1 ex. a 24.VI.2005 – 1 ex. (KR), 25.VI.2005 – 1 ex. a 2.VII.2005 – 2 ex. (GR). Mor.: Hodonín – Pánov (7168), 17.VII.2004 – 2 ex. na světlo na písčině opuštěného vojenského cvičiště (VE); Ostrožská Nová Ves (6970), 31.VII.2004 – 2 ex. na jílovitém břehu jezera v místě přítoku ze štěrkovny (VE); Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 26.IV.2005 – 1 ex. v mokřadu (KR); NP Podyjí, Hnanice – Fládnitská chata (7162), 27.VII.2005 – 2 ex. na světlo (KR); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 18.VII.2005 – 1 ex. na světlo (KR); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 4.IX.2005 – 17 ex. v zasolených terénních depresích v poli (MO).

V Čechách velmi vzácný, na Moravě lokální halofilní druh.

Acupalpus (***Ancylostria***) ***interstitialis*** Reitter, 1884 – Boh.: České středohoří – vrch Radobýl (5450), 6.IV.2002 – 3 ex. (RI); Sulejovice (5450), 24.IV.–17.V.2003 – 1 ex. v ZP na polní mezi u Vchynického potoka (MO); Škrle (5547), 22.V.2005 – 1 ex. v hlíně u slaného pramene (MO); České středohoří – Písečný vrch (5548), 9.VI.2004 – 13 ex. v porostu kokošky (*Capsella bursa-pastoris*) na okraji pole při západním úpatí vrchu, pozorováno více ex. (VE). Mor.: Jaroslavice (7263), 26.IV.2003 – 3 ex. na stepi (KR); NP Podyjí, Havraníky – Havranické vřesoviště (7162), 2.V.2005 – 2 ex. na vřesovišti (KR).

Lokální xerofilní druh, rozšířený především ve vinařských oblastech.

Anthracus longicornis (Schaum, 1857) – Mor.: Mušov env. (7165), 6.VI.1996 – 1 ex. na podmáčené louce (KO); Sedlec u Mikulova (7266), 5.VI.1996 – 1 ex. na slaništi, pozorováno více ex. (KO); Úvaly pr. Valtice (7266), 3.V.2002 – 2 ex. a 23.IV.2004 – 19 ex. na břehu rybníka (RE); Dobré Pole pr. Mikulov (7165), 17.V.2002 – 1 ex. na slanisku (MI); Nivnice (7071), 17.IV.–21.V.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); Bílé Karpaty – Lubná (7072), 21.V.–7.VII.2005 – 1 ex. v zemní pasti na mokřině (RE); Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 6.V.2006 – 2 ex. na okraji mokřadu (VE).

Lokální druh zachovalých mokřadů, slanisek a subhalofilních lokalit. Na jižní Moravě v posledních letech nalézaný častěji.

Bradycellus (***Bradycellus***) ***ruficollis*** (Stephens, 1828) – Boh.: Jizerské hory, Sviňský vrch (5057), 5.X.2004 – 8 ex. v prosevu vřesu (VO); Děčín (5251), 22.III.2006 – 1 ex. pod vřesem u zoologické zahrady (MO); Děčín – Horní Oldřichov (5251), 3.V.2006 – 18 ex. a 23. V.2006 – 10 ex., vše pod vřesem (MO).

Callunobiont, lokálně hojný v porostech vřesu.

Bradycellus (***Bradycellus***) ***verbasci*** (Duftschmid, 1812) – Boh.: Praha – Lysolaje (5852), 18.IV.2004 – 1 ex. v pískovně (MI).

Široce rozšířený druh rozmanitých stanovišť, pro skrytý způsob života je však (kromě odchytu na světlo) sbírán ojediněle.

Dicheirotrichus (***Dicheirotrichus***) ***rufithorax*** (C.R. Sahlberg, 1827) – Boh.: Třeboň, Lužnice (6954), 2.V.2003 – 1 ex. (KR).

Široce rozšířený hygrofilní druh, v jižních Čechách nehojný.

Dicheirotrichus (***Trichocellus***) ***placidus*** (Gyllenhal, 1827) (=*Trichocellus placidus* (Gyllenhal, 1827)) – Boh.: České Budějovice – Dubné (7052), 8.III.2004 – 1 ex. v listí na kraji rybníka (GR); Halámky (7155), 24.VII.2005 – 1 ex. v pískovně (GR).

Široce rozšířený hygrofilní druh, doplnění znalostí o výskytu v jižních Čechách.

Stenolophus (***Stenolophus***) ***discophorus*** (Fischer von Waldheim, 1823) – Mor.: Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 18.VII.2005 – 1 ex. na světlo (KR).

Zejména v teplejších oblastech lokálně rozšířený druh hlinitopísčitých a písčitých břehů vod.

Cymindis (***Cymindis***) ***angularis*** Gyllenhal, 1810 – Boh.: Poděbrady (5856), 20.IV.2002 – 3 ex. v trouchnivém dřevě v lese Boru (MI); Staňkovice (5647), 22.IV.2003 – 1 ex. (P. Krásenský lgt. et coll., MO det.) (MO); Bečov u Mostu, PR Chloumek (5548), 27.VIII.2005 – 1 ex. pod kamenem na stepi (GR); Rudná – Blýskava (5951), 19.VII. 17.IX.2006 – 4 ex. v ZP (MO & VO). Mor.: Miroslav – Miroslavské kopce (7063), 30.V.2004 – 1 ex. pod kamenem na stepi (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR); Pálava – Děvín (7165), 17.X.2005 – 1 ex. na stepi (KR); NP Podyjí, Havraníky – Havranické vřesoviště (7162), 29.VIII.2006 – 1 ex. na vřesovišti (H. Uhlíková observ.) (KR).

Xerofilní druh přírodně zachovalých lokalit.

Cymindis (***Cymindis***) ***axillaris axillaris*** (Fabricius, 1794) – Mor.: Načeratice – Načeratický kopec (7162), 9.X.2001 – 1 ex. na stepi (KR).

Xerofilní druh přírodně zachovalých lokalit, výhradně na stepích a xerotermních pastvinách.

Cymindis (***Cymindis***) ***cingulata*** Dejean, 1825 – Boh.: Albrechtice v Jizerských horách, Tanvaldský Špičák (5257), 28.VI.–4.VIII.2006 – 1 ex. v ZP u potoka (VO). Mor.: Mladeč (6268), 1.IV.1996 – 1 ex. na břehu Moravy (KM); Jeseníky – Černá stráň (5868), 28.VI.1998 – 1 ex., 800 m n.m. (KM); Malá Vrbka (7170), 8.VIII.–11.IX.2004 – 1 ex. v zemní pasti (RE); NP Podyjí, Mašovice – Králův stolec (7162), 23.IV.2005 – 1 ex. v lese (Stejskal lgt., KR det. et coll.) (KR); Bílé Karpaty – Javořina (7172), 25.V.–23.VII.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); Pozlovice (6872), 1.VII.–10.VIII.2006 – 1 ex. v zemní pasti (O. Konvička lgt., RE det et coll.) (RE); Rokytnice (6973), 17.VI.–10.VIII.2006 – 2 ex. v zemní pasti (RE); Žítková (7073), 16.VII.–2.IX.2006 – 3 ex. v zemní pasti (RE); Dolní Lhota (6872), 1.VII.–10.VIII.2006 – 1 ex. v zemní pasti (O. Konvička lgt., RE det et coll.) (RE).

Převážně v podhorských a horských oblastech lokálně a skrytě žijící, většinou jednotlivě nalézaný druh. Potvrzení recentního výskytu v Jizerských horách, odkud je znám pouze jediný nález J. Pulpána: Hejnice, 11.VIII.1947 (Skoupý 2004). V lesních biotopech Bílých Karpat je zřejmě rozšířenější, než se doposud předpokládalo.

Cymindis (***Cymindis***) ***humeralis*** (Geoffroy, 1785) – Boh.: Český Krumlov – Liščí vrch (7151), 2.V.2004 – 2 ex. v hromadě kamení, 15.V.2005 – 2 ex. na opuštěném vojenském cvičišti (GR); Střelské Hoštice (6748), 5.V.2004 – 2 ex. na stepní lokalitě (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR); Brloh – PP Na Stráži (7051), V.–VIII.2005 – ojediněle pod kameny, dřevem či mechem (Čudan lgt. et coll., KR det.) (KR); Praha – Císařský ostrov (5852),

29.VII.2005 – 1 ♀ pod osvětlením v areálu ÚČOV (VE); Slavkov pr. Český Krumlov (7251), 5.X.2005 – 1 ex. pod kameny na malé stepi (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR); Chvalšiny (7151), 6.V.2006 – 1 ex. na okraji lesa a stepi (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR).

Xerofilní druh přírodně zachovalejších lokalit. Z jižních Čech dosud známo nemnoho údajů.

Cymindis (***Menas***) ***miliaris*** (Fabricius, 1801) (=*Cymindis variolosa* (Fabricius, 1801)) – Mor.: Bzenec – Přívoz (7069), 17.VIII.2001 – 1 ex. (KR), 27.IV.2002 – 1 ex. pod dřevem na písku nedaleko železniční trati (KO), 13.VI.2003 – 1 ex. pod kamenem u železniční trati (GR), 16.VII.2004 – 1 ex. (PR) a 1 ex. aktivní v noci v okolí světla (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR).

Xerofilní druh přírodně zachovalých lokalit, výhradně na stepích a xerotermních pastvinách.

Cymindis (***Tarulus***) ***vaporariorum*** (Linné, 1758) – Boh.: Přední Zvonková – Račín (7250), 20.IX. a 30.IX.2000 – více ex. přezimujících v hroudách staré rašeliny na vytěženém rašeliništi (GR); Běleč nad Orlicí env. (5861), 19.VIII.2005 – 1 ex. na vřesovišti na okraji borové paseky (KO).

Reliktní a velmi lokální druh zachovalých lokalit, v chladnějších polohách na kyselých půdách.

Demetrias (***Demetrias***) ***atricapillus*** (Linné, 1758) – Mor.: Slezské Pavlovice (5672), 30.VII.2002 – 5 ex. oklepem dubů na okraji rybníka (ZU); NP Podyjí, Konice – Trauznické údolí (7162), 10.VIII.2005 – 1 ex. (KR).

Expanzívní druh, na Moravě na rozmanitých stanovištích s vyšší bylinnou vegetací.

Dromius (***Dromius***) ***angustus angustus*** Brullé, 1834 – Boh.: Srbce pr. Luže (6062), 8.VI.2004 – 2 ex. (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR). Mor.: Bernartice nad Odrou (6373), 3.XI.2002 – 2 ex. pod kůrou buků (KA).

V Čechách vzácný, na Moravě lokální druh, nalézaný zejména v zachovalých lesních porostech.

Dromius (***Dromius***) ***quadraticollis*** A. Morawitz, 1862 – Mor.: Ostrava – Plesná (6174), 10.III.2002 – 1 ex. na smrku (RE); Hošťálkovice (6175), 9.XI.2003 – 1 ex. na smrku (RE), 1 ex. pod kůrou smrku (LA).

Lokální a vzácný druh, ve Slezsku poměrně rozšířený.

Microlestes fissuralis (Reitter, 1901) – Boh.: Staňkovice (5647), 22.IV.2003 – 3 ex. (P. Krásenský lgt. et coll., MO det. et coll.) (MO); Praha – Lysolaje (5852), 18.IV.2004 – 4 ex. v pískovně (MI). Mor.: Milovická stráň env. (7166), 11.III.2003 – 1 ex. v detritu (KO); Dyjákovičky – Ječmeniště (7262), 16.III.2004 – 1 ex. na stepi (KR); Pouzdřany – NPR Pouzdřanská step (7065), 1.IV.2004 – 1 ex. na stepi (KR); Čejč (7067), 25.IV.2004 – 1 ex. na sprašové stepi (Holub lgt. et coll., KR lgt.) (KR); NP Podyjí, Hnanice – Staré vinice (7161), 11.VI.2004 – 1 ex. na stepi (KR); Tvarožná Lhota (7170), 22.IV.2006 – 1 ex. na okraji pole (RE).

Xerofilní druh, v posledních 20 letech se objevuje početněji i na druhotných stanovištích (rumiště, náspy) v blízkosti přírodně zachovalých lokalit teplejších oblastí.

Microlestes schroederi Holdhaus, 1912 – Mor.: Načeratice – Načeratický kopec (7162), 9.X.2001 – 1 ex. na stepi (KR); Kobylí (7067), 16.V.2003 – 2 ex. na sprašových stěnách (KA).

Vzácný a lokální druh stepních oblastí Moravy. Zejména na sprašových půdách.

Paradromius (***Paradromius***) ***longiceps*** (Dejean, 1826) – Boh.: Tetčiněves (5452), 29.V.2004 – 2 ex. v rákosině v nivě Úštěckého potoka (MO & VO); Vrbka pr. Budyně nad Ohří (5650), 15.III.2005 – 1 ex. přezimující pod kůrou stromu (MO).

Skrytě žijící druh rozsáhlejších rákosin.

Philorhizus crucifer crucifer (Lucas, 1846) – Boh.: Krušné hory, Adolfov, PR Černá louka (5249), 25.V.–3.X.2001 – 2 ex. (makropterní) v ZP, 690–760 m n.m. (V. Hula lgt., MO det. et coll.) (MO); Benátky nad Jizerou, návrší Brdy (5754), 7.V.–2.VII.2005 – 2 ex. v ZP (MO & VO); Třtěno, Třtěnské stráně (5549), 12.V.2005 – 1 ex. (VO); Předměřice nad Jizerou (5754), 2.VII.2005 – 1 ex. (VO); Lužná (6242), 13.V.–17.VI.2006 – 4 ex. a 17.VIII.–16.IX.2006 – 1 ex., vše v ZP na okraji pole, 500 m n.m. (MO & VO); Vráž (6050), 18.VI.–19.VII.2006 – 1 ex. v ZP (MO & VO). Mor.: Ostrov u Macochy (6666), 10.–24.X.2003 – 1 ex. (makropterní) v ZP (J. Klašková lgt., MO det. et coll.) (MO).

Xerofilní druh otevřených stanovišť. Další údaj z náhorní plošiny Krušných hor (cf. Veselý et al. 2002) potvrzuje trvalejší výskyt druhu také v chladných a vlhčích polohách (MO).

Philorhizus quadrisignatus (Dejean, 1825) – Boh.: Teplice (5348), 9.XII.2006 – 2 ex. pod kůrou javoru klenu (RI lgt. et coll., MO revid.) (RI).

Velice lokální a vzácný druh, v Čechách hlavně v okolí Labe a Vltavy. První nález v severních Čechách.

Lebia (***Lebia***) ***cruxminor cruxminor*** (Linné, 1758) – Boh.: Milovice – Mladá (5755), 1.V.2002 – 6 ex. (ZU); Lipník (5755), 5.VII.2002 – 4 ex. (ZU); Brloh – PP Na Stráži (7051), V.–VIII.2005 – více ex. v podsevech, několik jedinců sklepáno z hlohu (Čudan lgt. et coll., KR det.) (KR). Mor.: Nezdenice (6972), 25.IX.2005 – 1 ex. na pastvině (RE); Záhorovice (6972), 10.IV.2005 – 3 ex. a 13.IV.2005 – 2 ex. na mezi (RE).

Druh rozmanitých přírodně zachovalých stanovišť, častější na okrajích lesů.

Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) – Mor.: Ostrov u Macochy, Ostrovská plošina (6666), 23.V.–12.IX.2003 – 5 ex. v ZP (J. Klašková & J. Horáková lgt., MO det. et coll.) (MO); Popice (7065), 30.V.2003 – 1 ex. v zanedbaném sadu (MI).

Druh žije na rozmanitých stanovištích, častější bývá na okrajích lužních porostů.

Syntomus pallipes (Dejean, 1825) – Boh.: Předměřice nad Jizerou (5754), 7.V.–5.VI.2005 – 1 ex. v ZP (MO & VO), 5.VIII.2005 – 4 ex. (MO & VO), 11.IX.2005 – 1 ex. (MO); Praha – Folimanka (5952), 12.X.2005 – 1 ex. a 25.X.2005 – 5 ex. při patě novoměstských hradeb (VE); Praha – Nové Město, Karlov (5952), 14.X.2005 – 6 ex. v bývalé zahradě pod muzeem policie (VE).

V Čechách vzácný xerofilní druh, lokálně rozšířený podél dolních toků Labe a Vltavy.

Badister (***Badister***) ***meridionalis*** Puel, 1925 – Boh.: Lomnice nad Lužnicí – NPR Velký a Malý Tisý (6954), 4.VII.2004 – 1 ex. na světlo (KR); Koštice (5649), 22.V.2005 – 1 ex. pod vegetací na vlhké louce spolu s hojným *B. unipustulatus* (MO).

Hygrofil, v Čechách vzácně a lokálně zejména v teplejších oblastech na nezastíněných březích mokřadů.

Badister (***Badister***) ***unipustulatus*** Bonelli, 1813 – Boh.: Stříbřec (6955), 22.VI.2002 – 1 ex. na světlo (KR); Hluboká nad Vltavou – ZOO Ohrada (6952), 4.VIII.2003 – 1 ex. na světlo (KR); Koštice (5649), 9.V.2004 – 3 ex. a 22.V.2005 – 10 ex. pod vegetací na vlhké louce (MO). Mor.: Hodonín – Pánov (7168), 17.VII.2004 – 1 ex. na světlo na písčině opuštěného vojenského cvičiště (VE).

Charakteristický druh zachovalých lužních porostů, v Čechách již jen velmi lokální.

Badister (***Baudia***) ***peltatus peltatus*** (Panzer, 1796) – Boh.: Ražice – NPR Řežabinec (6750), 8.V.2000 – 3 ex. na litorálu rybníka (2 ex. coll. KR, 1 ex. coll. JMM Znojmo) (KR); Hluboká nad Vltavou env. (6952), 4.VIII.2003 – 1 ex. na světlo (Holub lgt. et coll., KR det.) (KR); Lysá nad Labem, NPR Hrabanovská Černava (5755), 4.VI.2002 – 5 ex. (J. Preisler lgt., VO

det. et coll.) (VO); Břehyňský rybník (5454), 15.VII.2005 – 1 ex. na světlo při východním okraji rybníka (VE). Mor.: Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 6.V.2006 – 1 ex. na okraji mokřadu (VE); Trkmanský dvůr (7167), 21.VII.2006 – 1 ♀ na světlo (RE).

Vzácný druh, častější u tůní v lužních lesích a na zachovalých mokřadech, místy se objevuje i u rybníků.

Badister (***Trimorphus***) ***dorsiger*** (Duftschmid, 1812) – Mor.: Břeclav (7267), 12.V.1996 – 1 ex. na břehu Dyje (KM); Břeclav – Pohansko env. (7367), 14.VI.1999 – 4 ex. v rákosině vysýchající tůně v nivě řeky Dyje (KO).

Druh s lokálním výskytem v zachovalých lužních porostech s přirozeným vodním režimem.

Badister (***Trimorphus***) ***sodalis*** (Duftschmid, 1812) – Mor.: Bílé Karpaty – Lubná (7072), 22.IV.–21.V.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE).

Hygrofil, poměrně častý v pobřežních porostech u zachovalejších mokřadů v nížinách.

Licinus (***Licinus***) ***cassideus cassideus*** (Fabricius, 1792) – Boh.: Bečov u Mostu, PR Chloumek (5548), 27.VIII.2005 – 1 ex. pod kamenem (GR). Mor.: Miroslav – Miroslavské kopce (7063), 12.V.2005 – 1 ex. na stepi (KR); Dyjákovičky – Ječmeniště (7262), 28.VII.2005 – 2 ex. na stepi (Stejskal lgt., KR det. et coll.) (KR).

Reliktní stepní druh vápnitých a sprašových půd.

Licinus (***Licinus***) ***depressus*** (Paykull, 1790) – Boh.: Ražice – NPR Řežabinec (6750), 8.V.2000 – 1 ex. v litorálu rybníka (KR); Mirochov – Hajnice (7055), VIII.2001 – 1 na okraji lesa (M. Snížek lgt., KR det. et coll.) (KR); Dříteň (6852), VII.2006 – 1 ex. v zemní pasti na poli (Kindlmann lgt., GR det. et coll.) (GR); Český Krumlov – NPR Vyšenské kopce (7151), 22.X.2006 – 1 ex. pod kamenem na pastvině (J. Blízek lgt., GR det. et coll.) (GR). Mor.: Litovel (6369), 21.V.1995 – 1 ex. v lužním lese u Moravy (KM); Suchov (7171), 6.VII.–8.VIII.2004 – 3 ex. v zemní pasti (RE); Nezdenice (6972), 2.VII.–8.VIII.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); Našiměřice (7064), 17.VIII.2006 – 1 ex. na zahradě (KR); NP Podyjí – Hnanice, PP Horecký kopec (7261), 28.VIII.2006 – 1 ex. na stepi (KR observ.) (KR).

Druh široké škály stanovišť. Výskytuje se většinou jednotlivě, v posledních letech jsou nálezy četnější.

Oodes gracilis A. Villa et G. B. Villa, 1833 – Boh.: Břehyňský rybník (5353), 21.–22.V.2005 – více ex. vyšlapáno z rákosin (KA). Mor.: Dobré Pole (7165), 8.VI.1996 – 2 ex. na slanisku (KM); Lednice (7266), 10.XI.2001 – 1 ex. v pařezu v lužním lese (KR); Úvaly pr. Valtice (7266), 23.IV.2004 – 1 ex. na břehu rybníka (RE); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 21.IX.2004 – 1 ex. v rákosině (KR lgt. et coll., MO det.) (KR); Rakvice – Trkmanský dvůr (7167), 1.V.2005 – 1 ex. u nezastíněného mokřadu (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR); Oleksovice – Oleksovická mokřina (7063), 27.VI.2005 – 4 ex. v rákosině (KR).

Druh zachovalých mokřadů a slatin, vzácně nalézaný i v lužních lesích.

Panageus (***Panageus***) ***bipustulatus*** (Fabricius, 1775) – Boh.: Černousy env. (4956), 8.V.2004 – 1 ex. na hlinitopísčitém břehu říčky (KA); Brloh – PP Na Stráži (7051), V.–VIII.2005 – ojediněle pod kameny, především na jaře (Čudan lgt. et coll., KR det.) (GR). Mor.: Mladeč (6268), III.1992 – 1 ex. na břehu Moravy (KM).

Druh širokého spektra spíše sušších a teplejších stanovišť. Nálezy na březích jsou neobvyklé.

Perigona (***Perigona***) ***nigriceps*** (Dejean, 1831) – Mor.: Břeclav (7267), 9.V.2003 – 1 ex. ve skladu kůry (KM); Bořetice (7167), 23.VII.2004 – 1 ex. na světlo (RE); NP Podyjí, Podmolí –

Šobes (7161), 22.VIII.2004 – 1 ex. na světlo (KR); Suchov (7171), 11.IX.–17.X.2004 – 1 ex. v zemní pasti (RE).

Skrytě žijící velmi pohyblivý druh vázaný na tlející rostlinný materiál.

Agonum (***Agonum***) ***dolens*** (C.R. Sahlberg, 1827) – Mor.: Úvaly pr. Valtice (7266), 1.V.2003 – 1 ex. mezi vegetací na břehu rybníka (LA).

Hygrofil, vázaný na zachovalé, vegetací porostlé břehy stojatých vod. Na Moravě velmi vzácný druh. Potvrzení recentního výskytu.

Agonum (***Agonum***) ***ericeti*** (Panzer, 1809) – Boh.: Přední Zvonková – Račín (7250), 1.VI.2000 – 3 ex. vyšlapány na rašeliništi (GR); Novohradské hory – Pohoří na Šumavě env. (7354), 27.V.2005 – 3 ex. a 3.VI.2005 – 8 ex. na rašeliništi (M. Snížek lgt., GR det. et. coll.). První známé nálezy tohoto druhu z Novohradských hor (GR).

Tyrfobiont s lokálním výskytem především na horských a podhorských rašeliništích.

Agonum (***Agonum***) ***lugens*** (Duftschmid, 1812) – Boh.: Vlkov nad Lužnicí – PR Písečný přesyp (6854), V.2002 – 2 ex. na světlo (KR); Novohradské hory – Žofín (7354), 16.VII.2003 – 1 ex. na světlo (KR). Mor.: Novosedly (7164), 3.IX.2005 – 1 ex. v rákosišti na slanisku (MO).

Druh zachovalých lužních porostů. Přeletuje i na delší vzdálenosti. V Čechách velmi lokální a vzácný.

Agonum (***Agonum***) ***monachum*** (Duftschmid, 1812) (=*Agonum atratum* (Duftschmid, 1812)) – Mor.: Šumice (6972), 20.VII.2004 – 1 ex. na světlo (RE).

Halofilní hygrofil. Na Moravě velmi vzácný druh. Potvrzení recentního výskytu.

Agonum (***Agonum***) ***muelleri*** (Herbst, 1784) – Mor.: Rohatec (7169), 5.VI.2005 – 1 ex. na mokřině v poli v nivě Moravy (LA).

Převážně hojný a nenáročný, v uvedené oblasti však jen vzácně se vyskytující druh.

Agonum (***Agonum***) ***viridicupreum viridicupreum*** (Goeze, 1777) – Mor.: Šumice (6972), 3.V.2002 – 1 ex. a 12.V.2002 – 1 ex. na bahně mezi vegetací na polní mokřině u potoka (LA); Litovel env., Mladeč, NPP Třesín (6268), 22.VIII.2004 – 1 ex. (NA); Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 22.V.2005 – 1 ex. v mokřadu (KR).

Na Moravě vzácný druh, který bývá nalézán na vlhkých místech s nezapojenou vegetací, nejčastěji v dosahu větších řek. Přeletuje i na delší vzdálenosti a osidluje proto i polní mokřiny.

Agonum (***Platynomicrus***) ***gracilipes*** (Duftschmid, 1812) – Boh.: Hluboká nad Vltavou – ZOO Ohrada (6952), 4.VIII.2003 – 1 ex. na světlo (KR); Praha – Pitkovice (5953), 30.VII.2005 – 1 ex. na světlo na louce u Pitkovického potoka (VE). Mor.: Kunovice (6970), 28.VII.2003 – 2 ex. ve světelném lapáku (F. Kopeček lgt., LA det. et coll.) (LA); Šumice (6972), 20.VII.2004 – 1 ex. na světlo (RE); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 18.VII.2005 – 1 ex. na světlo (KR); NP Podyjí, Hnanice – Fládnitská chata (7162), 27.VII.2005 – 1 ex. na světlo (KR); Dyjákovičky – Ječmeniště (7262), 28.VII.2005 – 4 ex. na světlo (Stejskal lgt.) (KR); NP Podyjí, Podmolí – Šobes (7161), 6.VII.2006 – 1 ex. na světlo (M. Žemlička lgt., MO det. et coll.) (MO); Trkmanský dvůr (7167), 21.VII.2006 – 1 ex. na světlo (RE).

Bionomie druhu není dosud dostatečně známa. Jedná se o velmi pohyblivý druh, který bývá zjištěn nejčastěji na světlo nebo náhodně při přeletech na rozmanitých stanovištích.

Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790) – Boh.: Ejpovice (6247), 20.IX. 2002 – 1 ex. v kaolinovém lomu (MI), 15.V.2004 – 1 ex. pod kamenem na okraji hliniště (ST). Mor.: Louka (7070), 13.VIII.2005 – 1 ex. pod kamenem na louce (GR).

Lokální druh, rozšířený spíše v pahorkatinách a v podhůří na hlinitých a písčitých půdách, často v hliništích a lomech.

Olisthopus sturmii (Duftschmid, 1812) – Boh.: Beroun, lom Kosov (6050), 30.V.2002 – 7 ex. pod vegetací na zbytku stepi (MO & VO); Vražkov, vrch Říp (5651), 15.V.2003 – 2 ex. na stepi západního svahu (MO). Mor.: Mutěnice (7068), 22.V.2005 – 2 ex. mezi kmínky vinné révy pod uschlými listy a starou trávou (J. Gahai et Třešňák lgt., GR det. et coll.) (GR).

Reliktní, lokálně občas i hojný druh lesostepí a stepí.

Platynus (***Batenus***) ***livens*** (Gyllenhal, 1810) – Mor.: Oleksovice – Oleksovická mokřina (7063), 27.VI.2005 – 4 ex. v mokřadu (KR).

Charakteristický druh zachovalých lužních lesů.

Platynus (***Platynus***) ***longiventris*** Mannerheim, 1825 – Mor.: Kostelany nad Moravou (6970), 5.VI.2003 – 1 ♂ na světlo (RE); Břeclav – Pohansko (7267), 23.V.2005 – 1 ex. (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR).

Lokální druh zachovalých lužních porostů.

Platynus (***Platynus***) ***krynickii*** (Sperk, 1835) – Mor.: Střeň (6369), 20.V.1999 – 1 ex. v lužním lese (KM); Lanžhot – Soutok (7367), 26.III.2005 – 1 ex. v náplavu Moravy a Dyje (GR); Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 26.IV.2005 – 1 ex. v mokřadu (KR); Pouzdřany (7065), 30.IV.2005 – 2 ex. na břehu vypuštěného rybníka (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR).

Charakteristický druh zachovalých lužních lesů.

Sericoda quadripunctata (DeGeer, 1774) – Boh.: Frymburk – Posudov (7350), 16.VI.1995 – 6 ex. na spáleništi na lesní pasece (V. Němec lgt., GR det. et coll.) (GR); Pohoří na Šumavě env. (7354), 31.V.2003 – 10 ex. na spáleništi na lesní pasece (KR), 7.VI.2003 – 8 ex. na spáleništi na lesní pasece (GR); Novohradské hory (7354), 31.VII.2004 – 1 ex. u rybníka Zlatá Ktíš (MI). Mor.: Komňa (7072), 14.V.2005 – 4 ex. na spáleništi na pasece (RE).

Podhorský lesní druh s vazbou na lesní spáliště.

Molops (***Molops***) ***elatus elatus*** (Fabricius, 1801) – Boh.: Vrahožily pr. Teplice (5348) 30.IV.2002 – 2 ex. na okraji lesíka (RI); Český Krumlov – NPR Vyšenské kopce (7151), 8.V.2006 – 3 ex. pod starou travou na okraji pole, pozorováno více ex. (GR); Vráž (6050), 14.V.–19.VII.2006 – 27 ex. v ZP (MO & VO); Mýto (6248), 14.V.–18.VI.2006 – 1 ex. v ZP (MO & VO); Volduchy (6247), 14.V.–18.VI.2006 – 1 ex. v ZP (MO & VO). Mor.: Úvaly pr. Valtice (7266), 3.V.2002 – 4 ex. pod kameny a mechem, 3.V.–18.V.2002 – 9 ex. v zemní pasti, 30.IV.2003 – 4 ex. v detritu a pod mechem, 7.V.–1.VI.2003 – 6 ex. v zemní pasti, 2.V.–5.VI.2004 – 6 ex. v zemní pasti (RE).

Lokální druh, nalézaný nejčastěji v suťových lesích pahorkatin a podhůří.

Molops (***Molops***) ***piceus austriacus*** Ganglbauer, 1889 – Boh.: Dobrá – Stožec (7148), 10.VII.2003 – 1 ♂ pod dřevem (RE).

Poddruh lesního druhu, rozšířený v Rakousku, severní Itálii, Slovinsku a Chorvatsku. V Čechách pouze vzácný a okrajový výskyt na Šumavě.

Poecilus (***Poecilus***) ***punctulatus*** (Schaller, 1783) – Mor.: Pálava – Pavlov (7166), 28.IV.1996 – 5 ex. (KM); Bořetice (7167), 29.VII.2005 – 1 ex. na okraji pole (RE); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), VIII.2005 – 1 ex. na poli (KR).

Stepní druh s lokálním výskytem v nejteplejších, přírodně zachovalých oblastech.

Poecilus (***Poecilus***) ***sericeus sericeus*** Fischer von Waldheim, 1824 – Boh.: České středohoří, vrch Raná (5548), 17.V.2005 – 2 ex. na okraji opuštěného pole (VO). Mor.: Pálava – Pavlov (7166), 28.IV.1996 – 1 ex. (KM); Pálava – Děvín (7166), 27.IX.1996 – 1 ex. (KM); Úvaly pr.

Valtice (7266), 3.V.2002 – 1 ex. na okraji stepi (RE); Jaroslavice (7263), 26.IV.2003 – 1 ex. na stepi (KR); Miroslav – Miroslavské kopce (7063), 5.V.2005 – 1 ex. na poli (KR); NP Podyjí, Konice env. (7162), VII.2005 – 1 ex. na poli (Stejskal lgt., KR det. et coll.) (KR).

Stepní druh s lokálním výskytem v nejteplejších, přírodně zachovalých oblastech.

Pterostichus (***Adelosia***) ***macer macer*** (Marsham, 1802) – Boh.: Plástovice (6952), 1.VII.2006 – 3 ex. v zemní pasti na okraji pole (Kindlmann lgt., GR det. et coll.) (GR); Volduchy (6247), 18.VI.–18.VIII.2006 – 4 ex. v ZP (MO & VO). Mor.: NP Podyjí, Havraníky – Havranické vřesoviště (7162), 15.X.2005 – 1 ex. na vřesovišti (KR).

Na polích s jílovitou půdou dříve místy hojný druh, který však na mnoha místech již zcela vymizel. Při přeletech bývá občas zastižen i na tak pro něj neobvyklých stanovištích jako jsou vřesoviště.

Pterostichus (***Argutor***) ***chameleon*** (Motschulsky, 1866) – Mor.: Lanžhot – Soutok (7367), 26.III.2005 – 1 ex. v náplavu Moravy a Dyje (GR).

Druh vázaný na okolí řek s přirozeným vodním režimem a zachovalými lužními porosty.

Pterostichus (***Argutor***) ***cursor*** (Dejean, 1828) – Mor.: Břeclav – Pohansko env. (7367), 5.–7.V.2000 – 1 ex. v rákosině vysychající tůně v nivě řeky Dyje (KO); Trkmanský dvůr (7167), 30.IV.2005 – 1 ex. a 1.V.2005 – 1 ex. v nezastíněném mokřadu (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR), 3.VIII.2005 – 3 ex. (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR); Novosedly (7164), 3.IX.2005 – 1 ex. v rákosišti na slanisku (MO).

Halofil, lokálně na zachovalých, vegetací zarostlých březích mokřadů jižní Moravy.

Pterostichus (***Argutor***) ***leonisi*** Apfelbeck, 1904 – Boh.: Praha – Radotín (6052), 10.V.2006 – 1 ♀ na okraji pole a ruderálu jižně od lávky na levém břehu Berounky (VE). Mor.: Pouzdřany (7065), 26.III.2005 – 1 ex. (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR). Mor.: Hustopeče (7066), 30.IV.2005 – 1 ex. (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR); Trkmanský dvůr (7166), 17.V.2005 – 1 ex. (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR).

Halofil, šířící se zejména na druhotných vlhkých i sušších stanovištích.

Pterostichus (***Cryobius***) ***negligens negligens*** (Sturm, 1824) – Boh.: Labské pískovce, Holý vrch (5250), 23.IV.2002 – 9 ex. v suti (M. Chochel lgt. et coll., MO det. et coll.) (MO), 1.V.2006 – 1 ex. na úpatí suťového pole (VO); Krkonoše, Studniční hora (5360), 23.VI.–4.VIII.2004 – 2 ex. v ZP, cca 1500 m n.m. (J. Vaněk lgt. et coll., VO det.) (VO); Krkonoše – Luční hora (5260), 2.VII.2005 – 7 ex. v suti (KR).

Reliktní a velmi lokální skrytě žijící druh suťových polí.

Pterostichus (***Eosteropus***) ***rufitarsis cordatus*** Letzner, 1842 – Boh.: Pec pod Sněžkou (5360), 24.X.2004 – 2 ex. ve shnilém dřevě v nadmořské výšce 1000 m (MI); Králický Sněžník (5867), 24.VI.2006 – 1 ex. pod kůrou padlého smrku (RE); Teplice nad Metují env., Teplické skály, Teplická jeskyně (5462), 7.VII.2006 – 1 ex. na vodní hladině podzemního potoka (ML lgt., A. Hamet det., SJMK Blansko coll.) (ML); Teplice nad Metují env., Teplické skály (5462), 29.IX.2006 – 2 ex. v pseudokrasovém systému Poseidón I, v části Tundra, 10.X.2006 – 1 ex. v pseudokrasovém systému Poseidón I, v Rozsedlině pod Brankou (ML lgt., PR det., SJMK Blansko coll.) (ML).

Vzácný a lokální reliktní lesní druh, nalézaný především v zachovalých horských porostech. V Teplických skalách jde o unikátní reliktní, mikroklimaticky podmíněný výskyt.

Pterostichus (***Feronidius***) ***incommodus*** Schaumm, 1858 – Mor.: Louka (7070) 13.VIII.2005 – 4 ex. pod kameny na pastvině v PR Hloží (GR).

Lesostepní druh. Potvrzení stálého výskytu na jediné lokalitě v České republice.

Pterostichus (***Feronidius***) ***melas melas*** (Creutzer, 1799) – Boh.: Vráž (6050), 14.V.–17.IX.2006 – 72 ex. v ZP (MO & VO).

Lokálně hojný druh okrajů listnatých lesů.

Pterostichus (***Melanius***) ***aterrimus aterrimus*** (Herbst, 1784) – Boh.: Břehyňský rybník (5454), 21.V.2005 – 1 ex. (RI), 21.–22.V.2005 – 3 ex. vyšlapány z rákosin (KA); Lázně Bohdaneč (5960), Bohdanečský rybník, 3.IX.2005 – 1 ex. a 27.VIII.2006 – 1 ex. (Klouček lgt. et coll., PR det.) (PR). Mor.: Moravičany – PR Kačení louka (6268), 11.VIII.2002 – 4 ex. (KM).

Reliktní hygrofilní druh vázaný na zachovalé močály. Údaje od Bohdanečského rybníka potvrzují zdejší starší nálezy z 50. let 20. století: Bohdaneč, 15.V.1953 – 1 ex., J. Pulpán lgt. (Skoupý 2004) a V., VI.1956, Vosyka lgt. (Heyrovský 1963).

Pterostichus (***Melanius***) ***elongatus*** (Duftschmid, 1812) – Mor.: Úvaly pr. Valtice (7266), 2.V.2002 – 2 ex. na břehu rybníka (RE); Lednice (7266), 26.VI.2003 – 1 ex. na břehu tůně (KR); Zvěrkovice pr. Moravské Budějovice (6961), 28.IV.2004 – 1 ex. na břehu rybníka (KR); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 27.V.2005 – 1 ex. v rákosině (KR); Trkmanský dvůr (7166), 13.V.2005 – 2 ex., 16.VII.2005 – 2 ex. a 13.VIII.2005 – 1 ex. (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR).

Na Moravě velmi lokální druh zachovalých nezastíněných mokřadů.

Pterostichus (***Pseudomaseus***) ***gracilis gracilis*** (Dejean, 1828) – Boh.: Zaječice pr. Jirkov (5546), 14.IX.2001 – 2 ex. (M. Chochel lgt. et coll., MO det. et coll.) (MO). Mor.: NP Podyjí, Lukov – Vraní skála (7161), 18.VI.2002 – 1 ex. na světlo (Vítek lgt., KR det. et coll.) (KR); Břeclav – Pohansko (7267), 15.V.2003 – 1 ex. v mokřadu (GR); Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 26.IV.2004 – 1 ex. a 22.V.2005 – 1 ex. v mokřadu (KR); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 3.V.2005 – 1 ex. na břehu rybníka (M. Škorpík lgt., KR det. et coll.) a 18.VII.2005 – 1 ex. na světlo (KR).

Zejména v Čechách velmi lokální a vzácný druh zachovalých mokřadů.

Pterostichus (***Pseudomaseus***) ***piceolus latoricaensis*** Pulpán, 1965 – Mor.: Sedlec u Mikulova (7266), 1.V.1998 – 1 ex. na slaništi (KO); Pohansko (7267), 11.VIII.2005 – 1 ex. (R. Udržal lgt. et coll., PR det.) (PR).

Na Moravě byl druh znám pouze z oblasti soutoku Moravy a Dyje. Nález na lokalitě Sedlec, pokud není náhodný, naznačuje možnost jeho rozšíření i mimo toto území.

Pterostichus (***Pseudosteropus***) ***illigeri sudeticus*** Gerhardt, 1909 – Boh.: Pohoří na Šumavě (7354), 10.VII.2003 – 11 ex. pod dřevem ve smrkovém lese (RE), 9.VII.2006 – 8 ex. a 22.VII.2006 – 3 ex. ve vlhkém smrkovém lese (GR).

Horský lesní druh, v České republice rozšířen pouze v Novohradských horách.

Platyderus (***Platyderus***) ***rufus rufus*** (Duftschmid, 1812) – Mor.: Načeratice – Načeratický kopec (7162), 9.X.2001 – 1 ex. na stepi (KR); Úvaly pr. Valtice (7266), 21.IX.2003 – 1 ex. na stepi (RE); NP Podyjí, Znojmo – Kraví hora (7162), 11.IX.2004 – 1 ex. na ruderálu (KR); NP Podyjí, Čížov env. (7161), 4.IV.2005 – 1 ex. na úvozové cestě (KR).

Lokální, na Moravě většinou pouze jednotlivě se vyskytující lesní a lesostepní druh.

Calathus (***Neocalathus***) ***cinctus*** Motschulsky, 1850 – Boh.: Křemže, Bohouškovice (7151), 12.II.2000 – 1 ex. pod kamenem na okraji pole (KR); Benátky nad Jizerou (5754), 5.VI.–2.VII.2005 – 1 ex. v ZP na návrší Brdy (MO & VO); Oleško (5551), 6.X.2005 – 1 ex. na okraji písčitého pole (MO). Mor.: Mikulovice – Mikulovické jezero (7062), 27.VI.2005 – 2 ex. na úhoru (KR); Dyjákovičky – Ječmeniště (7262), 9.VI.2005 – 3 ex. na úhoru (KR).

Xerofilní druh s lokálním výskytem v teplých oblastech.

Dolichus halensis (Schaller, 1783) – Boh.: Lipník (5755), 5.VII.2002 – 1 ex., pozorováno dalších cca 15 immaturních ex., 7.VII.2002 – 4 ex., pozorováno dalších cca 10 ex. (ZU); Vlkov nad Lužnicí (6854), 1.VIII.2002 – 1 ex. na světlo (Hlásek lgt., KR det. et coll.) (KR); Vítězov u Velimi (5856), 4.VI.2004 – 1 ex. v bývalé pískovně (MI); Bělá pod Bezdězem (54–5554), 15.VII.2005 – 1 ex. na světlo v cílovém prostoru bývalé střelnice Vrchbělá (VE); Předměřice nad Jizerou (5754), 5.VIII.–11.IX.2005 – 1 ex. v ZP (MO & VO). Mor.: Miroslav – Miroslavské kopce (7063), 23.VI.2005 – 1 ex. na poli (KR).

Xerofilní expanzívní druh, mimo teplejší oblasti vzácný.

Laemostenus (***Pristonychus***) ***terricola terricola*** (Herbst, 1784) – Boh.: Praha – Radotín (6052), 9.IV.2005 – 3 ex. v norách jezevců (J. Gahai lgt., GR det. et. coll.) (GR); České středohoří – vrch Raná (5548), 28.VIII.2005 – více ex. v zemních pastech (GR). Mor.: Úvaly pr. Valtice (7266), 7.V.–1.VI.2003 – 1 ex., 21.VI.–27.VII.2003 – 1 ex. a 2.V.– 5.VI.2004 – 5 ex. v zemní pasti (RE). Mor.: Jaroslavice (7263), 31.VIII.2005 – 4 ex. v králičích norách 1,5 km severovýchodně (KR); Dolní Věstonice env., jeskyně Sprašovka (7165), 9.VIII.2006 – 1 ex. v Kořenovém dómu (ML lgt., PR det., SJMK Blansko coll.) (ML).

V norách a dalších podzemních prostorách žijící druh. V místech výskytu bývá početnější.

Amara (***Amara***) ***anthobia*** A. Villa & G. B. Villa, 1833 – Mor.: Uherčice (7065), 17.V.2002 – 5 ex. (MI), 7.VI.2004 – 1 ex. na okraji pole a lesa (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR); Čejč (7067), 18.V.2002 – více ex. na spraši (MI), 20.V.2004 – 1 ex. na sprašové stepi (Holub lgt. et coll., KR det.), 12.VI.2006 – 15 ex. pod plevelem na okraji vinice (LA); Břeclav – Pohansko env. (7367), 19.IV.2003 – 2 ex. v trsu trávy (KO); Dubňany (7068), 26.IV.2003 – 7 ex. na okraji písčité cesty (RE); Pouzdřany (7065), 30.IV.2005 – 1 ex. ve staré pískovně (J. Gahai lgt., GR coll. et. det) (GR), 15.IX.2004 – 1 ex. na okraji pole a lesa (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR); Hrabětice – Trávní dvůr (7264), 22.V.2005 – 1 ex. (KR).

Lokální xerofilní druh, rozšířený především ve vinařských oblastech.

Amara (***Amara***) ***communis*** (Panzer, 1797) – Boh.: Pecka pr. Nová Paka (5559), 18.VII.2006 – více ex. v jehličí na okraji březoborového lesa (KA lgt. et coll., VE det.) (KA).

Netypické stanoviště tohoto hojného druhu niv a lužních porostů.

Amara (***Amara***) ***lucida*** (Duftschmid, 1812) – Mor.: Uherský Brod (6971), 7.V.2002 – 3 ex. a 30.VIII.2002 – 1 ex. na suchém úhoru v zemi pod plevelem (LA); NP Podyjí, Havraníky – Havranické vřesoviště (7162), 10.V.2003 – 1 ex. na vinici (KR); Derflice – Kamenný vrch (7162), 1.IV.2004 – 1 ex. na stepi (KR); Čejč (7067), 8.V.2004 – 1 ex. na okraji vinice pod vegetací (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR), 15.IV.2006 – 2 ex. na stepi (RE); Kněžice – Chaloupky (6760), 6.VI.2004 – 1 ex. v prosevu na louce (KR); Pouzdřany (7065), 15.IX.2004 – 1 ex. na stepi (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR); Lanžhot – Soutok (7367), 26.III.2005 – 2 ex. v náplavu Moravy a Dyje (GR); Mašovice – Šafářka (7161–62) 3.V.2005 – 4 ex. na okraji lesa (KR); NP Podyjí, Hnanice – Horecký kopec (7262), 17.V.2005 – 3 ex. na úhoru (KR); Radějov – Žerotín (7169), 4.VI.2005 – 1 ex. na okraji vinice (RE).

Lokální druh teplejších oblastí. Nejčastěji na lehkých až písčitých půdách.

Amara (***Amara***) ***makolskii*** Roubal, 1923 – Boh.: Veselí nad Lužnicí (6854), 1.VII.2002 – 1 ex. (KR lgt. et coll., J. Hejkal det.) (KR); Košice (6654), 18.IV.2003 – 8 ex. pod listím bříz na břehu rybníka Koberný, 1.VII.–9.VIII.2003 – 1 ex. v ZP tamtéž (MO & VO); Vrbka pr. Budyně nad Ohří (5650), 9.VII.2004 – 4 ex. v listnatém lese s břízou (MO); Strašnov, Strašnovský les (5655), 2.VII.–5.VIII.2005 – 5 ex. v ZP v dubovém lese s břízou (MO & VO); Labské pískovce, Holý vrch (5250), 10.VI.2005 – 1 ex. v březovém porostu na okraji sutě (MO).

Lokální druh lesních a hájových stanovišť s březovými porosty.

Amara (***Amara***) ***montivaga*** Sturm, 1825 – Mor.: Litovel – Víska (6368), 3.VIII.2002 – 3 ex. na světlo (KM).

Poměrně hojný druh s výskytem na vlhkých loukách v nivách, ale i na druhotných, vegetací spoře porostlých stanovištích. Na světlo dosud zjištěn zcela výjimečně.

Amara (***Amara***) ***nigricornis*** C.G. Thomson, 1857 – Boh.: Nepomuk pr. Šalmanovice (7154), 3.V.1997 – 1 ♂ v zemní pasti na lesní pasece v nadmořské výšce 474–490 m (Šlachta lgt. et coll., K. Hůrka det., J. Hejkal revid.) (GR); Pohoří na Šumavě env. (7354), 21.VIII.2001 – 2 ex. v náplavu Pohorského potoka (Holub lgt. et coll., J. Hejkal det.) (GR), 31.V.2003 – 1 ex. na lesní pasece (KR); Šumava – Ždanidla (6845), 20.V.2004 – 10 ex. na lesní cestě a pasece (RE); Kvilda (6947), 20.V.2005 – 1 ex. na rašeliništi Mezilesní slať (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR); Želnava – Knížecí stolec (7149), 20.V.2006 – 5 ex. (GR lgt., det. et coll., 1 ex. in coll. VE, 1 ex. in coll. P. Bulirsch), 23.V.2006 – 10 ex. (GR lgt., det. et coll., 2 ex. in coll. J. Gahai), 23.V.2006 – 2 ex. (Šlachta lgt. et coll., GR det.), 11.VI.2006 – 3 ex. (GR lgt., det. et coll., 1 ex. in coll. T. Třešňák), vše pod travinami na pasece v nadmořské výšce 1180 m (GR), 26.VIII.2006 – 2 ex. v nadmořské výšce 1100 m (KM).

Další nálezy montánního druhu s dosud nedostatečně známým rozšířením. Nález z Nepomuku je velmi pozoruhodný a naznačuje možnost rozšíření druhu i v nižších nadmořských výškách (cf. Moravec & Dvořák 2000). První nález v Novohradských horách.

Amara (***Amara***) ***nitida*** Sturm, 1825 – Boh.: Krušné hory, Nové Město (5348), 2.V.2002 – 1 ex. na louce (RI); Šumava, Kašperk (6847), 6.VII.2003 – 1 ex. na louce (RI); Šumava – Ždanidla (6845), 20.V.2004 – 2 ex. na lesní cestě (RE). Mor.: Jeseníky – Černá stráň (5868), 5.VI.1999 – 6 ex. a 7.VIII.1999 – 2 ex., 700 m n.m. (KM); Karpaty – Javořina (7172), 24.IV.2005 – 1 ex. na louce (RE); Strání (7172), 30.V.–2.VII.2002 – 1 ex. a 1. IV.–1.V.2002–1 ex. v zemní pasti (RE); Brumov – Bylnice (7071), 4.VII.–6.VIII.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); Lopeník (7072), 25.V.–30.VI.2004 – 2 ex. a 28.XI.2004–16.IV.2005– 1ex. v zemní pasti (RE); Rudimov (6972), 15.IV.–14.V.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); Bílé Karpaty – Lopata (7072), 20.V.–25.VI.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE); Bílé Karpaty – Lopenické sedlo (7072), 16.IV.–20.V.2005 – 1 ex. v zemní pasti (RE).

Zejména v podhůří rozšířený druh, vzácně i v nižších polohách v nivách vodních toků.

Amara (***Amara***) ***pulpani*** Kult, 1949 – Boh.: Písty (5856), 30.IV.2001 – 1 ex. a 15. V.2003 – 1 ex. pod trsy travin na písku (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR).

Lokální druh suchých lesních stanovišť, zejména světlých suťových lesů, vřesovišť a písčin.

Amara (***Amara***) ***schimperi*** Wencker, 1866 – Mor.: Raškovice (6376), 22.V.2003 – 2 ex. vyhrabány ze štěrku na břehu říčky Morávky (KA lgt. et coll., VE det.) (KA).

Reliktní druh zachovalých štěrkopískových břehů podhorských toků.

Amara (***Amara***) ***spreta*** Dejean, 1831 – Boh.: Vrbová Lhota (5856), 31.III.2002 – 2 ex. v pískovně (MI); Doubrava u Kostomlat (5855), 24.IV.2005 – 1 ex. v okolí pískovny (MI). Mor. Dubňany (7068), 26.IV.2003 – 1 ex. na okraji písčité cesty (RE), 6.VII. 2004 – 1 ex. v písku pod plevelem v listnatém lese (LA).

Lokální a nehojný psamobiont, nejčastěji na lesních písčinách.

Amara (***Bradytus***) ***majuscula*** (Chaudoir, 1850) – Boh.: Jizerské hory, Jizerka (5158), 22.VII.1998 – 1 ex. na světlo v nadmořské výšce 850 m (J. Preisler lgt., VO det. et coll.) (VO).

Eurytopní druh s výskytem téměř výhradně na druhotných stanovištích, zvláště okrajích polí, úhorech, výsypkách a ruderálech. Při přeletech bývá zastižen i v horách.

Amara (***Celia***) ***brunnea*** (Gyllenhal, 1810) – Boh.: Bohuslav (5457), 29.VII. 3. VIII.2001 – 1 ex. (MO); Světlá pod Ještědem – Rozstání, Mazova horka (5255), 6.IX.2003 –2 ex. (VO); Hradec Králové – Plachta (5861), 5.VI.2004 – 1 ex. (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR); Liberec – Vesec, Vesecký Špičák (5256), 30.V.–11.VII.2004 – 1 ex. v ZP (VO); Děčín – Horní Oldřichov (5251), 4.VII.2004 – 2 ex. pod listím při okraji lesa (MO & VO); Vrbka pr. Budyně nad Ohří (5650), 9.VII.2004 – 2 ex. v listnatém lese s břízou (MO); Liberec – Krásná Studánka (5156), 20.V.–27.VI.2005 – 2 ex. v ZP na okraji lesa (VO).

Druh s lokálním výskytem v lesních a hájových porostech s břízami.

Amara (***Celia***) ***erratica*** (Duftschmid, 1812) – Boh.: Frymburk – Vřesná (7351), 5.VII. 1994 – 1 ex. na kamenitém břehu potoka (GR); Krušné hory, Klínovec (5543), VI.2003 – 1 ex. (P. Krásenský lgt., VO det. et coll.) (VO); Knížecí Stolec (7150), 23.V.2006 – 1 ex. a 11. VI.2006 – 1 ex. na kraji lesní cesty v nadmořské výšce 1200 m (GR).

Montánní druh, v Krušných horách velmi vzácný.

Amara (***Celia***) ***praetermissa*** (C. R. Sahlberg, 1827) – Boh.: Liberec – Vesec, Vesecký Špičák (5256), 11.VII.–23.VIII.2004 – 1 ex. v ZP v opuštěném lomu (VO). Mor.: Bystřice pod Lopeníkem (7072), 17.V.2005 – 1 ex. v opuštěném lomu (RE).

Velmi lokální druh, v pahorkatinách a podhůří žije zejména na lesních světlinách a vřesovištích, v horách potom na loukách nad hranicí lesa.

Amara (***Celia***) ***sabulosa*** (Audinet-Serville, 1821) – Boh.: Velemyšleves (5547), 14.IX.2003 – 1 ex. (MO); Sulejovice (5450), 17.V.2003 – 1 ex. na polní mezi u Vchynického potoka, 25.VII.–26.VIII.2003 – 1 ex. v ZP tamtéž (MO). Mor.: Mohelno, Mohelenská hadcová step (6863), 6.VIII.2004 – 1 ex. na světlo (M. Žemlička lgt., MO det. et coll.) (MO).

Vzácnější xerofilní druh teplejších oblastí.

Amara (***Curtonotus***) ***gebleri*** Dejean, 1831 – Boh.: Prácheň (5252), 18.VIII.1989 – 1 ex. na poli (M. Waldhauser lgt., MO det. et coll.) (MO); Libochovice, PR Myslivna (5650), 26.II.1994 – 1 ex. (M. Jaroš lgt. et coll., J. Hejkal det.) (MO); Holubov – Dívčí kámen (7152), 19.VIII.1996 – 2 ex. na okolíku *Daucus carota* (KR); Český Krumlov – Vyšné (7151), 2.VI.2002 – 1 ex. (V. Němec lgt., KR det. et coll.) (KR); Frýdlant, Křížový vrch (5056), 7.V.2004 – 1 ex., 31.V.2004 – 1 ex., oba sesmýkány na podmáčené louce (VO, J. Hejkal revid.) (VO); Jilemnice, Na Kozinci (5359), 1.V.2004 – 2 ex. (VO); Bílý Potok (5157), 19.VIII.2005 – 1 ex. v mokřině na vegetaci (VO, J. Hejkal revid.) (VO); Liberec – Nové Pavlovice (5256), 31.VIII.2005 – 1 ex. na břehu Nisy (VO, J. Hejkal revid.) (VO); Předměřice nad Jizerou (5754), 7.V.–5.VI.2005 – 1 ex. v ZP (MO & VO); Lázně Libverda (5157), 16.V.2006 – 1 ex. pod vegetací na břehu Libverdského rybníka (VO). Mor.: Hodonín – Zbrod (7168), 15.VII.2004 – 2 ex. pod vegetací v sypké půdě u kanálu pod popílkovištěm, 1 ex. immaturní (VE); Tlumačov pr. Zlín (6771), 2.VIII.2005 – 1 ex. na dně vápencového lomu vrchu Křemenná (VE); Víska pr. Litovel (6268), 20.VII.2006 – 1 ex. pod vegetací na okraji louky u ramena řeky Moravy (VE).

Lokální druh vlhčích stanovišť, typický zejména pro okolí vodních toků v podhůří.

Amara (***Zezea***) ***tricuspidata*** Dejean, 1831 – Mor.: Čejč (7067), 29.V.1999 – 1 ex. na Mansonové stepi (KM), 21.V.2005 – 1 ex. na vinici (J. Gahai lgt. et coll., GR det.) (GR); Bulhary – Křivé jezero (7166), 27.III.2000 – 1 ex. (KM); Újezdec u Luhačovic (6972), 29.V.2003 – 1 ex. na květenství *Apera spica-venti*. Nový druh pro Uherskobrodsko (LA); Miroslav – Miroslavské kopce (7063), 31.V.2004 – 4 ex. (KR); Bystřice pod Lopeníkem (7072), 17.V.2005 – 1 ex. na okraji pole (RE); Vrbovec – Vrbovecký rybník (7262), 27.V.2005 – 2 ex. na poli (KR); Oleksovice – Oleksovická mokřina (7063), 27.VI.2005 – 5 ex. na poli (KR).

Druh s lokálním výskytem na přírodně zachovalejších lokalitách, v posledních letech přibývá nálezů, nejspíše v důsledku změn v zemědělství.

Zabrus (***Pelor***) ***spinipes spinipes*** (Fabricius, 1798) – Mor.: Úvaly pr. Valtice (7266), 31.III.2002 – 2 ex. v zemi a pod travou na okraji vápencové stepi (LA), 2.V.–5.VI.2004 – 5 ex. v zemní pasti (RE); Pálava – Soutěska (7165), 25.IX.2004 – 1 ex. na stepi (Hlásek lgt., KR det. et coll.); Miroslav – Miroslavské kopce (7063), 5.V.2005 – 2 ex. (KR).

Reliktní brachypterní stepní druh vinařských oblastí.

Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) – Boh.: Třtěno, Třtěnské stráně (5549), 12.V.2005 – 1 ex. (VO); České středohoří, vrch Raná (5548), 17.V.2005 – 1 ex. (VO). Mor.: Mušov (7165), 22.V.2005 – 1 ex. pod kamenem na zavezené skládce (GR); Bořetice (7167), 21.VII.2006 – 1 ex. na světlo (RE).

Druh vázaný především na volné vysýchavé jílovité půdy, v jejichž puklinách žije. Lokálně na stepích a na loukách a pastvinách v okolí řek s přirozeným vodním režimem. Z Čech je známo mnohem více nálezů než z Moravy.

ERRATA

Veselý et al. (2002: 105) – „*Harpalus xanthopus winkleri* Schauberger, 1923 – Boh.: Praha – Lochkov, PP Lochkovský profil [(5952)], 9.VI.1999 – 1 ♀ na okraji pole (MO)“. Údaj se týká exempláře druhu *Harpalus luteicornis* (Duftschmid, 1812) se slabým, ale zřetelným zubem brady (MO redet.) (MO).

LITERATURA

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1988). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni,* 6–7: 13-31 (in Czech, German title).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk za rok 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1989 und der Nachtrag zu den Funden im Jahre 1988). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni,* 8: 19-40 (in Czech, German summary).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1990 and supplement of prior period collections). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni, Series Carabidologica,* 1: 9-40 (in Czech, English summary).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1991 and supplementary data of prior period collections). *Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol. v Plzni, Series Carabidologica,* 2: 15-30 (in Czech, English summary).

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (eds.) 2005: *Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates*. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp (in Czech and English).

GEBERT J. 2006: Die Sandlaufkäfer und Laufkäfer von Sachsen. Teil 1 (Carabidae: Cicindelini – Loricerini). In: KLAUSNITZER B. & REINHART R (eds.): Beiträge zur Insektenfauna Sachsens, Band 4. *Entomologische Nachrichten und Berichte,* Beiheft 10: 1-180.

HEYROVSKÝ L. 1963: Další příspěvek k faunistice a bionomii československých Coleopter. *Acta Musei Reginaehradecensis,* 4 (1962): 89-95 (in Czech).

HŮRKA K. 1996: *Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky*. Kabourek, Zlín, 565 pp (in English and Czech).

KALÁB J. 2000: Několik zajímavějších nálezů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z území České republiky. (Several interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic). *Klapalekiana*, 36: 261-274 (in Czech, English abstr.).

KIRCHNER A. 1858: Die Coleopteren der Umgegend von Kaplitz. *Lotos*, 8: 38-40, 56-64, 87-89, 126-133, 180-182, 201-203.
KITTNER T. 1867: Verzeichniss der bei Boskowitz aufgefundenen Coleopteren. *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, 5 (1866): 114-149.
LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2003*: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1: Archostemata – Myxophaga – Adephaga*. Apollo Books, Stenstrup, 819 pp.
MORAVEC J. & DVOŘÁK L. 2000: Další nálezy střevlíka Amara nigricornis (Coleoptera: Carabidae) na Šumavě. (Further records of a carabid beetle Amara nigricornis (Coleoptera: Carabidae) from Bohemian Forest). *Silva Gabreta*, 5: 233-234 (in Czech).
MORAVEC P., VONIČKA P., ŠŤASTNÝ J. & KRÁSENSKÝ P. 2006: Výsledky faunisticko-ekologického průzkumu brouků čeledí Carabidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Staphylinidae, Dryopidae a Heteroceridae (Coleoptera) mokřadních biotopů v okolí skládky toxických odpadů v Chabařovicích, sz. Čechy. (Results of the faunistic and ecological research of families Carabidae, ...and Heteroceridae (Coleoptera) of the swamp biotopes in the vicinity of the toxic waste dump in Chabařovice, northwestern Bohemia). *Sborník Oblastního Muzea v Mostě, Řada Přírodovědná*, 28: 23-46 (in Czech, English summary).
PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana*, 32 (Suppl.): 1-115 (in Czech, English abstr.).
PULPÁN J. 1993: *Prodromus střevlíkovitých brouků Československa.* (*Prodromus of the ground beetles of Czechoslovakia*). Unpubl. msc., dep. in coll. P. Veselý, Praha, 2097 pp (in Czech).
REJSEK J. 1999: Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice – Mladá. (Carabidae (Coleoptera) from the former military ranges at Milovice – Mladá). *Vlastivědný Zpravodaj Polabí*, 33: 170-192 (in Czech, English summary).
SKOUPÝ V. 2004: *Střevlíkovití brouci* (*Coleoptera: Carabidae*) *České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána. Ground beetles* (*Coleoptera: Carabidae*) *of the Czech and Slovak Republics of Jan Pulpan´s collection*. Public History, Praha, 213 pp. + CD-ROM (in Czech and English).
VESELÝ P. & TĚŤÁL I. 1998: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska v letech 1992–96 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from Bohemia, Moravia and Slovakia in the years 1992–96 and supplementary data on earlier records). *Klapalekiana*, 34: 99-131 (in Czech, English summary).
VESELÝ P., RESL K. & TĚŤÁL I. 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 1997-2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from the Czech Republic in the years 1997-2001 with supplementary pre-1997 data). *Klapalekiana*, 38: 85-109 (in Czech, English summary).

SUMMARY

We present findings of 212 species of ground beetles that are either rare, were collected in an unusal habitat or under otherwise interesting circumstances or their distribution in the Czech Republic is insufficiently known. Notes on the biology and distribution of some species are included.

The following records are particularly interesting: we confirm the presence of *Bembidion velox* (Linné, 1761) in the Czech Republic (Bohemia) after nearly 100 years and of *Harpalus hirtipes* (Panzer, 1796) in Bohemia after 33 years. *Trechus pulchellus* Putzeys, 1846 is recorded as new for Austria.