# EUXOA VITTA [ESP.], VZÁCNÁ MŮRA PRAŽSKÉHO OKOLÍ A EUXOA HASTIFERA [DONZ.], NOVÝ DRUH PRO ČESKO-SLOVENSKO [LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE]

Jaroslav Wichra

Skupina druhů *Euxoa vitta* [Esp.], *E. hastifera* [Donz.], *E. aquilina* [Den. et Schiff.], *E. segnilis* [Dup.], *E. obelisca* [Den. et Schiff.] a *E. tritici* [L.] s různými formami jsou i pro zkušené entomology velkým problémem, a proto také starší údaje v naší literatuře musíme brát s rezervou. Brněnští entomologové J. STARÝ a J. MAREK [1966: 77] uvedli, že dne 17. srpna 1965 v Borkovicích u Piešťan byl chycen samec *E. vitta,* a že v mém článku [WICHRA, 1949: 175, sub *Agrotis vitta* Hb.] jde o nesprávnou determinaci tohoto druhu, který "je nutno zatím ze seznamu českých motýlů vypustit."

V letech 1967 a 1968 jsem se zaměřil na studium této skupiny a chytil a vychoval jsem větší množství jedinců *Euxoa vitta* [Esp.]. Správná determinace byla potvrzena ve Vídni Dr. Kasym a Ing. Pinkerem a v poslední době i Dr. Boursinem z Paříže.

Exemplář z Borkovic u Piešťan ulovený 17. 9. 1965 byl určen jako *Euxoa hastifera* [Donz.], což je nový druh pro Československo. Nejblíže se vyskytuje v Rakousku [KASY 1965].

Údaje o výskytu *E. vitta* [Esp.] na Slovensku [HRUBÝ 1964] jsou z r. 1901 až 1902 [Bratislava, Trnava, Prešov] a nebyly později potvrzeny. Po svém studiu lokalit v pražském okolí docházím k závěru, že není vyloučen výskyt této můry na Děvínské Kobyle u Bratislavy. Z Moravy není hlášena, ale podle mého názoru je výskyt možný v okolí Brna [Hády, Říčky, kde jsou podmínky takřka ideální].

V Čechách pokládám údaje ve STERNECKOVĚ Prodromu [1929] [Bráník 1889, Srdínko e.l.; Prokop 7. 9. 1875, Nickerl] za velmi pravděpodobné, i když jsem uvedené exempláře neviděl. V okolí Prahy jsem chytil *E. vitta* [Esp.] u Prokopa, v Řepory jích, Rado-

tíně, Srbsku a Karlštejně. Létá jednotlivě, od srpna až do poloviny září, vyhledává vápencové skály a na jedné lokalitě žije společně s vzácnými druhy *Derthisa glaucina* [Esp.] a *Palluperina nickerlii* [Frr.].

Dorostlá housenka je podobná druhům *E. obelisca, nigricans, tritici,* je relativně největší, ostřeji kreslená a nejsvětlejší. Za dne se pečlivě ukrývá a v noci ožírá k zemi přilehlé listy různých nízkých rostlin, hlavně Salvia, Verbascum, Seseli a Stachys. V zajetí přijímá s oblibou Tussilago farfara. Kuklí se nehluboko v zemi.

## Zusammenfassung

### EUXOA VITTA [ESP.], EINE SELTENE EULE DER PRAGER UMGEBUNG UND EUXOA HASTIFERA [DONZ.], EINE NEUE ART FÜR DIE TSCHECHOSLOWAKEI. [LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE]

*Euxoa hastifera* [Donz.] wurde bei Borkovice [Piešťany, West-Slowakei] am 17. 9. 1965 gefangen; es ist der erste Fund dieser Art in der Tschechoslowakei. *Euxoa vitta* [Esp.] habe ich mehrmals in der Umgebung von Prag im August bis Mitte September 1967 und 1968 gefangen und habe diese Art auch gezüchtet. Die Raupe frisst nur nachts und zwar die der Erde anliegenden Blätter von Salvia, Verbascum, Seseli, Stachys; in der Gefangenschaft Tussilago farfara. Sie verpuppt sich nicht tief in der Erde.

## Literatura

HRUBÝ K., 1964: Prodromus Lepidopter Slovenska. NČSAV, Bratislava. - KASY F., 1965: Zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna des östlichen Neusiedlersee-Gebietes. Wien. Ent. Ztschr. - STARÝ J. et MAREK J., 1966: Zprávy Čs. spol. ent. při ČSAV, 2: 77-92. - STERNECK J., 1929: Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmen. Karlsbad. - WICHRA J., 1949: Nová naleziště vzácnějších motýlů v Čechách. Čas. Čs. spol. ent., 46: 173-180.