

## FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 330

## Coleoptera: Chrysomelidae

*Aphthona flaviceps* Allard, 1859. Moravia mer. or., Uherský Brod (6971), 24.ix.2011, 4 ♂♂, 5 ♀♀, K. Resl (Šumice) lgt., det. et coll.; 4.x.2011, 3 ♂♂, 4 ♀♀, P. Jáchymek (Luhačovice) lgt., det. et coll.; 6.x.2011, 9 ♂♂, 11 ♀♀, P. Jáchymek lgt., det. et coll.; 13.x.2011, 8 ♂♂, 11 ♀♀, F. Urbánek (Uherský Brod) lgt., det. et coll.; 15.x.2011, 2 ♀♀, P. Jáchymek lgt., det. et coll.; 18.x.2011, 3 ♀♀, P. Jáchymek lgt., det. et coll.; 27.x.2011, 1 ♂, P. Jáchymek lgt., det. et coll.; 27.x.2011, 1 ♂, 1 ♀, F. Urbánek lgt., det. et coll.; 30.x.2011, 1 ♀, P. Jáchymek lgt., det. et coll.; 19.xi.2011, 1 ♂, K. Resl lgt., det. et coll. All specimens collected on *Tithymalus platyphyllos*. Distribution: Europe: Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, France, Greece, Hungary, Italy, Malta, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine; Asia: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Cyprus, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Syria, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan; Africa: Algeria, Egypt, Tunisia (Gruev & Döberl 1997, 2005; Čížek & Doguet 2008, Döberl 2010). The species has already been reported from the Czech Republic by Klima (1902) and Fleischer (1927–1930), but probably based on a misidentification. Confirmed occurrence in the Czech Republic.

*Longitarsus agilis* (Rye, 1868). Moravia mer. or., Uherský Brod (6971), 11.ix.2011, 1 ♀, F. Urbánek lgt., det. et coll.; 17.ix.2011, 1 ♀, F. Urbánek lgt., det. et coll.; 22.ix.2011, 1 ♀, F. Urbánek lgt., det. et coll.; 24.ix.2011, 1 ♀, K. Resl lgt., det. et coll.; 4.x.2011, 1 ♀, P. Jáchymek lgt., det. et coll.; 4.x.2011, 1 ♀, K. Resl lgt., det. et coll.; 16.x.2011, 1 ♀, F. Urbánek lgt., det. et coll.; 18.x.2011, 1 ♂, 1 ♀, P. Jáchymek lgt., det. et coll.; 19.x.2011, 2 ♂♂, 2 ♀♀, P. Jáchymek lgt., det. et coll.; 21.x.2011, 4 ♀♀, F. Urbánek lgt., det. et coll.; 23.x.2011, 3 ♂♂, 8 ♀♀, P. Boža (Olomouc) lgt., det. et coll.; 23.x.2011, 6 ♂♂, 1 ♀, P. Jáchymek lgt., det. et coll.; 23.x.2011, 11 ♂♂, 15 ♀♀, K. Resl lgt. et det., P. Čížek et K. Resl coll.; 26.x.2011, 4 ♂♂, 4 ♀♀, K. Resl lgt., det. et coll.; 27.x.2011, 1 ♂, 2 ♀♀, P. Jáchymek lgt., det. et coll.; 27.x.2011, 4 ♂♂, 5 ♀♀, F. Urbánek lgt., det. et coll.; 30.x.2011, 5 ♂♂, 7 ♀♀, P. Jáchymek lgt., det. et coll.; 3.xi.2011, 17 ♂♂, 21 ♀♀, P. Čížek lgt., det. et coll., 1 ♂, 1 ♀ revid. et coll. M. Döberl (Abensberg); 19.xi.2011, 1 ♂, 1 ♀, K. Resl lgt., det. et coll.; 10.xii.2011, 5 ♂♂, 6 ♀♀, K. Resl lgt. et det., P. Čížek et K. Resl coll. All specimens collected on *Scrophularia umbrosa*. Distribution: Europe: Belgium, Great Britain, France, Germany and the Netherlands (Gruev & Döberl 1997, 2005; Čížek & Doguet 2008, Döberl 2010). New species for the Czech Republic.

*Minota carpathica* Heikertinger, 1912. Bohemia or., Dolní Morava (5866), 15.vi.2010, 2 ♂♂, P. Čížek lgt., det. et coll. Distribution: Europe: Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland and Ukraine (Gruev & Döberl 1997, 2005, Döberl 2010). In the Czech Republic only known from Moravia (Biondi 1986, Strejček 1993, Čížek & Doguet 2008). New species for Bohemia.

*Neocrepidodera crassicornis* (Faldermann, 1837). Moravia mer., Dolní Dubňany (6963), Ve Žlebě Nature Reserve, 9.ix.2009, 1 ♂, 1 ♀, P. Baňar et I. Malenovský lgt., coll. J. Bezděk (Brno), P. Čížek det. Distribution: Europe: Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, France, Hungary, Italy, Macedonia, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Ukraine; Asia: "Caucasus", Kazakhstan and Turkey (Gruev & Döberl 1997, 2005; Čížek & Doguet 2008, Döberl 2010). New species for the Czech Republic.

BIONDI M. 1986: Lo status sistematico del complesso *Minota obesa*: un approccio morfologico, statistico e biografico (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* **86**: 45–64. – ČÍZEK P. & DOGUET S. 2008: *Klíč k určování dřepčiků (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) Česka a Slovenska*. [Key for the identification of the flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) of the Czech and Slovak Republics]. Městské muzeum, Nové Město nad Metují, 232 pp. (in Czech). – DÖBERL M. 2010: Alticinae. Pp. 491–563. In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrysomeloidea*. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp. – FLEISCHER A. 1927–1930: *Přehled brouků fauny československé republiky*. [Overview of the Beetle Fauna of the Czechoslovak Republic]. Moravské muzeum Zemské, Brno, 483 pp. (in Czech). – GRUEV B. & DÖBERL M. 1997: General Distribution of the Flea Beetles in the Palearctic Subregion (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae). *Scopelia* **37**: 1–496. – GRUEV B. & DÖBERL M. 2005: *General Distribution of Flea Beetles in the Palearctic Subregion (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae). Supplement*. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, 239 pp. – KLIMAA. 1902: *Catalogus insectorum faunae bohemicae, VI. Die Käfer (Coleoptera)*. Verlag der Gesellschaft für Physiokratie in Prag, Praha, 120 pp. (in German). – STREJČEK J. 1993: *Faunistické, bionomické a taxonomické poznámky k mandelinkovitým (Chrysomelidae s.lat.) a nosatcovitým (Curculionidae s.lat.) České a Slovenské republiky (Coleoptera)*. (Faunistische, bionomische und taxonomische Bemerkungen zu den Familien Chrysomelidae s.lat. und Curculionidae s.lat. aus der Tschechischen und Slowakischen Republik (Coleoptera). *Klapalekiana* **29**: 131–135 (in Czech, German abstract).

Petr ČÍZEK, Nádražní 55, CZ-564 01 Žamberk, Czech Republic;  
e-mail: cizek@orlicko.cz