HOLCOCRANUM SATUREJAE [KOLENATI, 1861], NOVÝ DRUH A ROD PRO ÚZEMÍ ČECH [HETEROPTERA - LYGAEIDAE].

Otakar Kubík

Podčeleď Artheneinae byla na území Čech zjištěna dosud jen v jednom druhu a rodu, a to *Chilacis typhae* [Perr.]. Nález *Holcocranum saturejae* [Kolenati, 1861] doplňuje faunu Heteropter Čech o další druh a rod této podčeledi. Našel jsem jej v jednom exempláři [♂] při průzkumu lokalit druhu *Chilacis typhae* [Perr.] v okolí Kolína u Velkého Oseka 18.11.1969.

V době nálezu byla na stanovišti u lužního lesa západně od Velkého Oseka tůň již vyschlá a palice porostu orobince *(Typha latifolia* L.*)* se rozpadaly. V nich právě byl uvedený exemplář [ve společnosti 4 ♂ a 8 ♀ *Chilacis typhae* [Perr.] nalezen. Přestože teplota byla jen asi +5°C, byly všechny exempláře velmi pohyblivé. Larvy nalezeny nebyly. Na dalších lokalitách, kde byl *Chilacis typhae* [Perr.] u Kolína sbírán [v Telčicích u Chvaletic 15.10.1967, 4 ♂, 2 ♀, u vesnice Mikuláš u Starého Kolína 18.5.1969, 2 ♀, 1.11.1969, 3 ♂, 4 ♀ druh *Holcocranum saturejae* [Klti.] nalezen nebyl.

Holcocranum saturejae [Klti.] je všeobecně jen řídce sbírán. GULDE [1936] uvádí jeho rozšíření ze Středomoří, jižního Ruska, Kavkazu; v jižní Francii byl nalezen jedenkráte u Avignonu. V území Dunaje zasahuje až k Budapešti. STICHEL [1956] uvádí Maroko, jižní Francii, Sardinii, Itálii, Jugoslávii, Maďarsko, Rumunsko a jižní Rusko. Nález Jordanův [Lužice: Neudorf Spree, Klein Saubernitz], jediný z Německa, odmítá jako omyl. KIRIČENKO uvádí území dolního Dněpru, dolní Volhy a Krymu. WAGNER [1966] uvádí jižní Evropu a část Středomoří a z Německa cituje uvedený nález Jordanův z Lužice.

Z Československa je možno citovat dosud jen údaj STEHLÍKŮV [1963] o nálezu ze Slovenska: Bujačí vrch v Belanských Tatrách. Nález v Čechách posunuje tudíž hranici výskytu *H. saturejae* [Klti.] dále na sever a průkazně potvrzuje názor, jejž v uvedené práci vyslovil STEHLÍK [1963], že pochybnost STICHELOVA [1956] o správnosti nálezu Jordanově v Lužici je neopodstatněná.

Panu Dr. J. Stehlíkovi, CSc., děkuji za cenné informace, které mi ochotně pro tuto práci poskytl.

Zusammenfassung

HOLCOCRANUM SATUREJAE [KLTI.] EINE NEUE ART UND GATTUNG FUR BÖHMEN [HETEROPTERA - LYGAEIDAE].

Es wird der erste Fund von *H. saturejae* [Kolenati, 1861] aus Böhmen gemeldet und zwar aus der Umgebung von Velký Osek bei Kolín. Diese Art wurde in Gesellschaft von vielen *Chilacis typhae* [Perr.] in teilweise zerfallenen Kolben von *Typha latifolia* L. am 18.11.1969 gefunden.

Der Autor, ebenso wie Stehlík, i.l., lehnen auf Grund dieses Fundes die Ansicht STICHELS [1956] ab, dass die Angabe von Jordan aus Deutschland [Lausitz] irrtümlich sei.

Literatura

Gulde J., 1936: Die Wanzen Mitteleuropas V: 62. Frankfurt a.M. - Kiričenko A.N., 1951: Nastojaščije polužestkokrylyje jevropejskoj časti SSSR: 274. Moskva-Leningrad. - Stehlík J.L., 1963: Zajímavé nálezy Heteropter na Moravě a na Slovensku V. Časopis Moravského muzea XLVIII: 157. - Stichel E., 1956: Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen IV: 130. Berlin-Hermsdorf. - Wagner E., 1966: Wanzen oder Heteropteren in Die Tierwelt Deutschlands, Teil 54: 274. Jena.