

**Nové a zajímavé nálezy tesaříkovitých (Coleoptera: Cerambycidae)
na severní Moravě****New and interesting records of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae)
in northern Moravia**

Ondřej SABOL

Foksova 19, CZ–724 00 Ostrava-Nová Bělá, Czech Republic;
email: ondrej.sabol@seznam.cz**Faunistics, Coleoptera, Cerambycidae, northern Moravia, Czech Republic, Central Europe**

Abstract. Data on the distribution of 56 species of longhorned beetles obtained during the last 50 years are presented. Four species are recorded for the first time from the studied area: *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763), *Clytus tropicus* (Panzer, 1795), *Axinopalpis gracilis gracilis* (Krynicky, 1832) and *Gracilia minuta* (Fabricius, 1781). A further twenty four species are recent additions, have been recently confirmed after many years, or have very few recent records: *Anoplodera sexguttata* (Schaller, 1775), *Grammoptera ustulata* (Schaller, 1783), *G. abdominalis* (Stephens, 1831), *Pedotrangalia revestita* (Linnaeus, 1767), *Cortodera femorata* (Fabricius, 1787), *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839), *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758), *R. ungaricus* (Herbst, 1784), *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763), *Isotomus speciosus* (D. H. Schneider, 1787), *Rosalia alpina alpina* (Linnaeus, 1758), *Acanthocinus aedilis* (Linnaeus, 1758), *Agapanthia dahl*i (C. F. W. Richter, 1820), *Calamobius filum* (Rossi, 1790), *Anaesthetis testacea testacea* (Fabricius, 1781), *Mesosa nebulosa nebulosa* (Fabricius, 1781), *M. curculionoides* (Linnaeus, 1760), *Monochamus galloprovincialis pistior* (Germar, 1818), *Phytoecia icterica* (Schaller, 1783), *P. nigricornis* (Fabricius, 1781), *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767), *E. punctipennis* Mulsant et Guillebeau, 1856, *Menesia bipunctata* (Zoubkoff, 1829) and *Saperda punctata* (Linnaeus, 1767). These are listed here, as well as rare or locally scarce species.

ÚVOD

Předkládaná práce doplňuje současně faunistické informace o rozšíření a výskytu tesaříkovitých v České republice. Autor tak navazuje na již dříve publikované rozsáhlejší práce Reittera (1870, 1912), Letznera (1871), Fleischera (1927–1930), Heyrovského (1930, 1955), Slámy (1998), ale také na menší zprávy či články týkající se především sledovaného území: Hlissnikovský (1958), Kudla (1966), Koloničný & Stanovský (1975), Navrátil (1975), Malec (1976), Vavroušek (1978a, 1978b), Vysoký (1993), Šigut (1996), Szopa (2002, 2009), Kočárek (2005), Sabol & Boščík (2007), Foit (2009), Kašák & Gabriš (2011), Sabol (2012) a Šuhaj & Šuhaj (2012). Uvedeny jsou druhy, které jsou pro tuto oblast nové nebo po řadu desítek let nenalezené. Jsou zmíněny i vzácnější druhy nebo méně hojné, které se zde vyskytují spíše jednotlivě.

CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Sledovaná oblast (obr. 1) se nachází na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Její hranice vychází z práce (Stanovský & Pulpán 2006). Je vymezena linií od jihu Rychlebských hor po státní hranici a jihovýchodním směrem úpatím Hrubého Jeseníku po Starou Ves a Rýmařov, dále úpatím Nízkého Jeseníku po Moravský Beroun, odsud po řece Bystřici a po jižním úpatí Nízkého Jeseníku východně po Moravskou bránu. Linie pokračuje od Hranic na Moravě proti proudu Bečvy po Valašské Meziříčí a odtud proti proudu Rožnovské Bečvy jejím údolím až na hře-

ben na státní hranici na Horní Bečvě. V zeměpisných souřadnicích je zájmové území vymezeno zeměpisnou šířkou 49°23'63" – 50°26'45" a zeměpisnou délkou 16°51'20" – 18°51'43". Jedná se o značně členité území s výškovým rozpětím od 192 m (řeka Odry na státní hranici u Bohumína) po 1492 m (vrchol Pradědu).

Území zahrnuje jak horské oblasti Jeseníků a Beskyd s vysokou lesnatostí, tak území říčních niv Bečvy, Odry, Ostravice nebo Morávky s fragmenty lužních lešů v jinak intenzivně obhospodařované krajině. Vysokou lesnatostí se vyznačuje rovněž pahorkatinné území Nizkého Jeseníku a Oderských vrchů s hluboce zařezanými údolími řek Moravice a Bystřice. Méně lesnatá a zemědělsky využívaná je Podbeskydská pahorkatina. Pokud jde o míru ovlivnění člověkem, tak Ostravská pánev patří mezi nejvíce pozměněnou část území. Má vysokou míru antropogenní zátěže v souvislosti s těžbou černého uhlí a rozsáhlou průmyslovou výrobou.

MATERIÁL A METODIKA

V práci jsou předloženy faunistické údaje získané za posledních 50 let z území severní Moravy.

Tato data byla sestavena na základě studia muzejního materiálu, soukromých sbírek a vlastních sběrů autora příspěvku. Dokladový materiál byl získán klasickými sběrnými metodami – individuálním sběrem imag na květech nebo na dřevu, smýkáním travní vegetace a smýkáním či oklepem keřového podrostu a stromů. Několik druhů bylo také uloveno do „závěsných stromových pastí“, tj. do plastových lahví s návnadou extraktu z kvasícího ovoce, umístěných ve většině případů na kmenech stromů. Další použitou metodou byl odchov imag z larev a kulek. Ty byly sbírány převážně v podzimních a zimních měsících v zaschlých nebo zavadajících kmenech a větvích. Determinaci, případně revizi dokladových exemplářů provedli kromě autora článku také další níže uvedení sběratelé.

Předkládané údaje mají v textu následující strukturu. U každého druhu jsou uvedeny, pokud jsou známy, literární údaje ze sledované oblasti. Následuje přehled nálezů se všemi zjištěnými údaji, včetně okolností sběrů. K lokalitám jsou přiřazena čísla faunistických čtvrců podle Prunera & Míky (1996). Řazeny jsou od severu k jihu a od západu k východu a u stejného čísla čtvorce podle data sběru od nejstaršího nálezu. Pokud je daná informace dostupná, je uvedena také nadmořská výška. Následuje datum sběru s počtem ulovených exemplářů a okolnostmi nálezu, zkratka sběratele, determinátora a sbírky. Není-li za zkratkou sběratele uvedeno nic dalšího, platí pro něj lgt., det. et coll. V komentáři je hodnoceno rozšíření, které se vztahuje pouze na území severní Moravy, někdy doplněné bionomickými poznámkami. Pokud je druh zařazen do některé z kategorií ohrožení podle Červeného seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005), je toto uvedeno na konci komentáře. Nomenklatura a systematické řazení druhů je převzato z práce Sama & Löbl (2010).

Použité zkratky

a) zkratky sběratelů a sbírek: AP – Antonín Peutlschmid (Olomouc); AS – Aleš Sedláček (Hranice na Moravě); BB – Boris Bubeník (Frýdek-Místek); BK – Bohumil Kočenda † (Odry); BM – Bořivoj Malec (Šumperk); DH – David Hřebeň (Prostřední Suchá); DO – Karel Doležel (Olomouc); DV – Dušan Vacík (Hranice na Moravě); EH – Ervin Hudeček † (Ostrava-Hošťálkovice); FP – František Petřík † (Jablunkov-Košaršiska); FT – Filip Trnka (Rychnov nad Kněžnou); IB – Ivo Boščík (Skalice u Frýdku-Místku); IJ – Ivo Jeniš (Náklo); JD – Jiří Drašner (Ostrava); JF – Jiří Flanderka (Ostrava); JJ – Jiří Janeček (Ostrava); JK – Jiří Káňa (Haviřov); JN – Jan Novák (Hranice na Moravě); JS – Jiří Stanovský (Ostrava); JT – Jiří Tomčík (Ostrava); JV – Jiří Vávra (Ostrava); JZ – Jaroslav Žák (Jezernice); KD – Stanislav Kadlec † (Litvínov); KL – Libor Klíma (Ostrava); KN – Květoslav Novák (Jeseník); KS – Josef Kašák (Vrbno pod Pradědem); KW – Karel Wiecek (Ostrava); LH – Lubomír Honč (Štěpánkovice); LK – Lubomír Koloničný (Ostrava); LM – Libor Mikulénka (Krnov); LT – Ladislav Tomečka (Drahotuše); MB – Muzeum Beskyd Frýdek-Místek; MJ – Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník; MM – Marion Mantič (Hlučín-Bobrovniky); MR – Magdaléna Roháčová (Frýdek-Místek); MU – Martin Jůza (Ostrava); MV – Michal Vrána (Vrbno pod Pradědem); OK – Ondřej Konvička (Zlín); OM – Ostravské muzeum, Ostrava; OS – Ondřej Sabol (Ostrava-Nová Bělá); PB – Petr Boža (Olomouc); PK – Petr Kočárek (Ostrava); PS – Petr Švácha (České Budějovice); PZ – Petr Zajiček (Zábřeh na Moravě); RD – Roman Dvořák (Neratovice); RG – Radim Gabriš (Skorošice); RS – Radim Šigut (Paskov); RV – Radovan Veigler (Olomouc); SB – Radim Šumbera (Ostrava); SH – Jiří Šuhaj (Bohumín); SJ – Jan Sitek (Frýdek-Místek); SK – Stanislav Krejčík (Ruda u Rýmařova); SL – Antonín Šlachta † (Otice u Opavy); SZ – Richard Szopa (Bystřice nad Olší); TS – Tomáš Sitek (Ostrava); VH – Vladimír Holec (Olomouc); VK – Vratislav Kiška † (Opava); VS – Vladimír Šima (Bruntál); VU – Vladimír Šušák (Frýdek-Místek); ZM – Zdeněk Malinka (Opava); ZS – Zbyšek Smutný (Ostrava).

b) ostatní zkratky: det. – determinoval; coll. – sbírka; env. – okolí; ex. – exemplář; ex l. – vychováno z larvy; ex p. – vychováno z kukly; ex pr. – vychováno z praeupy (předkukelní stádium), datum přiřazené k těmto posledním třem zkratkám je datem sběru larvy, praeupy nebo kukly, nikoliv datem líhnutí imaga; lgt. – sbíral; observ. – pozoroval; revid. – revidoval; MS Beskydy – Moravskoslezské Beskydy; NPP – národní přírodní památka; NPR – národní přírodní rezervace; PP – přírodní památka; PR – přírodní rezervace.

VÝSLEDKY

***Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763)**

Materiál a pozorování: Ostrava-Kunčice (6275), V.2006, 1 ♂, v areálu podniku Arcelor Mittal nalezeno uhynulé „uschlé“ imago u balíku dřeva dovezeného zřejmě na podzim roku 2005, JD lgt. et pers. comm., OS det. et coll.; Frýdek-Místek (6376), 29.VII.2010, 1 ♂, na keři při okraji bukového porostu Frýdeckého lesa, J. Bubeníková lgt., BB det. et coll.

V případě nálezu v areálu Arcelor Mittal jde z největší pravděpodobnosti o zavlečený exemplář ze Slovenska, odkud bylo dřevo dovezeno. Velmi vzácný a polyfágní druh. První nálezy na severní Moravě.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „ohrožený“.

***Anoplodera sexguttata* (Schaller, 1775)**

Literární údaje: Reitter (1870): pohoří Praděd; Heyrovský (1930): Lysá hora, Frýdlant; Kudla (1955): Hlubočky; Sláma (1998): udáván ze čtverců 5772, 6369, 6370, 6470 a 6476.

Materiál a pozorování: Skorošice env., PR Lánský luh (5668), 9.VI.2006, 1 ex., na květu Apiaceae; Žulová (5668), 12.VI.2011, 1 ex., na travním podrostu, vše RG; Třemešná (5771), 22.V.2002, 1 ex., SK; Podhoří (6471), 7.VI.1998, 1 ex., na květu Apiaceae, JZ; Teplice nad Bečvou (6472), 22.VI.2010, 3 ex., na květech v okolí Hranické propasti, ZM; Lučice (6473), VI.2010, více ex., na květech Apiaceae kolem Lučického potoku, IJ.

Vzácný, spíše jednotlivě se vyskytující druh. První nálezy ze čtverců 5771, 5868, 6471, 6472 a 6473.

***Grammoptera ustulata* (Schaller, 1783)**

Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6370.

Materiál a pozorování: Ostrava-Plesná (6174), ex l. 22.XII.1993, 1 ex., ZS lgt., JV det., coll. ZS; Ostrava-Ludgeřovice (6175), 7.V.2010, 1 ex., sklepán z *Quercus robur* v Ludgeřovickém lese, JF; Polanka nad Odrou (6275), ex p. 26.III.2003, 1 ♂ 1 ♀; 9.V.2003, 2 ex.; 11.V.–2.VI.2005, 1 ex., v závěsné stromové pasti, vše OS; Suchdol nad Odrou env., PR Bařiny (6373), 20.V.2011, 1 ex., na květu Apiaceae, KS.


Vzácný. Recentně doložený po více než 40 letech. První nálezy ze čtverců 6174, 6175, 6275 a 6373.

***Grammoptera abdominalis* (Stephens, 1831)**

Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6274; Sabol & Boščík (2007): Havířov-Suchá (6176), Paskov (6275), Šenov (6276).

Materiál a pozorování: Ostrava-Ludgeřovice (6175), 5.V.2012, 1 ex., na květu *Vigna brizoides* v Ludgeřovickém lese, JF; Polanka nad Odrou (6275), ex p. 26.III.2003, 6 ♂♂ 5 ♀♀; ex l. 28.III.2012, 1 ♀; Ostrava-Hrabová (6275), ex p. 17.II.2004, 2 ♀♀ (1 ♀ aberace *nigrescens*), v okolí rybníku Pilík; Ostrava-Nová Bělá (6275), ex pr. 19.XI.2008, 1 ♂ 1 ♀, vše OS.

Nehojný druh dubových, převážně nížinných porostů. Je vázaný na odumřelé větve dubu (*Quercus* sp.) napadené houbou *Vuilleminia comedens* (Sláma 1998). Další doložené nálezy pro sledovanou oblast a první údaj ze čtverce 6175.



Obr. 1: Mapa sledovaného území.
Fig. 1: Map of the observed territory.

***Judolia sexmaculata* (Linnaeus, 1758)**

Literární údaje: Heyrovský (1930, 1955), Vysoký Jeseník, Beskydy; Vysoký (1993): údolí potoku Černé Ostravice u obce Bílá; Sláma (1998): udáván ze čtverců 5769, 5866, 5868, 5869, 5968, 5969, 6068, 6476, 6477 a 6576; Szopa (2002): Košariska (6477), Girová (6478).

Materiál a pozorování: Hrubý Jeseník, Jeseník env., NPR Rejvíz (5769), 20.VI.1998, 3 ex., KS; Hrubý Jeseník, Vidly env., Malý Jezerník (hora) (5869), 18.VII.1976, více ex.; Hrubý Jeseník, Vidly env., Malý Děd (hora) (5869), 6.VII.1995, 3 ex.; 4.VII.2006, 2 ex., vše na květech, vše PZ; Hrubý Jeseník, Bílý Potok (5869), 10.VI.1998, 2 ex.; 7.–20.VI.2000, 4 ex.; 23.VI.2001, 1 ex.; Hrubý Jeseník, Bílý Potok env., PR Skalní potok (5869), 10.VI.2002, 1 ex.; 10.VI.2003, 1 ex.; 10.VI.2004, 1 ex., vše KS; Hrubý Jeseník, Vidly env., PR Jelení bučina (5869), 14.VI.2009, 1 ex., RD; Hrubý Jeseník, Malá Morávka env, PR Pod Jelení studánkou (5969), 21.VI.1992, 1 ex., ZM lgt., KD det., coll. ZM; MS Beskydy, Morávka (6377), 13.VI.1992, 1 ex.; 3.–4.VII.2006, 2 ex., vše v údolí Velký Lipový; MS Beskydy, Morávka env., Kotař (hora) (6377), 10.VII.2006, 2 ex., vše OS lgt. et det., coll. MB; MS Beskydy, Ostravice (6476), 20.V.1989, 1 ex.; 31.VI.1993, 1 ex.; 26.VI.2010, 1 ex., vše na květech Apiaceae kolem Bučacího potoku, vše RS; MS Beskydy, Ostravice env., Muchovec (hora) (6476), 655 m, 20.XI.2012, 1 larva, pod kůrou ohořelého pařezu *Picea* sp., OS lgt.,

PS det., coll. OS.; MS Beskydy, Morávka (6477), 30.VI.1976, 1 ex., FP lgt., JS det., coll. MB; 24.VI.1990, 2 ex., vše v údolí kolem potoku Travný, OS lgt. et det., coll. MB; MS Beskydy, Morávka env., Malý Travný (hora) (6477), 22.VI.1990, 1 ♀; MS Beskydy, Morávka env., Slavič (hora) (6477), 9.VII.1994, 1 ♂, oba ex. OS; MS Beskydy, Staré Hamry (6576), 27.V.2001, 1 ex., v údolí kolem Velkého potoku, TS; MS Beskydy, Bílá (6576), 14.VII.2002, 1 ♂, na květu Apiaceae, OS.

Nehojný, spíše jednotlivě se vyskytující horský druh. Další doložené nálezy ze čtverců 5769, 5869, 5969, 6476, 6477 a 6576 a první údaj ze čtverce 6377.

***Pedostrangalia revestita* (Linnaeus, 1767)**

Literární údaje: Kudla (1955), Sláma (1998): Hlubočky (6370).

Materiál a pozorování: Pišť (6075), 12.–31.V.2005, 3 ♂♂; 31.V.–16.VI.2005, 1 ♀; 7.–28.VI.2006, 1 ♀, vše v závěsné stromové pasti umístěné na kraji lesa Hranečník, vše OS; Vřesina env., PR Dařenec (6075), 20.VI.1995, 1 ex., na poraženém kmeni *Quercus* sp. v rozmezí 17:00–19:00 hod., MM.

Velmi vzácný a lokální druh. Jedná se o potvrzení jeho výskytu po více než 40 letech. První nálezy ze čtverce 6075.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „ohrožený“.

***Stenurella nigra* (Linnaeus, 1758)**

Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverců 5669, 5770, 6372, 6373, 6472, 6574 a 6575.

Materiál a pozorování: Kobylá nad Vidnávkou (5668), 2.VII.2006, 1 ex., na květu *Achillea* sp., RG; Hrubý Jeseník, Vrbno pod Pradědem env., Bílý Potok (5869), 26.VI.2001, 1 ex., na květu Apiaceae, KS; Darkovičky (6075), 18.V.–9.VI.2006, 1 ♀, v závěsné stromové pasti; 9.VI.2006, 3 ♂♂ 3 ♀♀; 4.VI.2008, 1 ♂; 9.VI.2008, 2 ♂♂; Závada (6075), 29.VI.2006, 1 ex., na okraji lesa Bor; Pišť (6075), 3.VI.2009, 10 ♂♂ 5 ♀♀; 9.VI.2009, 5 ♂♂ 2 ♀♀, vše na květech podél okraje lesa Hranečník, vše OS; Bohumín env., PP Hraniční meandry Odry (6076), 8.VI.2009, 1 ♂, DH; Suchdol nad Odrou env., PR Bařiny (6373), 8.VII.2011, 1 ex., na květu Apiaceae, KS; MS Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm env., Radhošť (hora) (6575), 28.VI.1976, 1 ex.; 23.VI.1984, 1 ex., oba ex. TS; MS Beskydy, Dolní Bečva env., Dolní Rozpité (6575), 11.–12.VIII.1990, 1 ♂, LK.

Vzácný, lokálně hojnější. První nálezy ze čtverců 5668, 5869, 6075, 6076, 6373 a 6575.

***Stictoleptura scutellata scutellata* (Fabricius, 1781)**

Literární údaje: Kudla (1966): Hrubá Voda; Navrátil (1975): Horní Lomná; Sláma (1998): udáván ze čtverců 5769, 6071, 6073, 6074, 6169, 6370, 6371, 6476 a 6576.

Materiál a pozorování: Rešov env., NPP Rešovské vodopády (6169), 25.–27.VI.2002, 2 ex.; 26.VII.2004, 1 ex.; Ruda (6169), 9.VII.2002, 1 ex.; 18.VI.2008, 1 ex.; 12.VI.2010, 1 ex., vše SK; Šilheřovice (6075), 10.VII.1992, 2 ♀♀, EH lgt. et det., coll. OM; Ostrava-Martinov env., PP Turkov (6175), 15.VI.2006, 2 ♂♂ 1 ♀; 23.VI.2006, 1 ♀, vše na květech Apiaceae, vše OS; Ostrava-Martinov (6175), 16.VI.2009, 2 ex., TS; Ostrava-Petřkovice env., NPP Landek (6175), 21.V.2009, 1 ♀, na pahýlu *Betula* sp.; 26.VI.2009, 1 ♂, v letu na lesní pasece, oba ex. JF; Polanka nad Odrou (6275), 2.VIII.2006, 1 ♀, u soutoku řek Odry a Ondřejnice, PB;

Hukvaldy (6375), 4.VI.1993, 2 ex.; 11.VI.1995, 2 ex., vše MM; 11.VII.1997, 1 ex., TS; Nýdek env., Velká Čantoryje (hora) (6378), 6.VII.2009, 1 ♀, na květu Apiaceae, DH; Oderské vrchy, Podhoří (6471), 15.VI.2011, 1 ex., uhynulé imago pod stojícím torzem *Fagus sylvatica* u zříceniny hradu Drahotuš, KS observ. et det.

Vzácný. První nálezy ze čtvrců 6075, 6169, 6175, 6275, 6375, 6378 a 6471.

***Strangalia attenuata* (Linnaeus, 1758)**

Literární údaje: Heyrovský (1930): Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtvrců 5669, 5769, 5772, 6476 a 6575; Sabol & Boščík (2007): Havířov (6276), Dobrá (6376).

Materiál a pozorování: Hlučín env., Vřesina (6075), 1.–3.VIII.1978, 1 ♀ 1 ♂; 1.VIII.1985, 1 ♂; 19.–20.VII.1988, 7 ♂♂ 3 ♀♀; 28.VII.1989, 1 ♀, vše EH lgt. et det., coll. OM; Dolní Suchá (6176), 6.–19.VII.2008, 3 ♂♂ 3 ♂♂; 11.VII.2009, 2 ♀♀, vše na květech Apiaceae v okolí rybníku Bartošůvka, vše DH; Dobrá env., PP Kamenec (6376), 10.–30.VII.2009, 16 ex., na květech Apiaceae, OS.

Vzácný, lokálně hojnější druh. Opětovně potvrzen ve čtvrci 6376, první nálezy ze čtvrců 6075 a 6176.

***Cortodera femorata* (Fabricius, 1787)**

Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtvorce 6074.

Materiál a pozorování: Jeseník env., Vápenná (5768), 28.VI.2006, 1 ex., oklepem větvi *Betula* sp., RG; Ruda (6169), 18.VI.2009, 1 ex.; 9.VI.2010, 1 ex., oba ex. na světlo; 12.VI.2010, 1 ex., vše SK.

Velmi vzácný. Recentně doložený po více než 40 letech. První nálezy ze čtvrců 5768 a 6169.

***Pachyta quadrimaculata* (Linnaeus, 1758)**

Literární údaje: Heyrovský (1930): Beskydy; Kudla (1955, 1966): Hrubá Voda; Navrátil (1975) a Szopa (2002): Jablunkov (6478); Vysoký (1993): osada Konečná, údolí potoku Černé Ostravice u obce Bílá; Sláma (1998): udáván ze čtvrců 5768, 5769, 5868, 5869, 5970, 6270, 6275, 6370, 6475, 6476, 6575 a 6576.

Materiál a pozorování: Hrubý Jeseník, Jeseník env., NPR Rejvíz (5769), 11.VII.2006, 1 ex., SK; Hrubý Jeseník, Ramzová env., Kepník (hora) (5868), 900 m, 5.VII.2007, 4 ex., SL lgt. et det., coll. ZM; Hrubý Jeseník, Vrbno pod Pradědem env., Vidly (5869), 20.VII.1998, 1 ex., MV lgt., KS det. et coll.; Hrubý Jeseník, Vrbno pod Pradědem env., Bílý Potok (5869), 30.VIII.2002, 1 ex., na květu Apiaceae, KS; Hrubý Jeseník, Adolfovice (5869), 15.VII.2009, 1 ex., v údolí Šumného potoku, KN lgt., RG det. et coll.; Hrubý Jeseník, Karlova Studánka (5969), 800 m, 20.X.2003, 1 ex., SL lgt. et det., coll. ZM; Jívová (6270), 18.VI.1987, 1 ex., RV; 5.VII.1997, 8 ex., na květech Apiaceae v údolí potoku Bystřice poblíž železniční stanice Jívová, AP; Hukvaldy (6375), 3.VI.1973, 1 ex., Burša lgt. et det., coll. MB; MS Beskydy, Ostravice (6476), 18.VII.1985, 1 ex., v Masarykově údolí poblíž vodní nádrže Šance, SB; MS Beskydy, Morávka (6477), 15.VII.1975, 1 ex., FP lgt., MR det., coll. MB; 13.VI.1976, 1 ex., VU lgt., MR det., coll. MB; 29.VI.2008, 1 ♂, IB; 6.VII.2008, 1 ♀, OS, oba ex. byly uloveny na květu Apiaceae nad částí Bebek u potoku Morávka; MS Beskydy, Bílý Kříž (6577), 15.VII.1990, 5 ex., TS.

Vzácný, lokálně hojnější. Další doložené nálezy ze čtvrců 5769, 5868, 5969, 6270 a 6476 a první nálezy ze čtvrců 6375, 6477 a 6577.

***Stenocorus meridianus* (Linnaeus, 1758)**

Literární údaje: Kudla (1955): Hlubočky; Sláma (1998): udáván ze čtverců 5868, 6073, 6074, 6076, 6175, 6277, 6375 a 6472.

Materiál a pozorování: Vápenná (5768), 11.–12.VII.2006, 2 ex., na květech Apiaceae v lomu, RG; Bohumín (6176), 7.VI.1993, 2 ♂♂, SH lgt. et det., coll. PB; Jistebník (6274), 19.VI.1992, 1 ♂; Ostrava-Poruba env., PR Rezavka (6275), 17.V.1990, 1 ♂, oba ex. SB lgt., OS det., coll. SB; Polanka nad Odrou (6275), 3.VII.1997, 1 ex., TS; 4.VI.1999, 1 ♂, na květu Apiaceae, OS; Vendryně (6378), 22.V.2002, 4 ex., SZ; Nový Jičín env., Svinec (vrch) (6473), 22.VI.1994, 1 ex.; 29.VI.1996, 1 ex., oba ex. TS.

Vzácný. První nálezy ze čtverců 5768, 6176, 6274, 6275, 6378 a 6473.

***Rhamnusium bicolor bicolor* (Schränk, 1781)**

Literární údaje: Sláma (1998): Opava (6072), Hrabyně (6174), Ostrava (6175), Těšín (6277), Rožnov pod Radhoštěm (6574).

Materiál a pozorování: Albertovec (6074), 10.VIII.1993, 2 ex., LH lgt. et det., coll. ZM; Hrabyně (6174), 23.VI.1992, 1 ♂ 1 ♀, v dutině *Tilia* sp., MM; Ostrava-centrum (6175), 10.–12.VI.1992, 5 ♂♂ 4 ♀♀; Ostrava-Přívov (6175), 11.VI.1992, 1 ♂; 5.VI.2002, 1 ♂; Ostrava-Hrušov (6175), 11.VI.1992, 2 ♀♀; Ostrava-Mariánské Hory (6175), 11.–12.VI.1992, 2 ♀♀; Ostrava-Svinov (6175), 11.VI.1992, 2 ♂♂ 1 ♀, vše v dutině *Aesculus hippocastanum*, vše OS; Ostrava (6175), 2.–18.VI.1993, 4 ♂♂ 6 ♀♀, EH lgt. et det., coll. OM; 17.VI.1995, 4 ex., JT; 14.VI.1996, 6 ex., TS; 20.–23.VI.1996, 1 ♂ 1 ♀; 1.VI.1997, 1 ♀, vše v dutině *A. hippocastanum*, vše EH lgt. et det., coll. OM; 19.VI.1997, 2 ex., TS; 20.VI.1998, 1 ♂, v dutině *A. hippocastanum*, EH lgt. et det., coll. OM; Hlučín-Bobrovniky (6175), 1.VI.2007, 2 ♂♂ 2 ♀♀; 9.V.2008, 2 ♂♂, vše v dutině *A. hippocastanum*, vše OS; 11.VI.2008, 1 ♂, v dutině *A. hippocastanum*, IB; Ostrava-Michálkovice (6176), 15.V.1993, 1 ♀, JD; Vítkov (6272), 25.VI.1995, 1 ♂, EH lgt. et det., coll. OM; Lískovec (6275), ex pr. 11.II.2009, 2 ex., z dutiny *A. hippocastanum*, IB.

Vzácný a ubývající druh. Vývojem je vázaný na odumřelé dřevo dutých stromů (Sláma 1998). Další doložené nálezy pro sledovaný region ve čtverci 6175, první nálezy ze čtverců 6074, 6176 a 6272.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „zranitelný“.

***Anisarthron barbipes* (Schränk, 1781)**

Literární údaje: Heyrovský (1930): Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverců ze čtverců 5669, 6174, 6175, 6275, 6373, 6472 a 6575; Sabol & Boščík (2007): Frýdek-Místek (6376).

Materiál a pozorování: Javorník (5667), 18.VI.2011, 1 ex., oklepem *A. hippocastanum* v aleji poblíž kaple Svatého Antonína, KS; Skorošice (5668), 2.VII.2009, 1 ex., na ořezaných větvích *Juglans* sp., RG; Ruda (6169), 27.VI.2008, 1 ex.; Tvrdkov (6169), 12.VII.2010, 1 ex., oba ex. SK; Vítkov env., Podhradí (6172), 10.VII.1987, 1 ♀, EH lgt. et det., coll. OM; Ostrava-centrum (6175), ex l. 15.II.1992, 3 ♀♀, z *A. hippocastanum*; 11.VI.1999, 1 ♀; 13.VI.2002, 2 ♀♀; 16.–18.VI.2003, 4 ♀♀, vše OS; Ostrava-Zábřeh (6175), ex l. XII.1992, 1 ♀, z *A. hippocastanum*; Ostrava-Michálkovice (6176), ex l. III.1996, 1 ♀, z *A. hippocastanum* v areálu ZOO, oba ex. JD; Ostrava-Mariánské Hory (6175), 9.VI.2003, 1 ♂; Hlučín-Bobrovniky (6175), 15.VI.2007, 1 ♂ 1 ♀, vše na *A. hippocastanum*, vše OS; Rychvald (6176), ex l. 19.I.1991,

5 ex., z větve *Populus* sp., MM; Vítkov (6272), 2.VI.1990, 1 ♀; 20.–25.VI.1995, 3 ♂♂, vše EH lgt. et det., coll. OM et JK (1 ♂); Ostrava-Hrabůvka (6275), 11.–23.VI.2003, 5 ♂♂ 6 ♀♀; 24.VI.2005, 1 ♂; Ostrava-Hrabová (6275), 11.VI.2003, 2 ♂♂ 2 ♀♀; 15.VI.2005, 1 ♂, vše na *A. hippocastanum* v části Žižkov, vše OS; Polanka nad Odrou (6275), ex l. 3.I.1998, 2 ex., TS; Stará Ves nad Ondřejnicí (6275), 25.VI.1995, 8 ex., JT; Potštát (6371), 9.VII.1995, 1 ex., EH lgt. et det., coll. OM; Hukvaldy (6375), 6.VI.1998, 1 ♂, v areálu lesní obory, LK; Frýdek-Místek (6376), 17.–23.VI.2006, 2 ♂♂ 2 ♀♀, na *A. hippocastanum* v části Frýdek, OS; 17.VI.2007, 1 ex., na *A. hippocastanum* v části Frýdek, RS; MS Beskydy, Morávka (6377), X.2007, 2 larvy, ve *Fagus sylvatica* v údolí Velký Lipový, OS lgt., PS det., coll. OS; Milíkov (6378), 14.VI.2010, 1 ex., na *Corylus avellana*, SZ.

Nehojný druh, široce rozšířený v intravilánu měst a obcí, ale i ve volné přírodě. Recentně potvrzený ve čtvercích 6175, 6275 a 6376, první nálezy ze čtverců 5667, 5668, 6169, 6172, 6176, 6272, 6371, 6377 a 6378.

***Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839)**

Literární údaje: Sláma (1998): Jeseník (5769), Krnov (5972), „Slezsko“ a „Oderské vrchy“; Szopa (2002): Kozubová (6478).

Materiál a pozorování: Opava-Komárov (6073), 4.VIII.1994, 1 ex., v areálu bývalého podniku Galena a. s., VK lgt., JV det., coll. ZM.

Velmi vzácný, sporadicky se vyskytující druh. První nález ze čtverce 6073.

***Tetropium gabrieli* Weise, 1905**

Literární údaje: Fleischer (1927–1930), Heyrovský (1930, 1955): Beskydy; Navrátil (1975): Frýdek-Místek; Sláma (1998): udáván ze čtverců 5669, 5768, 5769, 5770, 6174, 6175, 6275, 6370, 6372, 6373 a 6472; Szopa (2002): Třinec (6378); Sabol & Boščík (2007): Petřvald (6176), Skalice (6376).

Materiál a pozorování: Žulová (5668), ex l. 12.I.2006, 1 ex., z palivového dříví *Larix decidua*, RG; Vřesina env., PR Dařenec (6075), 24.V.1999, 2 ex., TS; Ostrava-Hošťalkovice (6175), 5.–19.VI.1990, 89 ex.; 5.VI.1998, 1 ex., vše EH lgt. et det., coll. OM et JK (1 ex.); Ostrava-Poruba (6175), 8.V.1993, 2 ex., MM; Ostrava-Lhotka (6175), ex p. 19.IV.1995, 4 ex., z kmene *L. decidua* v Ludgeřovickém lese, OS; Odry (6372–73), 14.VI.1963, 1 ex., BK lgt., EH det., coll. OM.

Vzácný, lokálně hojný druh, vázaný na modřín opadavý (*Larix decidua*) (Sláma 1998). Další doložené nálezy ze čtverců 6175, 6372 a 6373 a první nález ze čtverce 5668.

***Aromia moschata moschata* (Linnaeus, 1758)**

Literární údaje: Heyrovský (1930): Ostravsko, Paskov, Těšín; Sláma (1998): uvádí více starších i novějších údajů ze sledovaného území.

Materiál a pozorování: MS Beskydy, Třinec env., Javorový (hora) (6377), 1020 m, 18.IX.2012, více čerstvých požerků v *Salix caprea*, OS observ. et det.

Nerovnoměrně rozšířený, místy hojnější. Uvedený nález je ve sledovaném území zajímavý svoji vyšší nadmořskou výškou.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „téměř ohrožený“.

***Callidium aeneum aeneum* (De Geer, 1775)**

Literární údaje: Sláma (1998) uvádí více starších i novějších údajů ze sledovaného území. Materiál a pozorování: MS Beskydy, Ostravice env., Smrk (hora) (6476), 1276 m, 16.VI.2012, 1 ex., DH.

Nehojný druh jehličnatých, převážně nížinných porostů. Pozoruhodný nález vzhledem k vyšší nadmořské výšce.

***Callidium coriaceum* Paykull, 1800**

Literární údaje: Letzner (1871), Heyrovský (1930): Praděd (pohoří); Sláma (1998): Malý Děd (5869), Lysá hora (6476), Smrk v Beskydech (6476); Sabol & Boščík (2007): Ostravice (6476), Smrk v Beskydech (6476).

Materiál a pozorování: MS Beskydy, Malenovice env., PR Malenovický kotel (6476), 760 m, 24.V.2012, 2 ♀♀; 28.V.2012, 1 ♂, vše v zaschlých kmenech *Picea* sp.; MS Beskydy, Malenovice (6476), 610 m, 31.V.2012, 4 ♂♂ 7 ♀♀, v zaschlém kmenu *Picea* sp. a 1 ♀ (aberce *aeneipenne*) v ležícím odřezku z kmene *Picea* sp. v lese Satina, vše OS; MS Beskydy, Ostravice env., Smrk (hora) (6576), 29.VI.1991, 4 ex., v zaschlém kmenu *Picea* sp., TS. Všechna imaga byla nalezena v kukelních kolébkách.

Velmi vzácný boreální element, rozšířený jen v zachovalých horských porostech. Další doložené nálezy pro sledovanou oblast, první nález ze čtvrtce 6576.

***Pronocera angusta* (Kriechbaumer, 1844)**

Literární údaje: Fleischer (1927–1930), Heyrovský (1930, 1955): Paskov; Sláma (1998): Ostrava (6175), Ostrava-Poruba (6175), Ostrava-Vřesina (6275), Paskov (6275), Těšín (6277); Szopa (2002): Milíkov (6378); Sabol & Boščík (2007): Havířov-Suchá (6176), Ostrava-Nová Bělá (6275), Havířov (6276), Šenov (6276), Frýdek-Místek (6375).

Materiál a pozorování: Štáblovice (6072), 22.IV.1992, pozorovány starší požerky ve větších ležících *Picea abies* v lese Břeží, OS observ. et det.; Vřesina env., PR Dařenec (6075), 20.VI.1995, 1 ex., MM; Skřípov env., Hrabství (6173), 20.VI.1996, 3 ♂♂ 4 ♀♀, ZS; Ostrava-Poruba (6174), 26.VI.1987, 5 ex., JT; ex l. 12.IV.1993, 1 ex., MM; Ostrava-Plesná (6174), ex l. 12.III.1993, 3 ex., JV lgt. et det., coll. MM; ex l. 3.XI.1998, 1 ex., TS; ex l. XII.2007, 2 ex., OK; Studénka (6274), ex l. 1994, více ex., IJ.

Vzácný. První nálezy ze čtvrců 6072, 6075, 6173, 6174 a 6274.

***Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758)**

Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtvrců 6074, 6175, 6275 a 6575.

Materiál a pozorování: Žulová (5768), ex l. VIII.2006, 2 ex., z větve *Quercus* sp. na úbočí kopce Hadí vrch, RG; Třemešná (5771), 30.V.2008, 3 ex.; Holčovice (5870), 7.V.2005, 2 ex., vše LM; Vřesina env., PR Dařenec (6075), 5.–9.V.2006, 9 ♂♂ 2 ♀♀, na nařezaných metrových polenech *Quercus* sp., OS; Studénka env., Nová Horka (6274), 16.V.2005, 1 ex., TS.

Vzácný, častější v jižní části sledovaného území. První nálezy ze čtvrců 5768, 5771, 5870, 6075 a 6274.

***Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758)**

Literární údaje: Heyrovský (1930): Opava; Koloničný & Stanovský (1975): Ostrava-Třebovice.

Materiál a pozorování: Vřesina env., PR Dařenec (6075), 24.V.1999, 1 ex., TS; Píšť (6075), 15.V.–7.VI.2006, 1 ♀, v závěsné stromové pasti; ex pr. 20.–29.XI.2006, 1 ♂ 4 ♀♀, z větvi *Quercus* sp., vše na okraji lesa Hranečník; Děhylov (6175), ex l. 28.II.2000, 2 ♂♂, z větve *Quercus* sp., vše OS.

Velmi vzácný. Recentně potvrzený ze čtverce 6175, první nález ve čtverci 6075.

***Ropalopus ungaricus* (Herbst, 1784)**

Literární údaje: Letzner (1871): Lysá hora; Reitter (1912): Těšínsko; Hlisnikovský (1958): Smrk v Beskydech; Kudla (1966): Hrubá Voda; Sláma (1998): Červenohorské sedlo (5868), Praděd (5969), Skřítek (6068); Kašák & Gabriš (2011): Vidly (5869), Bílý Potok (5870); Sabol (2012): hora Kamenárka u Rožnova pod Radhoštěm (6474), osada Vyšní Mohelnice u obce Krásná (6476), hora Okrouhlice v Beskydech (6476), hora Čertův mlýn v Beskydech (6575).

Materiál a pozorování: Hrubý Jeseník, Vidly (5869), 15.VIII.1978, 1 ♀, E. Danišová lgt., MU det. et coll.; 13.VII.2011, 1 ♀, na kmenu *Acer pseudoplatanus*, FT; Oderské vrchy, Podhoří (6471), VII.1964, 1 ex., v údolí poblíž osady Peklo, Dienelt lgt., AS det., coll. JN; MS Beskydy, Ostravice env., Kobylanka (hora) (6476), 847 m, ex l. 12.X.2011, 1 ♂ 1 ♀, na jihovýchodním úbočí hory Kobylanka v údolí potoka Jatný; MS Beskydy, Ostravice env., PR Smrk (6576), 1078 m, ex l. 19.XI.2009, 1 ♂ 1 ♀, nedaleko lovecké chaty Hubertka; MS Beskydy, Bílá env., Polanky (hora) (6576), 830 m, ex l. 23.X.2012, 1 ♂, vše OS. Všechny ex. byly vychovány z kmenů *A. pseudoplatanus*.

Velmi vzácný a lokální horský druh. V Moravskoslezských Beskydech potvrzen po více než 100 letech z okolí Lysé hory a po téměř 60 letech z hory Smrk ze čtverce 6476. Další doložený nález ve čtverci 5869 a první nálezy ze čtverců 6471 a 6576.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „ohrožený“.

***Cerambyx scopolii* Fuessly, 1775**

Literární údaje: Heyrovský (1930): pohoří Praděda; Sláma (1998): udáván ze čtverců 5668, 5769, 5969, 6073, 6370 a 6472; Sabol & Boščík (2007): Morávka (6477).

Materiál a pozorování: Plinkout (5169), ex l. 13.II.2002, 1 ex.; Ruda (5169), 10.V.2003, 1 ex.; 27.V.2008, 1 ex., vše SK; Oderské vrchy, Boňkov (6372), 17.VI.1995, více ex., na lesní mýtině v okolí nařezaného listnatého dřeva, AS; Oderské vrchy, Podhoří (6471), VI.1998, 1 ex., na květu Apiaceae, JZ; 5.VIII.2011, 1 ex., na skládce dřeva u lesní hájovny poblíž osady V Pekle, KS; Oderské vrchy, Loučka (6471), 14.VI.2011, 1 ex., na skládce dřeva u samoty Lipnická Myslivna, VH observ. et foto, KS det.

Vzácný, častější v jižní části sledovaného území. První nálezy ze čtverců 5169, 6372 a 6471.

***Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763)**

Literární údaje: Letzner (1871), Sláma (1998): Těšín (6277); Szopa (2002): Ostrý (6478).

Materiál a pozorování: Věřňovice (6076), ex l. IV.2010, více ex., z *Corylus* sp., IJ; Hranice na Moravě env., Špičky (6472), VI.2004, 2 ex., na květech Apiaceae, AS; Lučice (6473), VI.2010, více ex., na květech Apiaceae kolem Lučického potoku, IJ.

Velmi vzácný. Na severní Moravě jsou v současné době známy jen čtyři recentní nálezy. První nálezy ze čtverců 6076, 6472 a 6473.

***Chlorophorus herbstii* (Brahm, 1790)**

Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverců 6075, 6173, 6175, 6375 a 6470.

Materiál a pozorování: Šilheřovice (6075), 5.VI.1982, 3 ex., JT; 16.–19.VI.1982, 6 ex.; 19.VI.1983, 1 ex., vše EH lgt. et det., coll. OM; 12.VI.1990, 2 ex.; 14.VI.1990, 4 ex., vše OS; ex l. 19.XII.1993, 5 ex., ZS; ex l. 1995, 17 ex., z *Tilia* sp., EH lgt. et det., coll. OM; Antošovice (6075), 20.VI.1990, 2 ex.; ex l. XI.1994, 2 ex., z *Tilia* sp., vše OS; Vítkov env., Podhradí (6172), 25.VI.1983, 1 ex.; 25.–26.VI.1984, 2 ex., vše EH lgt. et det., coll. OM; Ostrava-Martinov (6175), ex l. 17.XI.1991, 1 ex., TS; ex l. 18.I.2008, 3 ex., ze spadlé větve *Tilia* sp.; Ostrava-Martinov env., PP Turkov (6175), 15.VI.2006, 1 ex., na květu Apiaceae, vše OS; Vítkov (6272), ex l. II.1994, 1 ex., EH lgt. et det., coll. OM; Hukvaldy (6375), ex l. 13.V.1991, 1 ex.; ex l. 1.IV.2000, 1 ex.; ex l. 15.IV.2001, 3 ex., vše v areálu lesní obory, vše TS; ex l. 4.II.2003, 1 ex., z *Tilia* sp. v areálu lesní obory, IB.

Vzácný, pouze lokálně hojnější. Další doložené nálezy ve sledovaném území, první nálezy ze čtverců 6172 a 6272.

***Clytus tropicus* (Panzer, 1795)**

Materiál a pozorování: Vřesina env., PR Dařenec (6075), 12.–31.V.2005, 1 ♀; 16.–30.VI.2005, 1 ♂ 1 ♀; 7.–28.VI.2006, 1 ♂, vše v závěsné stromové pasti, vše OS.

Velmi vzácný druh. Zde uvedené nálezy jsou první na severní Moravě.

***Isotomus speciosus* (D. H. Schneider, 1787)**

Literární údaje: Heyrovský (1930): Těšín (6277); Sláma (1998): Rožnov pod Radhoštěm (6574).

Materiál a pozorování: Hrubá Voda (6370), ex l. XI.2003, více ex., z větve *Fagus sylvatica*, JJ.

Velmi vzácný. Na severní Moravě je v současné době znám jen na základě dvou recentních nálezů. První nález ze čtvrtce 6370.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „ohrožený“.

***Plagionotus detritus* (Linnaeus, 1758)**

Literární údaje: Šigut (1996): Paskov; Sláma (1998): udáván ze čtverců 6175, 6275 a 6373; Sabol & Boščík (2007): Horní Suchá (6176–6276).

Materiál a pozorování: Žulová (5668), 7.VI.2008, 1 ex.; 21.VI.2008, 1 ex.; Vápenná (5768), 19.VI.2007, 2 ex., vše na kládách *Quercus* sp. společně s *Plagionotus arcuatus*, vše RG; Třemešná (5771), 7.VI.1997, 2 ex.; 26.VI.2002, 2 ex., vše LM; Vřesina env., PR Dařenec (6075), 31.V.–16.VI.2005, 1 ex.; 16.–30.VI.2005, 2 ex., vše v závěsné stromové pasti, vše OS; Ostrava-Slezská Ostrava (6175), 4.VII.2012, 1 ex., uhynulé imago na terase domu, PK; Vítkov (6272), 10.VI.2006, 1 ex., SL lgt. et det., coll. ZM; Ostrava-Výškovice (6275), 4.VII.2007, 1 ex., JT; Dolní Datyně (6276), 1.VII.2009, více ex., na pořezaném *Quercus* sp. v Datýnském lese, DH; Oderské vrchy, Loučka (6471), 14.VI.2011, 1 ex., na skládce dřeva u samoty Lipnická Myslivna, VH observ. et foto, KS det.; Hranice na Moravě env., Boňkov (6472), VI.1992, více ex., DV observ. et det.

Vzácný. Další doložené nálezy pro sledované území ve čtvrcích 6176 a 6275, první nálezy ze čtverců 5668, 5768, 5771, 6075, 6175, 6272, 6471 a 6472.

***Rusticoclytus pantherinus* (Savenius, 1825)**

Literární údaje: Heyrovský (1930, 1955): Těšín (6277); Kudla (1955): Hlubočky; Hlisenkovský (1958): Lysá hora v Beskydech; Sláma (1998): Hlubočky (6370), Mřklesy (6370), Hranice na Moravě (6472).

Materiál a pozorování: Svobodné Heřmanice (6072), ex l. 1.–10.V.2012, 4 ex., v okolí zatopeného břidlicového lomu Šifra, VS; Jívová (6270), ex l. X.1987, 2 ex., v údolí potoku Bystřice poblíž železniční stanice Jívová, AP; Jakubčovice nad Odrou (6272), ex l. IV.2010, 2 ex., v okolí lomu, BB.

Velmi vzácný a lokální. První nálezy ze čtverců 6072, 6270 a 6272.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „téměř ohrožený“.

***Axinopalpis gracilis gracilis* (Krynicky, 1832)**

Materiál a pozorování: Pišť (6075), 16.–30.VI.2005, 1 ♂ 1 ♀; 30.VI.–29.VII.2005, 1 ♀; 7.–28.VI.2006, 1 ♂, vše v závěsné stromové pasti; ex l. 20.XI.2006, 2 ♀♀, z větví *Quercus* sp., vše na okraji lesa Hranečník, vše OS; Děhylov (6175), 23.V.2005, nalezeny 2 staré požerky v koncových větvích *Quercus* sp., OS observ. et det.; Jezernice (6471), 10.VI.2000, 1 ex., na suchém dříví dovezeném z lesa u obce Podhoří, JZ.

Velmi vzácný. První nálezy na severní Moravě.

***Gracilia minuta* (Fabricius, 1781)**

Materiál a pozorování: Ostrava-Hošťálkovice (6175), ex l. 1988, více ex.; 10.VII.1993, 12 ex.; 25.VII.1995, 10 ex., vše EH lgt. et det., coll. OM et JK (1 ex.), MM (5 ex.), TS (4 ex.), OS (2 ex.); Ostrava-Třebovice (6175), ex l. XII.1999, více ex., vše SZ lgt. et det., coll. SZ et PB (1 ex.), LK (2 ex.), OS (2 ex.).

Dle ústního sdělení obou sběratelů byla všechna imaga nalezena a vypěstována z proutěných vrbových košů.

Synantropní druh, který je převážně nalézán na výrobcích z vrbového proutí (Sláma 1998). První nálezy na severní Moravě.

***Obrium cantharinum cantharinum* (Linnaeus, 1767)**

Literární údaje: Sláma (1998): Město Albrechtice (5871), Chuchelná (6074), Hrabyně (6174), Ostrava (6175); Sabol & Boščík (2007): Ostrava-Nová Bělá (6275), Oprechtice (6275), Šenov (6276).

Materiál a pozorování: Skorošice env., PR Lánský luh (5668), 26.VIII.2007, 1 ex., uhynulé imago v kukelní kolébce ve větvi *Populus tremula*, RG; Ostrava-Nová Bělá (6275), ex l. 18.III.2010, 4 ex., z kmene *P. tremula* na okraji lesa Lipina, OS; Hranice na Moravě env., NPR Hůrka u Hranic (6472), 10.VII.2006, 1 ex., na světlo, SJ lgt., TS det. et coll.

Vzácný, bionomicky vázaný na *Populus* sp. (Sláma 1998). Další doložený nález ve čtverci 6275, první nálezy ze čtverců 5668 a 6472.

***Rosalia alpina alpina* (Linnaeus, 1758)**

Literární údaje: Letzner (1871), Reitter (1912), Heyrovský (1930, 1955): Lysá hora (6476); Sláma (1998): Opava (6073), Hranice na Moravě (6472), Kunzov u Hranic na Moravě (6472), Milotice nad Bečvou (6473).

Materiál a pozorování: Hranice na Moravě env., NPR Hůrka u Hranic (6472), VIII.1990, 1 ♀, umírající imago, LT lgt., AS det. et coll.

Velmi vzácný. Na severní Moravě jsou v současné době známy jen dva recentní nálezy.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „kriticky ohrožený“.

***Acanthocinus aedilis* (Linnaeus, 1758)**

Literární údaje: Kudla (1955): Hlubočky; Sláma (1998): udáván ze čtverců 5669, 5769 a 5770.

Materiál a pozorování: Žulová (5668), 14.IV.2007, 3 ex., na čerstvě uřezaných pařezech *Pinus* sp. v lese Bažantnice, RG; Ostrava-Ludeřovice (6175), 22.V.2012, 1 ♀, na skládce klád *Quercus rubra* v Ludeřovickém lese, JF.

Vzácný. Doposud známo jen několik jednotlivých nálezů. První nálezy ze čtverců 5668 a 6175.

***Agapanthia intermedia* Ganglbauer, 1884**

Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverců 5769, 5772, 5969 a 5972; Sabol & Boščík (2007): Paskov (6275), PP Kamenná (6375), přehrada Olešná u Frýdku-Místku (6376).

Materiál a pozorování: Žulová (5668), 29.V.–25.VI.2006, 2 ex., smykem travní vegetace; 5.V.2012, 1 ex., na *Knautia arvensis*, vše RG; Dolní Povelice (5771), 24.VI.1976, 2 ex.; Třemešná (5771), 18.V.1984, 10 ex.; 6.VI.1992, 2 ex.; 10.VIII.2003, 5 ex.; 20.VI.2009, 1 ex., vše LM; Ruda (6169), 18.V.2002, 1 ex.; 18.V.2003, 1 ex.; 22.V.2004, 1 ex.; 25.V.2005, 1 ex.; 10.VI.2008, 1 ex.; Křivá (6169), 20.V.2004, 1 ex., vše na *K. arvensis*, vše SK; Ostrava-Muglinov (6175), 25.V.2012, 1 ♂ 1 ♀, na *K. arvensis* na protipovodňové hrázi pravého břehu řeky Ostravice, JF; Skalice (6376), 12.VI.2008, 1 ex., na *K. arvensis*, IB; Hranice na Moravě (6472), 20.V.2009, 1 ex., smykem louky; 20.V.2012, 1 ex., smykem louky, oba ex. DV; Nový Jičín env., Svinec (vrch) (6473), 11.V.2001, 1 ex.; 22.V.2001, 1 ex., oba ex. TS.

Nehojný a lokální druh, bionomicky vázaný na *K. arvensis* (Sláma 1998). Další doložený nález ve čtverci 6376, první nálezy ze čtverců 5668, 5771, 6169, 6175, 6472 a 6473.

***Agapanthia dahli* (C. F. W. Richter, 1820)**

Literární údaje: Letzner (1871), Heyrovský (1930): pohoří Praděd; Sláma (1998): Bolatice (6074).

Materiál a pozorování: Frýdek-Místek (6375), 20.V.2007, 1 ♀, na *Cirsium* sp. poblíž přehrady Olešná, BB lgt., IB det., coll. BB.

Nesmírně vzácný, recentně zatím nalezen jen ve dvou exemplářích.

***Calamobius filum* (Rossi, 1790)**

Literární údaje: Sláma (1998): Krnov (5972); Foit (2009): Heřmanice (6175).

Materiál a pozorování: Ostrava-Muglinov (6175), 25.V.2012, 1 ex.; Ostrava-Prívov (6175), 12.VI.2012, 1 ex.; Ostrava-Petřkovice (6175), 22.VI.2012, 1 ex., vše JF; Hranice na Moravě (6472), 7.VI.2009, více ex.; 28.V.2012, více ex., v obou případech byl pozorován masový výskyt, vše DV; Štramberský (6474), VI.2009, více ex., ve smyku travní vegetace, JJ.

Lokálně hojný až velmi hojný, šířící se druh. Všechny výše uvedené exempláře z Ostravy byly uloveny na protipovodňové hrázi pravého břehu řeky Ostravice. Další doložené nálezy ze čtverce 6175, první nálezy ze čtverců 6472 a 6474.

***Anaesthetis testacea testacea* (Fabricius, 1781)**

Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverců 5771, 5772, 6370, 6378 a 6470.

Materiál a pozorování: Kravaře env., PR Koutské a Zábřežské louky (6074), 21.VII.2010, 1 ex., sklepan z *Euonymus* sp., JS; Píšť (6075), ex l. 16.X.2006, 1 ex., z větve *Quercus* sp. na kraji lesa Hranečník, OS; Odry (6372–6373), 19.VI.1973, 1 ex., BK lgt., EH det., coll. OM; Hrabětice (6373), VI.2010, 1 ex., oklepem větvi *Quercus* sp. v Hrabětickém lese, IJ; Suchdol nad Odrou env., PR Bařiny (6373), 8.VII.2011, 1 ex., oklepem na zemi ležících větví *Acer* sp., KS; Hranice na Moravě env., NPR Hůrka u Hranic (6472), 21.VI.1994, 1 ex., oklepem větví na okraji lesa, AS.

Velmi vzácný. První nálezy ze čtverců 6074, 6075, 6372, 6373 a 6472.

***Mesosa nebulosa nebulosa* (Fabricius, 1781)**

Literární údaje: Sláma (1998): udáván ze čtverce 6370.

Materiál a pozorování: Žulová (5668), XII.2002, 1 ex., z větve *Quercus* sp., RG; Hlučín env., Vřesina (6075), 14.VI.1982, 2 ♂♂ 3 ♀♀, EH lgt. et det., coll. OM; Vřesina env., PR Dařenec (6075), 21.IV.2006, 2 ♂♂, ve větvi *Quercus* sp.; Darkovičky (6075), 18.V.–9.VI.2006, 1 ♀, v závěsné stromové pasti; ex l. 16.X.2006, 1 ♀, z větve *Quercus* sp.; Píšť (6075), 20.XI.2006, 3 ♂♂ 3 ♀♀, v kukelních kolébkách ve větvích *Quercus* sp. na kraji lesa Hranečník, vše OS; Ruda (6169), ex l. 2011, 1 ex., z větve *Tilia* sp., SK; Hrabyně (6174), 15.III.1999, 1 ex.; 5.X.1999, 1 ex., oba ex. JT; Děhylov (6174), 8.XII.2004, 1 ♀, ve větvi *Quercus* sp., OS; Hlučín-Bobrovníky (6175), 26.IV.2002, 1 ex., MM lgt., JV det., coll. MM; Vítkov (6272), 20.VI.1992, 1 ♀, EH lgt. et det., coll. OM; Polanka nad Odrou (6275), ex l. 26.III.2003, 1 ♀, z větve *Quercus* sp., OS; Jezernice (6471), 11.VI.1999, 1 ex., na suchém dříví dovezeném z lesa u obce Podhoří, JZ.

Vzácný. První nálezy ze čtverců 5668, 6075, 6169, 6174, 6175, 6275 a 6471.

***Mesosa curculionoides* (Linnaeus, 1760)**

Literární údaje: Heyrovský (1930): Opava, Bohumín, Těšínské hory; Sláma (1998): udáván ze čtverců 6073, 6074, 6176, 6378 a 6470; Szopa (2009): NPP Skalická Morávka (6376).

Materiál a pozorování: Nošovice env., NPP Skalická Morávka (6376), 18.V.2009, 1 ♂ 1 ♀; 15.VI.2009, 1 ♂ 1 ♀, vše na zasychající *Salix* sp., vše IB.

Velmi vzácný. Potvrzení výskytu ve čtverci 6376.

***Monochamus galloprovincialis pistar* (Germar, 1818)**

Literární údaje: Letzner (1871), Heyrovský (1930): Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverce 5972; Šuhaj & Šuhaj (2012): Bohuslavice (6074).

Materiál a pozorování: Vidnava (5669), 10.VII.1995, 1 ♀, KW lgt., LK det. et coll.; Město Albrechtice env., Linhartovy (5871), 1.VII.2006, 1 ex., LM; Hrubý Jeseník, Karlova Studánka env., NPR Praděd (5969), 13.VII.2011, 2 ex., v letu u Petrových kamenů, FT; Hlučín env., Vřesina (6075), ex l. 11.X.2008, 2 ♀♀, v ležícím odumřelém kmeni *Pinus sylvestris* na okraji pískovcového lomu poblíž lesa Bor; Kozmice (6075), ex l. 26.XI.2012, 20 ex., ve stojících suchých kmenech *P. sylvestris* v lese Bor, vše OS.

Vzácný. První nálezy ze čtverců 5669, 5871, 5969 a 6075.

***Oberea pupillata* (Gyllenhal, 1817)**

Literární údaje: Sláma (1998): Praděd (5969), Opava (6073) Těšín (6277), Hrubá Voda (6370), Smilov (6370); Szopa (2002): Dolní Lomná (6478); Kašák & Gabriš (2011): Vrbno pod Pradědem (5870).

Materiál a pozorování: Jeseník (5769), 2003, více ex., K. Novák lgt., KS det., coll. MJ; Ruda env., NPP Rešovské vodopády (6169), 16.VII.2006, 1 ex., na *Lonicera nigra*, SK; Vítkov env., Podhradí (6172), 30.VI.1984, 1 ex.; 26.–30.VI.1986, 5 ex.; 30.VI.1987, 1 ex.; Ostrava (6175), 20.–28.VI.1992, 4 ex., vše EH lgt. et det., coll. OM; Ostrava-Slezská Ostrava (6175), 9.VI.2008, 1 ♂ 1 ♀; 15.VI.2009, 3 ♂♂ 1 ♀, vše OS; Vítkov (6272), 21.V.1987, 1 ex.; 28.VI.1990, 1 ex., oba ex. EH lgt. et det., coll. OM; Frýdek-Místek (6375), 4.VI.2008, více ex., na *L. nigra* v části Místek, IB; 6.VI.2008, 22 ex.; 26.V.2009, 3 ex., vše na *L. nigra* v části Místek; Frýdek-Místek (6276), 6.VI.2008, 6 ex., na *L. nigra* v části Frýdek, vše OS; MS Beskydy, Dolní Bečva env., Dolní Rozpité (6575), 4.–27.VII.2004, 3 ex., LK.

Lokální, spíše vzácnější, vázaný na uměle vysazené i přirozené porosty zimolezů (*Lonicera* sp.) (Sláma 1998). První nálezy ze čtvrců 5769, 6169, 6172, 6175, 6272, 6276, 6375, 6376 a 6575.

***Phytoecia ictérica* (Schaller, 1783)**

Literární údaje: Heyrovský (1930): Beskydy, Boskovice u Těšína; Sláma (1998) udává faunistický čtverec 6074; Kočárek (2005): Ostrava-Heřmanice (6176); Sabol & Boščík (2007): Havířov (6176).

Materiál a pozorování: Ostrava (6175), 28.V.2004, 1 ex., MM lgt., JV det., coll. MM; Ostrava-Heřmanice (6175), 29.V.2006, 1 ex.; 29.–30.V.2008, 6 ex., vše ve smyku travní vegetace, vše OS; Hranice na Moravě (6472), 17.–26.V.1994, 4 ex.; 28.V.2010, 1 ex., vše smykem travní vegetace, vše DV; Štramberk (6474), VI.2009, více ex., ve smyku porostu *Libanotis* sp., IJ. Vzácný. První nálezy ze čtvrců 6175, 6472 a 6474.

***Phytoecia nigricornis* (Fabricius 1782)**

Literární údaje: Heyrovský (1930): Slezsko, Lysá hora; Sláma (1998): Karlova Studánka (5969), Ostravice (6476), Lysá hora (6476), Třemešná (5771); Kočárek (2005): Dívčí Hrad (5771).

Materiál a pozorování: Kobylá nad Vidnávkou (5668), 11.V.2007, 1 ex., smykem *Tanacetum* sp.; Vápenná (5768), 14.VI.2007, 1 ex., smykem travní vegetace, vše RG; Hranice na Moravě (6472), 20.V.1993, 1 ex., AS lgt. et det., coll. JZ; 15.V.1994, 10 ex.; 28.V.2010, 11 ex.; 22.V.2011, 5 ex.; 29.V.2012, 2 ex.; Radíkov (6472), 22.V.2011, 1 ex., vše DV.

Vzácný, častější v jižní části sledovaného území. První nálezy ze čtvrců 5668, 5768 a 6472.

***Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767)**

Literární údaje: Kudla (1955): Hlubočky; Sláma (1998): udáván ze čtvrců 6275, 6370 a 6472.

Materiál a pozorování: Žulová (5668), ex l. 8.III.2006, 2 ex., z větvi *Tilia* sp.; 20.VI.2007, 1 ex., na odlomené větvi *Tilia* sp., vše RG; Opava (6073), ex l. 22.IV.1992, více ex., z větvi *Tilia* sp., OS et PK; Šilheřovice (6075), 14.–15.VI.1992, 23 ex., EH lgt. et det., coll. OM; ex l. 5.IV.1993, 3 ex.; Antošovice (6075), ex l. 12.IV.2008, 10 ex., vše z větvi *Tilia* sp., vše OS;

Ruda (6169), 9.VII.2005, 1 ex., SK; Ostrava-Poruba (6175), ex l. 3.III.2008, 13 ex., z větvi *Tilia* sp., OS; Ostrava-Petřkovice (6175), 4.VI.2010, 4 ex., na větvích *Tilia* sp., JF; Ostrava-Mariánské Hory (6175), VII.2011, 1 ex., přiletěl večer na světlo v bytě, KL lgt., OS det., coll. KL; Šenov (6276), ex l. 21.I.2008, 18 ex., z větvi *Tilia* sp., OS; Kunín env., PP Pusté nivy (6373), 7.VII.2011, 2 ex., oklep větvi *Tilia* sp.; Suchdol nad Odrou env., PR Bařiny (6373), 8.VII.2011, 3 ex., oklep větvi *Quercus* sp. a *Tilia* sp.; Bartošovice env., PR Koryta (6374), 7.VII.2011, 2 ex., oklep větvi *Tilia* sp., vše KS lgt., RG det., coll. KS; Hukvaldy (6375), 28.VIII.1996, 1 ex., MM lgt., JV det., coll. MM; ex l. 10.XI.1996, 1 ex., TS; Bystřice nad Olší (6378), 12.VII.2011, 3 ex., nočním oklepem *Tilia* sp., SZ.

Lokálně hojný druh, bionomicky vázaný především na *Tilia* sp. (Sláma 1998). První nálezy ze čtverců 5668, 6073, 6075, 6169, 6175, 6276, 6373, 6374, 6375 a 6378.

***Exocentrus punctipennis* Mulsant et Guillebeau, 1856**

Literární údaje: Fleischer (1927–1930), Heyrovský (1930, 1955), Sláma (1998): Slezsko; Kočárek (2005): Amalín (5772).

Materiál a pozorování: Šilheřovice (6075), ex l. 4.–9.IV.2008, desítky ex., z tenkých větví *Ulmus* sp. v Černém lese, OS; Polanka nad Odrou (6275), ex l. 3.I.1998, 2 ex.; ex l. 10.VI.1998, 2 ex., vše TS; Ostrava-Výškovice (6275), ex p. 2000, 1 ex., JT; Havířov (6276), 14.VI.1998, 1 ex., oklepem *Salix* sp., JK lgt., det. OS, coll. JK; Nošovice env., NPP Skalická Morávka (6376), 15.VII.2009, 1 ex., v kukelní kolébce větve *Ulmus* sp., IB.

Vzácný druh, vývojem vázaný především na *Ulmus* sp. (Sláma 1998). První nálezy ze čtverců 6075, 6275, 6276 a 6376.

***Pogonocherus decoratus* Fairmaire, 1855**

Literární údaje: Navrátil (1975): Raškovice, Frýdek-Místek; Sláma (1998): udáván ze čtverců 6276, 6472 a 6476; Sabol & Boščík (2007): Dolní Datyně (6276), Havířov (6276), Albrechtice (6277).

Materiál a pozorování: Závada (6075), 26.IX.2005, 6 ex.; 11.X.2005, 14 ex., vše oklepem *Pinus* sp.; ex l. 11.X.2005, 1 ex., z tenké větve *Pinus sylvestris*; 11.X.2006, 12 ex.; 20.IV.2012, 1 ex., vše oklepem *Pinus* sp. rostoucích na okraji pískovcového lomu poblíž lesa Bor, vše OS lgt. et det., coll. OS et JK (1 ex.); Vítkov (6272), ex l. 1997, 2 ex., EH lgt. et det., coll. OM; Metylovice env., Metylovická hůrka (vrch) (6376), 20.XI.1999, 3 ex.; 27.XI.2004, 1 ex., vše TS.

Vzácný, lokálně hojnější druh. Opětovně potvrzen ve čtverci 6376, první nálezy ze čtverců 6075 a 6272.

***Pogonocherus ovatus* (Goeze, 1777)**

Literární údaje: Heyrovský (1955): Beskydy; Sláma (1998): udáván ze čtverců 5669, 5769, 5770, 6172, 6176, 6272 a 6477; Szopa (2002): Vendryně (6378), Košariska (6478); Sabol & Boščík (2007): kopec Štándl u Frýdku-Místku (6375); Kašák & Gabriš (2011): Nýznerov (5768), Zlatý Chlum u Jeseníku (5769), Obří vrch u Karlovic (5870), Markvartice (5970), Pocheň (5970).

Materiál a pozorování: Hrubý Jeseník, Vrbno pod Pradědem (5870), 665 m, 10.III.2012, 1 ex., v části Mnichov; Hrubý Jeseník, Vrbno pod Pradědem (5870), 30.XII.2012, 2 ex., ve svahu Vysoké hory; Hrubý Jeseník, Karlovice (5870), 1.I.2013, 1 ex., u osady Hájovna v údolí Adamovského potoka; 1.I.2003, 1 ex., poblíž bývalé osady Adamov, vše pod borkou *Abies* sp.,

vše KS; Malá Morávka (5969), VIII.2010, 1 ex., na Kapličkovém vrchu, DO; Ruda (6169), 17.II.–2.III.2003, 6 ex.; 21.V.2004, 1 ex., vše pod borkou *Abies* sp., vše SK; Ostrava env., Vřesina (6174), 6.II.1998, 5 ex., JT; Dobroslavice (6174), 24.–29.I.2002, 9 ex.; 6.III.2003, 1 ex.; 15.I.2004, 4 ex.; 16.XI.2005, 10 ex., vše pod borkou *Abies* sp. poblíž osady Rybárna, vše OS; Ostrava (6175), 15.VI.1995, 1 ex.; 4.VII.1995, 1 ex.; Vítkov (6272), ex l. 1995, 4 ex.; 20.XI.1996, 16 ex.; 23.I.1998, 6 ex.; 1.–20.XII.1998, 46 ex.; 23.I.1999, 10 ex., vše EH lgt. et det., coll. OM; Hrubá Voda (6370), XI.2010, 3 ex., pod borkou *Abies* sp., JZ; Frýdek-Místek (6375), 13.–28.I.2012, 35 ex., pod borkou *Abies* sp. na jihovýchodním úbočí kopce Štandl, OS; Metylovice env., Metylovická hůrka (vrch) (6376), 23.XI.2001, 4 ex.; 26.XII.2006, 1 ex., vše TS; Oderské vrchy, Podhoří (6471), II.2011, 1 ex., u lesní hájovny poblíž osady V Pekle, KS observ. et det.; MS Beskydy, Ostravice env., Velký Kobylík (hora) (6476), 16.XII.2006, 1 ex.; MS Beskydy, Bílý Kříž (6577), 19.V.1996, 1 ex., vše TS.

Vzácný, lokálně hojný, vázaný na porosty *Abies alba* (Sláma 1998). Další doložené nálezy ze čtverců 6272 a 6375 a první nálezy ze čtverců 5870, 5969, 6169, 6174, 6175, 6370, 6376, 6471, 6476 a 6577.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen v kategorii „téměř ohrožený“.

***Menesia bipunctata* (Zoubkov, 1829)**

Literární údaje: Sabol & Boščík (2007): Havířov-Suchá (6176), Karviná (6177), Stonava (6177), NPP Skalická Morávka (6376).

Materiál a pozorování: Žulová env., Černá Voda (5668), 10.VII.2005, 1 ex., smykem *Frangula alnus* v okolí Velkého rybníku, BM; Vřesina env., PR Dařenec (6075), ex l. 14.III.2000, více ex., JV lgt. et det., coll. JV et MB (2 ex.); ex l. 2.V.2001, 2 ex., TS; ex l. 15.III.2007, 4 ex., OS; ex l. XII.2007, 7 ex., OK; Pišť (6075), ex l. XI.2004, 8 ex., v lese Hranečník; Šilheřovice (6075), ex l. 4.IV.2008, 6 ex., v Černém lese, vše OS; Dolní Datyně (6276), 1.VI.2008, více ex., v letu a na listech *F. alnus* v Datyňském lese, DH; ex l. III.2012, více ex., DH lgt. et det., coll. VS. Všechna výše uvedená preimaginální stadia byla nalezena ve *F. alnus*.

Vzácný. První nálezy ze čtverců 5668, 6075 a 6276.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „téměř ohrožený“.

***Saperda octopunctata* (Scopoli, 1772)**

Literární údaje: Heyrovský (1955): Nízký Jeseník; Kudla (1955): Hlubočky; Sláma (1998): Jívová (6270), Hlubočky (6370), Hrubá Voda (6370), Hranice na Moravě (6472).

Materiál a pozorování: Vítkov env., Podhradí (6172), 16.VII.1978, 1 ex., EH lgt. et det., coll. OM; Jívová (6270), ex p. 2.V.1986, 6 ex., v údolí potoku Bystřice poblíž železniční stanice Jívová, AP; Vítkov (6272), 2.–8.VI.1978, 24 ♂♂ 18 ♀♀; ex l. 1996, 1 ♂, vše EH lgt. et det., coll. OM et LK (1 ♂ 1 ♀); Oderské vrchy, Loučka (6471), 14.VI.2011, 1 ex., na skládce dřeva u samoty Lipnická Myslivna, VH observ. et foto, KS det.; Teplice nad Bečvou (6472), 12.VI.1992, 2 ex., na pokácených kmenech *Tilia* sp. v areálu lázeňského parku, AS.

Vzácný a lokální. Další doložené nálezy ve čtvercích 6270 a 6472, první nálezy ze čtverců 6172, 6272 a 6471.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „téměř ohrožený“.

***Saperda perforata* (Pallas, 1773)**

Literární údaje: Reitter (1870), Letzner (1871), Fleischer (1927–1930): Těšín; Sláma (1998): Hrubá Voda (6370); Sabol & Boščík (2007): Ostrava-Nová Bělá (6275); Kašák & Gabriš (2011): Žulová (5668), Vrbno pod Pradědem (5870).

Materiál a pozorování: Darkovičky (6075), ex l. 30.V.2010, 1 ex., TS.; Hranice na Moravě env., Špičky (6472), ex l. 2004, více ex., z kmene *Populus nigra* nebo *P. x canadensis*, AS. Na severní Moravě vzácný. Vývojem je vázaný především na *Populus tremula* a *P. alba* (Sláma 1998), na lokalitě Špičky byl vychován také z jiného druhu *Populus*. První nálezy ze čtverců 6075 a 6472.

***Saperda punctata* (Linnaeus, 1767)**

Literární údaje: Heyrovský (1930), Sláma (1998): Beskydy; Sabol & Boščík (2007): NPP Skalická Morávka (6376).

Materiál a pozorování: Nošovice env., NPP Skalická Morávka (6376), ex l. 29.II.2008, 3 ♂♂ 4 ♀♀; ex l. 7.III.2008, 10 ♂♂ 8 ♀♀, vše z kmenů *Ulmus* sp., vše OS; Nošovice (6376), ex l. 31.III.2008, 4 ex.; Nižní Lhoty (6376), ex l. 31.III.2008, 16 ex., vše z kmenů *Ulmus* sp., vše SZ.

Velmi vzácný druh, který je vývojem vázaný na porosty jilmu *Ulmus* sp. (Sláma 1998). Další doložené nálezy ze čtverce 6376.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „ohrožený“.

***Saperda similis* Laicharting, 1784**

Literární údaje: Kudla (1955): Hlubočky, Hrubá Voda; Sláma (1998): Jeseník (5769), Rabštejn (6068), Jívová (6270), Bílovec-Stará Ves (6273), Těšín (6277), Mrsklesy (6370), Hlubočky (6370), Odry (6372); Sabol & Boščík (2007): Janovice-Bystré (63–6475), Šance-Řečice (6476).

Materiál a pozorování: Vápenná (5768), 7.XI.2009, 1 larva, ve 5–6 cm silném kmeni *Salix caprea* v lomu, RG observ. et foto, RG det., OS revid.; Leskovec nad Moravicí (6071), ex pr. 12.IV.2012, 10 ex.; Razová (6071), ex pr. 27.IV.–15.V.2012, 14 ex., vše VS; Jívová (6270), ex p. V.1989, 2 ♂♂, RV; 10.VI.2002, 3 ex., oklepem větví *S. caprea* v údolí potoku Bystřice poblíž železniční stanice Jívová, AP; Libavá (6271), 1.–10.VII.1993, 4 ex.; Potštát (6371), ex l. 1991, 2 ex.; 28.VI.1993, 10 ex.; 1.VII.1995, 6 ex., vše EH lgt. et det., coll. OM et JK (1 ex.); ex l. 22.V.1995, 1 ♀, AS lgt. et det., coll. LK; 2.–9.VII.1995, 10 ex.; Odry (6372), ex l. VII.1991, 2 ex., vše EH lgt. et det., coll. OM; Oderské vrchy, Veselí (6372), ex l. 1.IV.1993, 18 ♂♂ 18 ♀♀, OS (8 ♂♂ 8 ♀♀) et PK (10 ♂♂ 10 ♀♀); Podhoří (6471), 30.VI.1995, 1 ex., na kmeni *S. caprea*; 26.VI.1997, 1 ex., sklepán ze *S. caprea*, JZ; Hranice na Moravě (6472), ex l. V.1995, 1 ♂ 1 ♀, AS lgt. et det., coll. LK; MS Beskydy, Ostravice (6476), 560 m, ex l. 22.X.2009, 2 ♀♀, z větví *S. caprea* u vodní nádrže Šance; ex p. 5.VI.2012, 2 ♂♂ 2 ♀♀, v okolí bývalého kamenolomu u osady Mazák; MS Beskydy, Ostravice env., Okrouhlice (hora) (6476), 730 m, ex p. 24.V.2012, 7 ♂♂ 2 ♀♀; MS Beskydy, Ostravice env., Muchovec (hora) (6476), 655 m, 20.XI.2012, čerstvé požerky v kmeni a větvích *S. caprea*, vše OS observ. et lgt., det. et coll.

Vzácný a lokální. Potvrzený ze čtverců 6372 a 6476, první nálezy ze čtverců 5768, 6071, 6270, 6271, 6371, 6471 a 6472.

V Červeném seznamu bezobratlých druhů ČR (Rejzek 2005) je zařazen do kategorie „téměř ohrožený“.

***Stenostola ferrea ferrea* (Schrank, 1776)**

Literární údaje: Heyrovský (1930): Karlova Studánka; Sláma (1998): udáván ze čtverců 5669, 5769, 5969, 6277 a 6575.

Materiál a pozorování: Odry (6372), ex l. 1984, 1 ex., JT; Hukvaldy (6375), ex l. 14.XI.1993, 1 ex.; Nový Jičín env., Svinec (vrch) (6473), 15.IV.1990, 1 ex., oba ex. MM lgt., JV det., coll. MM; Hostašovice (6474), 18.V.2009, 2 ex., oklepem starší a zarůstající lesní mýtiny poblíž železniční stanice, AS.

Vzácný. První nálezy ze čtverců 6372, 6375, 6473 a 6474.

***Tetrops starkii* Chevrolat, 1859**

Literární údaje: Sláma (1998): Polanka nad Odrou (6275), Paskov (6275), Brušperk (6275), Metylovická hůrka (6376), Smrk v Beskydech (6376).

Materiál a pozorování: Studénka (6274), V.2010, více ex., oklepem větvi *Fraxinus* sp., IJ; Ostrava-Výškovice (6275), ex l. 1999, 4 ex., JT; Polanka nad Odrou (6275), ex pr. 2.IV.2007, 1 ex.; ex p. 6.IV.2007, 1 ex.; 11.–24.V.2007, 4 ex.; 27.V.2008, 35 ex., vše smykem *Fraxinus* sp., OS; Skalice (6376), ex l. 19.II.2007, 2 ex., z tenkých větví *Fraxinus* sp., IB; Štramberk env., Kotouč (vrch) (6474), 28.V.2004, 1 ex., MM lgt., JV det., coll. MM.

Vzácný druh, hojnější pouze v nížinných, často aluviálních porostech kolem vodních toků. Vychází se v tenkých větvích *Fraxinus* sp. (Sláma 1998). Další doložené nálezy ve čtvercích 6275, 6376, první nálezy ze čtverců 6075, 6274 a 6474.

ZÁVĚR

Práce přináší nové údaje o výskytu 56 druhů tesaříků z území severní Moravy. Čtyři druhy jsou pro tuto oblast nové: *Aegosoma scabricorne*, *Clytus tropicus*, *Axinopalpis g. gracilis* a *Gracilia minuta*.

Dalších 24 druhů patří mezi ty, které byly objeveny teprve nedávno, případně byly potvrzeny po mnoha letech nebo u nich bylo známo velice málo recentních údajů. Mezi tyto druhy patří *Anoploclera sexguttata*, *Grammoptera ustulata*, *G. abdominalis*, *Pedostrangalia revestita*, *Cortodera femorata*, *Arhopalus ferus*, *Ropalopus femoratus*, *R. ungaricus*, *Chlorophorus figuratus*, *Isotomus speciosus*, *Rosalia a. alpina*, *Acanthocinus aedilis*, *Agapanthia dahli*, *Calamobius filum*, *Anaesthetis t. testacea*, *Mesosa n. nebulosa*, *M. curculionoides*, *Monochamus galloprovincialis pistor*, *Phytoecia icterica*, *P. nigricornis*, *Exocentrus lusitanus*, *E. punctipennis*, *Menesia bipunctata* a *Saperda punctata*. Druhy *G. ustulata*, *P. revestita* a *C. femorata* jsou doloženy po více než 40 letech. První dva byly doposud známy jen z jižní části sledované oblasti, z faunistického čtverce 6075. *R. ungaricus* je z okolí Lysé hory potvrzen po více než 100 letech a po téměř 60 letech z hory Smrk v Moravskoslezských Beskydech. Druhy *R. femoratus*, *I. speciosus*, *Ch. figuratus* a *R. a. alpina* jsou recentně doloženy z dalších lokalit. Všechny byly převážně známy jen na základě starších a jednotlivých nálezů. V případě *A. dahli* a *A. ferus* je ze sledovaného území zatím známo pouze několik exemplářů.

Další tři druhy, mezi které patří *Callidium coriaceum*, *Rusticoclytus pantherinus* a *Saperda similis*, jsou vzácné po celém území České republiky.

Nepřilíš mnoho údajů ze severní Moravy bylo známo také u dalších v České republice nehojných druhů. Mezi ně patří *Judolia sexmaculata*, *Stenurella nigra*, *Stictoleptura s. scutellata*, *Strangalia attenuata*, *Pachyta quadrimaculata*, *Stenocorus meridianus*, *Rhamnusium b. bicolor*, *Anisarthron barbipes*, *Tetropium gabrieli*, *Pronocera angusta*, *Pyrrhidium sanguineum*, *Cerambyx scopolii*, *Chlorophorus herbstii*, *Plagionotus detritus*, *Obrium c. cantharinum*, *Agapanthia intermedia*, *Oberea pupillata*, *Pogonocherus decoratus*, *P. ovatus*, *Saperda octopunctata*, *S. perforata*, *Stenostola f. ferrea* a *Tetrops starkii*. Jejich nálezy jsou pro sledované území potvrzením výskytu nebo doložením nových faunistických čtverců.

Do práce byly zařazeny také dva nálezy v České republice hojnějších druhů *Aromia m. moschata* a *Callidium a. aeneum*. V Moravskoslezských Beskydech byly oba nalezeny v nadmořské výšce nad 1000 m, zajímavý je výskyt *C. a. aeneum* ve výšce nad 1200 m.

Dle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky (Rejzek 2005) je z celkového výčtu zjištěných druhů zařazen jeden do kategorie „kriticky ohrožený“: *R. a. alpina*, pět do kategorie „ohrožený“: *A. scabricorne*, *P. revestita*, *R. ungaricus*, *I. speciosus* a *S. punctata*, šest do kategorie „téměř ohrožený“: *A. m. moschata*, *R. pantherinus*, *P. ovatus*, *M. bipunctata*, *S. octopunctata* a *S. similis*, a jeden do kategorie „zranitelný“: *R. b. bicolor*.

PODĚKOVÁNÍ. Autor bych chtěl poděkovat všem výše uvedeným kolegům za poskytnutá faunistická data a paní Gertrudě Hudečkové (Ostrava-Hošťalkovice) za zpřístupnění sbírky. Zvláštní dík patří paní Magdaléně Roháčové a Miroslavě Bilkové (Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku) za poskytnutí mapového podkladu. Jiřímu Vávrovi (Ostrava) také za podnětné rady a připomínky k rukopisu.

LITERATURA

- FLEISCHER A. 1927–1930: *Přehled brouků fauny Československé republiky*. [Overview of the Beetle Fauna of the Czechoslovak Republic]. Moravské museum zemské, Brno, 483 pp. (in Czech).
- FOIT J. 2008: An interesting record of *Calamobius filum* (Coleoptera: Cerambycidae) near the boundary of Moravia and Bohemia. *Klapalekiana* **44**: 127–128.
- HEYROVSKÝ L. 1930: *Seznam brouků republiky Československé 1. Cerambycidae. Entomologické příručky 15. (Verzeichnis der Cerambyciden der Tschechoslowakischen Republik)*. Československá společnost entomologická, Praha, 61 pp. (in Czech, German summary).
- HEYROVSKÝ L. 1955: *Tesaříkovití – Cerambycidae. Fauna ČSR. Svazek 5. [Longhorned beetles – Cerambycidae. Fauna of ČSR. Volume 5.]*. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 347 pp. (in Czech, Russian and German summaries without title).
- HLISNIKOVSÝ J. 1958: Příspěvek k poznání brouků (Insecta – Coleoptera) Beskyd. [Contribution to the knowledge of beetles (Insecta – Coleoptera) of the Beskydy Mountains]. *Časopis Národního muzea, Oddíl Přírodovědný*, **127**: 212–213 (in Czech).
- KAŠÁK J. & GABRIŠ R. 2011: Nálezy ekofaunisticky významných druhů brouků (Coleoptera) na Jesenicku (severní Morava, Česká republika). (Records of ecofaunistically significant beetles (Coleoptera) in the Jeseník region (northern Moravia, Czech Republic)). *Acta Musei Beskidensis* **3**: 187–192 (in Czech, English abstract).
- KOLONIČNÝ L. & STANOVSKÝ J. 1975: Některé zajímavější druhy brouků v okolí Třebovic. [Some interesting species of beetles around Třebovice]. *Ostravský Zpravodaj* **5**: 9–16 (in Czech).
- KOČÁREK P. 2005: Faunisticky zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Moravskoslezském kraji (Česká republika). (Records faunistically interesting beetles (Coleoptera) in the Moravian–Silesian district (Czech Republic)). *Práce a Studie Muzea Beskyd (Přírodní Vědy)* **15**: 217–218 (in Czech, English abstract).
- KUDLA M. 1955: Tesařici (Cerambycidae, Coleoptera) na Olomoucku. [Longhorned beetles in Olomouc district]. *Ročenka Musei Olomouckého Kraje* **1**: 164–176 (in Czech).
- KUDLA M. 1966: Další nálezy tesaříků na Olomoucku (Coleoptera, Cerambycidae). (Weitere und zum Teil für den Bezirk Olmütz in Mähren neue Meldungen von Cerambyciden). *Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV* **3**: 55–56 (in Czech, German abstract).

- LETZNER K. 1871: *Verzeichnis der Käfer Schlesiens*. J. Hofman, Breslau, xxiv + 328 pp.
- MALEC B. 1976: Tesaříkovití v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (Cerambycidae, Coleoptera). (Bockkäfer des Landschaftsschutzgebietes Jeseníky (Cerambycidae, Coleoptera)). *Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV* **12**: 93–98 (in Czech, German summary).
- NAVRÁTIL M. 1975: Příspěvek k poznání čeledi Cerambycidae v Moravskoslezských Beskydách. [Contribution to the knowledge of the family Cerambycidae in the Moravian-Silesian Beskyds]. *Pobeskydí, Metodický Zpravodaj VÚ Frýdek-Místek* **2**: 19–39 (in Czech).
- PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana* **32** (Supplementum): 1–115 (in Czech, English abstract).
- REITTER E. 1870: *Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien*. E. Reitter, Brünn, vii + 195 pp.
- REITTER E. 1912: *Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. IV. Band*. K. G. Lutz, Stuttgart, xxiv + 236 pp.
- REJZEK M. 2005: Cerambycidae. Pp. 530–532. In: FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (eds): *Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates*. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. (in Czech and English).
- SABOL O. & BOŠČÍK I. 2007: Nové a zajímavé nálezy tesaříkovitých (Coleoptera: Cerambycidae) z okolí Frýdku-Místku a Karviné (Česká Republika). (New and interesting findings of longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in the surroundings of Frýdek-Místek and Karviná (Czech Republic)). *Práce a Studie Muzea Beskyd (Přírodní Vědy)* **19**: 97–104 (in Czech, English summary).
- SABOL O. 2012: Závěrečná zpráva z entomologického průzkumu 2007–2012 zaměřeného na výskyt tesaříka *Ropalopus ungaricus* (Herbst, 1784) (Coleoptera: Cerambycidae) v CHKO Beskydy. [Final report of the entomological survey 2007–2012 focused on the occurrence of the longhorn beetles *Ropalopus ungaricus* (Herbst, 1784) (Coleoptera: Cerambycidae) in CHKO Beskyds]. Unpublished report. Deposited in administration of Beskydy Protected Landscape Area, Rožnov pod Radhoštěm, 31 pp. (in Czech).
- SAMA G. & LÖBL I. 2010: Cerambycidae: Western Palaearctic taxa, eastward to Afghanistan, excluding Oman and Yemen and the countries of the former Soviet Union. Pp. 84–334. In: LÖBL I. & SMETANAA. (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrysomeloidea*. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.
- SLÁMA M. E. F. 1998: *Tesaříkovití – Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). Bockkäfer (Coleoptera – Cerambycidae) der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik*. Milan Sláma, Krhanice, 383 pp. (in Czech, German introduction without title).
- STANOVSKÝ J. & PULPAN J. 2006: *Sřevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) Slezska (severovýchodní Moravy). Die Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) der Schlesien (nordöstlich Mähren)*. Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, 159 pp. (in Czech and German, English abstract).
- SZOPA R. 2002: Příspěvek k poznání tesaříkovitých (Coleoptera: Cerambycidae) Jablunkovské brázdy a blízkého okolí. (Contribution to the knowledge of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Jablunkovská brázda valley and its close environs). *Klapalekiana* **38**: 63–83 (in Czech, English summary).
- SZOPA R. 2009: K výskytu tesaříka *Mesosa curculionoides* (Coleoptera: Cerambycidae) na severovýchodní Moravě. (On the occurrence of the long-horned beetle *Mesosa curculionoides* (Coleoptera: Cerambycidae) in northeastern Moravia). *Acta Musei Beskidensis* **1**: 119–120 (in Czech, English abstract).
- ŠIGUT R. 1996: Tesaříkovití (Cerambycidae) Paskova a okolí – faunistický čtverec číslo 6275. [Longhorned beetles (Cerambycidae) of Paskov and its surroundings – faunistic square number 6275]. *Reitteriana* **1996**: 13–15 (in Czech).
- ŠUHAJ J. & ŠUHAJ J. 2012: Occurrence of the pine sawyer beetle *Monochamus galloprovincialis pistor* (Coleoptera: Cerambycidae) in Silesia (Czech Republic). *Časopis Slezského Muzea Opava, Serie A* **61**: 93–94.
- VAVROUŠEK J. 1978a: Tesaříkovití v oblasti Jeseník – Písečná – Mikulovice (Coleoptera, Cerambycidae). (Bockkäfer des Gebietes Jeseník – Písečná – Mikulovice (Coleoptera, Cerambycidae)). *Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV* **14**: 25–30 (in Czech).
- VAVROUŠEK J. 1978b: Tesaříkovití v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (Coleoptera, Cerambycidae). (Bockkäfer des Landschaftsschutzgebietes Jeseníky (Coleoptera, Cerambycidae)). *Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV* **14**: 31–32 (in Czech).
- VYSOKÝ V. 1993: Příspěvek k výskytu tesaříků Beskyd (Coleoptera – Cerambycidae). (Der Beitrag zum Vorkommen von Bockkäfern in Beskydy (Coleoptera – Cerambycidae)). *Práce a Studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku* **8**: 193–198 (in Czech, German summary).

SUMMARY

This article introduces new data on the distribution of 56 longhorned beetles in the area of north Moravia (Fig. 1). Four species are new for the area: *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763), *Clytus tropicus* (Panzer, 1795), *Axinopalpis gracilis gracilis* (Krynicky, 1832) and *Gracilia minuta* (Fabricius, 1781). A further twenty four species are recent additions, have been recently confirmed after many years, or have very few recent records: *Anoplodera sexguttata* (Schaller, 1775), *Grammoptera ustulata* (Schaller, 1783), *G. abdominalis* (Stephens, 1831), *Pedostrangalia revestita* (Linnaeus, 1767), *Cortodera femorata* (Fabricius, 1787), *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839), *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758), *R. ungaricus* (Herbst, 1784), *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763), *Isotomus speciosus* (D. H. Schneider, 1787), *Rosalia alpina alpina* (Linnaeus, 1758), *Acanthocinus aedilis* (Linnaeus, 1758), *Agapanthia dahli* (C. F. W. Richter, 1820), *Calamobius filum* (Rossi, 1790), *Anaesthetis testacea testacea* (Fabricius, 1781), *Mesosa nebulosa nebulosa* (Fabricius, 1781), *M. curculionoides* (Linnaeus, 1760), *Monochamus galloprovincialis pistior* (Germar, 1818), *Phytoecia icterica* (Schaller, 1783), *P. nigricornis* (Fabricius, 1781), *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767), *E. punctipennis* Mulsant et Guillebeau, 1856, *Menesia bipunctata* (Zoubkoff, 1829) and *Saperda punctata* (Linnaeus, 1767). *G. ustulata*, *P. revestita* and *C. femorata* are confirmed after more than 40 years. The first two were formerly only known from the southern part of the investigated area, from faunistic square 6075. *R. ungaricus* is confirmed from the vicinity of Lysá hora after more than 100 years and after almost 60 years in the area of Smrk mountain in the Moravian-Silesian Beskyds. *R. femoratus*, *I. speciosus*, *Ch. figuratus* and *R. a. alpina* have recently been documented from other localities. All were known mainly on the basis of earlier and individual findings from the monitored area. In the case of *A. dahli* and *A. ferus* – there are only several specimens known in the monitored area.

Callidium coriaceum Paykull, 1800, *Rusticoclytus pantherinus* (Savenius, 1825) and *Saperda similis* Laicharting, 1784 are rare throughout the Czech Republic.

Even for species that are more common in the Czech Republic, insufficient data was available for northern Moravia. Such species include *Judolia sexmaculata* (Linnaeus, 1758), *Stenurella nigra* (Linnaeus, 1758), *Stictoleptura scutellata scutellata* (Fabricius, 1781), *Strangalia attenuata* (Linnaeus, 1758), *Pachyta quadrimaculata* (Linnaeus, 1758), *Stenocorus meridianus* (Linnaeus, 1758), *Rhamnusium bicolor bicolor* (Schränk, 1781), *Anisarthron barbipes* (Schränk, 1781), *Tetropium gabrieli* Weise, 1905, *Pronocera angusta* (Kriechbaumer, 1844), *Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758), *Cerambyx scopoli* Fuessly, 1775, *Chlorophorus herbstii* (Brahm, 1790), *Plagionotus detritus* (Linnaeus, 1758), *Obrium cantharinum cantharinum* (Linnaeus, 1767), *Agapanthia intermedia* Ganglbauer, 1884, *Oberea pupillata* (Gyllenhal, 1817), *Pogonocherus decoratus* Fairmaire, 1855, *P. ovatus* (Goeze, 1777), *Saperda octopunctata* (Scopoli, 1772), *S. perforata* (Pallas, 1773), *Stenostola ferrea ferrea* (Schränk, 1776) and *Tetrops starkii* Chevrolat, 1859. The records of these species confirm their occurrence in the investigated area, and in new mapping squares.

Records of two species that are more abundant in the Czech Republic, *Aromia moschata moschata* (Linnaeus, 1758) and *Callidium aeneum aeneum* (De Geer, 1775) were included, because they were found at altitudes over 1000 m in the Moravian-Silesian Beskyds; the occurrence of *C. a. aeneum* above a height of 1200 m is of interest.

Thirteen species are included in the Red list of endangered species in the Czech Republic (Rejzek 2005) as follows: one species in the „critically endangered“ category: *R. a. alpina*, five species in the „endangered“ category: *A. scabricorne*, *P. revestita*, *R. ungaricus*, *I. speciosus* and *S. punctata*, six species in the „near threatened“ category: *A. m. moschata*, *R. pantherinus*, *P. ovatus*, *M. bipunctata*, *S. octopunctata*, *S. similis* and one in the „vulnerable“ category: *R. b. bicolor*.