
FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC – 351

Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae

Atheta (Philhygra) pseudoelongatula Bernhauer, 1907. Bohemia centr., Praha-Stromovka (5852), 23.VIII.2013, 1 ♂, in Detritus am Fuße eines Eichentorsos (*Quercus* sp.), A. Štouračová & P. Štourač lgt., P. Štourač det. et coll. Wenig bekannte Art, nach drei Exemplaren aus Japan (Kanagawa, Okayama und Takakyama) beschrieben. Nach Vogel (2007) außer Japan bisher nur in China, Russland, Ungarn und vor kurzem auch in Deutschland gefunden. Neue Art für die Fauna der Tschechischen Republik.

Gyrophæna transversalis Strand, 1939. Moravia mer., Mikulov env., Mušlov (7266), 27.VI.2013, 1 ♂, beim Sieben im Schilfbestand am Tümpel in der Sandgrube, zusammen mit der selteneren Art *Scaphium immaculatum* (Olivier, 1790) (Staphylinidae: Scaphidiinae), P. Štourač lgt., det. et coll. Verbreitung nach Smetana (2004): Deutschland, Italien, Österreich, Russland (mitteleuropäischer Teil), Schweiz, Slowakische Republik, Tschechische Republik. In der Tschechischen Republik von Matějček & Boháč (2003) nur aus Böhmen (Český Krumlov) angeführt. Neue Art für die Fauna von Mähren.

MATĚJČEK J. & BOHÁČ J. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 166. Coleoptera: Staphylinidae: Scaphidiinae, Olisthaerinae, Pseudopsinae, Pselaphinae, Oxytelinae, Steninae, Paederinae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. *Klapalekiana* 39: 131–135. – SMETANA A. 2004: Staphylinidae: Aleocharinae. Pp. 353–494. In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp. – VOGEL J. 2007: Drei neue *Atheta*-Arten für die Fauna von Deutschland (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). *Entomologische Blätter* 102 (2006): 165–172.

Petr ŠTOURAC, Taussigova 1169, CZ-182 00 Praha 8-Kobylišy, Tschechische Republik;
e-mail: stourac@chello.cz