

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ FAUNY BROUKŮ ČESKOSLOVENSKA.

Jaromír S t r e j č e k

Během posledních let jsem zjistil některé druhy brouků nových pro faunu Československa, jež uvádím v tomto příspěvku spolu s druhy sice již známými, ale buď velmi vzácnými nebo jinak zajímavými, u nichž většinou podávám i bližší údaje o biotopu či bionomii imag. Dokladové kusy - až na označené výjimky - jsem sbíral sám a jsou uloženy v mé sbírce.

C a r a b i d a e

Olisthopus sturmi Duft. - Bohemia centr.-Praha-okolí, dosti hojný po celý rok na skalních stepích a lesostepích.

Tachys bisulcatus Nicol. - Bohemia centr.-Praha-Stromovka, 11.XII.1960, 1 ex. v kompostu.

Trechoblemus micros Hbst. - Bohemia centr.-Čelákovice, 19.II.1961, v hníždě krtka (Talpa) s vlhčí výstelkou (u tůně).

S i l p h i d a e

Catops neglectus Kr. - Bohemia centr.-Nižbor, 9.V.1956, 1 ex. na zbytcích srny (jeden z našich nejvzácnějších druhů tohoto rodu).

Catops nigricantoides Reitt. - Slovakia mer.-Štúrovo, VI.1963, 2 ex. ♂♂, leg.Rous, coll.Rous et m.(Szymczakowski rev.) - nový druh pro faunu Československa.

Sciodrepa alpestris Jeannel - Bohemia centr.-dostí rozšířený, ale zatím málo známý druh, snadno rozlišitelný od příbuzných druhů formou aedoeagu (viz Szymczakowski, 1961).

S c y d m a e n i d a e

Euconnus rutilipennis Müll.P.W.J. et Kunze - Bohemia centr.-Hostivice u Pr., 14.IV.1963; Kunratice u Pr., 15.XI.1964; v obou případech několik ex. proseto z detritu na březích rybníků v těsné blízkosti vody.

Euconnus (Nepochus) claviger Müll.P.W.J. et Kunze - Bohemia mer.-Dražič u Bechyně, 27.VIII.1961, 1 ex. ve hníždě *Formica rufa*.

Pselaphidae

Plectophloeus erichsoni Aubé - Bohemia centr.-Roztoky, Roztocký háj (st.přír.reservace), 30.VII.1961, 1 ex. z prosevu od paty dubu.

Trichonyx sulcicollis Rchenb. - Bohemia centr.-Praha-Troja, zám.park, 30.X.1961, více ex. v trouchu líp (s mravencem *Lasius brunneus*).

Elateridae

Elater elegantulus Schönh. - Bohemia centr.-Praha, Císařský ostrov, 16.III.1961, 3 ex. v trouchu vrb.

Procraterus tibialis Lac. - S předešlým, ale hojněji (lokalita dnes zničena stavbou).

Euprestidae

Acmaeodera degener Scop. - Moravia mer.-Lednice, 8.VI.1960 (leg.Alex.Strejšková).

Sphaenoptera substriata Kryn. - Slovakia mer.-Čenkov (st.přír.reservace), 13.VII.1961, více ex. sesmýkáno na nízké vegetaci písečné duny za poledního vedra.

Sphaenoptera danubiana Obenbg. - Slovakia mer.-Kamenica n.Hr., 4.VII.1961, více ex.sesmýkáno na stepních sprašových svazích za poledního vedra.

Cylindromorphus sp. (snad bohemicus Obenbg., velmi blízký k C.filum Gyll., ale menší, patrně jen jeho rasa (-Bohemia centr.-Praha-Baba, 21.VI.1960, více ex.; Praha-Podhoří, 2.VII.1963, více ex. - Bohemia sept.-Č.Středohoří, kopec Milá u Loun (st.přír.reservace), 30.IV.1961, 1 ex.; kopec Dlouhý u Kozlů, 17.V.1964, více ex. Vždy na skalních stepích obrácených k jihu.

Trachys problematica Obenbg. - Bohemia centr.-Praha-Baba, Praha-Podhoří, Praha-Dol.Šárka, Praha-Prokop.údolí, Srbsko u Karlštejna, VI.-VIII., dosti častý na teplých skalních stepích.

Eucinetidae

Eucinetus haemorrhoidalis Germ. - Bohemia centr.-Praha ok., na všech stepních a polestepních, k jihu obrácených biotopech dosti hojný v podzimních a jarních podsevech, hlavně pod jednotlivě stojícími keři trnek, hlohů apod.

Nitidulidae

Cateretes bipustulatus Payk. - Bohemia centr.-Lány, 10.V.1963, hojně smýkán na vlhkých loučkách v lesním údolí.

Cateretes rufilabris Latr. - Bohemia sept.-Dubí u Teplic, 28. VI.1953, několik ex. sesmýkáno na lesní mokřině s trsy Juncus sp. a Scirpus sylvaticus.

Meligethes discoideus Er. - Slovakia mer.-Chotín (st.přír.reservace), 5.VI.1960, více ex. na květech trýzlu (Erysimum sp.).

Meligethes solidus Strm. - Bohemia centr.-Praha-Prokopské údolí, 14.VI.1962, velmi hojně na květech devaterníku (Helianthemum sp.) na vápenci.

Meligethes brevis Strm. - Bohemia centr.-S předešlým, 1 ex. (det.Jelínek).

Carpophilus bipustulatus Heer. - Slovakia or.-Remetské Hámre, 13.VII.1955, více ex. pohromadě pod korou na slabší habrové větvi.

Omosita depressa L. - Bohemia occ.-Kynžvart, 21.V.1964, více ex. v lese na zmydelnatělých zbytcích srny.

Cucujidae

Laemophilaeus kraussi Ganglb. - Slovakia mer.-Kováčovské kopce (st.přír.reservace), 17.VIII.1963, mnoho ex. sklepano s ležícími dubových větví.

Lathropus sepicola Müll.Ph. - Bohemia centr.-Praha-Šárka, 17. VI.1964, 2 ex. sklepany s uschlých vrbových větví; Slovakia mer.-Štúrovo ok., V.-VII., hojně na suchých vrbových a dubových větvích. Vždy spolu s Anthribidy z rodu Rhaphitropis.

Eretylidae

Combocerus gleber Schall. - Slovakia mer.-Gbelce, 26.V.1959, 1 ex. na hníku (Coprinus sp.) rostoucím na koňském trusu. Tím by bylo možno vysvětlit i běžně uváděný údaj (Reitter, Fleischer, Roubal) o jeho výskytu v suchém koňském trusu, neboť zde často podhoubí i plodnice hub rostou a druh může být na ně vázán.

Cryptophilus integer Heer. - Slovakia mer.-Štúrovo, 14.VII. 1961, několik ex. smýkáno s řídké vegetace na sprašovém břehu u Dunaje.

Lathridiidae

Holoparamesus caularum Aubé - Bohemia centr.-Praha-Stromovka,

25.XII.1960, více ex. v kompostu.

Holoparamerus kunzei Aubé - Bohemia centr.-Praha-Ruzyně, 1 ex. X.1959, ve starém stohu slámy (leg.Rous).

C o l y d i i d a e

Orthocerus crassicornis Er. - Bohemia centr.-Praha-Podhoří, 11.X.1958, 1 ex. sesmýkán na stepním svahu (leg. Alex.Strejčková).

Diodesma subterranea Guér. - Slovakia mer.-Kováčovské kopce, spolu s Laemophloeus kraussi Ganglb. - viz výše!

Coxelus pictus Strm. - Slovakia oce.-Piešťany ok., 10.IV.1964, hromadně vyklepán z ležících dubových větví; vrch Sitno u B. Štiavnice, 25.VI.1961, 1 ex. pod jedlovou korou.

S p h i n d i i d a e

Asphidiphorus larevinae Duv. - Slovakia mer.-Kováčov, 7.VII.1961, více ex. v prášku uvnitř plodnic hlenek (Myxomycetales) na vrbovém pařezu, spolu s běžným A.orbiculatus Gyll. - Nový druh pro faunu Československa.

A n o b i i d a e

Hedobia pubescens Ol. - Moravia mer.-Lednice, Židlochovice, mnoho ex. vypěstováno z odumřelých větviček ochmetu (Loranthus europaeus), spadlých či odlomených s dubů. Imaga se líhla III.-IV.1961.

Mesoccelopus niger Müll.Ph. - Bohemia centr.-Praha-Stromovka, více ex. vypěstováno z odumřelých silnějších větvíků břečťanu (Hedera helix) sebraných v zimě. Imaga se líhla v V.1961.

O . e . d . e . m . e . r . i . d . a . e .

Asclera (Ischnomera) sanguinicollis F. - Bohemia centr.-Veltrusy, 6.IX.1959, 2 ex. imaturní ve shnilém a mokřím dřevě jasanu, spolu s larvami, z nichž vypěstováno více ex. během zimy.

M o r d e l l i d a e

Mordella bisignata Redtb. - Bohemia centr.-Praha-Bubeneč, 18.VI.1960, 1 ex. na poledního parna na starém stavebním dříví.

M e l a n d r y i d a e

Abdera flexuosa Payk. - Bohemia sept.-Chlumec u Ústí n.L., Ústěk, vypěstován hromadně z tvrdých oranžově zbarvených chorobů rostoucích na olších. Líhnutí imag v V.-VI.1962.

BEITRAG ZUR KENNTNISS DER KÄFERFAUNA VON TSCHECHOSLOWAKEI.

Autor bringt eine Reihe faunistischer Angaben, die sich auf seltenere Käferarten der Fauna von Tschechoslowakei beziehen und führt zugleich Bemerkungen über deren Biotope und Bionomie an. Als neu für die Fauna der Tschechoslowakei sind hier folgende Arten angegeben Catops nigricantoides Reitt. und Aspidiphorus lareyinei Duv.

LITERATURA

F l e i s c h e r A., 1930: Přehled brouků fauny Československé republiky, Brno. R e i t t e r E.; 1916: Fauna Germanica. R o u b a l J., 1930-41: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska, Bratislava-Praha. S z y m c z a k o w s k i W., 1961: Klucze do oznaczania owadów Polski, Catopidae, Warszawa.

EUPITHECIA IMPURATA (HB.) ZJIŠTĚNA V ČECHÁCH A DALŠÍ POZNÁMKY O RODU EUPITHECIA (GEOMETRIDAE, LEP.).

Jiří Š m e l h a u s

Dne 19.července 1964 jsem chytil na hradě Lichnice v Železných horách jeden exemplář píďalky Eupithecia impurata (Hb.). Tato píďalka seděla na stropě stinné místnosti hradu, kde jsou uloženy některé památky ze zbořeníště. Podle údajů o ekologii tohoto druhu vyhledává motýl k odpočinku ve dne stinné skalní rozsedliny a skalní stěny v teplých a vysluněných křovinatých stráních. Motýl je zřídka nalézán.

Dosavadních údajů o výskytu druhu Eupithecia (Tephroclystia) impurata (Hb.) v ČSSR je málo. Sterneček (Prodromus, 1929) neuvádí z Čech žádný spolehlivý nález, Skala (1913) má Schellenbergův údaj Moravská Třebová a Místek - na světlo v červenci, později uvádí Skala (1936) Bílovec a Oderberg. Hrubý (1964) uvádí ze Slovenska pouze dva staré údaje Vángelovy (1885): Horný