DVA NOVÉ DRUHY BROUKŮ PRO ČESKOSLOVENSKO (COL.)
ZWEI FÜR DIE TSCHECHOSLOWAKEI NEUE KÄFERARTEN (COL.)

Leo Heyrovský

1. Oedemera laticollis Seidl. - Druh je rozšířen od Sibiře až do Pannonské nížiny a zjištěn na řadě lokalit v Maďarsku. Na našem území jej poprvé nalezl Stanislav Laibner u Liptovské Porubky na Slovensku v červenci 1960. Nově zjištěný druh je velmi podobný Oedemera virescens (L.), liší se od něho na první pohled širším, příčným štítem. Je u nás pravděpodobně rozšířen i jinde, ale byl přehlížen. Vyskytuje se na bažinatých biotopech.

2. Stenopterus ater (L.) - Tento význačný mediterránní druh chytil ve dvou kusech (in copula) B. Krása v Pezinoku na Slovensku dne 11. července 1969 na květech Umbellifer ve společnosti Stenopterus rufus (L.) a Stenopterus flavicornis Küst. Tesařík Stenopterus ater (L.) je rozšířen v celém Středomoří a jde severovýchodním směrem přes Rumunsko až na Krym. Larva se vyvíjí v zasychajících větvičkách Pistacia lentiscus a Acacia tortilis. Je možné, že k nám uvedený druh byl zavlečen s rostlinami z jihu.

Zusammenfassung

1. Oedemera laticollis Seidl. wurde zum ersten Mal in der Tschechoslowakei bei der Ortschaft Liptovská Porubka in der Slowakei in Juli 1960 von St. Laibner gesammelt. Die Art ist von Sibirien bis in die Pannonische Ebene verbreitet und kommt auf Sumpflokalitäten vor.

2. Stenopterus ater (L.) - Zwei Stücke (in Copula) hat in der Slowakei bei Pezinok am 11. Juli 1969 an Umbelliferen B. Krása gefunden. Diese typisch mediterrane Art ist nordöstlich über Rumänien bis auf die Krim verbreitet. Sie ist neu für die Tschechoslowakei. Eine Verschleppung mit ausländischen Pflanzen ist nicht ausgeschlossen.

Adresa autora (Anschrift des Autors):

Dr. Leo Heyrovský
Platnéřská 7
Praha 1, St. Město

Zprávy Československ. spol. entomol. ČSAV, Praha, 3, 1972.