Published November 6, 2020

Klapalekiana, **56**: 87–130, 2020
ISSN 1210-6100

Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 2007–2014 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období

Interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 2007–2014, supplemented with earlier data

Petr VESELÝ[1)], Květoslav RESL[2)], Jiří STANOVSKÝ[3)], Jan FARKAČ[4)], František GRYCZ[5)], Jiří CHVALKOVSKÝ[6)], Ludvík KAŠPAR[7)], Rudolf KMECO[8)], Radek LÁSKA[9)], Martin LINHART[10)], Adolf MIKYŠKA[11)], Roman MLEJNEK[12)], Pavel MORAVEC[13)], Ivo TĚŤÁL[14)], Pavel VONIČKA[15)] & David SOMMER[16,17)]

[1)] Tálínská 1030, 198 00 Praha-Kyje; e-mail: vesely.ptr@tiscali.cz
[2)] 687 31 Šumice 299; e-mail: kvetoslav.resl@tiscali.cz
[3)] Na výspě 18, 704 00 Ostrava-Výškovice; e-mail: stanovsky.j@seznam.cz
[4)] Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 1176, 165 00 Praha-Suchdol; e-mail: farkac@fld.czu.cz
[5)] Nerudova 10, 370 04 České Budějovice; e-mail: gryczak@seznam.cz
[6)] Bořetín č. 22, 470 02; e-mail: jchvalkovsky@fehrer.cz
[7)] Havířská 1986, 470 01 Česká Lípa; e-mail: kaspar.ludvik@tiscali.cz
[8)] Vítězná 584, 784 01 Litovel; e-mail: kmeco@papcel.cz
[9)] Partyzánů 1938, 688 01 Uherský Brod; e-mail: radomir.laska@tiscali.cz
[10)] Štolmíř 103, 282 01 Český Brod; e-mail: duvalius@volny.cz
[11)] Jiráskova 275, 290 01 Poděbrady; e-mail: adolfmikyska@email.cz
[12)] Jana Zajíce 865, 530 12 Pardubice; e-mail: antroherpon@atlas.cz
[13)] Jezuitská 6, 412 01 Litoměřice; e-mail: pavel.moravec@nature.cz
[14)] Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň; e-mail: itetal@zcm.cz
[15)] Severočeské muzeum, Masarykova 11, 460 01 Liberec; e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz
[16)] Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Viničná 7, 128 43 Praha 2; e-mail: dejv.sommer@gmail.com
[17)] Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol

Faunistics, Coleoptera, Carabidae, Central Europe, Bohemia, Moravia, Czech Republic

Abstract. We present here new faunistic records of 212 rare or little known species of the family Carabidae from the Czech Republic, obtained from 15 private collections. Notes on the biology and habitats of most of the species are included. The following records are of particular interest: *Lebia* (*Lebia*) *humeralis* Dejean, 1825 (confirmation of recent presence in Moravia and the Czech Republic), *Harpalus* (*Harpalus*) *servus* (Duftschmid, 1812) and *Limodromus longiventris* (Mannerheim, 1825) (confirmation of recent presence in Bohemia). Other significant findings for Bohemia include: *Elaphrus* (*Elaphroterus*) *ullrichii* W. Redtenbacher, 1842 and *Sphodrus leucophthalmus* (Linnaeus, 1758) (most recent known occurrence). Significant records for Moravia are: *Acupalpus* (*Acupalpus*) *suturalis* (Dejean, 1829); *Asaphidion austriacum* Schweiger, 1975; *Ophonus* (*Metophonus*) *parallelus* (Dejean, 1829) and *Pogonus* (*Pogonus*) *luridipennis* (Germar, 1822).

ÚVOD

V příspěvku uvádíme přehled faunistických údajů o nových zajímavých nálezech 212 druhů střevlíkovitých brouků z území České republiky z let 2007–2014 a doplňky z let dřívějších, jak je připravili k publikaci autoři z řad Carabidologické sekce České společnosti entomologické. Navazujeme na dříve publikované přehledy zajímavých nálezů střevlíkovitých brouků (Benedikt & Těťál 1989, 1990, 1991, 1994, Veselý & Těťál 1998, Veselý et al. 2002, 2009). Součástí jsou i opravy k dosud poslednímu přehledu zajímavých nálezů (Veselý et al. 2009).

MATERIÁL A METODIKA

Nomenklatura a systematické řazení taxonů čeledi Carabidae jsou použity podle druhé edice Katalogu palearktických brouků (Löbl & Löbl 2017) s několika výjimkami: pojetí rodu *Dyschiriodes* Jeannel, 1941 je podle Fedorenko (1996); taxon *Dyschiriodes benedikti* (Bulirsch, 1995) považujeme za validní druh, nikoliv za synonymum k *D. agnatus* Motschulsky, 1844; taxon *Poecilus sericeus* Fischer von Waldheim, 1824 považujeme za validní druh, nikoliv za synonymum k *P. koyi koyi* Germar, 1823 (cf. Marggi 2017); zachováváme status taxonu *Pterostichus piceolus latoricaensis* Pulpán, 1965 podle Wrase (1992).

Pokud není uvedeno jinak, rozumí se, že jednotliví autoři sbírali, případně pozorovali a determinovali uváděné exempláře sami a dokladový materiál je uložen v jejich sbírce. Údaje o nálezech každého druhu jsou řazeny nejprve podle zemí (Boh., Mor.), dále potom podle data nálezu. Lokalitám jsou přiřazena čísla mapových polí podle Pruner & Míka (1996). Bionomické, faunistické i další poznámky v komentářích k jednotlivým druhům jsou vlastní poznatky autorů a pocházejí z území České republiky.

Použité zkratky

a) zkratky jmen autorů: DS – David SOMMER, FA – Jan FARKAČ, GR – František GRYCZ, CH – Jiří CHVALKOVSKÝ, KA – Ludvík KAŠPAR, KM – Rudolf KMECO, LA – Radomír LÁSKA, LT – Martin LINHART, MI – Adolf MIKYŠKA, ML – Roman MLEJNEK, MO – Pavel MORAVEC, MO et VO – Pavel MORAVEC et Pavel VONIČKA, RE – Květoslav RESL, ST – Jiří STANOVSKÝ, SS – David SOMMER et Václav SOMMER, TL – Ivo TĚŤÁL, VE – Petr VESELÝ, VO – Pavel VONIČKA; VS – Václav SOMMER.

b) ostatní zkratky: Boh. = Bohemia; EVL = evropsky významná lokalita; JčM = Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích; ZF JčU = Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; Mor. = Moravia; NP = národní park; NMP = Národní muzeum, Praha; NPR = národní přírodní rezervace; observ. = pozoroval; NPP = národní přírodní památka; PřF OU = Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity; PLM = Západočeské muzeum v Plzni; PP = přírodní památka; PR = přírodní rezervace; revid. = revidoval; SJMK = Správa jeskyní Moravského krasu, Blansko; UV = ultrafialový světelný zdroj; ÚČOV = Ústřední čistírna odpadních vod (Praha); ZP = zemní past(i); [§KO] = druh kriticky ohrožený dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.; [§O] = druh ohrožený dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.; [ČS/CR] = druh kriticky ohrožený, [ČS/EN] = druh ohrožený, [ČS/RE] = druh vyhynulý, [ČS/NT] = druh téměř ohrožený, [ČS/VU] = druh zranitelný (vše dle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí, viz Veselý et al. (2017)).

PŘEHLED NÁLEZŮ

Leistus (***Leistus***) ***piceus piceus*** Frölich, 1799 – **Boh**.: Trutnov, Poříčský hřbet (5461), 14.VI.2009 – 1 ex. na lesním prameništi (MO), 14.VI.–18.VII.2009 – 1 ex. v ZP v lese (MO et VO); Košov pr. Lomnice nad Popelkou, EVL Kozlov - Tábor (5458), 16.VI.–13.VIII.2010 – 1 ex. v ZP (P. Marhoul lgt. et coll., VO det.) (VO).

Nehojný podhorský a horský druh, v nižších polohách pouze jako relikt na zachovalých vlhkých, chladných a stinných stanovištích.

Leistus* (*Leistus*) *terminatus (Panzer, 1793) – **Boh**.: Branišov (5944), 24.V.2009 – 1 ex. na břehu Blažejského rybníka (TL); Český Brod, Štolmíř (5955), 18.VII.2011 – 10 ex., pozorovány další desítky ex. (LT); Polínka, PR Rašeliniště u Polínek (6044), 14.X.2010 – 1 ex. v prosevu listí v olšině (TL); Úherce, PR Nový rybník (6345), 18.V.2011 – 1 ex. a 10. VI.2011 – 1 ex. mezi vegetací na břehu rybníka (TL); Krásno, V Borkách (5842), 19.V.2011 – 1 ex. na rašeliništi (TL); Lestkov, PR U rybníčků (6143), 15.VI.–12. VII.2013 – 1 ex. a 12.VII.–16.VIII.2013 – 1 ex. v ZP na podmáčené rašelinné louce (TL).

Lokálně se vyskytující druh rozmanitých zachovalejších vlhčích stanovišť, zpravidla na kyselém podkladu.

Leistus* (*Pogonophorus*) *rufomarginatus (Duftschmid, 1812) – **Mor**.: Klentnice env., Sirotčí hrádek (7165), 28.II.2007 – 1 ex. ve vchodové části jeskyně pod hradem (ML lgt. et det., coll. SJMK Blansko) (ML); Nevšová (6973), 15.VI.–17.VIII.2008 – 1 ex. v ZP (RE); Pánov pr. Hodonín (7168), 20.V.–19.VI.2010 – 2 ex. v ZP na území bývalého vojenského cvičiště (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det.) (VO); Bílé Karpaty - Velká Javořina (7172), 2.IX.2011 – 2 ex. (KM).

Druh hájů a listnatých lesů, který je však schopen přechodně osídlit i sousední druhotná a nelesní stanoviště.

Nebria* (*Eunebria*) *jockischii hoepfneri Dejean, 1826 – **Boh**.: Krkonoše - vrch Medvědín pr. Špindlerův Mlýn (5259), 4.VIII.2007 – 4 ex. na kamenitém břehu potoka (VO).

Lokální druh štěrkových břehů horských a podhorských toků.

Nebria* (*Paranebria*) *livida livida (Linnaeus, 1758) – **Boh**.: Mělice (5959), 31.VII.2010 – 1 ex. na břehu v pískovně (VO); Lipno, Lojzovy paseky env. (7350), 14.VIII.2014 – 10 ex. na břehu Lipenské nádrže pod kameny (DS lgt., det. et coll., VE revid.) (DS).

Náročnější druh neznečištěných písčitých břehů stojatých i tekoucích vod.

Notiophilus laticollis Chaudoir, 1850 [ČS/VU] – **Mor**.: Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 1.V.2009 – 2 ex. na hrázi Trkmanky (RE).

Xerofilní druh s velmi lokálním výskytem v nejteplejších oblastech. Zejména na sprašových a vápnitých půdách s nízkou nezapojenou vegetací.

Notiophilus rufipes Curtis, 1829 – **Boh**.: Liteň (6050), 21.IX.2007 – 4 ex. pod listím v dubovém lese (MO et VO), 1.IV.2008 – 1 ex. a 8.V.2008 – 1 ex. tamtéž (MO), 8.–23.V.2008 – 1 ex. v ZP (MO et VO); Levousy, les Šebín (5649–5650), 16.IV.2010 – 1 ex. v dubovém lese na říční terase (MO); Roudníček-Podhájí (5650), 18.VII.2010 – 5 ex. v dubovém lese na říční terase (MO); Štětí env. (5552), 20.VIII.2010 – 1 ex. ve zbytku dubového lesa na bílé stráni (MO); Knovíz (5750), 28.VIII.–25.IX.2010 – 1 ex. v ZP v sadu bez postřiku (MO et VO); Vinařice, Vinařická hora (5850), 25.IX.2010 – 8 ex. v dubovém lese (MO), – 4 ex. tamtéž (VO); Kostelec nad Ohří (5650), 8.IV.2011 – 2 ex. v dubovém lese na říční terase (MO); Chrastín, PP V hlubokém (5649), 8.IV.2011 – 1 ex. v dubovém lese na říční terase (MO); Velim, PP Vítězov (5956), 20.VIII.2011 – 5 ex. v lese u lůmků (KM). **Mor**.: Drslavice, PR Vrchové (6971), 30.III.2011 – 1 ex. na okraji lesa (RE).

Donedávna poměrně vzácný a lokální stenotopní druh teplomilných hájů a lesostepí je v současnosti nalézán stále častěji, a to i ve zcela druhotných, často i nelesních listnatých

porostech. Navíc se začíná šířit i mimo teplejší oblasti, viz např. nálezy od západočeských Čepic (Těťál 2010). Jde o okřídlený druh s denní aktivitou, v letu ale dosud nikdy pozorován nebyl.

Calosoma (***Calosoma***) ***inquisitor inquisitor*** (Linnaeus, 1758) [§O] – **Boh**.: Dubné pr. České Budějovice (7052), 17.V.2009 – 1 ex. v letu na okraji smíšeného lesa (J. Cempírek lgt., GR det. et coll.) (GR).

Predátor housenek motýlů žijící především na stromech, nejčastěji na dubech. Další údaj z jižních Čech.

Calosoma (***Calosoma***) ***sycophanta*** (Linnaeus, 1758) [§O, ČS/VU] – **Mor**.: Načeratice, Načeratický kopec (7162), 14.VII.–10.VIII.2009 – 1 ex. v ZP (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det. et coll.) (VO).

Žije podobně jako druh předešlý, ale je mnohem vzácnější. V ČR v současnosti zřejmě jen v teplých oblastech, především na jižní Moravě.

Carabus (***Carabus***) ***arvensis arvensis*** Herbst, 1784 [§O] – **Boh**.: Krkonoše – vrch Medvědín pr. Špindlerův Mlýn (5259), 20.VI.–26.VII.2007 – 1 ex. v ZP na okraji sjezdovky, 1100–1200 m n. m. (VO); Šumava – vrch Stožec (7148), 4.VI.2010 – 1 ex. pod kusy dřev (KA); Plzeň – Bolevec (6246), 20.IV.–25.V.2011 – 39 ex. a 25.V.–29.VI.2011 – 34 ex. v ZP ve vřesu v okolí Kamenného rybníka (TL); Třemošná – Orlík (6146), 20.IV.–25.V.2011 – 14 ex. a 25.V.–29.VI.2011 – 36 ex. v ZP ve vřesu v borovém lese (TL); Kamenný Újezd, PR Žďár (6247), 10.VII.–3.VIII.2011 – 4 ex. v ZP (TL).; Sedlec pr. Starý Plzenec (6347), 14.IV. –15.V.2012 – 8 ex. v ZP ve vřesu v průseku pod elektrickým vedením (TL).

Lokálně se vyskytující druh polotevřených stanovišť. V nižších polohách žije zpravidla na písčinách a vřesovištích ve světlých borových lesích, v horách nejčastěji v alpínském pásmu.

Carabus (***Carabus***) ***menetriesi pacholei*** Sokolář, 1911 [§KO, ČS/NT] – **Boh**.: Přední Zvonková - Hazlův Kříž (7250), 5.VI.2010 – 1 ex. v ZP (KA); Račín - Přední Zvonková (7250), 5.VI.2010 – 2 ex. v ZP (KA); Volary (7049), 29.VI.2008 – 8 ex. v ZP (M. Snížek lgt., GR det., VO coll.) (GR); Slavkovský les, Nová Ves env. (5942), 25.VI.2012 – 1 ex. v ZP na rašeliništi u obce (TL).

Tyrfobiont, reliktní druh s výskytem na horských a podhorských rašeliništích.

Carabus (***Mesocarabus***) ***problematicus problematicus*** Herbst, 1786 [§O] – **Boh**.: Krušné hory, Hora Sv. Šebestiána env. (5445), 13.V.2007 – 1 ex. (FA). **Mor**.: Stará Říše (6859), 10.V.2007 – 1 ex. pod dřevem (J. Helešic lgt., det. et coll.) (GR).

Lesní druh, lokálně rozšířený zejména v jehličnatých lesích pahorkatin a středních horských poloh.

Carabus (***Platycarabus***) ***irregularis irregularis*** Fabricius, 1792 [§O, ČS/NT] – **Boh**.: Kdyně env., PR Herštýn (6544), III.2007 – 1 ex. a VII.2007 – 1 ex., oba ex. v trouchnivém pařezu (SS lgt., DS det. et coll.) (DS); Poněšice, Nová obora (6852), 31.VIII.2008 – 3 ex. pod kůrou padlých stromů (GR).

Reliktní lesní druh vázaný na zachovalé, především suťové bukové lesy.

Carabus* (*Tachypus*) *cancellatus cancellatus Illiger, 1798 [ČS/NT] – **Boh**.: Nemilkov env. (6746), VII.2006 – 1 ex. do ZP s pivem (SS lgt., VS det., DS coll.) (DS); Dolejší Těšov pr. Hartmanice (6846), V.–X.2007 – 6 ex., V.–X.2008 – 83 ex. a V.2009 – 48 ex. v ZP na pastvině, 730 m n. m. (M. Šlachta lgt., coll. ZF JčU, GR det.) (GR).

Lokálně se vyskytující druh otevřených stanovišť, dříve hojný i na polích. Je možné, že jednou z příčin pokračujícího ústupu druhu může být i úbytek pastvin a extenzívních ploch s nižší vegetací obecně. Z jižních Čech je dosud známo málo údajů.

Cychrus* (*Cychrus*) *attenuatus attenuatus (Fabricius, 1792) – **Boh**.: Krkonoše - vrch Medvědín pr. Špindlerův Mlýn (5259), 26.VII.–21.VIII.2007 – 1 ex. v ZP v klimaxové smrčině (1200 m n. m.) a 3 ex. v ZP v kulturní smrčině s bukem (750 m n. m.) (VO); Trutnov, Poříčský hřbet (5461), 14.VI.2009 – 1 ex. na lesním prameništi (MO); Kamenný Újezd, PR Žďár (6247), 3.VIII.2011 – 2 ex. pod dřevem v bučině (TL). **Mor**.: Maletín (6166), 3.V.2008 – krovky mrtvého ex. u potoka Mírovka (MO).

Reliktní lesní druh, vázaný na zachovalejší, nejčastěji bukové lesy.

Cicindela* (*Cicindela*) *sylvatica sylvatica Linnaeus, 1758 [§O, ČS/NT] – **Boh**.: Nový Vojířov env. (6956), 21.–24.IV.2011 – 13 ex. na písčině v borovém lese, pozorováno více ex. (LT); Obora pr. Doksy (5454), 15.V.2013 – 4 ex. a 14.VI.2013 – 2 ex. na písčité pasece v borovém lese, vždy pozorováno více ex. (VE); Doksy env., Břehyně (5454), 2.VIII.2014 – 1 ex. (M. Mařík lgt. et det., DS coll.) (DS).

Lesní druh vyhledávající zejména písčité paseky a lesní cesty v rozsáhlejších borových lesích. Mimo větší písčitá území se objevuje jen velmi sporadicky.

Cylindera* (*Cylindera*) *germanica germanica (Linnaeus, 1758) [§O, ČS/NT] – **Boh**.: Milovy pr. Sněžné (6362), 1.VII.1992 – 1 ex. (Tesařová lgt., V. Tichý det. et coll.) (GR); Veselí nad Lužnicí (6854), 21.VI.2007 – 1 ex. na světlo na zahradě (V. Křivan lgt., det. et coll.) (GR). **Mor**.: Bohumín (6076), 15.V.2002 – 1 ex. (L. Krišica lgt., ST det. et coll.) (ST); Ostrava-Zábřeh (6175), 5.VI.2007 – 1 ex. (Z. Ivánek lgt. et coll., ST det.) (ST); Klentnice (7165), VI.2009 – 15 ex. v oboře (VS lgt. et det., DS coll.) (DS).

Lokální druh teplejších stanovišť s volnou hlinitou půdou a řídkou, nezapojenou vegetací. Jako jediný z našich svižníků létá v noci, což bylo již vícekrát pozorováno při odchytech na světlo. Zdá se, že v Čechách se počet lokalit mírně zvyšuje. Na Moravě, zejména ve sprašových oblastech, je mnohem častější.

Cylindera* (*Eugrapha*) *arenaria viennensis (Schrank, 1781) [§O] – **Mor**.: Únanov (7062), VI.2009 – 6 ex. (VS lgt. et det., DS coll.) (DS); Dolní Lutyně (6076), 9.VIII.2009 – 1 ex. v pískovně (D. Hrebeň lgt., det. et coll., ST revid.) (ST).

Velmi lokální druh žijící na většinou izolovaných písčitých a jílovitopísčitých stanovištích bez vegetace nebo na druhotných plochách podobného charakteru (skládky a odkaliště popílku).

Blethisa multipunctata multipunctata (Linnaeus, 1758) [ČS/NT] – **Boh**.: Majdalena-Rozvodí (7055), 14.V.2006 – 2 ex. na břehu tůně (KU); Kochánky (5754), 7.V.2007 – 1 ex. v mokřině (MO); Majdalena env. (7055), 22.VI.2008 – 3 ex. na okraji slepého ramene mezi

napadaným listím, pozorováno více ex. (GR); Dvory nad Lužnicí (7155), 31.VII.2009 – 1 ex. v noci v bažině (KU). **Mor**.: Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 17.VII.2007 – 1 ex. na světlo na hrázi říčky Trkmanky (VE); Lanžhot-Lány (7267), 10.V.2008 – 1 ex. v močálu (VO), – 2 ex. v močálu (MO); Lanžhot, PR Soutok (7367), 10.V.2008 – 1 ex. v pískovně u silnice (VO).

Lokální druh vázaný především na ploché, vegetací zarostlé nezastíněné břehy vod.

Elaphrus (***Elaphroterus***) ***aureus aureus*** P. W. J. Müller, 1821 – **Boh**.: Bernartice-Křenov (5361), 16.V.2009 – 6 ex. na písčitém břehu potoka Ličná pod listím a polehlou vegetací (MO et VO), 14.VI.2009 – 1 ex. tamtéž (VO); Černěves (5551), 21.VI.2009 – 2 ex. na písčitém náplavu Labe (MO); Heřmanice (5661), 1.V.2008, 1.VI.2008 a 5.VII.2008 – vždy více ex. na hlinitých březích Labe (MO et VO).

Lokální druh polostinných písčitých a hlinitopísčitých břehů neznečištěných řek.

Elaphrus (***Elaphroterus***) ***ullrichii*** W. Redtenbacher, 1842 [ČS/RE] – **Boh**.: Veselí nad Lužnicí (6854), 8.V.1967 – 1 ex. (V. Karas lgt. et det., coll. JčM) (GR).

Stenotopní druh vázaný na zachovalé písčité a štěrkopískové břehy řek s řídkou vegetací. Uvedený údaj je posledním známým nálezem v Čechách. V ČR je recentně vyhynulý v důsledku regulace a zarůstání břehů a znečištění vod.

Elaphrus (***Neoelaphrus***) ***uliginosus*** Fabricius, 1792 [ČS/NT] – **Boh**.: Kašperské hory env., Amálino údolí (6847), VIII.2007 – 1 ex. (SS lgt., VS det., VE revid., DS coll.) (DS); Horažďovice, rybník Zmrzlík (6648), VIII.2008 – 1 ex. (SS lgt., VS det., VE revid., DS coll.) (DS); Obora pr. Doksy (5454), 25.IV.2013 – 1 ex. v rákosině jižně od železniční trati (VE). **Mor**.: Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 15.IV.2007 – 6 ex. a 23.V.2007 – 2 ex. na podmáčeném poli (KU), 24.IV.2007 – 12 ex. na břehu mokřadu (VE).

Nehojný a lokální druh s výskytem na plochých, podmáčených a vegetací zarostlých březích mělkých tůní a mokřin.

Omophron (***Omophron***) ***limbatum*** (Fabricius, 1777) – **Boh**.: Krejčovice, NPP Blanice (7049), 2.VIII.2009 – 1 ex. na písčitém břehu řeky Blanice, cca 600 m n. m. (KU).

Obyvatel písčitých břehů vod v nížinách. Nálezy ve vyšší nadmořské výšce jsou velmi ojedinělé.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***benedikti*** (Bulirsch, 1995) [ČS/VU] – **Mor**.: Bzenec-Přívoz (7069), 9.VI.1996 – 3 ex. v pískovně (KM).

Málo známý druh nalézaný vzácně na písčitých březích stojatých vod.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***chalceus*** (Erichson, 1837) [ČS/CR] – **Mor**.: Terezín pr. Čejč (7067), 12.V.2008 – 7 ex. na hlinitých plochách kolem tůní na slanisku (GR), – více ex. (MO), – 10 ex. (VE), – 9 ex. (VO), 24.V.2008 – 25 ex. na bahně mezi rákosím a řídkou vegetací na slanisku (LA); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 23.V.2007 – 2 ex. na podmáčeném poli (KU), 17.VII.2007 – 4 ex. a 26.VII.2008 – 3 ex. na světlo na hrázi Trkmanky (VE), 9.V.2008 a 12.–13.V.2008 – 8 ex. na slanisku (MO), 9.V.2008 a 12.V.2008 – 5 ex. tamtéž (VO), 12.–13.V.2008 – 1 ex. tamtéž (VE).

Halobiont. Stálý početnější recentní výskyt je znám jen z okolí Trkmanského dvora. Slanisko u Terezína (bývalé slanisko Zápověď), obnovené v roce 2003, hostilo v roce 2008 bohatou populaci, později však lokalita silně zarostla rákosem a druh vymizel.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***chalybaeus gibbifrons*** (Apfelbeck, 1899) [ČS/CR] – **Mor**.: Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 17.VII.2007 – 7 ex. na světlo na hrázi Trkmanky (VE), 12.V.2008 – 1 ex. na bahně vysýchající mokřiny (VE).

Halobiont. Početněji jen v okolí Trkmanského dvora.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***intermedius*** (Putzeys, 1846) [ČS/NT] – **Boh**.: Český Krumlov, Liščí vrch (7151), 5.VIII.2007 – 2 ex. (KU lgt. et coll., GR det.) (KU); Volfartice-Nová Ves, Holý vrch (5252), 27.V.2008 – 1 ex. na vlhké hlinité ploše pod vyústěním srážkových vod ze skládky (VO); Bernartice-Křenov (5361), 16.V.2009 – 6 ex. na strmém jílovitém břehu potoka Ličná (MO et VO); Kystra, Dolejší Mlýn env. (5649), 9.IV.2010 – 7 ex. na bažinatém okraji pole (MO); Praha, Císařský ostrov (5852), 20.VIII.2012 – 1 ex. do světelného lapače na hrázi Vltavy v areálu ÚČOV (VE).

Nehojný druh zachovalých hlinitých břehů vod. První známý nález na světlo.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***nitidus nitidus*** (Dejean, 1825) [ČS/NT] – **Boh**.: Borovany, NPR Brouskův mlýn (7154), 16.VII.2007 – 1 ex. na světlo (J. Blízek lgt. et det., P. Bulirsch coll.) (GR). **Mor**.: Trávní dvůr pr. Hrabětice (7264), 6.V.2006 – 1 ex. (D. Pleskač lgt. et coll., VO det.) (VO); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 9.V.2008 – 1 ex. na slanisku (VO); Lanžhot, PR Soutok (7367), 10.V.2008 – 3 ex. v pískovně u silnice (VO); Šatov, V Pekle (7262), 2.VIII.2012 – 1 ex. na UV světlo nad vinicemi (VE).

Druh žijící na bahnitých a hlinitých březích nížinných vod. V Čechách je v současnosti jen velmi lokální.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***politus politus*** (Dejean, 1825) – **Boh**.: Předonín (5551–5552), 21.IV.2007 a 19.V.2007 – 5 ex. v pískovně (MO); Poříčany (5855), 16.V.2009 – 1 ex. v pískovně (LT lgt. et. coll., P. Bulirsch det.) (LT); Černá v Pošumaví, Vápenný vrch (7250), 13.VII.2009 – 1 ex. na okraji tůně v opuštěném vápencovém lomu (J. Majer lgt., GR det. et coll.) (GR). **Mor**.: Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 9.V.2008 a 13.V.2008 – 3 ex. na slanisku (VO), 12.–13.V.2008 – 1 ex. na slanisku (MO); Lednice, NPP Pastvisko u Lednice (7266), 23.VIII.2008 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO).

Jeden z méně náročných druhů rodu. Žije na písčitých a hlinitopísčitých březích vod.

Dyschiriodes (***Eudyschirius***) ***rufipes*** (Dejean, 1825) [ČS/VU] – **Mor**.: Přímětice (7162), 2.IX.2010 – 1 ex. na sprašovém svahu společně s *D. bonellii* (Putzeys, 1846) (LT).

Převážně jednotlivě nalézaný a skrytě žijící stepní druh.

Dyschirius (***Dyschirius***) ***angustatus*** (Ahrens, 1830) [ČS/VU] – **Boh**.: Předonín (5551–5552), 19.V.2007 – 1 ex. v pískovně (MO); Nučničky (5451–5551), 13.IV.2009 – 1 ex. v pískovně (MO); Travčice (5451–5551), 15.V.2009 – 3 ex. ve staré pískovně (MO).

Druh otevřených písčitých stanovišť, často žijící i na suchých bezvodých místech. Nálezy na lokalitě Hamr na Jezeře byl potvrzen výskyt na Českolipsku a v celém Libereckém kraji po téměř 100 letech (cf. Kral 1915).

Dyschirius* (*Dyschirius*) *digitatus (Dejean, 1825) [ČS/NT] – **Boh**.: Ktová (5457), 26.IV.2007 – 3 ex. na břehu Libuňky (R. Čtvrtečka lgt., VO det., coll. R. Čtvrtečka a Severočeské muzeum v Liberci) (VO); Heřmanice (5661), 1.V.2008, 1.VI.2008 a 5.VII.2008 – vždy více ex. na hlinitých březích Labe (MO ET VO).

V Čechách velmi lokální druh s vazbou na zachovalé břehy vod.

Broscus* (*Broscus*) *cephalotes (Linnaeus, 1758) – **Boh**.: Strakonice, pískovna u Drachkova (6749), 3.IV.2010 – 1 ex. v pískovně u kořenů rostlin (J. Cempírek lgt., GR det. et coll.) (GR); Františkov (7155), 22.V.2010 – 1 ex. v pískovně u Dračice (LT); Tušť (7155), 11.V.2007 – 1 ex. do ZP v pískovně (KU).

Druh volných, nezastíněných písčitých a písčitohlinitých stanovišť. Vyhledává především pískovny a hliniště. Občas i na okrajích písčitých polí a březích v nivách řek. Na řadě míst znatelně ubývá.

Asaphidion austriacum Schweiger, 1975 – **Mor**.: Drnholec (7164), 12.IV.1988 – 1 ex. v náplavu Dyje (V. Karas lgt., coll. JčM, GR det., VE revid.) (GR); Přímětice (7162), 11.IV.2007 – 1 ex. v listí na rozhraní pole a lipového hájku při okraji kaolinového lomu (GR); Únanov, kaolínka (7162), 24.VIII.2013 – 1 ex. v kaolinovém lomu (J. Kovář lgt. et coll., GR det., VE revid.) (GR.), 22.III.2014 – 6 ♂, 2 ♀♀ pod listím ve stinném rohu odkaliště v lesíku (LT), 1.V.2014 – 14 ex. v kaolinovém lomu (J. Kovář lgt. et coll., 3 ex. in coll. GR, GR det.) (GR); Přímětice (7162), 2.V.2014 – 2 ♂♂, 3 ♀♀ v prosevu topolového listí na okraji odkaliště kaolinového lomu (GR).

Druh žije na vlhkých, polozastíněných jílovitých, jílovitopísčitých až písčitých březích vod. Je snadno zaměnitelný s obecným druhem *Asaphidion flavipes* (Linnaeus, 1761), se kterým se navíc často vyskytuje společně. Jako nový pro ČR a Moravu byl tento druh poprvé publikován na základě nálezu z roku 2008 z Křemačova u Mohelnice (Křivan et al. 2009). Teprve později byly rozpoznány dva výše uvedené starší nálezy z Drnholce a Přímětic. Nedávno byl zjištěn na několika lokalitách i v Čechách, a to na dolním Labi a Ohři (Vonička et al. 2017). Na Slovensku je znám z břehů Dunaje od Bratislavy po Štúrovo. Poznámka: lokalizace Únanov a Přímětice se týká téže oblasti kaolinových lomů situovaných mezi oběma obcemi.

Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) – **Mor**.: Bohuslavice (6074), 11.VI.2011 – 6 ex. v pískovně (L. Krišica lgt., ST det. et col.) (ST); Přímětice (7162), 11.IV.2008 – 1 ex. a 2.IX.2010 – 5 ex. v opuštěném kaolínovém lomu, pozorováno více ex. (GR).

Velmi lokální druh volných vlhčích hlinitých a hlinitopísčitých stanovišť.

Bembidion* (*Asioperyphus*) *lunatum (Duftschmid, 1812) [ČS/NT] – **Boh**.: Majdalena env. (7055), 8.VIII.1983 – 2 ex. na hlinitém břehu Lužnice (V. Karas lgt. et det., coll. JčM) (GR).

Velmi lokální druh volných hlinitých a hlinitopísčitých břehů vod.

Bembidion* (*Bembidion*) *humerale humerale Sturm, 1825 – **Boh**.: Nový Vojířov env. (6956), 9.IV.2009 – 1 ex. na břehu lesní tůně (LT); Lomy u Kunžaku env. (6856), 23.IV.2011 – 1 ex. na rašeliništi (LT); Cep (7054), 29.IV.2007 – 1 ex. u vody v pískovně (GR).

Reliktní druh nížinných rašelinných i písčitých stanovišť.

Bembidion (***Bembidionetolitzkya***) ***atrocaeruleum*** (Stephens, 1828) – **Boh**.: Špindlerův Mlýn (5259), 21.VI.2007 – 2 ex. na štěrkovém břehu Labe (VO); Blažejovice, NPP Blanice (7049), 5.VIII.2007 – 2 ex. v suchém štěrku na břehu řeky Blanice (KU lgt. et coll., GR det.) (KU); Krejčovice, NPP Blanice (7049), 19.VII.2009 – 7 ex. na štěrkopísčitém břehu Blanice (GR); Spálenec, NPP Blanice (7049), 2.VIII.2009 – 2 ex. na štěrkopísčitém břehu Blanice (GR); Záblatí, PR Na soutoku (7049), 12.IX.2010 – více ex. na štěrkopísčitém břehu Blanice (GR).

Lokální druh přírodně zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion (***Bembidionetolitzkya***) ***conforme*** Dejean, 1831 [ČS/EN] – **Mor**.: Raškovice (6376), 20.VI.2011 – 5 ex. na břehu Morávky (KM).

Velmi lokální a nehojný reliktní druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion (***Bracteon***) ***litorale*** (Olivier, 1790) [ČS/EN] – **Boh**.: Majdalena, NPR Stará řeka (7055), 14.V.2006 – 1 ex. na písčitých nánosech na levém břehu Lužnice (Žahour lgt., KU det. et coll.), – 1 ex. (KU); Nepasice (5761), 30.IV.2010 – 1 ex. na břehu Orlice (J. Kovář lgt., GR det. et coll.) (GR); Suchdol nad Lužnicí, PR Na Ivance (7055), 24.V.2009 – 7 ex. na písčitých nánosech řeky Lužnice, pozorováno více ex. (GR).

V Čechách velmi lokální druh zachovalých písčitých břehů řek.

Bembidion (***Chlorodium***) ***pygmaeum*** (Fabricius, 1792) [ČS/NT] – **Mor**.: Přímětice (7162), 7.V.2006 – 5 ex. v hliništi kaolínky (VO); Starý Bohumín, PP Hraniční meandry Odry (6076), 28.V.2010 – 1 ex. (L. Krišica lgt., ST det. et coll.) (ST).

Velmi lokální druh písčitých a hlinitých půd se sporou vegetací v přírodně zachovalých oblastech.

Bembidion (***Diplocampa***) ***fumigatum*** (Duftschmid, 1812) – **Boh**.: Horažďovice, rybník Zmrzlík (6648), IV.2007 – 1 ex. (SS lgt., VS det., VE revid., DS coll.) (DS); Obora pr. Počedělice, Loužek (5649), 4.V.2007 – 1 ex. v močálu (MO); Český Brod, Štolmíř (5955), 16.VII.2010 – 1 ex. na světlo (LT); Obora pr. Doksy (5454), 25.IV.2013 – 1 ex. v rákosině jižně od železniční trati (VE). **Mor**.: Trávní dvůr pr. Hrabětice (7264), 6.V.2006 – 3 ex. a 8.V.2006 – 1 ex. (VO).

Hygrofilní druh s lokálním výskytem na zachovalých mokřadech s bohatou bylinnou vegetací.

Bembidion (***Emphanes***) ***azurescens azurescens*** Dalla Torre, 1877 – **Boh**.: Kadaň env. (5645), VI.2013 – 1 ex. (VS lgt. et det., VE revid., DS coll.) (DS); **Mor**.: Terezín pr. Čejč (7067), 12.V.2008 – 3 ex. na hlinitých plochách kolem tůní na slanisku (VO); Únanov (7062), VII.2013 – 5 ex. (VS lgt. et det., VE revid., DS coll.) (DS).

Nehojný, v současné době ubývající druh hlinitých a hlinitopísčitých břehů vod.

Bembidion (***Emphanes***) ***minimum*** (Fabricius, 1792) – **Mor**.: Dolní Lutyně (6076), 18.VI.2011 – 1 ex. v pískovně (D. Hrebeň lgt., det. et coll., ST revid.) (ST).

Nejčastější z našich druhů podrodu *Emphanes*, vyskytuje se zejména na hlinitých a bahnitých březích vod, často na vypuštěných rybnících a na zasolených plochách.

Bembidion (***Emphanes***) ***tenellum tenellum*** Erichson, 1837 – **Boh**.: Praha-Sedlec (5852), 28.IV.2008 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO); Liteň (6050), 8.V.2008 – 1 ex. u louže na hlinitém ruderálu mezi rybníkem a vlhkou loukou (VO); Praha, Císařský ostrov (5852), 12.VII.2010 – 1 ex. do světelného lapače na hrázi Vltavy v areálu ÚČOV (VE); Praha -Troja (5852), 10.VII.2012 – 2 ex. na štěrkopískovém břehu Vltavy pod ZOO (VE); Praha-Podbaba (5852), 28.VII.2013 – 1 ex. do světelného lapače u Vltavy nedaleko přívozu (F. Fiala lgt., VE lgt. et coll.) (VE); Praha-Dubeč (5953), 4.VII.2014 – 1 ex. a 20.VII.2014 – 3 ex. na světlo na polní mokřině při západním břehu rybníka Slatina (VE); Praha-Dubeč (5953), 19.VII.2014 – 1 ex. na světlo na dně vypuštěného rybníka Rohožník (VE). **Mor**.: Trávní dvůr pr. Hrabětice (7264), 6.V.2006 – 1 ex. (MO), – 3 ex. (VO), – 1 ex. (D. Pleskač lgt. et coll., VO det.), 8.V.2006 – 1 ex. (MO); Milovice env., Křivé jezero (7166), V.2008 – 6 ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 9.V.2008 a 12.–13.V.2008 – 4 ex. na slanisku (MO), 9.V.2008 – 1 ex. na slanisku (VO); Terezín pr. Čejč (7067), 12.V.2008 – 2 ex. na hlinitých plochách kolem tůní na slanisku (MO), – 2 ex. (VO); Maletín (6166), 31.V.2008 – 1 ex. na vlhkém hlinitém břehu rybníka (MO); Šatov, V Pekle (7262), 2.VIII.2012 – 36 ex. na UV světlo nad vinicemi (VE).

Hygrofilní, do nedávna nehojný a lokální druh, s častějším výskytem na zasolených půdách. V současné době se zřetelně šíří a zejména v Čechách se objevuje i na místech, kde dříve nebyl nikdy pozorován. Příčinou mohou být zvětšující se plochy litorálů i možné zvýšení salinity některých mokřin během posledních suchých let.

Bembidion (***Euperyphus***) ***fluviatile fluviatile*** Dejean, 1831 [ČS/NT] – **Boh**.: Halámky, PR Horní Lužnice (7155), 12.X.2008 – 1 ex. na písčitém břehu lesního rybníku (GR); Nepasice (5761), 21.V.2009 – 1 ex. na břehu Orlice (J. Kovář lgt. et coll., J. Prouza det.), 30.IV.2010 – 5 ex. na břehu Orlice (J. Kovář lgt., GR det., 3 ex. in coll. J. Kovář, 2 ex. in coll. GR) (GR); Blešno (5761), 23.IV.2011 – 2 ex. na břehu Orlice (J. Kovář lgt., GR det., 1 ex. in coll. J. Kovář, 1 ex. in coll. GR) (GR); Suchdol nad Lužnicí, PR Na Ivance (7055), 24.V.2009 – 9 ex. na kolmém hlinitém břehu Lužnice, pozorováno více ex. (GR lgt. et det., 1 ex. in coll. LT, 2 ex. in coll. VE) (GR).

Velmi lokální druh vegetací nezarostlých a neznečištěných písčitých a hlinitopísčitých břehů vod. Často v puklinách kolmých březů ve společnosti druhu *Nebria livida*.

Bembidion (***Euperyphus***) ***testaceum testaceum*** (Duftschmid, 1812) [ČS/EN] – **Boh**.: Beňovy (6645), 30.IV.2011 – 6 ex. na štěrkovém břehu zatopených částí pískovny (TL).

Druh zachovalých písčitých a štěrkových břehů řek a potoků. Potvrzení výskytu na jediné známé recentní lokalitě v západních Čechách (cf. Těťál 2010).

Bembidion (***Hydrium***) ***laticolle*** (Duftschmid, 1812) [ČS/EN] – **Mor**.: Přímětice (7162), 7.V.2006 – 15 ex. v hliništi kaolínky (VO), – mnoho ex. tamtéž (MO).

Druh zachovalých písčitých a hlinitopísčitých břehů. V Příměticích žije největší populace v ČR.

Bembidion (***Notaphus***) ***obliquum*** Sturm, 1825 – **Mor**.: Těrlicko-přehrada (6276), 7.V.2011 – 1 ex. (D. Hrebeň lgt., det. et coll., ST revid.) (ST); Lednice env. (7266), VI.2014 – 2 ex. (VS lgt. et det., coll. DS, VE revid.) (DS).

Hygrofil, žijící na mokřadech s kyselým podkladem a na rašeliništích. V Čechách je v některých oblastech hojný, na Moravě a ve Slezsku jde o vzácnější druh.

Bembidion (***Notaphus***) ***semipunctatum*** (Donovan, 1806) – **Boh**.: Borovany, NPR Brouskův mlýn (7154), 16.VII.2007 – 5 ex. na světlo, pozorováno více ex. (GR).

Lokální a jen místy hojný druh vyhledávající písčité a štěrkopískové břehy vod. Zdá se, že v poslední době ubývá. Z jižních Čech známe jen velmi málo nálezů.

Bembidion (***Ocydromus***) ***modestum*** (Fabricius, 1801) [ČS/VU] – **Boh**.: Majdalena (7055), 14.V.2006 – 6 ex. v pískovně (KU); Heřmanice (5661), 1.V.2008 – 1 ex. ve štěrku na levém břehu Labe (MO); Cep (7054), 19.V.2006 – 8 ex. v pískovně (KU); Halámky (7155), 17.VIII.2006 – 3 ex. v pískovně (KU), 3.IV.2008 a 12.X.2008 – masový výskyt na písčitém břehu u lesního rybníčku (GR); Suchdol nad Lužnicí env. (7055), 26.VII.2009 – 2 ex. v pískovně Cep I, 1.VIII.2009 – 1 ex. v noci pod kamenem v pískovně Cep I (KU).

V Čechách v současnosti velmi lokální druh vázaný na volné písčité a štěrkopískové břehy vod.

Bembidion (***Peryphanes***) ***milleri milleri*** Jacquelin du Val, 1852 – **Boh**.: Chotěšov (5550), 20.V.2009 – 4 ex. v pískovně (MO); Suchdol nad Lužnicí env. (7055), 26.VII.2009 – 3 ex. a 27.VII.2009 – 10 ex., v pískovně Cep I, pozorováno více ex. (KU); Zahájí pr. Zliv (6952), 9.V.2010 – 24 ex. v opuštěném lomu na jíl (GR lgt. et det., 10 ex. in coll. GR, 2 ex. in coll. J. Blízek, 2 ex. in coll. F. Houška, 4 ex. in coll. LT, 2 ex. in coll. M. Šlachta, 4 ex. in coll. VO) (GR). **Mor**.: Přímětice (7162), 7.V.2006 – 1 ex. v hliništi kaolínky (D. Pleskač lgt. et coll., VO det.) (VO).

Druh vázaný na volné jílovité půdy, pravidelně nalézaný v cihelnách, hliništích a lomech.

Bembidion (***Peryphiolus***) ***monticola monticola*** Sturm, 1825 – **Boh**.: Heřmanice (5661), 5.VII.2008 – 2 ex. ve štěrkopísku na levém břehu Labe (MO et VO); Bernartice-Křenov (5361), 16.V.2009 – 2 ex. u potoka Ličná (VO), 14.VI.2009 – 8 ex. ve štěrkopísku na břehu potoka Ličná (MO et VO); Františkov (7155), 5.IX.2008 – 6 ex. v okolí řeky Dračice (KU); Blažejovice, NPP Blanice (7049), 19.VII.2009 – 3 ex. na písčitých březích (GR), 2.VIII.2009 – 1 ex. na břehu Blanice, 5.VIII.2007 – 1 ex. na hlinitém břehu Blanice (KU); Krejčovice, NPP Blanice (7049), 2.VIII.2009 – 11 ex. na písčitých březích, někteří jedinci immaturní, pozorováno více ex. (GR lgt. et det., 8 ex. in coll. GR, 1 ex. in coll. LT, 2 ex. in coll. VE), 27.IX.2009 – 1 ex. na písčitých březích, immaturní ex. (GR). **Mor**.: Křemačov (6267), 31.V.2008 – 1 ex. na hlinitém nezastíněném břehu potoka Mírovka (MO).

Lokální druh zachovalých štěrkopískových a hlinitých břehů podhorských toků.

Bembidion (***Peryphus***) ***tetracolum tetracolum*** Say, 1823 – **Boh**.: Praha, Císařský ostrov (5852), 30.VI.2009 – 1 ex. na světlo v areálu ÚČOV (VE).

Přesto, že jde o obecný hygrofilní druh, je přílet na světlo pozorován jen zcela výjimečně.

Bembidion (***Philochthus***) ***neresheimeri neresheimeri*** J. Müller, 1929 [ČS/NT] – **Mor**.: Trávní dvůr pr. Hrabětice (7264), 8.V.2006 – 9 ex. (VO).

Lokální druh zejména subhalofilních mokřadů. V ČR pouze na jižní Moravě.

Bembidion (***Semicampa***) ***gilvipes*** Sturm, 1825 – **Boh**.: Český Brod, Štolmíř (5955), 30.I.2011 – 1 ex. a 12.II.2011 – 1 ex. pod kůrou ležícího topolu (LT). **Mor**.: Sedlec env., Nesyt (7266), V.2014 – 1 ex. (VS lgt. et det., coll. DS, VE revid.) (DS).

Nehojný hygrofilní druh žijící v lužních lesích a na vlhkých loukách u větších a zachovalých mokřadů.

Bembidion (***Semicampa***) ***schueppelii*** Dejean, 1831 – **Mor**.: Lobodice, NPR Zástudánčí (6669), 13.IV.2009 – 1 ex. (E. Ezer lgt. et coll., RE det.), – 6 ex. (L. Bobot lgt. et coll., RE det.) (RE); Starý Bohumín, PP Hraniční meandry Odry (6076), 4.VIII.2010 – 1 ex. (L. Krišica lgt., ST det. et coll.) (ST).

Hygrofil. Nejčastěji na zachovalých březích podhorských potoků a řek.

Ocys quinquestriatus quinquestriatus (Gyllenhal, 1810) – **Boh**.: Dolní Třebonín (7152), 24.VIII.2009 – 1 ex. pod kůrou dubové fošny v truhlárně (GR); Kaplice (7252), 8.V.2014 – 1 ex. v hromadě starých cihel na nádraží (GR).

Široce rozšířený, ale skrytě žijící a poměrně zřídka nalézaný druh. Nejčastěji je nalézán koncem léta a na podzim synantropně na skládkách cihel, zbořeništích, ve sklepech a na podobných místech.

Sinechostictus (***Sinechostictus***) ***millerianum*** (Heyden, 1883) – **Boh**.: Záblatí, PR Na soutoku (7049), 2.VIII.2009 – 1 ex. a 12.IX.2010 – 5 ex. na štěrkopísčitém břehu Blanice (GR), 12.IX.2010 – 4 ex. tamtéž (D. Čudan lgt. et coll., GR det.) (GR). **Mor**.: Starý Bohumín, PP Hraniční meandry Odry (6076), 28.V.2010 – 1 ex. (L. Krišica lgt., ST det. et coll.) (ST).

Lokální a vzácný druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků. Záblatí je druhou známou recentní lokalitou druhu v Čechách (cf. Veselý et al. 2009) (GR).

Sinechostictus (***Sinechostictus***) ***ruficornis*** (Sturm, 1825) [ČS/EN] – **Boh**.: Raškovice (6376), 6.VIII.2011 – 1 ex. na štěrkových březích Morávky (RE), – 3 ex. (LT).

Lokální a vzácný druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Sinechostictus (***Sinechostictus***) ***stomoides stomoides*** (Dejean, 1831) – **Boh**.: Prášily env. (6846), IV.2007 – 1 ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS); Bernartice-Křenov (5361), 16.V.2009 a 14.VI.2009 – více ex. ve štěrkopísku na břehu potoka Ličná (MO et VO). **Mor**.: Vidly-Jelení bučina (5869), 10.VI.2009 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt., GR det. et coll.) (GR).

Lokální druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků, nejčastější druh rodu.

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) – **Boh**.: Hartvíkovice (6862), 28.V.2010 – 1 ex. na břehu Dalešické přehrady (J. Máca lgt. et coll., GR det.) (GR); Plzeň (6246), 19.VI.2013 – 1 ex. na světlo na balkóně obytného domu v centru města (TL).

Skrytě žijící druh vázaný na rozmanitý vlhký tlející rostlinný materiál.

Tachys (***Paratachys***) ***fulvicollis*** (Dejean, 1831) – **Boh**.: Praha, Prokopské údolí pr. Jinonice (5952), 9.VI.2004 – 1 ex. na světlo na okraji skalní stepi nad koupalištěm (VE); Praha, Císařský ostrov (5852), 23.VII.2004 – 1 ex. a 2.VI.2008 – 1 ex. na světlo v areálu ÚČOV, 12.VII.2010 – 2 ex. a 8.VI.2014 – 6 ex. do světelného lapače v areálu ÚČOV (VE); Praha-Pitkovice, PP

Pitkovická stráň (5953), 30.VII.2005 – 1 ex. na světlo na louce nad Pitkovickým potokem (VE); Předonín (5551–5552), 10.VI.2007 – 1 ex. na břehu vodní plochy v pískovně (MO). **Mor**.: Uherský Brod (6971), 12.V.2007 – 3 ex. pod vegetací u mokřadu, 20.VII.2007 – 1 ex. na světlo u mokřadu (RE); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7166), 14.VI.2009 – 3 ex. na na bahně na dně vypuštěného rybníka (LA); Šumice (6972), 13.VII.2010 – 1 ex. a 16.VII.2010 – 1 ex. na světlo (RE); Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 22.VII.2010 – 2 ex. na světlo (J. Vávra lgt. et coll., L. Koloničný det.), – 2 ex. (T. Sitek lgt. et coll., ST det.) (ST); Troskotovice (7064), 12.VI.2008 – 1 ex. na břehu Troskotovického rybníka (KU).

Vzácný halofilní druh, nalézaný nejčastěji na zasolených místech, na bahně vypuštěných rybníků nebo při odchytu na světlo. Jednotlivé nálezy pocházejí i z břehů zatopených pískoven a z močálů.

Tachys (***Paratachys***) ***micros*** (Fischer von Waldheim, 1828) – **Boh**.: Praha-Zbraslav (6052), 1.VI.2008 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO); Černěves (5551), 21.VI.2009 – 3 ex. na písčitém náplavu Labe (MO).

Druh žije na štěrkových a písčitých březích dolních toků řek, výjimečně i v hliništích.

Tachys (***Paratachys***) ***turkestanicus*** Csiki, 1928 – **Mor**.: Přímětice (7162), 7.V.2006 – 2 ex. na zasoleném místě u vodní plochy (MO), – 1 ex. tamtéž (VO); Únanov (7062), IV.2013 – 2 ex. (VS lgt., VE det., DS coll.) (DS); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 24.IV.2007 – 1 ex. na úhoru pod jižní hrází Trkmanky (VE), 12.V.2008 – 1 ex. na bahně vysýchající mokřiny (VE); Terezín pr. Čejč (7067), 12.V.2008 – 1 ex. na březích tůní na obnoveném slanisku (VE); Karviná env. (6177), VII.2008 – 1 ex. (P. Boža lgt., det. et coll., ST revid.) (ST); Šumice (6972), 3.VIII.2010 – 1 ex. na okraji pole u říčky Olšavy (VE); Bzenec-Přívoz (7069), 3.V.2008 – 2 ex. na hlinitém břehu ramene Moravy (LA).

Lokální druh vlhčích, především otevřených hlinitopísčitých stanovišť, častěji zejména na březích vod a v hliništích. Ze severní Moravy a Slezska byl doposud znám jen jeden údaj z Bohumína (Stanovský & Pulpán 2006).

Tachyura (***Tachyura***) ***diabrachys*** (Kolenati, 1845) – **Mor**.: Lanžhot, PR Soutok (7367), 10.V.2008 – 1 ex. v pískovně u silnice (VO).

Dříve vzácný, dnes expanzivní a široce rozšířený druh, častý i na druhotných lokalitách mimo břehy řek (štěrkové cesty, lomy, pískovny atd.).

Tachyura (***Tachyura***) ***parvula*** (Dejean, 1831) – **Boh**.: Předonín (5551–5552), 19.V.2007 – 2 ex. v pískovně (MO); Volfartice-Nová Ves, Holý vrch (5252), 16.VIII.2007 – 1 ex. a 18.IV.2008 – 12 ex. na hlinitých svazích v bývalém lomu (VO); Svinišťany (5661), 1.V.2008 – více ex. na holém svahu v hliníku (MO et VO); Praha, Císařský ostrov (5852), 2.VI.2008 – 1 ex. na světlo v areálu ÚČOV (VE).

Nevzácný druh vázaný na volné písčité a hlinité plochy, často nalézaný i daleko od vody.

Pogonus (***Pogonus***) ***luridipennis*** (Germar, 1822) [ČS/CR] – **Mor**.: Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 17.VII.2007 – 2 ♀♀ na světlo na hrázi říčky Trkmanky (VE).

Halobiont, vyhledávající hlinité i písčité břehy porostlé řídkou vegetací. V ČR zjištěn pouze několikrát, a to především na jižní Moravě. Z Čech jsou známé dva nálezy (Tropek et al.

2014). Z Moravy uvádí další nález Křivan (2018). Za příznivých let tento druh zřejmě podniká dlouhé přelety severním a severozápadním směrem, při kterých aktivně vyhledává místa alespoň s minimálním zasolením.

Perileptus (***Perileptus***) ***areolatus areolatus*** (Creutzer, 1799) [ČS/NT] – **Mor**.: Lanžhot, PR Soutok (7367), 10.V.2008 – 1 ex. v pískovně u silnice (MO) – 2 ex. tamtéž (VO).

Lokálně hojný stenotopní druh vázaný na zachovalé štěrkové břehy potoků a řek.

Blemus discus discus (Fabricius, 1792) – **Boh**.: Nové Hrady-Byňov (7254), 20.VII.2007 – 3 ex. na světlo (KU lgt. et coll., GR det.) (KU); Řípec (6754), 7.VI.–5.VII.2009 – 1 ex. v ZP v nivě Lužnice (MO et VO); Plzeň (6246), 25.VII.2012 – 1 ex. a 18.VII.2014 – 1 ex. na světlo na balkóně obytného domu v centru města (TL); Lestkov, PR U rybníčků (6143), 12.VII.2013 – 4 ex. na světlo (TL).

V podzemních dutinách skrytě žijící druh, poměrně dosti hojný na vlhčích loukách a v okolí vod. Početněji je ale nalézán jen v letních náplavech a při odchytech na světlo.

Trechoblemus micros (Herbst, 1784) – **Boh**.: Krkonoše-vrch Medvědín pr. Špindlerův Mlýn (5259), 20.VI.2007 – 1 ex. pod kamenem na vrcholu (1230 m n. m.) (VO); Krušné hory-Krásný Les, jeskyně na Špičáku (5249), 20.VI.2007 – 1 ex. v ZP (M. Holec lgt., MO det et coll.) (MO); Budyně nad Ohří, Pístecký les (5550), 21.IV.2009 – 1 ex. na světlině v lužním lese (MO); Řípec (6754), 4.VII.2009 – 2 ex. vyplavené povodní v nivě Lužnice (MO). **Mor**.: Moravský kras, Ostrovská plošina, Nová Amatérská jeskyně (6666), 12.II.2005 – 1 ex. v Rozlehlé chodbě, 15.II.2007 – 1 ex. u Dlouhého jezera (ML lgt. et det., coll. SJMK Blansko) (ML); Ostrava-Výškovice (6275), 19.V.2010 – 2 ex. v náplavu Odry (ST).

V podzemních dutinách žijící druh, častěji bývá zpravidla nalézán jen v náplavech v nivách řek, v jeskyních a v norách hlodavců.

Trechus (***Epaphius***) ***rivularis*** (Gyllenhal, 1810) – **Boh**.: Spálenec, NPP Blanice (7049), 2.VIII.2009 – 1 ex. a 19.VII.2009 – 2 ex. pod rostlinnými zbytky v olšině (GR), 2.VIII.2009 – 3 ex. v okolí řeky Blanice (KU); Dobrá, Mrtvý luh (7149), 26.VIII.2006 – 3 ex. na rašeliništi (KM), 4.VII.2011 – 9 ex. (RE); Slavkovský les, Nová Ves env. (5942), 25.VI.2012 – 1 ex. v ZP na rašeliništi u obce (TL); Lestkov, PR U rybníčků (6143), 15.VI.–12.VII.2013 – 1 ex. v ZP na podmáčené rašelinné louce (TL).

Velmi lokální, bioindikačně významný stenotopní druh rašelinišť a podmáčených rašelinných luk. Spálenec, Nová Ves a Lestkov jsou nově objevené lokality pro ČR (cf. Bašta et al. 2002, Kaláb 2003).

Trechus (***Trechus***) ***amplicollis*** Fairmaire, 1859 – **Mor**.: Jeseníky, Rejvíz (5769), 25.VII.2008 – 1 ex. (T. Sitek lgt. et coll., ST det.) (ST).

Lokální reliktní druh rašelinišť a podmáčených půd v horách a podhůří.

Trechus (***Trechus***) ***austriacus*** Dejean, 1831 – **Boh**.: Praha, Císařský ostrov (5852), 8.I.2007 – 1 ex. na levém břehu Vltavy (J. Strejček lgt., VE det. et coll.) (VE), 8.X.2007 – 5 ex. pod kořeny ostřic na štěrkopískovém břehu Vltavy západně od lávky do Troje (VE), 29.I.2008 – 1 ex. tamtéž, teplota cca 7 °C (VE). **Mor**.: Mikulovská vrchovina, Klentnice env., Sirotčí hrádek,

jeskyně pod hradem (7165), 28.II.2007 – 1 ex. ve vchodové části (ML lgt., J. Prouza det., coll. SJMK Blansko) (ML); Uherský Brod (6971), 2.VI.2007 – 1 ex. u mokřadu (RE); Mikulovice (7062), 29.VIII.2010 – 1 ex. v kompostu (J. Vávra lgt. et coll., L. Koloničný det.) (ST).

Široce rozšířený, ale skrytě žijící a jen lokálně nalézaný druh. Častěji je nalezán v různých podzemních prostorách nebo synantropně na skládkách, rumištích, ruderálech a podobných místech. Naproti tomu břeh Vltavy zřejmě představuje primární přirozené stanoviště.

Trechus (***Trechus***) ***montanellus*** Gemminger et Harold, 1868 [ČS/VU] – **Mor**.: Jeseníky, NPR Rašeliniště Skřítek (6069), 12.VIII.2008 – 14 ex. na rašeliništi (Habarta lgt. et coll., RE det., 3 ex. in coll. RE) (RE); Beskydy, Staré Hamry (6576), 14.IX.2007 – 1 ex. (T. Sitek lgt. et col., ST det.) (ST).

Velmi lokální montánní druh, obývající různé typy vlhkých až velmi vlhkých stanovišť.

Trechus (***Trechus***) ***obtusus obtusus*** Erichson, 1837 – **Boh**.: Rychnov nad Malší (7352), IV.–XI.2007 – 2 ex. v ZP na pastvině, 575 m n. m. (M. Šlachta lgt., coll. ZF JčU, GR det.) (GR); Vlčí jámy pr. Lenora (7048), V.–X.2007 – 1 ex. v ZP na pastvině, 793 m n. m. (M. Šlachta lgt., coll. ZF JčU, GR det.) (GR); Praha-Libeň, Jabloňka (5852), 25.VIII.2007 – 1 ex. na světlo nad křovinatou strání (VE); Voleč, vrch Soudný (5859), 29.VI.– 3.VIII.2008 – 1 ex. (brachypterní) v ZP (MO et VO), 27.IX.2008 – 6 ex. (brachypterních) v trávě na okraji lesa (MO); Praha-Dubeč (5953), 20.VII.2014 – 2 ex. na světlo na polní mokřině při západním břehu rybníka Slatina (VE). **Mor**.: Moravská Nová Ves (7168), 6.VI.2006 – 1 ex. v náplavu v lužním lese vně hráze řeky Moravy (J. Helešic lgt. et coll., RE det.) (RE); Trávní dvůr pr. Hrabětice (7264), 6.V.2006 – 1 ex. a 8.V.2006 – 1 ex. (oba makropterní) pod vegetací na okraji močálu (MO), 8.V.2006 – 1 ex. tamtéž (VO).

Spíše hygrofilní druh, v Čechách na většině území poměrně hojný. V populaci zpravidla výrazně převažují brachypterní jedinci, a i proto jsou odchyty na světlo velmi ojedinělé. Moravské nálezy upřesňují průběh východní hranice areálu rozšíření druhu v ČR (cf. Veselý et al. 2009).

Trechus (***Trechus***) ***pulchellus pulchellus*** Putzeys, 1845 – **Boh**.: Krušné hory, Pstruží (5642), 13.VII.2014 – 1 ex. v prosevu detritu a listí v lese při břehu říčky Bystřice (S. Benedikt lgt., TL det. et coll.) (TL).

V horských a podhorských polohách hojný lesní druh, v nižších polohách jen lokálně a vzácně ve zbytcích původních bukových porostů. Těžištěm výskytu v ČR je severovýchodní pohraničí. První známý nález v západních Čechách.

Trechus (***Trechus***) ***rubens*** (Fabricius, 1792) – **Boh**.: Obora pr. Doksy (5454), 14.VI.–16.VII.2013 – 1 ex. v ZP v rákosině u Okenského potoka (VE). **Mor**.: Moravský kras, Ostrovská plošina, Nová Amatérská jeskyně (6666), 15.II.2007 – 1 ex. v Chodbě samoty pod Rozlehlou chodbou (ML lgt., J. Prouza det., coll. SJMK Blansko) (ML).

Spíše podhorský až horský druh, řidčeji obývá i bahnité břehy, rašelinné louky a rašeliniště v nižších polohách. Mikroklimaticky podmíněný výskyt v jeskyních byl zaznamenán zatím pouze v Moravském krasu (cf. Veselý et al. 2009).

Trechus (***Trechus***) ***striatulus*** Putzeys, 1847 – **Boh**.: Krkonoše-vrch Medvědín pr. Špindlerův Mlýn (5259), 20.VI.–21.VIII.2007 – 4 ex. v ZP ve vrcholové smrčině (1200 m n. m.)

(VO); Krkonoše-vrch Přední Planina pr. Špindlerův Mlýn (5259), 20.VI.–21.VIII.2007 – 5 ex. v ZP ve vrcholové smrčině (1190 m n. m.) (VO).

V Krkonoších hojný druh především v alpínském pásmu.

Thalassophilus longicornis (Sturm, 1825) [ČS/NT] – **Boh**.: Chotýčany (6952–6953), 13.VI.1989 – 1 ex. na kamenitém břehu potoka Libochovka (V. Karas lgt., coll. JčM, GR det.) (GR). **Mor**.: Raškovice (6376), 20.VI.2011 – 4 ex. na břehu Morávky (KM); Beskydy, Staré Hamry (6576), 29.IV.2000 – 1 ex. (T. Sitek lgt. et col., ST det.) (ST).

Reliktní druh vázaný výhradně na zachovalé štěrkové břehy podhorských a nížinných toků.

Aptinus bombarda (Illiger, 1800) – **Mor**.: Zálesí pr. Štítary (7060), 16.V.2008 – 1 ex. v ZP v kaňonu Dyje (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR); Dešná env., PR Kysibl (7059), 23.V.2009 – 4 ex. v ZP (M. Snížek lgt., GR det., 2 ex. in coll. GR, 1 ex. in coll. J. Blízek et 1 ex. in coll. VE) (GR).

Lokální druh zachovalejších, především listnatých lesů pahorkatin a podhůří.

Brachinus (***Brachinus***) ***crepitans*** (Linnaeus, 1758) [§O] – **Mor**.: Ostrava-Krásné Pole (6174), 29.VII.2005 – 1 ex. na světlo (J. Vávra lgt. et coll., L. Koloničný det.) (ST).

Na severní Moravě ojedinělý druh, známý dosud jen z mála recentních lokalit.

Brachinus (***Brachinus***) ***psophia*** Audinet-Serville, 1821 [§O, ČS/EN] – **Mor**.: Dukovany (6963), 9.VIII.–25.IX.2010 – 2 ♂♂, 2 ♀♀ v ZP (P. Hesoun lgt., GR det., 1 ♂, 1 ♀ in coll. GR, 1 ♂, 1 ♀ in coll. VE) (GR); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 20.VII.2007 – 1 ♂ na světlo (J. Blízek lgt. et coll., GR det.) (GR).

Další moravské lokality vzácného druhu vázaného především na vlhká místa na loukách a pastvinách v okolí větších řek. Přílet na světlo u tohoto druhu nebyl dosud pozorován.

Brachinus (***Brachynidius***) ***explodens*** Duftschmid, 1812 [§O] – **Boh**.: Petrovice pr. Mladošovice (7054), VII.2007 – 1 ex. v ZP (P. Kindlmann lgt., GR det. et coll.) (GR); Olešnice-Jandovec (7154), 20.VI.2010 – 3 ex. v ZP na rozhraní louky a pastviny (GR); Horní Libchava, Cihelenské rybníky (5353), 8.VI.–13.VII.2010 – 9 ex. v ZP (P. Marhoul lgt., VO det.) (VO); Rovensko pod Troskami-Liščí Kotce (5457), 19.VI.2010 – 1 ex. (VO); Zlučín (6451), 3.IV.2011 – 1 ex. v travinách na okraji louky a lesa poblíž motocyklové dráhy (GR).

Na části území České republiky jde o běžný eurytopní druh, který však v některých oblastech zcela chybí nebo je zde vzácný. Např. nálezy z Petrovic a Olešnice jsou první známé údaje o výskytu tohoto druhu v jižních Čechách. Z oblasti Českolipska uvádějí Honců & Pulpán (1974) kromě několika starých a jednoho novějšího literárního údaje (Břehyně) jen nález z Úštěku, který se však nachází již v Českém středohoří. Jediný dosud známý recentní nález, taktéž z okolí Horní Libchavy publikovali Moravec & Vonička (2003). V Českém ráji (Rovensko pod Troskami) je druh rovněž vzácný a lokální.

Callistus lunatus lunatus (Fabricius, 1775) – **Boh**.: Český Brod, Zahrady (5955), 13.III.2011 – 11 ex. ve staré cihelně (LT). **Mor**.: Přímětice (7162), 7.V.2006 – 1 ex. na sprašovém svahu (VO), – 2 ex. (MO), 11.IV.2008 – 3 ex. mezi kořínky trav v opuštěném kaolínovém lomu (GR); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 24.IV.2007 – 6 ex., 2.VII.2007

– 1 ex. a 26.VII.2008 – 1 ex. na úhoru pod jižní hrází Trkmanky (VE); Pouzdřany (7065), IV.2008 – 1 ex. pod kamenem (SS lgt., DS det. et coll.) (DS).

Lokální druh. V Čechách vzácný, na Moravě mnohem častější. Typický pro hliniště, vápencové lomy a sprašové svahy s méně zapojenou vegetací.

Chlaenius (***Chlaeniellus***) ***nigricornis*** (Fabricius, 1787) – **Boh**.: Cep (7054), 29.IV.2007 – 1 ex. v pískovně (GR); Rychnov nad Malší (7352), IV.–XI.2007 – 3 ex. v ZP na pastvině, 575 m n. m. (M. Šlachta lgt., coll. ZF JčU, GR det.) (GR); Borovany, NPR Brouskův mlýn (7154), 20.VII.2008 – 1 ex. ve starém kmeni na pastvině (GR); Čepice env. (6747), VI.2013 – 2 ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS).

Hygrofil, jednotlivě se vyskytující na rozmanitých vlhkých místech bez zástínění. V posledních cca pěti letech je pozorován nárůst početnosti populací.

Chlaenius (***Chlaeniellus***) ***nitidulus*** (Schrank, 1781) – **Mor**.: Přímětice (7162), 7.V.2006 – 1 ex. na sprašovém svahu (VO); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 9.V.2008 – 1 ex. a 12.V.2008 – 1 ex. na slanisku (VO); Únanov (7062), V.2009 – 1 ex. (VS lgt. et det., coll. DS, VE revid.) (DS).

Nehojný druh, vyhledávající především nezastíněné hlinité nebo hlinitopísčité břehy vod s nezapojenou vegetací.

Chlaenius (***Chlaeniellus***) ***tristis tristis*** (Schaller, 1783) [ČS/NT] – **Boh**.: Srbská Kamenice-Nová Oleška (5152), 25.V.2007 – 1 ex. u rybníka (L. Blažej lgt., MO det. et coll.) (MO); Koštice (5649), 10.VI.2011 – 2 ex. na bažinaté louce (VO), – 1 ex. (MO); Nechranice (5643), 26.V.2011 – 3 ex. pod dřevy na obnaženém břehu přehrady (J. Ryšavý lgt., GR det., 2 ex. in coll. J. Ryšavý, 1 ex. in coll. GR) (GR); Praha-Hostivař, PP Meandry Botiče (5953), 6.VII.2011 – 1 ex. na březích mokřadu pod Toulcovým dvorem (VE observ. et det.) (VE), 29.VII.2011 – 2 ex. (VE); Praha, Císařský ostrov (5852), 7.VII.2011 – 2 ♂♂ na světlo v areálu ÚČOV, 26.VII.2013 – 1 ex. a 28.VII.2013 – 3 ex. do světelného lapače na hrázi Vltavy v areálu ÚČOV (VE); Čepice env. (6747), VI.2013 – 1 ex. u lomu u potoka (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS); Praha-Podbaba (5852), 28.VII.2013 – 1 ex. do světelného lapače u Vltavy nedaleko přívozu (F. Fiala lgt., VE det. et coll.) (VE); Praha-Dubeč (5953), 20.VII.2014 – 1 ex. na světlo na polní mokřině při západním břehu rybníka Slatina (VE); Temelín (6852), 22.IX.2013 – 1 ex. v ZP v rákosině v areálu jaderné elektrárny (P. Hesoun lgt., det. et coll.) (GR). **Mor**.: Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 22.VII.2010 – 4 ex. na světlo (T. Sitek lgt. et coll., ST det.) (ST).

Vzácný a lokální hygrofilní druh žijící mezi vegetací na březích zachovalých nezastíněných mokřadů. V ČR byl dosud častější jen na jižní Moravě. Od roku 2011 je pozorováno významné zvýšení počtu nálezů v Čechách, a to i na místech, kde druh dosud nikdy pozorován nebyl, případně byl znám jen na základě historických nálezů. Například do té doby poslední známý nález z Prahy pocházel z roku 1942 (Veselý 2002). Je pravděpodobné, že podobně jako druhy příbuzného rodu *Epomis* jsou alespoň některé druhy rodu *Chlaenius* rovněž predátory larev žab a čolků. Příčinou stoupající početnosti druhu mohou být zvětšující se plochy litorálů během posledních suchých let, ale nelze vyloučit ani vliv ochranářských opatření na podporu populací obojživelníků při úpravách a revitalizacích menších vodních toků a mokřadů.

Chlaenius* (*Chlaenites*) *spoliatus spoliatus (Rossi, 1792) – **Mor**.: Terezín pr. Čejč (7067), 12.V.2008 – 1 ex. na hlinitých plochách kolem tůní na slanisku (MO), – 3 ex. tamtéž (VO).

V ČR mimo jižní Moravu vzácný a spíše náhodně nalézaný hygrofilní druh.

Drypta* (*Drypta*) *dentata (P. Rossi, 1790) – **Boh**.: Praha-Záběhlice (5953), 1.IV.2008 – 1 ♂ na travnaté ploše na východním okraji sídliště Spořilov II, 5.XII.2014 – 3 ex. přezimující pod kamenem tamtéž a 5.VI.2014 – 2 ♂♂ na travnaté ploše západně od ovocného sadu (VE); Praha-Hostivař (5953), 1.–30.IV.2008 – 1 ♂ v ZP na okraji pole pod sadem (VE), 2.X.2009 – 2 ex. (J. Strejček lgt. et det., 1 ex. in coll. VE) a 22.XI.2009 – 1 ex. v prosevu v okolí Botiče (J. Strejček lgt., det. et coll.) (VE); Praha-Hostivař, PP Meandry Botiče (5953), 12.IX.2011 – 1 ♀ na okraji křovinatého lemu polní cesty u Botiče (VE); Praha-Komořany (6052), 13.VIII.2014 – 1 ex. v prosevu na břehu tůně u Vltavy (J. Strejček lgt., det et coll.) (VE). **Mor**.: Mrsklesy (6370), 23.III.2011 – 1 ex. na vojenském autodromu (J. Kašák lgt., ST det. et coll.) (ST).

Expanzívní druh vyhledávající poněkud vlhčí stanoviště s porosty vyšších trav. Další pozorování recentního výskytu v Čechách. Pražská populace z okolí potoka Botiče v Hostivaři již dosáhla vltavského břehu, což je zásadní pro její další šíření (cf. Veselý et al. 2009, Špryňar & Pumr 2018).

Amblystomus niger (Heer, 1841) – **Mor**.: Bořetice env., Zázmoníky (7067), 1.VII.2007 – 1 ex. na světlo na stepní stráni při okraji lesa (VE); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 2.VII.2007 – 3 ex. na zamokřeném úhoru (VE), 9.V.2008 – 1 ex. a 12.–13.V.2008 – 1 ex. na slanisku (MO), 13.V.2008 – 1 ex. na slanisku (VO), 15.VI.2008 – 6 ex. na zamokřeném úhoru (VE); Uherský Brod (6971), 16.VII.2007 – 1 ex. a 17.VII.2009 – 1 ex. na světlo u mokřadu (RE); Mikulčice (7168), 8.III.2008 – 2 ex. v drnech a kypré hlíně na okraji opuštěného hliníku v nivě Moravy (LA), 22.III.2008 – 2 ex. (RE); Troskotovice (7064), 12.VI.2008 – 1 ex. na břehu Troskotovického rybníka (KU); Šumice (6972), 13.VII.2010 – 1 ex. na světlo (RE); Rakvice env. (7166), 1.V.2014 – 38 ex. na zasolené polní mokřině u dálnice, pozorováno více ex. (VE).

Druh rozmanitých stanovišť, nalézaný od stepí a slanisek až po světlé podhorské listnaté lesy. Zdá se však, že preferuje volné, osluněné a mírně vlhké plochy se sporou vegetací, často polní mokřiny. Od roku 1996 je na Moravě pozorována výrazná expanze, během níž druh osídlil celou řadu lokalit (cf. Veselý et al. 2009). V roce 2012 byl poprvé nalezen v Čechách (Vonička et al. 2014).

Anisodactylus* (*Anisodactylus*) *nemorivagus (Duftschmid, 1812) – **Boh**.: Kroclov env. (7052), 12.V.2008 – 3 ex. v ZP v kaňonu Vltavy (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR). **Mor**.: Nezdenice (6972), 14.V.2007 – 1 ex. pod listím v trávě na křovinatém úhoru (LA).

Nehojný až vzácný druh nalézaný zpravidla jednotlivě, ale na rozmanitých stanovištích: na loukách v nivách řek, na písčitých travnatých úhorech, na lesních pasekách a světlinách, i na pastvinách. Častější je v pahorkatinách a v podhůří. Zřejmě vyžaduje extenzívní způsob obhospodařování a přítomnost ploch s méně zapojenou vegetací. Dlouhodobě ubývající druh.

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) – **Boh**.: Březany nad Ohří, Pístecký les (5550), 20.V.2009 – 2 ex. ve vyschlém říčním rameni v lužním lese (MO); Koštice (5649), 10.VI.2011

– 1 ex. na bažinaté louce (MO); Folmava, Ovčí vrch (6642–6643), 9.VI.2009 – 1 ex. na okraji smíšeného lesa (J. Lahoda lgt. det. et coll., TL revid.) (TL); Stružnice env., Stružnické rybníky (5352), 8.VI.–13.VII.2010 – 3 ex. v ZP (P. Marhoul lgt., et coll., VO det.) (VO); Dolní Lukavice, PR Zlín (6346), 6.V.2014 – 1 ex. pod hroudou na okraji pole (TL); Praha-Dubeč (5953), 4.VI.2014 – 50 ex. na polní mokřině při západním břehu rybníka Slatina, pozorováno více ex. (VE). **Mor**.: Ostrava-Výškovice (6275), 19.V.2010 – 1 ex. v náplavu Odry (ST); Bohuslavice (6074), 11.VI.2011 – 1 ex. v pískovně (L. Krišica lgt. et coll., ST det.) (ST); Bartošovice, PR Bartošovický luh (6374), VI.2010 – 1 ex. v letu (J. Kašák lgt., ST det. et coll.) (ST).

Vlhkomilný druh, typický pro vlhké louky v nivách větších řek. V ostatní krajině vyhledává příležitostná stanoviště, jako jsou dna vypuštěných rybníků a polní mokřiny, kde někdy bývá lokálně hojný. Nález z Lukavice je pravděpodobně druhý doklad ze západních Čech.

Harpalus (***Cryptophonus***) ***melancholicus melancholicus*** Dejean, 1829 [ČS/VU] – **Boh**.: Káraný env. (5854), 2.IX.2009 – 2 ex. v noci na písku v lesním průseku podél vodárenských studní (VE); Semín (5959), 1.VIII.2010 – 2 ex. v noci na písku v centru obce (LT). **Mor**.: Pánov pr. Hodonín (7168), 19.VI.–29.VIII.2010 – 10 ex. v ZP na území vojenského cvičiště (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det.) (VO); Bzenec (7069), 11.VII.–8.VIII.2009 – 2 ex. v ZP na vojenském cvičišti (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det. et coll.) (VO).

Psamobiont, žijící téměř výhradně na volných vátých pískách, v Čechách vzácný a ubývající druh.

Harpalus (***Cryptophonus***) ***tenebrosus tenebrosus*** Dejean, 1829 – **Boh**.: České středohoří-Bečovský vrch (5548), 13.VIII.2009 – 6 ex. (VO); Plzeň-Roudná (6246), 16.VII.2014 – 1 ex. na světlo (S. Benedikt lgt., TL det. et coll.) (TL). **Mor**.: Tvrdonice (7268), 16.VII.2008 – 1 ex. na světlo (J. Helešic lgt. et coll., LA det.) (GR); Terezín pr. Čejč (7067), 11.VIII.2008 – 2 ex. na světlo (J. Helešic lgt. et coll., LA det.) (GR); Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 12.VIII.2008 – 2 ex. na světlo (GR); Šatov, V Pekle (7262), 2.VIII.2012 – 18 ex. na UV světlo nad vinicemi (VE).

Xerofilní druh. V současnosti se šíří zvláště na úhorech a ruderálních stanovištích s porosty *Daucus carota*. Plzeňský nález je pravděpodobně prvním známým dokladem ze západních Čech.

Harpalus (***Harpalus***) ***albanicus*** Reitter, 1900 – **Mor**.: Načeratice, Načeratický kopec (7162), 7.V.2006 – 1 ex. (MO).

V ČR pouze na jižní Moravě. Nehojný druh vinařských oblastí.

Harpalus (***Harpalus***) ***autumnalis*** (Duftschmid, 1812) – **Boh**.: Františkov (7155), 7.IV.2007 – 1 ex. v pískovně (KU lgt. et coll., GR det.) (KU), 13.IV.2009 – 4 ex. vyhrabány z písku v pískovně (KU); Tušť (7155), 20.IV.2007 – 1 ex. (KU lgt. et coll., GR det.) (KU); Lužnice, PP Slepičí vršek (6954), 2.IX.2008 – 1 ex. na písečném přesypu (M. Šlachta lgt. et coll., GR det.) (GR).

Druh vázaný na volné písčité plochy různého typu. Jeden z méně náročných psamobiontů.

Harpalus (***Harpalus***) ***caspius*** (Steven, 1806) – **Boh**.: Encovany (5451), XI.2007 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO); Dubany pr. Libochovice, vrch Rohatec (5650), 13.V.2010 – 3 ex. a 25.IX.2011 – 1 ex. na stepi (VO); Nepřevázka (5655), 17.V.–12.VI.2010 – 3 ex. v ZP na bývalém vojenském cvičišti (T. Kadlec & J. Skala lgt., VO det.) (VO).

Xerofilní druh, dříve hojný zvláště na xerotermních pastvinách. Vyžaduje extenzívní způsob obhospodařování a přítomnost míst s méně zapojenou vegetací.

Harpalus (***Harpalus***) ***flavescens*** (Piller et Mitterpacher, 1783) [ČS/NT] – **Boh**.: Semín, NPP Semínský přesyp (5959), 31.VII.2010 – 1 ex. pod vegetací na písku (MO), – 1 ex. (VO); Semín (5959), 31.VII.2010 – více ex. v pískovně v lese (MO), – více ex. tamtéž (VO). **Mor**.: Bzenec (7069), 17.V.–5.IX.2009 – mnoho ex. v ZP na vojenském cvičišti (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det.) (VO).

Psamobiont vázaný výhradně na volné váté písky, v místě výskytu bývají občas početné populace.

Harpalus (***Harpalus***) ***hirtipes*** (Panzer, 1796) [ČS/VU] – **Mor**.: Bzenec (7069), 17.V.2009 – 1 ex., 8.VIII.–5.IX.2009 – 1 ex. v ZP na vojenském cvičišti (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det. et coll.) (VO); Rohatec (7169), 10.VI.2007 – 1 ex. na mýtině pod zapadlým kusem dřeva v písku (LA); Rohatec-Soboňky (7069), 29.VIII.2007 – 1 ex. nalezen v noci se svítilnou (RE).

Psamobiont vázaný výhradně na volné váté písky. Nálezy na Bzenecku jsou v současnosti jen velmi sporadické.

Harpalus (***Harpalus***) ***laevipes*** Zetterstedt, 1828 (= *H. quadripunctatus* Dejean, 1829) – **Boh**.: Obora pr. Doksy (5454), 14.VI.–16.VII.2013 – 7 ex. v ZP ve stinné olšině u Okenského potoka (VE).

Spíše podhorský až horský druh, v nižších polohách jen lokálně, obvykle v lesních porostech v nivách potoků.

Harpalus (***Harpalus***) ***marginellus*** Gyllenhal, 1827 – **Mor**.: Zálesí pr. Štítary (7060), 24.V.2008 – 1 ex. v ZP v kaňonu Dyje, cca 430 m n. m. (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR).

Lokální druh lesních světlin a pasek, dosud nalezen v Bílých Karpatech a v Podyjí. Potvrzení výskytu v Podyjí.

Harpalus (***Harpalus***) ***modestus*** Dejean, 1829 [ČS/NT] – **Boh**.: Předonín (5551–5552), 19.V.2007 – 5 ex. v pískovně (MO); Drahobuz (5451–5452), 28.IV.2008 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO); Travčice (5451–5551), 15.V.2009 – 1 ex. a 13.VI.2009 – 1 ex. ve staré pískovně (MO); Nučničky (54511–5551), 8.VI.2010 – 1 ex. v pískovně (MO); Stroupeč (5646), 29.V.2010 – 2 ex. v prosevu na stepi (V. Klapka lgt., KA det. et coll.) (KA). **Mor**.: Pánov pr. Hodonín (7168), 11.V.2008 – 1 ex. v noci na písčité cestě (GR); Lednice (7166), 1.V.2009 – 1 ex. ve Valtické aleji (J. Kovář lgt. et coll., GR det.) (GR).

Xerofilní druh, častější pouze v písčitých oblastech. Jinde zpravidla jen velmi lokálně a jednotlivě.

Harpalus (***Harpalus***) ***neglectus neglectus*** Audinet-Serville, 1821 [ČS/VU] – **Boh**.: Oseček (5856), 17.III.2010 – 9 ex. na písečném přesypu (LT).

Psamobiont vázaný výhradně na volné váté písky.

Harpalus (***Harpalus***) ***picipennis*** (Duftschmid, 1812) [ČS/NT] – **Boh**.: Předonín (5551–5552), 19.V.2007 – mnoho ex. v pískovně (MO); Mělice (5959), 31.VII.2010 – 2 ex.

v pískovně s vodou (MO); Semín, NPP Semínský přesyp (5959), 31.VII.2010 – 2 ex. pod vegetací na písku (MO). **Mor**.: Pánov pr. Hodonín (7168), 20.V.–22.VII.2010 – 3 ex. v ZP na vojenském cvičišti (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det.) (VO); Bzenec (7069), 17.V.–5.IX.2009 – více ex. v ZP na vojenském cvičišti (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det.) (VO).

Psamobiont vázaný na volné písčité plochy různého typu.

Harpalus (***Harpalus***) ***politus politus*** Dejean, 1829 [ČS/NT] – **Boh**.: Dubany pr. Libochovice, vrch Rohatec (5650), 13.V.2010 – 2 ex. na stepi (VO); Žatec, PP Žatec (5647), 22.VI.2010 – 1 ex. ve smyku na stepi (MO); České středohoří-vrch Raná (5548), 19.VIII.2011 – 5 ex. (KM).

Charakteristický stepní druh, v ČR známý především z xerotermních oblastí Českého krasu a Českého středohoří.

Harpalus (***Harpalus***) ***progrediens*** Schauberger, 1922 [ČS/NT] – **Boh**.: Obříství, Zámecký les (5752), 8.V.2008 – 2 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO); Dolánky nad Ohří (5550), 15.IV.2009 – 9 ex. v lužním lese (VO), 10.IV.2009 a 15.IV.2009 – celkem 13 ex. v lužním lese spolu s *H. xanthopus winkleri* Schauberger, 1923 (MO).

Lokální a zpravidla nehojný druh zachovalých vlhkých luk a lužních porostů v okolí větších vodních toků.

Harpalus (***Harpalus***) ***servus*** (Duftschmid, 1812) [ČS/NT] – **Boh**.: Oleško (5551), 9.V.2013 – 1 ex. (P. Včelička lgt. et coll., LT det.) (LT). **Mor**.: Pánov pr. Hodonín (7168), 11.V.2008 – 11 ex. v noci na písčitých cestách na bývalém vojenském cvičišti (VO), více ex. (MO), 20.V.–22.VII.2010 – více ex. v ZP na území vojenského cvičiště (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det.) (VO); Bzenec (7069), 17.V.–5.IX.2009 – více ex. v ZP na vojenském cvičišti (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det.) (VO).

Druh vázaný výhradně na volné váté písky. Na rozdíl od Moravy, kde je na Bzenecku dosud poměrně častý, je v Čechách zřejmě na pokraji vymizení, neboť poslední známý nález pocházel z roku 1991 (Stará Boleslav, P. Štourač lgt.) (Benedikt & Těťál 1994). Potvrzení recentního výskytu v Čechách.

Harpalus (***Harpalus***) ***solitaris*** Dejean, 1829 – **Boh**.: NP České Švýcarsko, Vosí vrch pr. Doubice (5152), 12.VII.2011 – 11 ex. pod vegetací na lesní pasece (MO).

Charakteristický druh lesních světlin a pasek. Častější je v horách, v nižších polohách se vyskytuje jen lokálně v písčitých lesích.

Harpalus (***Harpalus***) ***xanthopus winkleri*** Schauberger, 1923 – **Boh**.: Úboč (6544), VIII.2007 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO); Dolánky nad Ohří (5550), 10.IV.2009 a 15.IV.2009 – celkem 8 ex. v lužním lese spolu s *H. progrediens* (MO); Žabovřesky nad Ohří (5550), 15.IV.2009 – 1 ex. v lužním lese (MO); Milovice, Pod Benáteckým vrchem (5755), 13.V.–22.VI.2010 – 1 ex. v ZP (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det. et coll., MO revid.) (VO); Obora pr. Doksy (5454), 14.VI.–15.VII.2013 – 1 ex. v ZP ve světlém borovém lese s podrostem mechů a borůvky (VE).

Lokální druh, vyskytující se na řadě vzájemně velmi odlišných typů stanovišť: na písčinách, v písčitých borech i akátinách, v lužních porostech i jinde při březích větších řek a ve světlých listnatých suťových lesích.

Harpalus (***Harpalus***) ***zabroides*** Dejean, 1829 [ČS/NT] – **Boh**.: České středohoří – vrch Radobýl (5450), 11.IV.2008 – 1 ex. na okraji křovin a vinice (KA). **Mor**.: Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 3.VII.2007 – 1 ex. na světlo na stepi (VE), 16.VII.2007 – 14 ex. na světlo na stepi a terasách vinice (VE), 12.VIII.2008 – 2 ex. na světlo (GR); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 26.VII.2008 – 1 ex. na světlo na hrázi Trkmanky (VE).

Lokální druh, vyskytující se především na sprašových půdách nejteplejších vinařských oblastí Čech a Moravy.

Ophonus (***Metophonus***) ***cordatus*** (Duftschmid, 1812) [ČS/VU] – **Boh**.: Praha, Prokopské údolí (5852), 18.VIII.2008 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO); Sušice (6747), 26.V.2009 – 1 ex. a 27.VII.2009 – 1 ex. pod kameny ve starém vápencovém lomu na okraji města (TL); Milovice, PP Pod Benáteckým vrchem (5755), 13.VII.–26.VIII.2010 – 1 ex. v ZP (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det. et coll.) (VO); Brzánky (5551), 20.VIII.2010 a 2. IX.2010 – 4 ex. pod kameny na bílé stráni (MO).

Xerofilní druh. Žije lokálně na stepích a na xerotermních pastvinách, hlavně s vápencovým, opukovým a sprašovým podkladem. Typický je pro kamenité okraje vápencových a opukových lomů.

Ophonus (***Metophonus***) ***parallelus*** (Dejean, 1829) – **Mor**.: Mikulov env., Růžový vrch (7165), 30.VII.2001 – 1 ex. (LT).

Xerofilní fytofágní a kalcikolní druh. Pro faunu ČR byl tento druh poprvé publikován na základě nálezu 1 ex. z Mikulova z roku 2005 (Křivan et al. 2009). Teprve později byl rozpoznán výše uvedený starší nález ze stejné lokality. Druh je zřejmě na Moravě velmi vzácný a jeho výskyt může být omezen na Pavlovské kopce.

Ophonus (***Ophonus***) ***ardosiacus*** (Lutshnik, 1922) – **Mor**.: Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 16.VII.2007 – 2 ♀♀ na světlo na stepi a terasách vinice (VE), 12.VIII.2008 – 4 ex. na světlo (GR); Kobylí env. (7067), 17.VII.2007 – 2 ex. do světelných lapačů při okraji lesa a zpustlých vinic (VE); Mikulov-Turold (7165), 3.IX.2011 – 1 ex. (KM); Šatov, V Pekle (7262), 2.VIII.2012 – 8 ex. na UV světlo nad vinicemi (VE).

Fytofágní druh, v ČR lokálně rozšířený na xerotermních sprašových a vápencových lokalitách jižní Moravy. V roce 2010 byl jeho výskyt potvrzen i v západních Čechách na Sokolovsku (Veselý et al. 2012).

Ophonus (***Ophonus***) ***diffinis*** (Dejean, 1829) – **Boh**.: České středohoří – Bečovský vrch (5548), 13.VIII.2009 – 8 ex. (VO); České středohoří - vrch Plešivec (5450), 29.VIII.2010 – 12 ex. ve starém sadu (VO), 8.IX.2010 – 2 ex. vyhrabány pod *Daucus carota* (KA); Most env. (5447), 24.IX.2011 – 3 ex. na výsypce (VE). **Mor**.: Terezín pr. Čejč (7067), 12.V.2008 – 1 ex. na hlinitých plochách kolem tůní na slanisku (VO); Mikulov-Turold (7165), 3.IX.2011 – 1 ex. (KM).

Fytofágní xerotermní druh. V Čechách původně jen vzácně na nejteplejších místech, postupně se rozšířil na mnoho lokalit včetně výsypek na Mostecku.

Ophonus (***Ophonus***) ***sabulicola*** (Panzer, 1796) [ČS/VU] – **Boh**.: Dubany pr. Libochovice, vrch Rohatec (5650), 13.V.2010 – 18 ex. na okraji pole (VO).

Lokální xerofilní druh žijící především na vápencových půdách a spraších. Nálezy mimo oblast Českého středohoří a Českého krasu jsou jen ojedinělé, což souvisí s plošným

vymizením živné rostliny dejvorce velkoplodého (*Caucalis platycarpos*). Je zajímavé, že v ČR dosud nebyla zjištěna potravní vazba na *Daucus carota*, pozorovaná na některých slovenských lokalitách.

Ophonus (***Ophonus***) ***stictus*** Stephens, 1828 [ČS/NT] – **Boh**.: Nepřevázka (5655), 19.VII.–14.VIII.2010 – 1 ex. v ZP na bývalém vojenském cvičišti (T. Kadlec & J. Skala lgt., VO det.) (VO); Štětí env. (5552), 20.VIII.2010 – 3 ex. pod kameny v hustém porostu smldníku jeleního (*Peucedanum cervaria*) na bílé stráni (MO); České středohoří - vrch Knobloška pr. Litoměřice (5450), 29.VIII.2010 – 5 ex. pod kameny v porostu smldníku jeleního (*Peucedanum cervaria*) na bílé stráni (VO), 8.IX.2010 – 4 ex. pod opukovými kamínky a 30.VIII.2011 – 4 ex. v opukovém štěrku (KA); České středohoří - vrch Plešivec (5450), 29.VIII.2010 – 4 ex. ve starém sadu (VO); Litoměřice env. (sever) (5450), 19.IX.2010 – 6 ex. pod drobnějšími opukovými kameny kolem úvozové cesty (MI). **Mor**.: Terezín pr. Čejč (7067), 11.VIII.2008 – 1 ex. v noci na *Daucus carota* (J. Helešic lgt., det. et coll.) (GR).

Velmi lokální druh různých otevřených stanovišť v přírodně zachovalejších oblastech. Potravní vazba na *Peucedanum cervaria* nebyla dosud publikována.

Parophonus (***Parophonus***) ***dejeani*** (Csiki, 1932) – **Mor**.: Čejč (7067), 23.V.1999 – 1 ex. na hranici stepi a pole (KM); Pouzdřany (7066), 2.IV.2011 – 1 ex. na jižním svahu stepi (KM).

Xerofilní druh, vyskytující se v nejteplejších vinařských oblastech jižní Moravy. První publikované ověřené nálezy pocházejí z let 2003–2007 (Křivan et al. 2009). Teprve později byl rozpoznán výše uvedený starší nález z roku 1999. Druh se v současnosti šíří na sever, ale je možné, že k tomu v závislosti na klimatických podmínkách občas docházelo i v minulosti.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***brunnipes*** (Sturm, 1825) [ČS/VU] – **Boh**.: Cep (7054), 29.IV.2007 – 1 ex. v pískovně (GR).

Velmi lokální stenotopní druh. Žije téměř výhradně na spoře porostlých písčitých březích tůní a louží v některých pískovnách. Nová lokalita pro Třeboňsko.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***dubius*** Schilsky, 1888 [ČS/VU] – **Boh**.: Praha-Dubeč env., Lítožnice (5953), 2.XI.2007 – 1 ex. v detritu v porostu sítin (VE); Praha, PP Milíčovský les (5953), 29.V.2008 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO); Praha-Benice (5953), 12.IX.2008 – 1 ex. pod trsy sítin (*Juncus* sp.) u částečně zazemněného betonového koryta Pitkovického potoka na západním okraji obce (VE); Nová Ves, PR Rašeliniště u myslivny (5942), 10.IX.2011 – 2 ex. immaturní v prosevu detritu na okraji rašeliniště (TL); Sokolov env. (5741), 22.IX.2011 – 2 ex. v okolí vodní nádrže v pískovně Erika, 1 ex. immaturní (VE). **Mor**.: Vacenovice, PP Jezero (7069), 19.IV.2009 – 9 ex. a 1.V.2009 – 32 ex. (RE).

Druh žije na březích mokřadů s porosty sítin (*Juncus* sp.). Vyhledává kyselé půdy, písčiny a rašeliniště. Na Moravě je velmi lokální a vzácný, dosud jen ve Vacenovicích byla zjištěna silná, ale plošně omezená populace.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***elegans*** (Dejean, 1829) [ČS/EN] – **Mor**.: Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 16.VII.2007 – 1 ex. na světlo na stepi a terasách vinice (VE); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 17.VII.2007 – 6 ex. na světlo na hrázi říčky Trkmanky (VE), 9.V.2008 – 2 ex. a 13.V.2008 – 1 ex. na slanisku (VO); Terezín pr. Čejč (7067), 12.V.2008 – 1 ex.

na hlinitých plochách kolem tůní na slanisku (VO), – 2 ex. (MO), – 3 ex. (VE), 24.V.2008 – 5 ex. na slanisku mezi řídkou vegetací (LA); Šatov, V Pekle (7262), 2.VIII.2012 – 2 ex. na UV světlo nad vinicemi (VE).

Halobiont, na moravských slaniskách je dosud místy častější. Při přeletech je občas nalézán i na subhalofilních lokalitách.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***exiguus*** Dejean, 1829 – **Boh**.: Praha-Dubeč (5953), 4.VI.2014 – 10 ex. na polní mokřině při západním břehu rybníka Slatina (VE). **Mor**.: Ostrava-Heřmanice (6176), 10.IV.2008 – 1 ex. u Heřmanického rybníka (P. Boža lgt., det. et coll., ST revid.) (ST).

Obývá bahnité břehy mokřadů s řídšími porosty trav a bylin, zaplavovaná místa luk a pastvin, častěji v náplavech. V ČR mimo jižní Moravu spíše nehojný druh.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***luteatus*** (Duftschmid, 1812) [ČS/NT] – **Boh**.: Praha, Císařský ostrov (5852), 23.VII.2004 – 1 ex. na světlo (VE); Praha, PP Milíčovský les (5953), 20.VI.2007 – 3 ex. na světlo na břehu částečně vypuštěného rybníka Homolka (VE). **Mor**.: Lanžhot, PR Soutok (7367), 10.V.2008 – 2 ex. v pískovně u silnice (MO); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 12.–13.V.2008 – 1 ex. na slanisku (MO); Lednice, NPP Pastvisko u Lednice (7266), 23.VIII.2008 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO); Uherský Brod (6971), 17.VII.2009 – 1 ex. na světlo u mokřadu (RE).

Hygrofil, vázaný na vegetací porostlé břehy stojatých vod. Druhotně na vypuštěných rybnících a stálejších lučních a polních mokřinách. V Čechách vzácný.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***maculatus*** (Schaum, 1860) [ČS/NT] – **Mor**.: Přímětice (7162), 7.V.2006 – 1 ex. v hliništi kaolínky (MO); Terezín pr. Čejč (7067), 12.V.2008 – 2 ex. na hlinitých plochách kolem tůní na slanisku (VO); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 9.V.2008 a 12.–13.V.2008 – vždy více ex. na slanisku (VO); Terezín pr. Čejč (7067), 12.V.2008 – 2 ex. na hlinitých plochách kolem tůní na slanisku (MO); Hlohovec, Hlohovecký rybník (7266), 24.VIII.2008 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO).

Hygrofilní a halofilní druh. V Čechách vzácný a lokální, v posledních letech nalézaný častěji. Na jižní Moravě lokálně hojný.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***suturalis*** Dejean, 1829 [ČS/CR] – **Mor**.: Šumice (6972), 15.VII.2007 – 1 ♂ a 17.VII.2007 – 1 ♂ na světlo (RE); Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 16.VII.2007 – 1 ex. na světlo na stepi a terasách vinic (VE); Uherský Brod (6971), 20.VII.2007 – 1 ♀ na světlo u mokřadu (RE).

V ČR velmi vzácný halofilní druh. Všechny moravské nálezy vyjma jednoho pocházejí z odchytů na světlo (cf. Resl 2000, Veselý et al. 2002).

Acupalpus (***Ancylostria***) ***interstitialis*** Reitter, 1884 – **Boh**.: Nučničky (5451–5551), 13.IV.2009 – 1 ex. v pískovně (MO); Brozany nad Ohří (5550), 26.VII.2009 a 15.VIII.2009 – více ex. na sprašovém návrší (MO); Dubany pr. Libochovice, vrch Rohatec (5650), 13.V.2010 – 1 ex. na stepi (VO); České středohoří - vrch Plešivec (5450), 29.VIII.2010 – 1 ex. ve starém sadu (VO). **Mor**.: Přímětice (7162), 7.V.2006 – 1 ex. v hliništi kaolínky (MO); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 13.V.2008 – 1 ex. na slanisku (VO); Kobylí (7067),

11.V.2008 – 1 ex. na okraji vinic (J. Ryšavý lgt. et coll., GR det.) (GR); Břeclav env. (7267), V.2008 – 1ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS); Pohansko (7267), VI.2013 – 2 ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS).

Velmi lokální xerofilní druh, rozšířený především ve vinařských oblastech.

Anthracus longicornis (Schaum, 1857) [ČS/VU] – **Mor**.: Lanžhot, PR Soutok (7367), 10.V.2008 – 1 ex. v pískovně u silnice (VO); Terezín pr. Čejč (7067), 12.V.2008 – 2 ex. na hlinitých plochách kolem tůní na slanisku (MO), – 1 ex. (VE); Lanžhot-Lány (7267), 10.V.2008 – 1 ex. v močálu (MO).

Lokální druh zachovalých mokřadů, slanisek a subhalofilních lokalit. Na jižní Moravě v posledních letech nalézaný častěji.

Bradycellus (***Bradycellus***) ***ruficollis*** (Stephens, 1828) – **Boh**.: Tušť (7155), 27.VIII.2008 – 1 ex. smykem na bývalém vojenském cvičišti (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR); Manětín (6045), 28.III.2012 – 2 ex. v prosevu detritu na vřesovišti v borovém lese (TL); Horní Bříza (6146), 24.VII.2012 – 1 ex. v prosevu detritu pod keříčky vřesu na staré zarůstající haldě v oprámu kaolinového lomu (TL).

Callunobiont, žijící v zachovalých vřesových porostech.

Bradycellus (***Bradycellus***) ***verbasci*** (Duftschmid, 1812) – **Boh**.: Nové Hrady-Byňov (7254), 20.VII.2007 – 1 ex. na světlo (KU lgt. et coll., GR det.) (KU); Halámky (7155), 17.VII.2009 – 2 ex. na světlo v pískovně (KU); Český Brod, Štolmíř (5955), 16.VII.2010 – 6 ex. a 14.VI.2011 – 14 ex. na světlo (LT); Přerov nad Labem, Přerovská hůra (5855), 9.VII.2011 – 5 ex. na světlo (LT); Lestkov, PR U rybníčků (6143), 12.VII.2013 – 1 ex. na světlo (TL); Plzeň (6246), 25.VII.2012 – 1 ex. a 27.VII.2013 – 1 ex. na světlo na balkóně obytného domu v centru města (TL); Kašperské hory (6847), 17.VII.2013 – 1 ex. na světlo v obci (TL).

Široce rozšířený druh rozmanitých stanovišť, pro skrytý způsob života je však kromě odchytu na světlo sbírán jen poměrně zřídka.

Cymindis (***Cymindis***) ***angularis*** Gyllenhal, 1810 – **Boh**.: Předonín (5551–5552), 21.IV. –19.V.2007 – 1ex. a 31.VIII.–7.X.2007 – 3 ex. v ZP v pískovně (MO); Nučničky (5451–5551), 26.VII.2009 – 1 ex. v pískovně (MO); Knovíz (5750), 8.VIII.–26.IX.2009 – 7 ex., 28.VIII.–25.IX.2010 – 4 ex. a 27.VIII.–25.IX.2011 – 3 ex., vše v ZP v sadu bez postřiku (MO et VO); Slaný (5750), 28.VIII.–25.IX.2010 – 1 ex., 16.VII.–6.VIII.2011 – 1 ex. a 27.VIII.–25.IX.2011 – 2 ex. v ZP v intezivně chemicky ošetřovaném sadu (MO et VO); Plzeň, vrch Sytná (6246), 2.VIII.–1.IX.2011 – 1 ex. v ZP na křovinatém okraji lesa (TL); Stod, Šibeniční vrch (6345), 22.VIII.–19.IX.2011 – 1 ex. v ZP na vřesovišti (TL); Blahotice pr. Slaný (5750), 16.VII.–6.VIII.2011 – 1 ex. v ZP v konvenčním sadu (MO et VO); Vinařice, Vinařická hora (5850), 8.–29.VIII.2009 – 1 ex., 28.VIII.–25.IX.2010 – 2 ex. a 27.VIII.–25.IX.2011 – 4 ex. v ZP v bývalém lomu (MO et VO). **Mor**.: Čejkovice, Čejkovické Špidláky (7067), 14.V.2008 – 1 ex. (J. Gahaj lgt. et coll., GR det.) (GR), 26.V.2008 – 1 ex. na vátých pískách (A. Holub lgt. et coll., GR det.) (GR); Přímětice (7162), 7.V.2006 – 1 ex. na spražovém svahu (MO).

Xerofilní druh přírodně zachovalých lokalit. Výskyt v intenzívních sadech, tedy na člověkem silně pozměněných stanovištích, je velmi neobvyklý a svědčí o nečekané adaptabilitě druhu.

Cymindis (***Cymindis***) ***axillaris axillaris*** (Fabricius, 1794) [ČS/VU] – **Boh**.: Horažďovice, PP Kacle (6648), 20.X.2006 – 1 ex. na stepi (M. Šlachta lgt., det. et coll.) (GR); Kamenec pr. Radnice (6147), 23.IX.2012 – 3 ex. pod kameny na stepi (TL).

Xerofilní stenotopní druh přírodně zachovalých lokalit, žije výhradně na stepích, xerotermních pastvinách a otevřených vřesovištích.

Cymindis (***Cymindis***) ***cingulata*** Dejean, 1825 – **Boh**.: Trutnov, Poříčský hřbet (5461), 16.V.–14.VI.2009 – 1 ex. v ZP na okraji pastviny (MO et VO). **Mor**.: Ždánice env. (6968), 16.V.2008 – 1 ex. v ZP (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR); Chřiby - Holý kopec env. (6969), 30.V.2008 – 4 ex. v ZP (M. Snížek lgt., GR det., 2 ex. in coll. GR, 1 ex. in coll. J. Blízek, 1 ex. in coll. VE) (GR).

Převážně v podhorských a horských oblastech v lesích lokálně a skrytě žijící, většinou jednotlivě nalézaný druh. Potvrzení recentního výskytu v Jizerských horách, odkud byl dosud znám pouze jediný nález (Hejnice, 1947, J. Pulpán lgt.; Skoupý 2004).

Cymindis (***Tarsostinus***) ***macularis*** Fischer von Waldheim, 1824 [ČS/NT] – **Mor**.: Bzenec (7069), 17.V.–5.IX.2009 – 19 ex. v ZP na vojenském cvičišti (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det. et coll.) (VO).

Stenotopní psamobiont, potvrzení stálého výskytu v oblasti.

Cymindis (***Tarulus***) ***vaporariorum*** (Linnaeus, 1758) [ČS/VU] – **Boh**.: Plzeň, vrch Krkavec (6146), 25.V.–29.VI.2011 – 1 ex., 29.VI.–2.VIII.2011 – 7 ex. a 2.VIII.–1.IX.2011 – 2 ex. v ZP na vřesovišti v borovém lese (TL); Plzeň-Bolevec (6246), 2.VIII.–1.IX.2011 – 3 ex. v ZP ve vřesu v okolí Kamenného rybníka (TL); Horní Bříza (6146), 12.VI.–24.VII.2012 – 1 ex. v ZP na vřesovišti na staré zarůstající haldě v oprámu kaolinového lomu (TL); Vlkošov (5944), 24.VII.–21.VIII.2012 – 1 ex. v ZP na malém vřesovišti v lese severovýchodně od obce (TL).

Reliktní a velmi lokální druh zachovalých lokalit, žije především v chladnějších polohách a na kyselých půdách. Dále viz Hradská & Těťál (2017).

Demetrias (***Demetrias***) ***atricapillus*** (Linnaeus, 1758) – **Boh**.: Praha-Dolní Chabry (5852), 6.II.2005 – 1 ex. v prosevu u pat vrb u rybníčka (P. Štourač lgt., det. et coll.) (VE); Ražice env. (6750), 1.X.2005 – 1 ex. u rybníka Řežabinec (LT); Velký Osek, PR Libický luh (5857), 7.III.2007 – 1 ex. v prosevu (J. Gahaj lgt. et coll., GR det.) (GR); Tušť (7155), 12.IV.2007 – 1 ex. v pískovně pod porostem janovce metlatého (*Cytisus scoparius*), – 1 ex. v pískovně (KU), 27.VIII.2008 – 1 ex. smykem na bývalém vojenském cvičišti (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR); Praha-Benice (5953), 13.I.2008 – 1 ex. v údolí Pitkovického potoka (J. Strejček lgt., VE det. et coll.) (VE); Praha-Křeslice (5953), 31.VII.2008 – 1 ex. na světlo na svahu nad údolím Botiče (VE); Praha-Benice (5953), 12.IX.2008 – 1 ex. pod trsy sítin (*Juncus* sp.) u částečně zazemněného betonového koryta Pitkovického potoka na západním okraji obce (VE); Chlum u Křemže (7051), 12.IX.2009 – 1 ex. v prosevu detritu (D. Čudan lgt., GR det. et coll.) (GR); Praha-Pitkovice (5953), 3.X.2010 – 1 ex. pod vegetací na malém ruderálu na okraji louky u Pitkoviček (VE); Praha, Uhříněveská obora (5953), 23.X.2010 – 1 ex. na okraji pole na východním okraji obory a 2 ex. na východním okraji pole uvnitř obory (VE); Praha-Zbraslav (6052), 16.I.2011 – 1 ex. u Zbraslavské tůně (PP Krňák) (J. Strejček lgt., VE det. et coll.) (VE); Mantov (6345), 19.III.2011 – 1 ex. v prosevu listí a detritu u rybníka

Malý mantovský (TL); Hrádek, PP Hrádecká bahna (6247), 15.VII.2011 – 1 ex. v nočním smyku vegetace (TL).

Expanzívní druh, častý zvláště na stanovištích s vyšší bylinnou vegetací typu mezí, úhorů a břehů vod. V Čechách byl až do 90. let 20. století velmi vzácný a jen jednotlivě nalézaný (např. Havelka 1987, Voříšek 1957) a zdejší malé lokální populace nejevily tendenci k expanzi. V devadesátých letech se druh začíná rychle šířit z Moravy směrem na západ. Nejprve byl v r. 1995 nalezen J. Strejčkem ve východních Čechách na několika místech v okolí Vysokého Mýta (Veselý & Těťál 1998), v r. 2005 byl poprvé nalezen v Praze a v jižních Čechách, a v r. 2011 poprvé v západních Čechách jihozápadně od Plzně (Mantov). Toto šíření je dobře dokumentováno, neboť brouci se dají snadno nalézt smykem vegetace nebo prosevem rostlinného detritu, a navíc v létě velmi ochotně přilétají na světlo. V minulosti by proto výskyt nemohl unikat pozornosti.

Dromius (***Dromius***) ***angustus angustus*** Brullé, 1834 – **Mor**.: Květná (7172), 6.I.2007 – 1 ex. pod kůrou smrku (RE); Březová (7072), 20.I.2007 – 5 ex. pod kůrou smrků (RE); Poteč-Královec (6874), 24.II.2008 – 18 ex. na jedlích (RE); Jablunkov env., Košařiska (6478), 30.X.2007 – 1 ex. (R. Szopa lgt. et coll., L. Koloničný det.) (ST).

V Čechách vzácný, na Moravě lokální druh, nalézaný zejména v zachovalých lesních porostech.

Dromius (***Dromius***) ***kuntzei*** Polentz, 1939 – **Mor**.: Květná (7172), 6.I.2007 – 1 ex. pod kůrou smrku (RE); Bojkovice (6972), 24.II.2007 – 1 ex. pod kůrou smrku (RE); Poteč-Královec (6874), 24.II.2008 – 1 ex. pod kůrou jedle (RE).

Vzácný a velmi lokální druh. Podobně jako několik dalších druhů rodu v současnosti ubývá. Na Zlínsku vymizel z většiny dříve známých lokalit (Drslavice, Doubravy, Bojkovice atd.).

Dromius (***Dromius***) ***quadraticollis*** A. Morawitz, 1862 – **Mor**.: Jablunkov env., Košařiska (6478), 30.X.2007 – 1 ex. (R. Szopa lgt. et coll., L. Koloničný det.) (ST).

Lokální a vzácný druh, dříve ve Slezsku poměrně rozšířený. V současnosti z většiny dříve známých lokalit vymizel.

Dromius (***Dromius***) ***schneideri*** Crotch, 1871 – **Boh**.: Břehyně pr. Doksy (5454), 10.III.2011 – 2 ex. pod kůrou borovice (VO).

Lesní druh, vyhledávající zvláště borové porosty.

Microlestes fissuralis (Reitter, 1901) – **Boh**.: Roudnice nad Labem-Podlusky (5551), 24.IV.2008 – 1 ♂ v pískovně (MO); Nučničky (5451–5551), 13.IV.2009 – 1 ♂ v pískovně (MO); Travčice (5451–5551), 15.V.2009 – 2 ♂♂ ve staré pískovně (MO). **Mor**.: Dyjákovičky -Ječmeniště (7167), 6.V.2006 – 1 ex. na okraji terasy (MO); Valtice (7266), 21.VIII.2008 – 1 ♂ immaturní (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO); Bavory, Růžový vrch (7165), 9.V.2010 – 1 ♂ v trávě na vinici (MO); Bílé Karpaty, Velká nad Veličkou, PR Zahrady pod Hájem (7171), 23.III.2008 – 1 ex. (T. Sitek lgt. et coll., ST det) (ST); Šatov, V Pekle (7262), 2.VIII.2012 – 1 ex. na UV světlo nad vinicemi (VE).

Xerofilní druh, lokálně na druhotných i přirozených stanovištích v teplejších oblastech.

Microlestes schroederi Holdhaus, 1912 [ČS/VU] – **Mor**.: Dyjákovičky-Ječmeniště (7167), 6.V.2006 – 1 ex. na okraji terasy (MO).

Vzácný a lokální druh stepních oblastí jižní Moravy. Zejména na spražových půdách a kolmých hlinitých stěnách.

Paradromius (***Manodromius***) ***ruficollis*** (Motschulsky, 1844) (= *P. strigiceps* (Reitter, 1905)) [ČS/VU] – **Mor**.: Hrubý Jeseník - Velká kotlina (5969), 26.VIII.2009 – 1 ex. smykem travin (J. Gahaj lgt., det. et coll.) (GR).

Horský druh obývající otevřená travnatá stanoviště, často v blízkosti horských potoků. V ČR recentně jen v Hrubém Jeseníku. Potvrzení výskytu na lokalitě.

Paradromius (***Paradromius***) ***longiceps*** (Dejean, 1826) – **Boh**.: Sadská env. (5855), V.2007 – 1 ex. na břehu zatopené pískovny (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS); Brňany (5550), 4.IV.2008 – 2 ex. v lužním lese u Ohře severovýchodně od obce (MO); Zákupy env., Dobranovský (Panin) rybník (5353), 29.V.2008 – 2 ex. (VO); Terezín (5450), 27.III.2009 – 2 ex. v lužním lese u Ohře severně od města (MO); Břehyně pr. Doksy (5454), 10.III.2011 – 1 ex. pod kůrou borovice (VO); Obora pr. Doksy (5454), 16.VII.2013 – 1 ex. v rákosině u Okenského potoka (VE).

Skrytě žijící druh rozsáhlejších rákosin. Na Českolipsku je na rozdíl od Polabí a Poohří vzácný.

Philorhizus crucifer crucifer (Lucas, 1846) – **Boh**.: Divišov pr. Sušice (6747), V.2005 – 1 ex. (DS lgt., det. et coll., VE revid.) (DS); Lety u Písku (6450), 14.IX.2008 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO).

Xerofilní druh otevřených stanovišť, v ČR dosud s nedostatečně známým rozšířením.

Philorhizus quadrisignatus (Dejean, 1825) – **Boh**.: Veselí nad Lužnicí (6854), 18.III.1952 – 1 ex. (V. Karas lgt., GR det., coll. JčM) (GR). **Mor**.: Uherský Brod, Škrlovský rybník (6971), 29.XI.2009 – 3 ex. pod kůrou hlavatých vrb na břehu rybníka (MO), – 8 ex. tamtéž (VO); Uherský Brod (6971), 29.XI.2009 – 2 ex. na vrbě (RE).

Velice lokální a vzácný druh, v Čechách hlavně v okolí Labe a Vltavy. První nález z jižních Čech.

Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) – **Mor**.: Uherský Brod (6971), 17.II.2006 – 1 ex. u paty vrby u mokřadu (RE); Křemačov (6267), 2.V.2008 – 1 ex. na hlinitém nezastíněném břehu potoka Mírovka (MO).

Druh žije na rozmanitých stanovištích, častější bývá na okrajích lužních porostů. Na jihovýchodní Moravě v současnosti zcela běžný druh, který se zjevně šíří dále na sever.

Syntomus pallipes (Dejean, 1825) – **Boh**.: Drahobuz (5451–5452), 28.IV.2008 – 1 ex. na spražové stráni (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO), 2.IX.2010 – 2 ex. tamtéž (MO); Stroupeč, PP Stroupeč (5647), 23.III.2010 – 1 ex. (MO).

V Čechách vzácný xerofilní druh, lokálně rozšířený podél dolních toků Labe a Vltavy.

Lebia (***Lamprias***) ***chlorocephala*** (J. J. Hoffmann, 1803) – **Boh**.: Tušť (7155), 7.IV.2007 – 1 ex. v prosevu v pískovně (KU); Český Brod, Zahrady (5955), 16.V.2009 – 1 ex. v údolí říčky Šembery (LT); Lysá nad Labem, PP Hrabanovská Černava (5755), 6.VI.2010 – 1 ex. (LT).

Lokálně a nehojně se vyskytující druh. Obývá rozmanitá, většinou však přírodně zachovalejší stanoviště typu stepí, úhorů, xerotermních pastvin, okrajů lesů a luk v nivách. Častěji bývá nalézán při smyku a sklepávání vegetace.

Lebia (***Lamprias***) ***cyanocephala cyanocephala*** (Linnaeus, 1758) [ČS/CR] – **Mor**.: Havraníky, Staré vinice (7162), 17.VII.2009 – 1 ex. na světlo (T. Sitek lgt. et coll., ST det.) (ST).

Velmi vzácný druh, který se dnes vyskytuje již jen na několika málo lokalitách. Žije na přírodně zachovalých stanovištích: stepích, lesostepích, kamenitých stráních a zejména na xerotermních pastvinách. Na mnoha místech vymizel spolu se zánikem pastvy.

Lebia (***Lebia***) ***cruxminor cruxminor*** (Linnaeus, 1758) – **Boh**.: Trutnov, Poříčský hřbet (5461), 16.V.2009 – 1 ex. pod vegetací na okraji pastviny (MO); Přerov nad Labem, Přerovská hůra (5855), 16.V.2009 – 1 ex. na opukové stepi (LT); Kašperské hory env., Amálino údolí (6847), VI.2011 – 1 ex. (SS lgt., VS det., DS coll.) (DS); Lestkov, PR U rybníčků (6143), 5.V.2013 – 1 ex. sesmýkán s trsu blatouchu na podmáčené rašelinné louce (TL). **Mor**.: Šumice (6972), 9.III.2008 – 20 ex., 20.XII.2008 – 18 ex. a 29.XI.2009 – 5 ex. na okraji lesa (RE), 16.III.2008 – 8 ex. na okraji listnatého lesa pod travou a mezi listím (GR), 6.XI.2008 a 7. XI.2008 – cca 40 ex. mezi suchou vegetací a ve spadaném listí na okraji listnatého lesa (LA), 29.XI.2009 – 14 ex. pod listím a v trávě na okraji lesa (VO), více ex. tamtéž (MO); Slezské Beskydy, Čantoryje pr. Nýdek (6378), 27.VI.2009 – 1 ex. na květu (D. Hrebeň lgt., det. et coll., ST revid.) (ST); Pánov pr. Hodonín (7168), 29.VIII.2010 – 1 ex. smykem vegetace na území bývalého vojenského cvičiště (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det.) (VO); Drslavice, PR Vrchové (6971), 30.III.2011 – 1 ex. na okraji lesa (RE); Pouzdřany (7065), VI.2013 – 1 ex. (SS lgt., VS det., DS coll.) (DS).

Lokální a obvykle jednotlivě se vyskytující druh, nalézaný především smykem a sklepáváním vegetace. Žije na rozmanitých, většinou přírodně zachovalých stanovištích typu stepí, xerotermních pastvin a okrajů lesů. V Šumicích bylo na lokalitě o rozloze cca 20 × 2 m během dvou let nalezeno kolem 200 ex. Takto početný výskyt je unikátní, ale koresponduje s pozorováním u ostatních našich druhů rodu *Lebia* Latreille, 1802, které se mohou za výjimečně příhodných podmínek neobvykle namnožit.

Lebia (***Lebia***) ***humeralis*** Dejean, 1825 [ČS/CR] – **Mor**.: Pouzdřany (7065), 21.VII.2007 – 1 ex. na světlo (T. Sitek lgt. et coll., ST det.) (ST).

Velmi vzácný xerofilní druh. Žije na tradičních vinicích, na křovinatých stráních, na lesostepích a ve světlých teplomilných lesích. Z ČR známe jen staré obecné literární údaje o výskytu na Moravě (Kliment 1899, Fleischer 1930) a tři dokladové exempláře: Znojmo, V.1930 – 1 ex. (? lgt., coll. J. Pulpán/NMP) (Skoupý 2004) a Mor., Dyje, V.1946 – 2 ex. (Kohoušek lgt., coll. PLM) (Pulpán 1993). Nález z Pouzdřan potvrzuje recentní výskyt na Moravě a v ČR.

Badister (***Badister***) ***meridionalis*** Puel, 1925 – **Boh**.: Český Brod, Štolmíř (5955), 10.VIII.2001 – 1 ex. (LT); Maletice (6751), 21.VI.2008 – 1 ex. na světlo (A. Popadič lgt., coll. J. Ryšavý, GR det.) (GR); Borová pr. Chvalšiny (7151), 2.VII.2008 – 1 ex. na světlo (GR). **Mor**.: Lanžhot-Lány (7267), 10.V.2008 – 2 ex. v močálu (VO).

Hygrofil, v Čechách lokálně a nehojně zejména v teplejších oblastech na nezastíněných březích mokřadů, na jižní Moravě je běžný.

Badister (***Badister***) ***unipustulatus*** Bonelli, 1813 – **Boh**.: Terezín-Malá Pevnost env. (5451), 12.IV.2007 – 1 ex. v lužním lese (MO); Budyně nad Ohří, Budyňský les (5550), 17.–18.IV.2007 – 2 ex. v lužním lese (MO); Obora-Loužek (5649), 18.IV.2008 – 2 ex. v lužním lese (MO); Březany nad Ohří, Pístecký les (5550), 20.V.2009 – 2 ex. v lužním lese (MO); Kostelec nad Ohří, Budyňský les (5550), 18.VI.2010 – 1 ex. v lužním lese (MO), – 9 ex. (VO); Halámky (7155), 17.VII.2009 – 1 ex. na světlo v pískovně (KU); Koštice (5649), 2.V.2010 – 1 ex. a 10.VI.2011 – 2 ex. na bažinaté louce (VO); Český Brod, Štolmíř (5955), 12.II.2011 – 1 ex. (LT). **Mor**.: Lanžhot-Lány (7267), 10.V.2008 – 1 ex. v močálu (VO), – 1 ex. tamtéž (MO); Pouzdřany (7065), VI.2010 – 1 ex. u rybníka (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS).

Charakteristický druh zachovalých lužních lesů, v Čechách s velmi lokálním výskytem.

Badister (***Baudia***) ***peltatus peltatus*** (Panzer, 1796) [ČS/NT] – **Mor**.: Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 16.VII.2007 – 4 ex. na světlo na stepi a terasách vinice (VE); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 17.VII.2007 – 2 ex. na světlo na hrázi říčky Trkmanky (VE).

Vzácný druh, častější u tůní v lužních lesích a na zachovalých mokřadech, místy se objevuje i u rybníků. Často přilétá na světlo.

Badister (***Trimorphus***) ***sodalis*** (Duftschmid, 1812) – **Boh**.: Ražický rybník (6750), 5.IV.2011 – 2 ex. v prosevu (J. Ryšavý lgt., GR det. et coll.) (GR). **Mor**.: Uherský Brod (6971), 22.VIII.2007 – 1 ex. na světlo u mokřadu (RE).

Hygrofil, poměrně častý v pobřežních porostech v nížinách. Z jižních Čech nebyl doposud znám. Ke světlu přilétá velmi zřídka.

Licinus (***Licinus***) ***depressus*** (Paykull, 1790) – **Boh**.: Litoměřice env. (sever) (5450), 19.IX.2010 – 1 ex. pod drny u pole východně od NPR Bílé stráně (MI); Chotíkov pr. Plzeň (6145), 18.VII.–21.VIII.2012 – 1 ex. v ZP v borovo-březovém lese (TL); Zdebořice (6647), 18.IX.2014 – 1 ex., 12.X.2014 – 1 ex. v ZP na zarůstajícím vřesovišti na severním okraji obce (I. Formanová lgt., TL det. et coll.) (TL). **Mor**.: Ostrava-Radvanice (6176), 10.VI.2007 – 1 ex. na okraji haldy (ST); Petřvald (6176), 18.VIII.2008 – 3 ex. (D. Hrebeň lgt., det. et coll., ST revid.) (ST).

Predátor menších ulitnatých plžů, obývající velmi rozmanitá přirozená i druhotná nelesní stanoviště. Zpravidla se vyskytuje jednotlivě.

Licinus (***Neorescius***) ***hoffmannseggii*** (Panzer, 1803) [ČS/NT] – **Boh**.: Jílové u Děčína, Holý vrch (5250), 10.VI.2005 – 1 ex. pod listím na okraji velké sutě (MO); Kozly pr. Česká Lípa, vrch Kozel (5352), 16.V.2010 – 1 ex. (CH). **Mor**.: Ostrov u Macochy (6666) 13.–25. IV.2003 – 1 ex. v ZP (J. Klašková lgt., MO det. et coll.) (MO); Bílé Karpaty - Velká Javořina (7172), 23.VII.–30.VIII.2005 – 2 ex. v ZP (RE), 11.IX.2005 – 2 ex. pod kůrou padlého kmene javoru (LA), 3.IX.2006 – 4 ex. pod kůrou javorů v pralese na úbočí (LA), 9.IX.2006 – 10 ex., z toho 4 kopulující páry, pod odchlipující se kůrou javorů a lípy cca 20–50 cm nad zemí (RE), 14.IX.2007 – 6 ex. a 13.VIII.2011 – 2 ex. v pralese (RE), 2.IX.2011 – 1 ex. (KM); Bílé Karpaty, Sidonie env., PR Okrouhlá (6975), 3.VII.2006 – 1 ex. pod kůrou u paty buku (ST).

Stenotopní, bioindikačně významný druh obývající přírodně zachovalé bukové lesy, často suťové a kamenité. V noci pronásleduje na kmenech stromů menší ulitnaté plže.

Masoreus* (*Masoreus*) *wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813) – **Boh**.: Zvěřínek (5856), 5.VIII.2000 – 1 ex. v noci na písku (LT); Vinařice, Vinařická hora (5850), 29.VIII.–26.IX.2009 – 1 ex., 7.–28.VIII.2010 – 2 ex., 27.V.–26.VI.2011 – 1 ex. a 6.– 27.VIII.2011 – 1 ex. v ZP v bývalém lomu (MO et VO); Předonín (5551–5552), 7.VII.2007 – 1 ex. a 29. VII.2007 – 1 ex. v pískovně (MO); Nučničky (5451–5551), 26.VII.–15.VIII.2009 – 1 ex. v ZP v pískovně (MO); Kamenec pr. Radnice (6147), 8.X.2009 – 1 ex. na stepi (TL); Písty (5855), 1.VIII.2010 – 1 ex. na okraji písečného přesypu (LT); Plzeň-Litice (6246), 20.VII.–22. VIII.2011 – 2 ex. v ZP na malém zarůstajícím vřesovišti (TL); Stod, Šibeniční vrch (6345), 22.VIII.–19.IX.2011 – 1 ex. v ZP na vřesovišti (TL). **Mor**.: Rohatec (7169), 23.VI.2007 – 9 ex. na vátých pískách, na mýtině pod kusy dřeva a vegetací po dešti ve vlhkém písku (LA); Bzenec (7069), 17.V.2009 – 1 immaturní ex. v ZP na vojenském cvičišti (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det.) (VO); Pánov pr. Hodonín (7168), 22.VII.–29.VIII.2010 – 1 ex. v ZP na bývalém vojenském cvičišti (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det.) (VO).

Reliktní xerofilní druh, žijící na nejsušších místech stepí, skalních stepí a písčin.

Oodes gracilis A. Villa et G. B. Villa, 1833 [ČS/NT] – **Boh**.: Zákupy env., Dobranovský (Panin) rybník (5353), 29.V.2008 – 1 ex. (VO); Břehyně pr. Doksy (5454), 25.–27.V.2007 – více ex. vyšlapáváním rákosin (KA), 10.III.2011 – 2 ex. ve dřevě (VO). **Mor**.: Trávní dvůr pr. Hrabětice (7264), 6.V.2006 – 1 ex. na okraji močálu (VO), 6.V.2006 a 8.V.2006 – 1 ex. (MO); Lanžhot, PR Soutok (7367), 10.V.2008 – 1 ex. v pískovně u silnice (MO); Vacenovice, PP Jezero (7069), 19.IV.2009 – 1 ex. (RE); Šatov, V Pekle (7262), 2.VIII.2012 – 4 ex. na UV světlo nad vinicemi (VE).

Druh zachovalejších mokřadů a rákosin, vzácněji nalézaný i v lužních lesích. Zákupy jsou první lokalitou na Dokesku ležící mimo oblast známých lokalit severovýchodně od České Lípy.

Panagaeus* (*Panagaeus*) *bipustulatus (Fabricius, 1775) – **Mor**.: Jablunkov env., Milíkov (6378), 2.VI.2008 – 1 ex. (R. Szopa lgt. et coll., L. Koloničný det.) (ST).

Nehojný druh širokého spektra spíše sušších a teplejších stanovišť.

Perigona* (*Trechicus*) *nigriceps (Dejean, 1831) – **Boh**.: Veselí nad Lužnicí (6854), 27.VIII.2003 – 1 ex. (V. Karas lgt., coll. JčM, GR det.) (GR); Nové Hrady-Byňov (7254), 24.VIII.2007 – 1 ex. za letu (KU); Plzeň (6246), 22.VIII.2011 – 1 ex., 24.VIII.2011 – 1 ex., 11.V.2012 – 1 ex., 29.VI.2012 – 1 ex., 18.VIII.2012 – 2 ex., 20.VIII.2012 – 1 ex. a 10.IX.2012 – 1 ex., vše na světlo na balkóně obytného domu v centru města (TL). **Mor**.: Mladeč (6268), 10.X.2010 – mnoho ex. ve skladu štěpků (KM).

Skrytě žijící, ale čile létající druh vázaný na tlející rostlinný materiál.

Agonum* (*Agonum*) *gracilipes (Duftschmid, 1812) – **Boh**.: Halámky (7155), 17.VII.2009 – 1 ex. na světlo v pískovně (KU); Hluboká nad Vltavou, PP Baba (6952), 11.VI.2010 – 1 ex. na světlo v údolí řeky Vltavy (F. Houška lgt., det. et coll.) (GR); Vinařice, Vinařická hora (5850), 2.V.–1.VI.2010 – 1 ex. v ZP v bývalém lomu (MO et VO); Český Brod, Štolmíř (5955), 16.VII.2010 – 2 ex. na světlo (LT). **Mor**.: Bavory, Růžový vrch (7165), 9.V.2010 – 1 ex. v trávě na vinici (MO); Lipová (6873), 23.V.–6.VII.2010 – 1 ex. v ZP na okraji louky u lesa (RE); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 28.VII.2008 – 1 ex. na světlo (J. Helešic lgt., det. et coll.) (GR); Havraníky, Staré vinice (7162), 6.VIII.2009 – 1 ex. na světlo (T. Sitek lgt.

et coll., ST det.) (ST), Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 22.VII.2010 – 1 ex. na světlo (J. Vávra lgt. et coll., L. Koloničný det.), – 2 ex. na světlo (T. Sitek lgt. et coll., ST det.) (ST).

Dosud nedostatečně známý druh. Nejčastěji je sbírán při odchytech na světlo, méně časté jsou náhodné nálezy na rozmanitých suchých i vlhkých stanovištích.

Agonum (***Europhilus***) ***gracile*** Sturm, 1824 – **Mor**.: Rohatec (7169), 24.II.2008 – 1 ex. na mokřině v nivě Moravy na úpatí písečné duny, v tlejícím dřevě (LA); Vacenovice, PP Jezero (7069), 13.IV.2008 – 2 ex. společně s *Acupalpus dubius* (RE).

Druh obývající břehy mokřadů, vlhké louky a rašeliniště. Jen na kyselých půdách, na jižní Moravě jen velmi lokálně a ojediněle.

Agonum (***Europhilus***) ***piceum*** (Linnaeus, 1758) – **Boh**.: Nové Hrady (7254), 7.V.2008 – 4 ex. a 24.IV.2008 – 4 ex. v rákosině rybníka, vždy pozorováno více ex. (KU).

Hygrofil žijící lokálně a většinou nehojně na březích zachovalých mokřadů, v lužních porostech a větších rákosinách.

Agonum (***Olisares***) ***angustatum*** Dejean, 1828 (= *A. gisellae* Csiki, 1931) – **Mor**.: Terezín pr. Čejč (7067), 12.V.2008 – 1 ex. v rákosině na zrevitalizovaném slanisku Zápověď (GR); Uherský Brod (6971), 1.IV.–14.IX.2007 – několik desítek ex. do ZP i individuálním sběrem u mokřadu, 16.VII.2007 – 1 ex. na světlo u mokřadu (RE).

Hygrofilní druh rozmanitých typů stanovišť. Častěji bývá nalézán na slaniskách a na nezastíněných březích potoků s řidší vegetací. Na Uherskobrodsku je na vhodných místech celkem hojný a lze předpokládat, že tomu tak bude i na dalších místech jihovýchodní Moravy.

Agonum (***Olisares***) ***lugens*** (Duftschmid, 1812) [ČS/VU] – **Boh**.: Kroclov env. (7052), 11.VII.2008 – 1 ex. na světlo v údolí Vltavy (GR); Praha, Císařský ostrov (5852), 26.VII.2012 – 1 ♀, 28.VII.2013 – 1 ♂, 1 ♀ a 8.VI.2014 – 1 ex. do světelného UV lapače na hrázi Vltavy v areálu ÚČOV (VE); Praha-Podbaba (5852), 28.VII.2013 – 1 ♂ do světelného lapače u Vltavy nedaleko přívozu (F. Fiala lgt., VE det. et coll.) (VE); Praha-Dubeč (5953), 19.VII.2014 – 1ex. na světlo na dně vypuštěného rybníka Rohožník (VE); Praha-Dubeč (5953), 20.VII.2014 – 1 ex. na světlo na polní mokřině při západním břehu rybníka Slatina (VE). **Mor**.: Travní dvůr pr. Hrabětice (7264), 6.V.2006 – 1 ex. (VO); Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 22.VII.2010 – 1 ex. na světlo (J. Vávra lgt. et coll., L. Koloničný det.) (ST).

Původně vzácný a lokální hygrofilní druh, žijící na mokřadech, v rákosinách u tůní u větších řek a v lužních lesích. Od roku 2012 je v Čechách pozorováno výrazné zvýšení počtu nálezů, a to i na místech, kde druh dosud nikdy pozorován nebyl nebo je z nich znám jen na základě historických údajů. Příčiny mohou být podobné jako u druhu *Chlaenius tristis*.

Agonum (***Olisares***) ***viridicupreum viridicupreum*** (Goeze, 1777) [ČS/VU] – **Mor**.: Třemešná ve Slezsku (5771), 20.IX.2010 – 1 ex. (L. Mikulenka lgt. et coll., ST det.) (ST); Bartošovice, PR Bartošovický luh (6374), VI.2010 – 1 ex. a 10.VII.2011 – 1 ex. na zamokřené depresi na louce (ST); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 23.V.2007 – 2 ex. na podmáčeném poli (KU), 9.V.2008 – 1 ex. na slanisku (VO), 12.V.2008 – 3 ex. na bahně vysýchající mokřiny (VE), 12.–13.V.2008 – 1 ex. na slanisku (MO); Břeclav-Pohansko (7267), 21.V.2007 – 1 ex. (KU lgt. et coll., GR det.) (KU).

Na Moravě nehojný druh, který bývá nalézán na březích vod s nezapojenou vegetací, nejčastěji v dosahu větších řek. Přeletuje i na delší vzdálenosti a osídluje proto i polní a luční mokřiny.

Limodromus krynickii (Sperk, 1835) [ČS/VU] – **Mor**.: Trávní dvůr pr. Hrabětice (7264), 6. V.2006 – 1 ex. na okraji močálu (VO), 6. V.2006 – 1 ex. a 8.V.2006 – 1 ex. tamtéž (MO); Lanžhot-Lány (7267), 10.V.2008 – 1 ex. v močálu (MO), – 1 ex. tamtéž (VO); Pouzdřany (7065), V.2008 – 1 ex. (SS lgt., VS det., VE revid., DS coll.) (DS).

Charakteristický stenotopní druh zachovalých lužních lesů, na rozdíl od následujícího není zřejmě schopen letu.

Limodromus longiventris (Mannerheim, 1825) [ČS/VU] – **Boh**.: Praha-Hostivař, PP Meandry Botiče (5953), 3.VI.2011 – 1 ♂ na světlo u mokřadu pod Toulcovým dvorem (VE). **Mor**.: Šumice (6972), 12.VIII.2010 – 2 ♂♂, 1 ♀ na světlo (RE).

Vlhkomilný druh, charakteristický pro lužní lesy u větších řek. V Čechách je velmi vzácný a velmi lokální, dosud jsou známé jen tři věrohodné údaje: Brandýs nad Labem (Lokaj 1870); Třeboň, 1929 (Roubal 1934) a Stříbřec-Nová řeka, 1972 (Hůrka 1979). Lokalita Třeboň může být navíc totožná s lokalitou Stříbřec (jedná se o zbytek lužního lesa u řeky Lužnice). Pražský nález je potvrzením recentního výskytu v Čechách.

Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790) – **Boh**.: Dnešice (6345), 16.IX.2009 – 1 ex. v oprámu kaolinového lomu (TL); Holýšov (6444), 16.IX.2009 – 3 ex. pod kameny na bývalém vojenském cvičišti (TL); Šumava, Prášily env., Na Jelenách (6846), 23.V.2011 – 1 ex. a 18.IX.2011 – 2 ex. na malém izolovaném vřesovišti (LT); Vřesová (5742), 8.IX.2012 – 1 ex. pod kamenem na Vintířovské výsypce (TL).

Lokální druh, rozšířený spíše v pahorkatinách a v podhůří na hlinitých a písčitých půdách, charakteristický je zvláště pro hliniště cihelen a odvaly lomů.

Olisthopus sturmii (Duftschmid, 1812) – **Boh**.: Horažďovice (6648), 11.IV.2009 – 1 ex. a 18.IX.2009 – 1 ex. pod kameny na vápencové stepi (TL); Brozany nad Ohří (5550), 3.VII.2009 a 21.III.2010 – 3 ex. na sprašovém návrší (MO).

Reliktní, lokálně občas i hojný druh lesostepí a stepí. Horažďovice jsou třetí známou lokalitou v západních Čechách.

Platynus livens (Gyllenhal, 1810) – **Boh**.: Kersko env. (5855), 20.V.2001 – 3 ex. vyšlapány na břehu lesní tůně (LT); Majdalena-Rozvodí (7055), 10.XII.2006 – 2 ex. pod kůrou (KU); Majdalena, NPR Stará řeka (7055), 25.XI.2007 – 10 ex. pod kůrou padlé vrby (*Salix* sp.), pozorováno více ex. (GR); Pěkná-Nová Pec (7149), 11.VIII.2007 – 1 ex. na rašeliništi (RE); Budyně nad Ohří, Budyňský les (5550), 17.–18.IV.2007 – 4 ex. v lužním lese (MO); Kostelec nad Ohří, PR Myslivna (5650), 20.IV.2007 – 1 ex. v lužním lese (MO); Praha-Petrovice (5953), 10.VIII.2008 – 1 ex. na travnatém břehu tůně u potoka Botiče (VE); České Budějovice, rybník Černiš (7052), 19.IV.2009 – 1 ex. na mokřinách v olšovém luhu (GR); Nové Hrady-Byňov (7254), 29.X.2009 – 1 ex. pod kůrou padlého stromu, 22.XI.2009 – 6 ex. pod kůrou padlého stromu, pozorováno více ex. (KU). **Mor**.: Trávní dvůr pr. Hrabětice (7264), 8.V.2006 – 1 ex. na okraji močálu (VO); Lanžhot-Lány (7267), 10.V.2008 – 2 ex. v močálu (MO), – 1 ex. tamtéž (VO).

Charakteristický druh zachovalých lužních lesů.

Abax* (*Abacopercus*) *schueppeli rendschmidtii (Germar, 1839) – **Mor**.: Ostrava-Slezská Ostrava (6176), 21.VI.2006 – 3 ex., 7.VI.2006 – 2 ex. na haldě Zárubek (Hodeček lgt., coll. PřF OU, ST det.) (ST).

Lesní karpatský druh, obývající listnaté a smíšené lesy podhůří a pahorkatin. Adaptabilita na druhotná stanoviště nebyla dosud pozorována.

Molops* (*Molops*) *elatus elatus (Fabricius, 1801) – **Boh**.: Čepice env. (6747), IV.2007 – 1 ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (VE); Chmelná (6747), V.2007 – 1 ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS); Kašperské hory env. (6847), VIII.2007 – 1 ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS); Řepová (6267), 2.V.–6.VII.2008 – 4 ex. v ZP u Řepovského potoka (MO et VO).

Lokální druh suťových listnatých lesů pahorkatin a podhůří.

Pedius longicollis (Duftschmid, 1812) – **Boh**.: Rovensko pod Troskami-Liščí Kotce (5457), 19.VI.2010 – 1 ex. (VO).

Spíše hygrofilní druh, vázaný na jílovité půdy. Častější v hliništích, na okrajích polí, na pastvinách a na zaplavovaných loukách u řek. V oblasti Českého ráje je tento druh velmi lokální a vzácný.

Poecilus* (*Poecilus*) *sericeus sericeus Fischer von Waldheim, 1824 [ČS/VU] – **Boh**.: Poříčany env. (5855), 1.V.2003 – 1 ex. pod kamenem na okraji pískovny (LT, VO revid.) (LT). **Mor**.: Dyjákovičky-Ječmeniště (7167), 6.V.2006 – 1 ex. na vinici (D. Pleskač lgt. et coll., VO det.) (VO), 3.VII.2007 – 1 immaturní ex. na okraji vinice (VE); Úvaly (7266), 2.V.2009 – 2 ex. (J. Schneider lgt. et coll., MO det.) (MO).

Stepní druh s lokálním výskytem v teplejších, přírodně zachovalých oblastech.

Pterostichus* (*Argutor*) *chameleon (Motschulsky, 1866) [ČS/EN] – **Mor**.: Lanžhot, Košařské louky (7367), 14.III.2009 – 9 ex. v náplavu, 25.IV.2009 – 1 ex. (RE).

Hygrofilní druh zachovalých pobřežních porostů, pastvin a luk v záplavových územích větších řek s přirozeným vodním režimem.

Pterostichus* (*Argutor*) *cursor (Dejean, 1828) [ČS/EN] – **Mor**.: Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 1.V.2009 – 1 ex. (RE); Milovice env., Křivé jezero (7166), V.2008 – 1 ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS); Pohansko (7267), V.2014 – 1 ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS).

Halofilní hygrofil, v ČR lokálně na zachovalých, vegetací zarostlých březích mokřadů jižní Moravy.

Pterostichus* (*Argutor*) *leonisi Apfelbeck, 1904 – **Boh**.: Chvalšiny-Červený dvůr (7151), 31.III.1996 – 1 ex. pod kůrou smrkového pařezu na lesní pasece (GR); Brloh (7051), III.1997 – 1 ex. (D. Čudan lgt., GR det. et coll., MO revid.) (GR); Veselí nad Lužnicí (6854), 19.IV.2002 – 2 ex. (V. Karas lgt., coll. JčM, GR det.) (GR); Nové Hrady (7154), 19.IX.2009 – 1 ex. vyhrabán z kompostu (KU), 21.X.2009 – 1 ex. přezimující pod kládou (KU); Štiptoň pr. Nové Hrady (7154), 19.IX.2009 – 1 ex. v okolí hnojiště (KU), 21.X.2009 – 1 ex. přezimující pod dřevem v okolí hnojiště (KU); Praha-Komořany (6052), 3.XI.2011 – 1 ex. v trouchnivém

dřevě v okolí tůní u Vltavy (VE); Praha-Dubeč (5953), 4.VI.2014 – 1 ex. na polní mokřině při západním břehu rybníka Slatina (VE). **Mor**.: Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 24.IV.2007 – 3 ex. na mokřinách pod jižní hrází Trkmanky (VE); Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka (7170), 3.IV.2010 – 1 ex. v prosevu kompostu (J. Vávra lgt. et coll., L. Koloničný det.) (ST).

Halofilní a hygrofilní druh. V Čechách byl poprvé zjištěn v roce 1990 (Resl 1992), od té doby se šíří zejména na druhotných vlhkých i sušších stanovištích.

Pterostichus (***Cryobius***) ***negligens negligens*** (Sturm, 1824) – **Boh**.: Krkonoše - Vysoké Kolo (5259), 28.–29.VIII.2007 – 8 ex. (FA et T. Kopecký lgt., det. et coll.) (FA).

Reliktní chladnomilný druh, v Krkonoších velmi lokálně v kamenných sutích v alpínské zóně.

Pterostichus (***Eosteropus***) ***rufitarsis cordatus*** Letzner, 1842 [ČS/NT] – **Boh**.: Krkonoše - vrch Medvědín pr. Špindlerův Mlýn (5259), 20.VI.–21.VIII.2007 – 5 ex. v ZP v klimaxové smrčině (1230 m) (VO). **Mor**.: Jeseníky - Keprník (5868), 13.VI.2009 – 1 ex. (Ezer lgt. et coll., RE det.) (RE).

Vzácný a lokální reliktní lesní druh, nalézaný především v zachovalých horských lesích.

Pterostichus (***Melanius***) ***aterrimus aterrimus*** (Herbst, 1784) [ČS/VU] – **Boh**.: Kosov pr. Kamenný Újezd (7152), 25.IX.1995 – 14 ex. na břehu vypuštěného rybníka pod dřevy a starým rákosem (GR, 1 ex. in coll. D. Čudan) (GR); Ražice, NPR Řežabinec (6750), III.1998 – 1 ex. (J. Máca lgt. et coll., GR det.) (GR), IX.1998 – 1 ex. (J. Máca lgt. et coll., GR det.) (GR), 6.V.2000 – 13 ex. vyšlapáno z rákosí (J. Blízek lgt., det. et coll., 3 ex. in coll. F. Houška) (GR), 6.V.2000 – 9 ex. vyšlapáno z rákosí (A. Holub lgt. et coll., GR det.) (GR), 13.V.2000 – 3 ex. vyšlapány z rákosí (A. Holub lgt. et coll., GR det.) (GR), 13.V.2000 – 5 ex. vyšlapáno z rákosí (J. Blízek lgt., det. et coll.) (GR), 16.V.2000 – 7 ex. (F. Houška lgt., det. et coll.) (GR), 25.V.2000 – 3 ex. vyšlapány z rákosí (V. Křivan lgt., det. et coll.) (GR), 25.V.2000 – 2 ex. vyšlapány z rákosí (GR), 28.IX.2000 – více ex. přezimujících pod kůrou dřevin (GR), 28.IX.2000 – 5 ex. přezimujících pod kůrou dřevin (D. Čudan lgt. et coll., GR det.) (GR), 11.III.2001 – 5 ex. přezimujících pod kůrou dřevin (J. Blízek lgt., det. et coll.) (GR), 3.IV.2001 – 1 ex. vyšlapán z rákosí (J. Kynkor lgt. et coll., GR det.) (GR), V.2001– 1 ex. vyšlapán z rákosí (S. Budka lgt. et coll., GR det.) (GR), 18.IV.2004 – 1 ex. pod dřevy na okraji rybníka (GR), 29.V.2005 – 1 ex. vyšlapán z rákosí (GR lgt. et det., T. Třešňák coll.) (GR), 1.X.2005 – 7 ex. u rybníka Řežabinec (LT), 28.III.2010 – 2 ex. pod kmenem (GR), 19.III.2011 – 8 ex. (zbytky krovek ve starém pařízku) (J. Kovář observ. et det.) (GR); Stará Hlína, rybník Nový Vdovec (6955), 22.V.2001 – 1 ex. na břehu rybníka (V. Křivan lgt., det. et coll.) (GR), 9.IX.2002 – 1 ex. na břehu rybníka (V. Křivan lgt., det. et coll.) (GR), 10.IX.2002 – 3 ex. na břehu rybníka (V. Křivan lgt., det. et coll.) (GR); Lhenice env. (7050), 20.X.2004 – 1 ex. v ZP u Koubovského rybníka (J. Máca lgt. et coll., GR det.) (GR); Lovětín, PP Luží u Lovětína (6756), 16.VII.2006 – 1 ex. a 10.V.2011 – 1 ex., oba vyšlapány z mokré pobřežní vegetace (P. Hesoun lgt., det. et coll.) (GR).

Velmi lokální reliktní hygrofilní druh vázaný na přírodně zachovalé mokřady.

Pterostichus (***Melanius***) ***elongatus*** (Duftschmid, 1812) [ČS/NT] – **Mor**.: Uherský Brod (6971), 2.VI.2007 – 1 ex. u mokřadu (RE).

Na Moravě velmi lokální druh zachovalých nezastíněných mokřadů. V současnosti se šíří. Jde o první známý nález z okolí Uherského Brodu.

Pterostichus (***Phonias***) ***taksonyis*** Csiki, 1930 [ČS/CR] – **Boh**.: Záblatí, PR Ptačí Blato (6954), 18.V.1979 – 1 ex. na rašeliníku (V. Karas lgt., coll. JčM, GR det.) (GR). **Mor**.: Lanžhot, PR Soutok (7367), 10.V.2008 – 1 ♂ (RE); Lanžhot, Košařské louky (7367), 25.IV.2009 – 1 ♀ (RE).

Velmi vzácný a dlouhodobě ubývající hygrofilní druh zachovalých pobřežních porostů a luk v záplavových územích větších řek s přirozeným vodním režimem.

Pterostichus (***Pseudomaseus***) ***gracilis gracilis*** (Dejean, 1828) [ČS/VU] – **Mor**.: Lanžhot, PR Soutok (7367), 10.V.2008 – 1 ex. v pískovně u silnice (MO), – 1 ex. (VO); Tvrdonice (7268), 16.VII.2008 – 2 ex. na světlo (J. Helešic lgt. et coll., LA det.) (GR).

Hygrofil žijící na nezastíněných březích zachovalých mokřadů. V Čechách velmi lokální, na jižní Moravě poněkud častější.

Pterostichus (***Pseudomaseus***) ***piceolus latoricaensis*** Pulpán, 1965 [ČS/CR] – **Mor**.: Břeclav-Pohansko (7267), 14.IV.2007 – 1 ex. pod starou suchou naplavenou trávou (KU lgt. et coll., GR det.) (KU).

Velmi vzácný a lokální hygrofilní druh. Obyvatel zachovalých lužních lesů v záplavovém území Dyje v oblasti soutoku Moravy a Dyje.

Pterostichus (***Pseudosteropus***) ***illigeri sudeticus*** Gerhardt, 1909 [ČS/NT] – **Boh**.: Pohoří na Šumavě (7354–7454), 14.VII.2006 – 2 ex., 9.VII.2006 – 6 ex., 26.VII.2008 – 1 ex. a 31. VII.2008 – 1 ex., vše ve vlhkém smrkovém lese (KU).

Horský lesní druh, v ČR rozšířen pouze v Novohradských horách.

Platyderus (***Platyderus***) ***rufus rufus*** (Duftschmid, 1812) – **Boh**.: Nový Vojířov env. (6956), 9.IV.2009 – 1 ex. a 4.IV.2010 – 2 ex. pod kameny na okraji pastviny (LT); Kunžak, PP Jalovce u Valtínova (6857), 10.X.–18.XI.2009 – 1 ex. v ZP (P. Hesoun lgt., det. et coll.) (GR); Budkov, PR Hrádeček (6857), 1.V.–26.VI.2010 – 6 ex. (P. Hesoun lgt., det. et coll., 2 ex. in coll. GR) a 26.VI.–28.VIII.2010 – 1 ex. v ZP na suché hrázi rybníka (P. Hesoun lgt., det. et coll.) (GR).

Lokální a nehojný lesostepní druh. V ČR na jižní Moravě a na několika lokalitách v jihovýchodních Čechách a v okolí Kralup.

Calathus (***Neocalathus***) ***ambiguus ambiguus*** (Paykull, 1790) – **Boh**.: Františkov (7155), 25.VII.2008 – 1 ex. v pískovně (J. Máca lgt. et coll., GR det.) (GR).

Xerofilní druh, častější na okrajích polí a úhorech v teplejších oblastech. V jižních Čechách vzácný a lokální.

Calathus (***Neocalathus***) ***cinctus*** Motschulsky, 1850 – **Boh**.: Děčín (5251), 22.III.2006 – 1 ex. pod vřesem u zoologické zahrady (MO); Encovany (5451), 4.VII.2008 – 1 ex. (M. Knapp lgt. et coll., MO det.) (MO); Roudnice nad Labem-Podlusky (5551), 22.VIII.2008 – 4 ex. v pískovně (MO); Lysá nad Labem env. (5754), 2.VII.2009 – 1 ex. (J. Gahaj lgt. et

coll., GR det.) (GR); Úherce, PR Nový rybník (6345), 6.VII.2011 – 4 ex. při nočním smyku pobřežní vegetace (TL); Plzeň (6246), 22.VIII.2011 – 1 ex. na světlo na balkóně obytného domu v centru města (TL). **Mor**.: Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 6.V.2006 – 1 ex. na vinici (VO), 28.IV.2007 – 1 ex. (A. Holub lgt. et coll., GR det.) (GR).

Xerofilní druh obývající stepi, okraje polí, úhory a pískovny zejména v teplejších oblastech.

Dolichus halensis (Schaller, 1783) – **Boh**.: Svébohy env. (7254), 10.VII.2006 – 2 ex. v ZP (P. Kindlmann lgt., GR det. et coll.) (GR); Frymburk-Lojzovy paseky (7351), 2.VIII.2009 – 1 ex. v okolí Lipenské nádrže (M. Múčka lgt., GR det. et coll.) (GR); Český Brod, Štolmíř (5955), 16.VII.2010 – 1 ex. na světlo (LT); Přerov nad Labem, Přerovská hůra (5855), 9.VII.2012 – 2 ex. na světlo (LT). **Mor**.: Beskydy - Bílá (6576), 22.VII.2009 – 1 ex. (D. Hrebeň lgt., det. et coll., ST revid.) (ST); Dolní Suchá (6276), 19.VII.2008 – 1 ex. (D. Hrebeň lgt., det. et coll., ST revid.) (ST).

Xerofilní druh obývající zejména písčité a hlinitopísčité okraje polí a úhorů v teplejších oblastech. Při přeletech bývá pozorován i velmi daleko od míst stálého výskytu.

Laemostenus (***Pristonychus***) ***terricola terricola*** (Herbst, 1784) [ČS/NT] – **Boh**.: Hostěnice (5550), 22.V.2009 – 3 ex. v okolí nory na říční terase Ohře (MO); Blahotice pr. Slaný (5750), 26.VI.–18.VII.2010 – 1 ex. v ZP v konvenčním sadu (MO et VO). **Mor**.: Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 29.V.2007 – 1 ex. v ZP u liščí nory (VE).

V norách, doupatech a jiných podzemních prostorách, skrytě žijící druh. Často i synantropně ve sklepech.

Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus, 1758) [ČS/CR] – **Boh**.: Veselí nad Lužnicí (6854), 20.IX.1986 – 2 ex. ve sklepě zbouraného domu ve Svinenské ulici (V. Karas lgt., coll. JčM, GR det.) (GR).

V minulosti poměrně častý druh, žijící zejména v koňských stájích a ve sklepech. Odsud vymizel zároveň se změnou způsobu využívání těchto prostor. Na rozdíl od jižní části jeho areálu rozšíření existovaly na našem území výhradně synantropně žijící populace, ve volné přírodě byl druh zastižen pouze jednou (Rébl 2010). Uvedený nález je jedním z posledních známých údajů z Čech.

Amara (***Amara***) ***anthobia*** A. Villa et G. B. Villa, 1833 – **Boh**.: Třeboň env. (6954), 5.VII.1992– 1 ex. (J. Rolčík lgt., LT det. et coll., VE revid.) (LT); Praha-Libeň (5852), 3.IV.2007 – 4 ex. na ruderalizovaném úpatí skal v PP Jabloňka (VE); Praha, Prokopské údolí pr. Jinonice (5952), 16.VI.2009 – 1 ex. na louce u Jinonického potoka pod Novou Vsí (VE); Praha-Troja, Zoologická zahrada (5852), 14.V.2012 – 114 ex. pod listím a detritem ve východní části PP Skály v ZOO, pozorováno více ex. (VE); Praha, Císařský ostrov (5852), 3.IV.2014 – 1 ex. v letu za slunečného odpoledne (VE). **Mor**.: Dubňany (7068), 7.IV.2007 – 14 ex. (RE); Čejč (7067), 17.IV.2010 – 1 ex. (Bobot lgt. et coll., RE det.) (RE); Břeclav-Kančí obora (7267), 1.V.2010 – 1 ex. na okraji lesa (D. Čudan lgt. et coll., GR det.) (GR); Uherčice env. (7065), 14.VI.2010 – 4 ex. na okraji pole (LT).

Lokální xerofilní druh, rozšířený především ve vinařských oblastech. Nález z Třeboně je nanejvýš pozoruhodný a vyžaduje potvrzení dalšími nálezy.

Amara (***Amara***) ***famelica*** Zimmermann, 1832 – **Boh**.: Nový Vojířov env. (6956), 24.IV.2011 – 1 ex. (LT lgt. et coll., TL det.) (LT). **Mor**.: Brumov (7071), 1.–30.VI.2010 – 1 ♂ v ZP (L. Kandrnál lgt., RE det., LA coll.) (RE); Bylnice (6974), VI.2010 – 1 ex. v ZP na pastvině (L. Kandrnál lgt., LA det. et coll.) (LA).

Lokální druh s vazbou na vřesoviště, rašeliniště a chladnější lokality s kyselým nebo písčitým podkladem. Nový druh pro oblast jihovýchodní Moravy.

Amara (***Amara***) ***lucida*** (Duftschmid, 1812) [ČS/VU] – **Boh**.: Hluboká nad Vltavou (6952), 19.V.1987 – 1 ex. (V. Karas lgt., GR det. coll., JčM, J. Hejkal revid.) (GR). **Mor**.: Čejč (7067), 7.IV.2007 – 1 ex. (RE); Lanžhot, Košařské louky (7367), 14.III.2009 – 2 ex. v náplavu (RE); Břeclav-Kančí obora (7267), 1.V.2010 – 1 ex. na rozhraní lesa a pole (J. Ryšavý lgt., GR det. et coll.) (GR); Senorady, PP Kozánek (6863), 29.V.2010 – 2 ex. (Bobot lgt. et coll., RE det.) (RE); Senorady (6863), 25.V.2010 – 4 ex. na stepi (J. Ryšavý lgt., GR det., 1 ex. in coll. J. Ryšavý, 3 ex. in coll. GR) (GR); Dukovany (6963), 26.V.2010 – 1 ex. na stepi (J. Ryšavý lgt., GR det. et coll.) (GR).

Xerofilní druh s výskytem především v teplejších oblastech. V Čechách velmi lokální a vzácný.

Amara (***Amara***) ***makolskii*** Roubal, 1923 – **Boh**.: Dražice, PP Stará Jizera (5655), 8.V.2007 – 1 ex. v lese u řeky Jizery (MO); Trutnov, Poříčský hřbet (5461), 17.V.2009 – 1 ex. v březovo-osikovém porostu na skládce popílku (VO), 14.VI.2009 – 4 ex. tamtéž (MO); Nečichy, Černodoly (5648), 21.IV.2010 – 3 ex. pod listím na písku (KA).

Lokální druh lesních a lesostepních porostů s břízami. Častější na písčitých a pískovcových lokalitách.

Amara (***Amara***) ***nitida*** Sturm, 1825 – **Boh**.: Kroclov env. (7052), 12.V.2008 – 1 ex. v ZP v kaňonu Vltavy (M. Snížek lgt., GR det. et coll.) (GR). **Mor**.: Pouzdřany (7065), V.2012 – 1 ex. (SS lgt., O. Odvárka det., VE revid., coll. DS) (DS).

Zejména v podhůří a v horách rozšířený druh. V nižších polohách žije lokálně a vzácně v inverzních polohách v údolích vodních toků.

Amara (***Amara***) ***pulpani*** Kult, 1949 – **Boh**.: Písty (5855), 27.II.1999 – 1 ex. pod vřesem na okraji písečného přesypu (LT lgt. et coll., I. Mareček det., TL revid.) (LT); Mnichov, NPR Pluhův bor (5942), 7.V.2011 – 1 ex. (TL); Stod, Šibeniční vrch (6345), 12.IV.–24.V.2011 – 22 ex., 24.V.–17.VI.2011 – 4 ex. a 17.VI.–20.VII.2011 – 9 ex. v ZP na vřesovišti (TL); Doksy env. (5454), 25.IV. –15.VII.2013 – 1 ex. v ZP na západním okraji pískovcového zalesněného vršku v polích (VE). **Mor**.: Rohatec env., Soboňky (7169), 22.VII.2007 – 1 ex. (LT lgt. et coll., TL det.) (LT).

Lokální druh vyhledávající zejména světlé suťové lesy, lesostepi, vřesoviště a písčiny.

Amara (***Amara***) ***schimperi*** Wencker, 1866 [ČS/EN] – **Mor**.: Raškovice (6376), 20.VI.2011– 4 ex. na břehu Morávky (KM).

Reliktní stenotopní druh vázaný na zachovalé štěrkopískové břehy podhorských toků.

Amara (***Amara***) ***spreta*** Dejean, 1831 – **Boh**.: Předonín (5551–5552), 19.V.2007 – 2 ex. a 10.VII.2007 – 2 ex. v pískovně (MO); Nučničky (5451–5551), 13.IV.2009 – 3 ex. v pískovně, 13.IV.–15.V.2009 – 1 ex. v ZP v pískovně (MO); Travčice (5451–5551), 26.VII.2009 – 1 ex. a 30.IV.2011 – 1 ex. ve staré pískovně (MO); Poříčany env. (5855), 25.III.2011 – 2 ex. na písčitém okraji pole (LT).

Psamobiontní druh, žijící lokálně a většinou nehojně na lesních písčinách a v pískovnách. V současnosti pravděpodobně ubývající.

Amara (***Amarocelia***) ***erratica*** (Duftschmid, 1812) [ČS/VU] – **Boh**.: Krkonoše - vrch Hromovka pr. Špindlerův Mlýn (5259), 5.VIII.2007 – 1 ex. na sjezdovce, 1050 m n. m. (VO). **Mor**.: Jeseníky - Vysoká hole (5969), 14.VI.2009 – 1 ex., 1463 m n. m. (J. Schneider lgt. et coll., MO det.) (MO).

Horský druh obývající nezastíněná otevřená stanoviště až do alpínského pásma.

Amara (***Bradytus***) ***majuscula*** (Chaudoir, 1850) – **Boh**.: Plzeň (6246), 20.VIII.2012 – 1 ex. na světlo na balkóně obytného domu v centru města (TL).

Eurytopní druh poměrně skrytě žijící zejména na druhotných stanovištích s nezapojenou vegetací, zvláště na okrajích polí, úhorech, výsypkách a ruderálech. Většina nálezů pochází z odchytů na světlo.

Amara (***Celia***) ***brunnea*** (Gyllenhal, 1810) – **Boh**.: Vědomice-Zavadilka (5551), 22.VIII.2008 – 1 ex. v borovém lese (MO); Horní Řasnice (5057), 25.IX.2008 – 1 ex. v pískovně pod mechem (MO); Trutnov, Poříčský hřbet (5461), 17.V.2009 – 1 ex. v březovo-osikovém porostu na skládce popílku (VO) a 14.VI.2009 – 12 ex. tamtéž (MO et VO).

Druh s lokálním výskytem v lesních a hájových porostech s břízami. Častější na písčitých lokalitách.

Amara (***Celia***) ***praetermissa*** (C. R. Sahlberg, 1827) – **Boh**.: Nečichy, Černodoly (5648), 21.IV.2010 – 1 ex. a 27.V.2010 – 1 ex. pod listím na písku (KA).

V ČR velmi lokální druh, vyhledávající lesní světliny, písčiny, březové háje, vřesoviště, okraje lomů a podobně. Též nad hranicí lesa v horách. Potvrzení stálého výskytu na lokalitě (cf. Veselý 1994).

Amara (***Celia***) ***sabulosa*** (Audinet-Serville, 1821) – **Boh**.: Litoměřice env. (sever) (5450), 19.IX.2010 – 1 ex. na okraji pole (MI); Dubany pr. Libochovice, vrch Rohatec (5650), 25.IX.2011 – 1 ex. na okraji pole (VO); České středohoří – vrch Plešivec (5450), 29.VIII.2010 – 1 ex. ve starém sadu (VO). **Mor**.: Terezín pr. Čejč (7067), 25.V.2008 – 2 ex. na zrevitalizovaném slanisku Zápověď (A. Holub lgt. et coll., GR det.) (GR).

Poměrně vzácnější xerofilní druh teplejších oblastí.

Amara (***Curtonotus***) ***convexiuscula*** (Marsham, 1802) – **Boh**.: Plzeň (6246), 19.VII.2014 – 1 ex. na světlo na balkóně obytného domu v centru města (TL).

Eurytopní druh žijící zejména na druhotných stanovištích s nezapojenou vegetací, zvláště na okrajích polí, úhorech, výsypkách a ruderálech. Většina nálezů pochází z odchytů na světlo. V posledních letech se početnost nálezů snižuje.

Amara* (*Curtonotus*) *gebleri Dejean, 1831 – **Boh**.: Hartmanice (6846), VII.2007 – 2 ex. (VS lgt. et det., coll. DS, VE revid.) (DS); Obora (5649), 18.IV.2008 – 1 ex. pod vegetací na břehu Ohře (MO); Žabovřesky nad Ohří (5550), 15.IV.2009 – 1 ex. v lužním lese (MO); Brloh (7051), 10.VIII.2009 – 1 ex. (D. Čudan lgt. et coll., GR det.) (GR); Splzov (5357), 24.–30.V.2009 – 1 ex. (J. Gahaj lgt. et coll., GR det.) (GR); Kašperské hory env., Amálino údolí (6847), V.2011 – 1 ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS); Čepice env., vrch Čepičná (6747), VI.2013 – 1 ex. (SS lgt., VS det., coll. DS, VE revid.) (DS). **Mor**.: Vacenovice, PP Jezero (7069), 13.IV.2008 – 1 ex. (RE); Uherský Brod env. (6971), 1.V.2010 – 4 ex. v porostech kopřiv u potoka Korečnice (VE).

Lokální druh vlhčích a chladnějších stanovišť. Častější je v podhůří, ale podél řek proniká daleko do nížin.

Amara* (*Zezea*) *chaudoiri incognita Fassati, 1946 [ČS/VU] – **Mor**.: Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 24.IV.2007 – 7 ex. na úhoru pod jižní hrází Trkmanky (VE); Břeclav-Pohansko (7267), 5.V.2008 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., GR det.) (GR); Lanžhot-Lány (7267), 10.V.2008 – 3 ex. v močálu (VO), – 3 ex. (MO); Pánov pr. Hodonín (7168), 19.VI.–22.VII.2010 – 1 ex. v ZP na území vojenského cvičiště (O. Čížek & P. Marhoul lgt., VO det.) (VO); Lanžhot, PR Soutok (7367), 10.V.2008 – 2 ex. v pískovně u silnice (MO).

Charakteristický druh zaplavovaných luk v nivách větších řek, odkud se často šíří i do širšího okolí. Na Moravě dosud lokálně hojný, v Čechách pravděpodobně vyhynulý.

Amara* (*Zezea*) *tricuspidata Dejean, 1831 [ČS/NT] – **Mor**.: Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 12.–13.V.2008 – 1 ex. na slanisku (MO).

Druh s lokálním výskytem na okrajích polí a úhorech v přírodně zachovalejších lokalitách.

Zabrus* (*Pelor*) *spinipes spinipes (Fabricius, 1798) [ČS/VU] – **Mor**.: Miroslav, Miroslavské kopce (7063), 29.IV.2007 – 3 ex. v noci na okraji pole a 8.V.2008 – 1 ex. v noci na cestě (KU); Břeclav (7267), VII.2008 – 1 ex. (SS lgt., VS det., DS coll.) (DS).

Reliktní brachypterní stepní druh vinařských oblastí.

Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) [ČS/NT] – **Boh**.: České středohoří - vrch Oblík (5548), 11.IV.2008 – 1 ex. a 7.IV.2009 – 1 ex. pod kameny na vinici (KA); Dubany pr. Libochovice, vrch Rohatec (5650), 13.V.2010 – 4 ex. na stepi (VO); Český Brod, Štolmíř (5955), 16.VII.2010 – 1 ex. na světlo (LT). **Mor**.: Šumice (6972), 15.VII.2007 – 4 ex., 17.VII.2007 – 1 ex., 22.VII.2009 – 1 ex., 13.VII.2010 – 2 ex. na světlo (RE); Uherský Brod (6971), 16.VII.2007 – 1 ex., 20.VII.2007 – 2 ex., 8.VIII.2007 – 6 ex. a 17.VII.2009 – 1 ex. na světlo u mokřadu (RE); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 17.VII.2007 – 5 ex. na světlo na hrázi říčky Trkmanky (VE), 26.VII.2008 – 1 ex. na světlo na hrázi Trkmanky (VE lgt. et det., J. Blízek coll.) (VE); Pouzdřany (7065), 21.VII.2007 – 1 ex. na světlo (T. Sitek lgt. et col., ST det.) (ST); Přímětice (7162), 18.IV.2010 – 1 ex. pod suchou travou v opuštěném kaolínovém lomu (D. Čudan lgt., det. et coll.) (GR).

Druh žijící v puklinách jílovitých půd se sporou vegetací. Lokálně zejména na jílovcových, slínovcových a opukových svazích (bílé stráně) a na pastvinách v okolí řek s přirozeným vodním režimem. Na Moravě nalézán častěji teprve v posledních letech.

ERRATA

VESELÝ P., RESL K., STANOVSKÝ J., FARKAČ J., GRYCZ F., KAŠPAR L., KMECO R., KOPECKÝ T., KŘIVAN V., LÁSKA R., MIKYŠKA A., MLEJNEK R., MORAVEC P., NAKLÁDAL O., PROUZA J., ŘÍHA J., VONIČKA P. & ZÚBER M. 2009: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2002–2006 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from the Czech Republic in the years 2002–2006 with supplementary earlier data). *Klapalekiana* **45**: 83–116 (in Czech, English summary).

– str. 86, řádky 42–43: „vřesoviších“ opravit na „**vřesovištích**“
– str. 88, řádek 35: „1 ex. (MO)“ doplnit na „**1 ex**. v ZP (**MO**)“
– str. 90, řádek 2: „při západnim okraji pískovny“ doplnit a opravit na „**při západním okraji pískovny** (**VE**)“
– str. 90, řádky 17, 22, 31, 36: „*Chiridisus*“ opravit na „***Dyschiriodes***“
– str. 90, řádek 32: „F.GR“ opravit na „**GR**“
– str. 90, řádek 37: „(Čudan lgt., GR det. et coll.)“ doplnit na „(Čudan lgt.**, GR det**. **et coll**.)(**GR**)“
– str. 96, řádek 31: „1 ex. (MO)“ doplnit na „**1 ex**. v ZP (**MO**)“
– str. 96, řádek 40: „1 ex. (MO)“ doplnit na „**1 ex**. v ZP (**MO**)“
– str. 98, řádky 22–23: „(J. Strejček lgt. et det., coll. VE).“ doplnit na „(**J**. **Strejček lgt**. **et det**., **coll**. **VE**) (**VE**).“
– str. 98, řádek 34: „Novohradské Hory“ opravit na „**Novohradské hory**“
– str. 100, řádek 7: „Bílé Karpaty - Javořina“ opravit na „**Bílé Karpaty - Velká Javořina**“
– str. 101, řádek 20: „v jírovcovém háji“ opravit na „**v kaštanovníkovém háji**“
– str. 101, 102, 115: „Mušov“ opravit na „**Mikulov – Mušlov**“ (3x)
– str. 104, řádek 2: „Bílé Karpaty - Javořina“ opravit na „**Bílé Karpaty - Velká Javořina**“
– str. 105, řádek 36: „(Holub lgt. et coll., KR lgt.)“ opravit na „(**Holub lgt**. **et coll**., **KR det**.)“
– str. 107, řádek 20: „1 na okraji“ opravit na „**1 ex**. **na okraji**“
– str. 107, řádek 38: „*Panageus*“ opravit na „***Panagaeus***“ (2x)
– str. 108, řádek 38: „(Stejskal lgt.) doplnit na „(**Stejskal lgt**., **KR det**. **et coll**.)“
– str. 113, řádky 22–23: „Karpaty - Javořina“ opravit na „**Bílé Karpaty - Velká Javořina**“
– str. 113, řádek 38: „Mor. Dubňany“ opravit na „**Mor**.: **Dubňany**“
– str. 114, řádky 1–2: „29.VII.3.VIII.2001“ opravit na „**29**.**VII**.**–3**.**VIII**.**2001**“
– str. 114, řádek 2: „1 ex. (MO)“ doplnit na „**1 ex**. v ZP (**MO**)“

LITERATURA

BAŠTA J., KALÁB J. & MORAVEC P. 2002: Distribution and ecology of Epaphius rivularis (Coleoptera: Carabidae) in the Czech Republic. *Klapalekiana* **38**: 163–171.

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1988). *Zpravodaj Západočeské Pobočky Československé Společnosti Entomologické v Plzni* **6–7** (1988–1989): 13–31 (in Czech, German title).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk za rok 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1989 und der Nachtrag zu den Funden im Jahre 1988). *Zpravodaj Západočeské Pobočky Československé Společnosti Entomologické v Plzni* **8**: 19–40 (in Czech, German summary).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1990 and supplement of prior period collections). *Zpravodaj Západočeské Pobočky Československé Společnosti Entomologické v Plzni, Series Carabidologica* **1**: 9–39 (in Czech, English abstract).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1991 and supplementary data of prior period collections). *Zpravodaj Západočeské Pobočky Československé Společnosti Entomologické v Plzni*, *Series Carabidologica* **2**: 15–30 (in Czech, English summary).

FEDORENKO D. N. 1996: *Reclassification of world Dyschiriini, with a revision of the Palearctic fauna* (*Coleoptera, Carabidae*). Pensoft, Sofia, Moscow & St. Petersburg, 224 pp.

FLEISCHER A. 1930: *Přehled brouků fauny Československé republiky*. [*Overview of the beetle fauna of the Czechoslovak Republic*]. Moravské museum zemské, Brno, 485 pp. (in Czech).
HAVELKA J. 1987: Brouci - Coleoptera. Katalog středního Polabí. [Beetles - Coleoptera. A catalogue of the middle Polabí region]. *Vlastivědný Zpravodaj Polabí* (Poděbrady) **26** (1986): 103–112 (in Czech).
HONCŮ M. & PULPÁN J. 1974: Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) Českolipska. (Die Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) im Gebiet Česká Lípa). *Sborník Severočeského Musea, Serie Naturaea,* (Liberec) **6**: 93–149 (in Czech, German summary).
HRADSKÁ I. & TĚŤÁL I. 2017: Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť v západních Čechách. (Spiders and Carabid beetles of particular heathlands in West Bohemia (Czech Republic)). *Erica* (Plzeň) **24**: 3–34 (in Czech, English summary).
HŮRKA K. 1979: Faunistic records from Czechoslovakia. *Acta Entomologica Bohemoslovaca* **66**: 345.
KALÁB J. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 167. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **39**: 135.
KLIMENT J. 1899: Čeští brouci. Dílo o broucích Čech, *Moravy a Slezska.* [*Czech beetles. Beetles of Bohemia, Moravia and Silesia*]. J. Kliment, Německý Brod, xvi + 811 pp. (in Czech).
KRAL H. 1915: Die Käfer aus dem Gebiete des Kummergebirges. *Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenbach* **42**: 49–100.
KŘIVAN V. 2018: Faunistic records from the Czech Republic – 450. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **54**: 278.
KŘIVAN V., MORAVEC P., VESELÝ P., VONIČKA P., GRYCZ F. & PROUZA J. 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 289. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **45**: 283–285.
LOKAJ E. 1870: Seznam brouků českých. [Check-list of Czech beetles]. *Archiv pro Přírodnické Proskoumání Čech Vydávané od obou Komitétů pro Výskum Zemský* **1**: 7–77 (in Czech).
LÖBL I. & LÖBL D. 2017 (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden & Boston, 1443 pp.
MARGGI W. 2017: New Nomenclatural and Taxonomic Acts, and Comments. Carabidae: Harpalinae: Pterostichini. P. 19. In: LÖBL I. & LÖBL D. (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden & Boston, 1443 pp.
MORAVEC P. & VONIČKA P. 2003: Příspěvek k fauně střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) nivy Šporky na Českolipsku. (Contribution to the fauna of carabids (Coleoptera: Carabidae) of Šporka floodplain in the Česká Lípa region). *Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy* (Liberec) **23**: 117–126 (in Czech, English summary).
PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana* **32 (Supplementum)**: 1–115 (in Czech, English abstract).
PULPÁN J. 1993: *Prodromus střevlíkovitých brouků Československa*. [*Prodromus of the ground-beetles of Czechoslovakia*]. Unpublished manuscript, 3018 + 155 pp. Deposited in: archive of P. Veselý, Praha (in Czech).
RÉBL K. 2010: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). (Results of faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the territory of Protected Landscape Area and Biospheric Reservation Křivoklátsko (Czech Republic)). *Elateridarium* **4 (Supplementum)**: 1–253.
RESL K. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera, Carabidae. *Acta Entomologica Bohemoslovaca* **89**: 390–391.
RESL K. 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 104. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **36**: 175.
ROUBAL J. 1934: Die Coleopterenwelt (Tyrphobionte, Tyrphopile, Tyrphoxene etc.) der Treboner (Wittingauer) Moore. (Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopterenfauna Südböhmens.). *Folia Zoologica et Hygrobiologica* **7**: 56–97.
SKOUPÝ V. 2004: *Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána. Ground beetles (Coleoptera. Carabidae) of the Czech and Slovak republics of Jan Pulpán´s collection.* Jan Farkač, Vladimír Skoupý & Public History, Praha, 213 pp. + CD (in Czech and English).
STANOVSKÝ J. & PULPÁN J. 2006: *Střevlíkovití brouci Slezska (Coleoptera, Carabidae) (severovýchodní Moravy).* (*Die Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) der Schlesien (nordöstlich Mähren)*). Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, 159 pp. (in Czech and German, English abstract).
ŠPRYŇAR P. & PUMR J. M. 2018: Nové nálezy střevlíčka Drypta dentata (Coleoptera: Carabidae) ve středních Čechách. (New findings of the Ground Beetle Drypta dentata (Coleoptera: Carabidae) in Central Bohemia). *Muzeum a Současnost, Řada Přírodovědná* (Roztoky) **29**: 167–170 (in Czech, English abstract).
TĚŤÁL I. 2010: Faunistické zprávy ze západních Čech – 3. (Faunistic records from western Bohemia – 3). *Západočeské Entomologické Listy* **1**: 62–63 (in Czech, English title).

TROPEK R., PLÁTEK M., ČÍŽEK O. & ČERNÁ I. 2014: Výskyt střevlíka Pogonus luridipennis (Germar, 1823) (Coleoptera: Carabidae) v Čechách po 143 letech. (Occurence of Pogonus luridipennis (Germar, 1823) (Coleoptera: Carabidae) in Bohemia after 143 years). *Elateridarium* **8**: 118–119 (in Czech, English abstract).
VESELÝ P. 1994: Střevlíkovití brouci na lokalitě Černodoly u Loun. (Carabid beetles on the locality Černodoly near Louny) (Coleoptera, Carabidae). *Zpravodaj Západočeské Pobočky Československé Společnosti Entomologické v Plzni, Carabidol*. **2** (1992): 5–14 (in Czech, English summary).
VESELÝ P. 2002: *Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae)*. (*Die Laufkäfer Prags (Coleoptera: Carabidae)*). Jakub Rolčík – Clairon Production, Praha, 167 pp. + CD (in Czech and German, English abstract).
VESELÝ P., MORAVEC P. & STANOVSKÝ J. 2017: Carabidae (střevlíkovití). Pp. 295–301. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates. *Příroda* (Praha) **36**: 1–612 (in Czech and English).
VESELÝ P., RESL K. & TĚŤÁL I. 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 1997–2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 1997–2001 with supplementary pre- 1997 data). *Klapalekiana* **38**: 85–109 (in Czech, English summary).
VESELÝ P., RESL K., STANOVSKÝ J., FARKAČ J., GRYCZ F., KAŠPAR L., KMECO R., KOPECKÝ T., KŘIVAN V., LÁSKA R., MIKYŠKA A., MLEJNEK R., MORAVEC P., NAKLÁDAL O., PROUZA J., ŘÍHA J., VONIČKA P. & ZÚBER M. 2009: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2002–2006 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from the Czech Republic in the years 2002–2006 with supplementary earlier data). *Klapalekiana* **45**: 83–116 (in Czech, English summary).
VESELÝ P., ŠLACHTA M., BLÍZEK J. & HEJKAL J. 2012: Pozoruhodný výskyt střevlíka Ophonus (Ophonus) ardosiacus (Lutshnik, 1922) v západních Čechách. (Noteworthy occurence of ground beetle Ophonus (Ophonus) ardosiacus (Lutshnik, 1922) in Western Bohemia). *Erica* (Plzeň) **19**: 129–137 (in Czech, English summary).
VESELÝ P. & TĚŤÁL I. 1998: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska v letech 1992–96 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from Bohemia, Moravia and Slovakia in the years 1992–96 with supplementary data on earlier records). *Klapalekiana* **34**: 99–131 (in Czech, English summary).
VONIČKA P., BRÁDKA J., GRYCZ F., LINHART M., MAJER J., MORAVEC P., RESL K. & VESELÝ P. 2017: Faunistic records from the Czech Republic – 433. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **53**: 383–387.
VONIČKA P., VESELÝ P. & LINHART M. 2014: Faunistic records from the Czech Republic – 375. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **50**: 262.
VOŘÍŠEK O. 1957: Drobní střevlíčci na Kladensku. *Zprávy Okresního Vlastivědného Musea Kladno* **3**: 18–23 (in Czech).
WRASE D. W. 1992: Taxonomische und faunistische Bemerkungen über einige Carabiden-Arten (Col., Carabidae). *Linzer Biologische Beiträge* **24**: 123–138.

VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/7698185C778DA46FC125654B0044DDBC/%24file/V%20395_1992.pdf

SUMMARY

We present new faunistic records of 212 rare or little known species of the family Carabidae from the Czech Republic, obtained from 15 private collections. Notes on the biology and habitats of most of the species are included. The following records are of particular interest: *Lebia* (*Lebia*) *humeralis* Dejean, 1825 (confirmed occurrence in the Czech Republic and Moravia after 61 years), *Harpalus* (*Harpalus*) *servus* (Duftschmid, 1812) and *Limodromus longiventris* Mannerheim, 1825 (confirmation of recent presence in Bohemia). Other significant findings for Bohemia include: *Elaphrus* (*Elaphroterus*) *ullrichii* W. Redtenbacher, 1842 and *Sphodrus leucophthalmus* (Linnaeus, 1758) (most recent known occurrence). Significant records for Moravia are: *Acupalpus* (*Acupalpus*) *suturalis* (Dejean, 1829); *Asaphidion austriacum* Schweiger, 1975; *Ophonus* (*Metophonus*) *parallelus* (Dejean, 1829) and *Pogonus*

(*Pogonus*) *luridipennis* (Germar, 1822). *Harpalus* (*Cryptophonus*) *tenebrosus tenebrosus* Dejean, 1829 and *Trechus* (*Trechus*) *pulchellus pulchellus* Putzeys, 1845 are recorded as new for Western Bohemia.

The number in parentheses after the locality name represents the grid mapping square code used for faunistic research in the Czech Republic (Pruner & Míka 1996). The following abbreviations are used: Boh. = Bohemia; EVL = European Significant Locality; JčM = Jihočeské Museum in České Budějovice; ZF JčU = Agricultural Faculty of University of South Bohemia in České Budějovice; Mor. = Moravia; NP = National Park; NMP = National Museum, Prague; NPR = National Nature Reserve; observ. = observed; NPP = National Natural Monument; PřF OU = Faculty of Science of University of Ostrava; PLM = Západočeské Museum in Plzeň; PP = Natural Monument; PR = Nature Reserve; revid. = revised; SJMK = Cave Management of the Moravian Karst, Blansko; UV = ultraviolet light; ÚČOV = Central Wastewater Treatment Plant (Prague); ZP = pitfall trap(s); [§KO] = Critically Endangered according to public notice MŽP ČR No. 395/1992 Sb.; [§O] = Endangered according to public notice MŽP ČR No. 395/1992 Sb.; [ČS/CR] = Critically Endangered, [ČS/EN] = Endangered, [ČS/RE] = Regionally Extinct, [ČS/NT] = Near Threatened, [ČS/VU] = Vulnerable (all based on the section for the family Carabidae in the Red list of threatened species of Czech Republic, see Veselý et al. (2017)).