Published December 29, 2023

Klapalekiana, **59**: 257–304, 2023
ISSN 1210-6100

Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2015–2021 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období

Interesting finds of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from the Czech Republic in the years 2015–2021, supplemented with earlier data

Petr VESELÝ[1)], Jiří STANOVSKÝ[2)], Květoslav RESL[3)], Jiří HEJKAL[4)], Jiří CHVALKOVSKÝ[5)], Josef KAŠÁK[6)], Michal KAVKA[7)], Václav KLAPKA[8)], Ondřej KONVIČKA[9)], Radomír LÁSKA[10)], Martin LINHART[11)], Adolf MIKYŠKA[12)], Pavel MORAVEC[13)], Oto NAKLÁDAL[14)], Vojtěch RÝZNAR[15)], David SOMMER[16,17)], Jiří Ch. VÁVRA[18)], Pavel VONIČKA[19)] & Miroslav ZÚBER[20)]

[1)] Tálínská 1030, 198 00 Praha-Kyje; e-mail: vesely.ptr@tiscali.cz
[2)] Na výspě 18, 704 00 Ostrava-Výškovice; e-mail: stanovsky.j@seznam.cz
[3)] 687 31 Šumice 299; e-mail: kvetoslav.resl@tiscali.cz
[4)] Wolkerova 711, 358 01 Kraslice; e-mail: amara@volny.cz
[5)] 470 02 Bořetín 22; e-mail: jchvalkovsky@fehrer.cz
[6)] Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno; e-mail: abovic@seznam.cz
[7)] Pobřežní 53, 284 01 Kutná Hora; e-mail: numenius@seznam.cz
[8)] Máchova 1191, 470 01 Česká Lípa, klapka@cizi-jazyky.cz
[9)] Kúty 1959, 760 01 Zlín, e-mail: brouk.vsetin@centrum.cz
[10)] Partyzánů 1938, 688 01 Uherský Brod; e-mail: radomir.laska@tiscali.cz
[11)] Oleksovice 180, 671 62 Oleksovice; e-mail: duvalius@volny.cz
[12)] Jiráskova 275, 290 01 Poděbrady; e-mail: adolfmikyska@email.cz
[13)] Jezuitská 6, 412 01 Litoměřice; e-mail: pavel.moravec@nature.cz
[14)] Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ochrany lesa a entomologie, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol; e-mail: nakladal@fld.czu.cz
[15)] Břustkova 29, 700 30 Ostrava-Výškovice; e-mail: vojta.ryznar@centrum.cz
[16)] Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Viničná 7, 128 43 Praha 2; e-mail: dejv.sommer@gmail.com
[17)] Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol
[18)] Ostravské muzeum, Lechowiczova 4, 702 00 Ostrava 1; e-mail: jiri.vavra@ostrmuz.cz
[19)] Severočeské muzeum, Masarykova 11, 460 01 Liberec; e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz
[20)] Bradlec, Bezdězská 45, 293 06 Kosmonosy; e-mail: miroslav.zuber@seznam.cz

Faunistics, Coleoptera, Carabidae, Central Europe, Bohemia, Moravia, Czech Republic

Abstract. We present new faunistic records of 219 rare or little known species of the family Carabidae from the Czech Republic, obtained from 19 collections. Notes on the biology and habitats of most of species are included. The following records are particularly interesting: *Dyschiriodes* (*Dyschiriodes*) *salinus striatopunctatus* (Putzeys, 1846); *Dyschiriodes* (*Chiridysus*) *strumosus* (Erichson, 1837) and *Microlestes plagiatus* (Duftschmid, 1812) (confirmation of recent presence in Moravia and the Czech Republic), *Amara* (*Zezea*) *tricuspidata* Dejean, 1831; *Bem-*

bidion (*Semicampa*) *schueppelii* Dejean, 1831, *Ophonus* (*Metophonus*) *subsinuatus* Rey, 1886, *Pogonus* (*Pogonus*) *luridipennis* (Germar, 1822) and *Syntomus obscuroguttatus* (Duftschmid, 1812) (confirmation of recent presence in Bohemia), *Agonum* (*Olisares*) *hypocrita* (Apfelbeck, 1904) (confirmation of recent presence in Bohemia and the Czech Republic). Other significant finds for Bohemia include: *Acupalpus* (*Acupalpus*) *brunnipes* (Sturm, 1825) (light trap), *Calosoma* (*Calosoma*) *sycophanta* (Linnaeus, 1758), *Miscodera arctica* (Paykull, 1798), *Parophonus* (*Ophonomimus*) *hirsutulus* (Dejean, 1829) and *Stenolophus* (*Stenolophus*) *discophorus* (Fischer von Waldheim, 1823). Among significant finds for Moravia are: *Leistus* (*Pogonophorus*) *montanus kultianus* Farkač et Fassati, 1999 (new species for Moravia), *Dromius* (*Dromius*) *laeviceps* Motschulsky, 1850, *Dromius* (*Dromius*) *quadraticollis* A. Morawitz, 1862, *Lebia* (*Lebia*) *humeralis* Dejean, 1825 and *Patrobus septentrionis australis* J. R. Sahlberg, 1875.

ÚVOD

V příspěvku uvádíme přehled faunistických údajů o nových zajímavých nálezech 219 druhů střevlíkovitých brouků z území České republiky z let 2015–2021 a doplňky z let dřívějších, jak je připravili k publikaci autoři z řad Carabidologické sekce České společnosti entomologické a spolupracující sběratelé. Navazujeme na dříve publikované přehledy zajímavých nálezů střevlíkovitých brouků (Benedikt & Těťál 1989, 1990, 1991, 1994, Veselý & Těťál 1998, Veselý et al. 2002, 2009, 2020). Součástí jsou i opravy k dosud poslednímu přehledu zajímavých nálezů (Veselý et al. 2020).

MATERIÁL A METODIKA

Nomenklatura je použita podle druhé edice Katalogu palearktických brouků (Löbl & Löbl 2017) s těmito výjimkami: pojetí rodů *Dyschirius* Bonelli, 1810 a *Dyschiriodes* Jeannel, 1941 je podle Fedorenko (1996); taxon *Poecilus sericeus* Fischer von Waldheim, 1824 považujeme za validní druh, nikoliv za synonymum k *P. koyi koyi* Germar, 1823 (cf. Marggi 2017). Řazení taxonů v Přehledu nálezů je abecední.

Pokud není uvedeno jinak, rozumí se, že jednotliví autoři sbírali, případně pozorovali a determinovali uváděné exempláře sami a dokladový materiál je uložen v jejich sbírce. Údaje o nálezech každého druhu jsou řazeny nejprve podle zemí (Boh., Mor.), dále potom podle data nálezu. Lokalitám jsou přiřazena čísla mapových polí podle Pruner & Míka (1996). Bionomické, faunistické i další poznámky v komentářích k jednotlivým druhům vycházejí z poznatků autorů z území České republiky.

Použité zkratky

zkratky jmen autorů a přispěvatelů:

a) DS – David SOMMER, EE – Eduard EZER (Zlín), FK – František KOPEČEK (Uherský Brod), FO – Jiří FOIT (Brno), HE – Jiří HEJKAL, CH – Jiří CHVALKOVSKÝ, JK – Josef KAŠÁK, KL – Václav KLAPKA, KO – Ondřej KONVIČKA, LA – Radomír LÁSKA, LB – Ludvík BOBOT (Otrokovice), LM – Ladislav MARŠÍK (Uherský Brod), LT – Martin LINHART, MA – Pavel MARHOUL (Praha), MI – Adolf MIKYŠKA, MK – Michal KAVKA, MM – Miroslav MIKÁT (Hradec Králové), MO – Pavel MORAVEC, NA – Oto NAKLÁDAL, RE – Květoslav RESL, RZ – Vojtěch RÝZNAR, SD – Ondřej SEDLÁČEK (Praha), ST – Jiří STANOVSKÝ, VA – Jiří Ch. VÁVRA, VE – Petr VESELÝ, VK – Vojtěch KOHOUT (Vizovice), VO – Pavel VONIČKA, ZU – Miroslav ZÚBER.

b) ostatní zkratky: Boh. = Bohemia; J = jižně; JV = jihovýchodně; JZ = jihozápadně; MBF = Muzeum Beskyd Frýdek-Místek; Mor. = Moravia; NPR = národní přírodní rezervace; observ. = pozoroval; NPP = národní přírodní památka; OU = Ostravská univerzita; PP = přírodní památka; PR = přírodní rezervace; revid. = revidoval; SV = severovýchodní; UV = ultrafialový světelný zdroj; ÚČOV = Ústřední čistírna odpadních vod (Praha); V = východně; ZP = zemní past(i); [§KO] = druh kriticky ohrožený dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.; [§O] = druh ohrožený dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.; [ČS/CR] = druh kriticky ohrožený, [ČS/EN] = druh ohrožený, [ČS/RE] = druh vyhynulý, [ČS/NT] = druh téměř ohrožený, [ČS/VU] = druh zranitelný (vše dle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí, viz Veselý et al. (2017)).

Materiál z PP, NPP a NPR byl získán zejména v rámci projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“ realizovaný AOPK ČR.

PŘEHLED NÁLEZŮ

Abax* (*Abax*) *carinatus carinatus (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Třeboň, Branná (7054), 4.VII.2015 – 1 ♂ + 1 ♀ v lese pod dřevem (LT); Ejpovice (6247), 2.IX.2019 – 1 ♂ v kamenitém březovém hájku v pískovně (LT). **Mor.:** Chřiby, Koryčany (6869), 20.V.2017 – 1 ♂ + 1 ♀ ve smíšeném lese pod kameny v okolí hradu Cimburk (LT); Slezské Pavlovice, PR Velký Pavlovický rybník (5672), 16.VI.2019 – 1 ex. v ZP na okraji lužního porostu (ST); PR Březinka (6766), 30.IV.–27.V.2020 – 1 ex. v ZP v bučině (FO lgt., KA det. et coll.) (KA).

Lokální druh přírodě blízkých listnatých lesů. Nález ze Slezských Pavlovic je prvním nálezem pro Osoblažsko.

Acupalpus* (*Acupalpus*) *brunnipes (Sturm, 1825) [ČS/VU] – **Boh.:** Dobroměřický rybník pr. Nečichy (5548), 1.VIII.2008 – 1 ♀ do světelného lapače na stepi nad rybníkem (MO lgt., coll. et det., VE revid.). **Mor.:** Hlučín-Bobrovníky (6175), 12.VI.2020 – 1 ex. na světlo (M. Mantič lgt., coll. et det., ST revid.) (ST).

Velmi lokální stenotopní druh. Žije téměř výhradně na spoře porostlých písčitých březích tůní v pískovnách. Jde o první nález v oblasti Českého středohoří a o první konkrétní nález na SV Moravě (Stanovský et Pulpán (2006) uvádějí jen souhrnné historické údaje „Slezsko“). Přílet na světlo, ale ani let ve dne, nebyl dosud u tohoto druhu nikdy pozorován.

Acupalpus* (*Acupalpus*) *dubius (Schilsky, 1888) [ČS/VU] – **Boh.:** Horní Ředice, PR Žernov (5961), 27.X.2016 – 1 ex. v prosevu u rybníka Mordýř (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Praha-Šeberov, PP Hrnčířské louky (5953), 17.IX.2018 – 7 ex., z toho 2 ex. immaturní a 6.X.2018 – 1 ex. pod detritem a vegetací v mělké vlhké strouze V od rybníka Brůdek (VE); Mariánské Radčice (5448), 28.III.2020 – 71 ex. v prosevu sítin (*Juncus* sp.) (VO), 25.IV.2020 – 4 ex. (MO), 29.V.2020 – 22 ex. (MO et VO), 4.VII.2020 – 5 ex. (MO et VO); Vršany (důl) (5447), 12.VI.2020 – více ex. v mokřině při severním okraji velkolomu (MO); Hradec Králové (5861), 15.VI.2021 – 4 ex. na světlo (RZ); Uhelná (5155), 18.VI.2020 – 1 ex. v pískovně (KL). **Mor.:** Ostrava-Koblov (6175), 27.IV.2018 – 7 ex. a 1.I.2019 – 4 ex. v prosevu detritu na okraji mokřadu (L. Koloničný lgt. et coll., VE det.) (ST).

Hygrofilní druh vyhledávající břehy mokřadů s porosty sítin (*Juncus* sp.). V současné době se v Čechách plošně šíří a objevuje se i na drobných zamokřených místech. Přílet ke světlu je pozorován vzácně (cf. Veselý et al. 2020). Na Moravě je zatím velmi vzácný. Ostravské nálezy jsou první pro SV Moravu, Stanovský et Pulpán (2006) jej neuvádějí.

Acupalpus* (*Acupalpus*) *elegans (Dejean, 1829) [ČS/EN] – **Mor.:** Rakvice (7166), 4.VII.2011 – 1 ex. na polní mokřině 2,5 km JZ (MO); Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 7.VIII.2015 – 1 ♂ + 1 ♀ na světlo na slanisku (LT).

Halobiont, na moravských slaniskách je nalézán pravidelně, ale jednotlivě.

Acupalpus* (*Acupalpus*) *luteatus (Duftschmid, 1812) [ČS/NT] – **Boh.:** Nový Vojířov, Peršlák (6956), 3.VII.2015 – 1 ex. na světlo u Novomlýnského rybníka, 480 m n. m. (LT). **Mor.:** Rakvice (7166), 4.VII.2011 – 1 ex. na polní mokřině 2,5 km JZ (MO); Rohatec, Soboňky (7069), 28.I.2018 – 1 ex. a 10.III.2018 – 1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.) (RE); Šumná (7061), 27.VI.–3.VII.2020 – 2 ex. (J. Kadlec lgt. et coll., VO det.) (VO).

Hygrofil, vázaný na vegetací porostlé břehy stojatých vod. Druhotně na vypuštěných rybnících i na periodických lučních a polních mokřinách. V Čechách je celkem vzácný.

Acupalpus (***Acupalpus***) ***maculatus*** (Schaum, 1860) [ČS/NT] – **Boh.:** Nový Vojířov, Peršlák (6956), 3.VII.2015 – 1 ex. na světlo u Novomlýnského rybníka, 480 m n. m. (LT); Praha-Dubeč, PP Lítožnice (5953), 22.VII.2017 – 2 ex. na světlo na dně vypuštěného rybníka, 1.VIII.2020 – 1 ex. na světlo na břehu rybníka (VE); Praha – Císařský ostrov (5852), 10.VI.2019 – 2 ex. a 18.VI.2021 – 1 ex. do světelného UV lapače v areálu ÚČOV (VE); Lysá nad Labem (5755), 11.VI.2020 – 1 ex. v mokřadu Žabák (LT); Zbyslav (6058), 15.VII.2021 – 3 ex. v mokřadu (MK lgt. et coll., VE det.). **Mor.:** Mohelnice-Křemačov (6267), 16.VI.2015 – 2 ex. na zaplavované louce v nivě Mírovky (MO); Hlučín-Bobrovníky (6175), 14.VI.2019 – 1 ex. na světlo (M. Mantič lgt., coll. et det., ST rev. det.) (ST).

Hygrofilní a halofilní druh. V Čechách v posledních letech nalézaný častěji, a to i na nezasolených místech. Často zjištěn při příletu na světlo. Na jižní Moravě lokálně hojný, ze SV Moravy jde teprve o druhý známý nález (cf. Stanovský et Pulpán, 2006).

Acupalpus (***Ancylostria***) ***interstitialis*** Reitter, 1884 – **Boh.:** Klapý, vrch Hazmburk (5550), 3.V.2017 – 1 ex. pod vegetací v sadu (MO). **Mor.:** Dobré Pole (7165), 18.IV.2018 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Břeclav-Pohansko (7257), 19.IV.2018 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Uherčice (7065), 25.VI.2020 – 4 ex. pod suchou vegetací na rozhraní pole a lesa Ke Kolbám (LT).

Velmi lokální xerofilní druh, rozšířený především ve vinařských oblastech, v poslední době sbírán méně.

Agonum (***Agonum***) ***gracilipes*** (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Hradec Králové, Březhrad (5860), 21.VII.2018 – 1 ex. na světlo (MM lgt. et coll., RE det.) (RE); Nová Lhota (6057), 25.VI.2019 – 1 ex. na světlo (MK); Hradec Králové, Rozárka (5861), 20.VI.2021 – 1 ex. a 18.VII.2021 – 2 ex. (MM lgt. et coll., RE det.) (RE). **Mor.:** Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 27.VII.2018 – 1 ex. na UV světlo (VA lgt. et coll., LT det.) (VA); Slup, PP Ječmeniště (7262), 1.VIII.2018 – 5 ex. na světlo (LM lgt., RE det. et coll.) (RE); Hodonín – Černé bláto (7168), 6.VII.2019 – 1 ex. na UV světlo (VA lgt. et coll., LT det.) (VA); Bohumín-Záblatí (6176), 13.VII.2019 – 1 ex. v ZP na okraji lužního lesa (ST); Rakvice env., PP Trkmanec-Rybníčky (7167), 20.VII.2019 – 2 ex. na UV světlo (VA lgt. et coll., LT det.) (VA); Čejč, PP Bílý Kopec (7067), 14.VII.2021 – 1 ex. na světlo (LB lgt. et coll., RE det.) (RE); Bzenec-Přívoz (7069), 16.VII.2021 – 1 ex. na světlo (VK lgt. et coll., RE det.) (RE).

Lokální druh nejasné bionomie, častěji je sbírán jen na světlo. Odchyt do zemních pastí a náhodné nálezy na rozmanitých suchých i vlhkých stanovištích jsou spíše výjimečné.

Agonum (***Olisares***) ***angustatum*** Dejean, 1828 (= *A. gisellae* Csiki, 1931) – **Mor.:** Mohelnice-Křemačov (6267), 22.IV.2015 – 1 ♂ na zaplavované louce v nivě Mírovky (MO); Valtice (7266), 5.VI.2015 – 1 ♂ u rybníka před NPP Rendezvous (LT); Hustopeče nad Bečvou (6473), 11.V.2016 – 1 ex. na štěrkové lavici řeky Bečvy u přítoku Mřenky, (JK lgt. et coll., VE det.) (JK); Vyšní Lhoty (6376), 28.IV.2017 – 3 ex. u řeky Morávky (M. Kuboň lgt. et coll., VE det.) (ST); Paskov (6275), 30.VII.2017 – 1 ex. (J. Tomčík lgt. et coll., VE det.) (ST); Ostrava-Koblov, 27.IV.2018 – 1 ex. (L. Koloničný lgt. et coll., VE det.) (ST); Pozděchov (6773), 27.V.2018 –

1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.) (RE); Karviná-Ráj (6177), 27.V.2020 – 1 ex. na břehu Olše (P. Boža lgt. et coll., ST det.) (ST); Hovězí, U splavu (6674), 2.VIII.2020 – 1 ex. (KO lgt. et coll., RE det.) (RE); Polanka nad Odrou (6275), 22.IX.2020 – 3 ex., 10.III.2021 – 1 ex. a 2. VI.2021 – 1 ex. (J. Tomčík lgt. et coll. VE det.) (ST).

Hygrofilní druh rozmanitých typů nezastíněných mokřadů. Z J a JV Moravy se v poslední době šíří na sever i na západ. Pro SV Moravu (Slezsko) jde o první nálezy, Stanovský et Pulpán (2006) jej neuvádějí. Fakt, že v minulosti nebyl přehlížen a určován jako *A. moestum*, lze doložit absencí dokladového materiálu z našeho území ve starších, nově revidovaných sbírkách, např. ve sbírce J. Pulpána (cf. Skoupý 2004).

Agonum (***Olisares***) ***ericeti*** (Panzer, 1809) [ČS/NT] – **Boh.:** Suchdol nad Lužnicí env., Bor (7154), 5.V.1990 – 1 ex. (VA).

Tyrfobiont s velmi lokálním výskytem. Potvrzení výskytu v oblasti.

Agonum (***Olisares***) ***hypocrita*** (Apfelbeck, 1904) [ČS/CR] – **Boh.:** Horní Ředice (5961), 25.VIII.2015 – 50 ex. na podmáčené louce u rybníka Mordýř (VE), 12.IX.2015 – 8 ♂♂ + 14 ♀♀ v mokřině u rybníka Mordýř (LT), 29.V.2016 – 7 ex. (MI), 15.IX.2016 – 4 ex. (KL).

Vzácný a velmi lokální hygrofilní druh. Z ČR tento druh poprvé uvádí Schmidt (1994) z Břehyně u Doks. Další exempláře byly rozpoznány až poté, při revizi materiálu dříve zahrnovaného do bývalého taxonu *A. moestum*. Potvrzení výskytu v ČR po 46 letech od posledních, nepublikovaných nálezů M. Honců od Novozámeckého rybníka: Zahrádky (5353),13. VI.1966 – 1 ♂ + 1 ♀ a 14.VI.1969 – 1 ♂; Ralská pahorkatina – Karasy, Novozámecký rybník (5353), 3.VII.1967 – 1 ♀ (vše M. Honců leg. et coll., VE det.). Z Moravy je zatím známý jen jediný starý nález z Frýdku (Skoupý 2004).

Agonum (***Olisares***) ***lugens*** (Duftschmid, 1812) [ČS/NT] – **Boh.:** Záboří nad Labem, PR Na hornické (5957), 15.VIII.2017 – 1 ex. na světlo, 13.VIII.2019 – 1 ex., 11.V.2021 – 1 ex. a 16.V.2021 – 1 ex. v mokřadu, 10.III.2021 – 1 ex. pod kůrou ležícího stromu (MK); Lysá nad Labem (5755), 11.VI.2020 – 2 ex. v mokřadu Žabák (LT); Církvice (6058), 8.VIII.2020 – 2 ex. na světlo u rybníka Vrabcov (MK); Nové Dvory, PP Nový rybník (6058), 26.VII.2021 – 1 ex. v rákosině (MK); Žehušice (6058), 14.VIII.2021 – 1 ex. na světlo (MK).

Hygrofilní druh, žijící na mokřadech, v rákosinách, u tůní u větších řek a v lužních lesích, který se v poslední době plošně šíří. Často přilétá na světlo a díky tomu byl evidován na řadě nových lokalit.

Agonum (***Olisares***) ***viridicupreum viridicupreum*** (Goeze, 1777) [ČS/VU] – **Mor.:** Rakvice (7166), 4.VII.2011 – 6 ex. na polní mokřině 2,5 km JZ (MO); Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 11.IV.2015 – 1 ex. aktivní ve dne na slanisku (LT); Novosedly, PR Slanisko (7164), 31.V.2015 – 2 ex. a 27.VI.2015 – 1 ex. (RE); Šumice (6972), 12.III.2016 – 1 ex. na mokřině (RE); Kobylí, Smraďula (7067), 7.V.–29.V.2016 – 6 ex. v ZP na mokřině (RE); Staré Hamry, vodní nádrž Šance (6576), 12.VII.2017 – 1 ex. na dně vypuštěné přehrady, v bahnité sníženině u bývalého náspu (M. Roháčová lgt., coll. MBF, ST det.) (ST); Oleksovice (7063), 27.VI.2020 – 2 ex. na zasolené mokré louce (HE).

Na Moravě nehojný druh, který bývá nalézán na březích vod s nezapojenou vegetací, nejčastěji v dosahu větších řek. Nález ze Starých Hamrů je třetím nálezem pro SV Moravu (cf. Stanovský et Pulpán, 2006).

Amara (***Amara***) ***anthobia*** A. Villa et G. B. Villa, 1833 – **Boh.:** Husinec (5852), 6.VI.2016 – 10 ex. v ekotonu les/pole (MO et VO); Praha-Dejvice, Šatovka (5852), 1.V.–17.VI.2020 – 10 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO); Praha – Malá Strana, vrch Petřín (5952), 19.V.–9. VI.2020 – 1 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO). **Mor.:** Rakvice (7166), 4.VII.2011 – 2 ex. na polní mokřině 2,5 km JZ (MO); Pouzdřany (7065), 8.VII.2016 – 1 ex. (LB lgt. et coll., RE det.) (RE), 20.IV.2018 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Březí (7165), 20.IV.2018 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Mikulov, PR Svatý Kopeček (7165), 18.IV.2018 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Břeclav, Pohansko, 7.IV.2019 – 2 ex. (VK lgt. et coll., RE det.) (RE).

Lokální xerofilní druh, rozšířený především ve vinařských oblastech.

Amara (***Amara***) ***famelica*** C. Zimmermann, 1832 – **Boh.:** Kojákovice, PR Ruda u Kojákovic (7054), 5.VI.2016 – 1 ex. na břehu rybníka (RE); Mariánské Radčice (5448), 28.III.–25. IV.2020 – 1 ex. v ZP a 4.VII.2020 – 5 ex. pod vegetací na břehu tůně v předpolí lomu Bílina (vše MO et VO), 16.VII.2020 – 1 ex. (P. Krásenský lgt. et det.) (VO); Lomnice, Velká Podkrušnohorská výsypka (5741), 11.IV.2020 – 6 ex. a 16.IV.2020 – 15 ex. na jílovité ploše s řídkou vegetací a 9.V.2020 – 1 ex. na bahnitém břehu vodní nádrže s nižší vegetací (HE); Krásno, Krásenské rašeliniště (5842), 8.–14.V.2020 – 1 ex. v ZP na ploše s keříčky vřesu po těžbě rašeliny (HE).

Lokální druh s vazbou na vřesoviště, rašeliniště a chladnější lokality s kyselým nebo písčitým podkladem. Pozoruhodný je výskyt na jílovitém podkladu Podkrušnohorské výsypky.

Amara (***Amara***) ***lucida*** (Duftschmid, 1812) [ČS/VU] – **Boh.:** Kutná Hora, vrch Kaňk, NPP Kaňk (6057), 17.III.2021 – 1 ex. zimující v detritu při bázi kmene třešně (MK), 26.IV.2021 – 7 ex. v detritu na travnatém příkrém svahu (MK lgt., 4 ex. det. et coll. HE, 3 ex. det. et coll. MK) (MK); Kutná Hora, vrch Kaňk (6057), 11.V.2021 – 1 ex. v detritu na travnatém svahu západně od NPP Kaňk (MK); Nová Lhota (6057), 1.IV.2021 – 3 ex. pod kameny na úhoru s nízkou vegetací na pískovcovém podloží (MK lgt. et coll., HE det.) (MK), 17.IV.2021 – 5 ex. (HE), – 3 ex. (MK) pod vegetací na úhoru na pískovcovém podloží, 27.IV.2021 – 1 ex. pod kamenem na úhoru na pískovcovém podloží (MK). **Mor.:** Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 6.V.2017 – 1 ex., 4.VI.2017 – 1 ex. v ZP a 2 ex. smykem na pastvině (LT); Uherčice (7065), 29.V.2020 – 2 ex., 25.VI.2020 – 1 ex. a 27.V.2021 – 2 ex. pod suchou vegetací na okraji pole (LT); Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 1.VI.2021 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 1.VI.2021 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE).

Xerofilní druh s výskytem především v teplejších oblastech. V Čechách velmi lokální a vzácný.

Amara (***Amara***) ***makolskii*** Roubal, 1923 – **Boh.:** Bernardov (5958), 4.–11.V.2021 – 2ex. v ZP při okraji smíšeného lesa (MK); Bludov (6157), 11.IV.2021 – 1 ex. (MK, VE det.) a 6.V.2021 – 3 ex. v detritu pod břízami (MK); Záboří nad Labem (5958), 4.–11.V.2021 – 4 ex. v ZP v lese 1 km J od obce (MK); Řeplice (6257), 6.V.2021 – 1 ex. v detritu pod břízami (MK); Nová Lhota (6057), 28.X.2021 – 1 ex. pod mechem (MK).

Lokální druh lesních a lesostepních porostů s břízami. Častější na písčitých a pískovcových lokalitách.

Amara (***Amara***) ***pulpani*** Kult, 1949 – **Boh.:** Milovice (5755), 16.V.2015 – 1 ♂ pod vřesem v březovém hájku na okraji pastviny (LT); Boučí, Boučský vrch (5741), 24.V.2017 – 1 ex. v hromadě kamení s řídkou vegetací ve strmém svahu na staré výsypce obklopené březo-dubovým lesem (HE); Horní Slavkov, Hubský peň (5842), 26.IV.2020 – 8 ex. a 6.V.2020 – 1 ex. pod lišejníky v žulovém lomu (HE); Bernardov (5958), 4.–11.V.2021 – 1 ex. v ZP při okraji smíšeného lesa (MK lgt. et coll., VE det.) (VK); Vranice, Vranické skály (6256), 17.XI.2021 – 2 ex. pod vřesem (MK lgt. et coll., VE det.) (VK).

Lokální druh vyhledávající zejména světlé suťové lesy, lesostepi, vřesoviště a písčiny.

Amara (***Amara***) ***spreta*** Dejean, 1831 – **Boh.:** Lhota, Jezero (5753), 2.VIII.2014 – 2 ex. na břehu zatopené pískovny (VO).

Psamobiontní druh, žijící lokálně a většinou nehojně na lesních písčinách a v pískovnách. V současnosti pravděpodobně ubývající.

Amara (***Amarocelia***) ***erratica*** (Duftschmid, 1812) [ČS/VU] – **Mor.:** Keprník (5868), 1.VI.–25.VI.2016 – 1 ex., v ZP na subalpínské louce na vrcholu (JK).

Horský druh obývající nezastíněná otevřená stanoviště až do alpínského pásma.

Amara (***Celia***) ***brunnea*** (Gyllenhal, 1810) – **Boh.:** Záboří nad Labem (5958), 4.–11.V.2021 – 3 ex. a 2.–20.IX.2021 – 2 ex. v ZP v lese 1 km J od obce (MK).

Druh s lokálním výskytem v lesních a hájových porostech s břízami. Častější na písčitých lokalitách.

Amara (***Celia***) ***infima*** (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Roudnice nad Labem, NPP Kleneč (5651), 10.III.2014 – 2 ex. pod vřesem (MO).

Callunobiont, žijící výhradně ve vřesových porostech od nížin do středních poloh.

Amara (***Celia***) ***praetermissa*** (C. R. Sahlberg, 1827) – **Boh.:** Boučí, Boučský vrch (5741), 16.V.2016 – 16 ex. a 24.V.2017 – 44 ex. pod listím a v hromadách kamení s řídkou vegetací ve strmém svahu na staré výsypce obklopené březo-dubovým lesem (HE); Loučky (5742), 21.IV.2018 – 1 ex. pod vřesem v pískovně (HE).

V ČR velmi lokální druh, vyhledávající lesní světliny, písčiny, březové háje, vřesoviště a okraje lomů. Též v alpínském pásmu v horách.

Amara (***Celia***) ***sabulosa*** (Audinet-Serville, 1821) – **Boh.:** Mochov (5854), 29.VI.–1.VII.2015 – 2 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO); Encovany, PR Holý vrch (5451c), 3.VIII.–10.IX.2021 – 1 ex. v podzemní pasti na bílé stráni (VE et MO) (MO). **Mor.:** Únanov (7162), 13.VIII.–15.IX.2021 – 1 ex. do ZP v kaolince (NA).

Poměrně vzácnější xerofilní druh teplejších oblastí.

Amara (***Curtonotus***) ***convexiuscula*** (Marsham, 1802) – **Mor.:** Stonava, Křivý důl (6177), 27.V.2020 – 1 ex., vyhrabán z vegetace (P. Boža lgt., et coll., ST det.), 7.VIII.2020 – 1 ex. na světlo (ST).

Eurytopní druh žijící zejména na druhotných stanovištích s nezapojenou vegetací, zvláště na okrajích polí, úhorech, výsypkách a ruderálech. Většina nálezů pochází z odchytů na svět-

lo. V posledních letech se početnost nálezů snižuje. První nálezy pro SV Moravu (Slezsko). Stanovský et Pulpán (2006) jej neuvádějí.

Amara (***Curtonotus***) ***gebleri*** Dejean, 1831 – **Boh.:** Černěves (5551), 27.VIII.2013 – 1 ex. a 28.IV.2014 – 1 ex., vše v lužním lese u Labe (MO). **Mor.:** Orlová env., Kozinec (6177), 15.VII.2012 – 1 ex. oklepem chmelu v lužním porostu u řeky Olše (VA lgt. et coll., L. Koloničný det.) (VA); Kokory (6570) 1.–31.VIII.2015 – 1 ex. v ZP v lomu (49°29′32″N, 17°23′2″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Kurovice (6771), 1.–31.VIII.2015 – 1 ex. v ZP v Kurovickém lomu (49°16′25″N, 17°31′17″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Medlovice (6969), 1.–31.VIII.2015 – 6 ex. v ZP (49°03′27″N, 17°16′02″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Oleksovice, PP Oleksovické vřesoviště (7163), 26.VI.2020 – 1 ex. v malé pískovně (HE); Ostrava-Poruba (6175), 22.IX.2020 – 2 ex. oklepem bylin v údolí Plesenského potoka (VA lgt. et coll., LT det.) (VA); Zlín-Kostelec (6772), 14.VI.2021 – 2 ex. (KO lgt. et coll., RE det.) (KO); Oleksovice (7063), 15.IX.2021 – 1 ex. pod kamenem u vchodu do starého sklípku (VE).

Lokální druh vlhčích a chladnějších stanovišť. Častější je v podhůří, ale podél řek a potoků proniká daleko do nížin.

Amara (***Zezea***) ***chaudoiri incognita*** Fassati, 1946 [ČS/VU] – **Mor.:** Petřvaldík (6274), 23.VI.2020 – 1 ex. (M. Mantič lgt., coll. et det., ST rev. det.) (ST); Sušice, jihovýchodní okraj obce (6571), 8.V.–3.VI.2021 – 1 ex. v ZP na xerotermní louce (JK lgt., ST det. et coll.) (JK).

Charakteristický druh vlhčích a zaplavovaných luk v nivách větších řek, odkud se často šíří i do širšího okolí. Na J a střední Moravě dosud lokálně hojný, v Čechách pravděpodobně vyhynulý. Potvrzení výskytu na SV Moravě. Stanovský et Pulpán (2006) uvádějí jen staré nedatované nálezy.

Amara (***Zezea***) ***tricuspidata*** Dejean, 1831 [ČS/NT] – **Boh.:** Roudnice nad Labem, NPP Kleneč (5651), 20.V.–20.VI.2012 – 1 ♀ v ZP na písčině (A. Kůrka lgt., MO det. et coll., J.Hejkal revid.) (MO). **Mor.:** Rakvice (7166), 4.VII.2011 – 7 ex. na polní mokřině 2,5 km JZ (MO); Mohelnice-Křemačov (6267), 16.VI.2015 – 1 ex. pod vegetací na zaplavované louce v nivě Mírovky (MO); Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 31.V.2015 – 3 ex. (RE); Novosedly, PR Slanisko (7164), 27.VI.2015 – 1 ex. (RE); Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 4.VI.2017 – 2 ♂♂ + 4 ♀♀ smykem na pastvině (LT); Oleksovice, vrch Kamenec (7063–7163), 28.V.2021 – 25 ex. pod řídkou vegetací ve sprašové hlíně (HE); Uherský Brod (6971), 28.V.2021 – 1 ex. na okraji pšeničného pole, pozorováno více ex. na květenství *Apera spica-venti* (LA); Konice (7162), 29.V.2021 – 1 ex. pod vegetací ve sprašové hlíně na okraji pole (HE).

Druh s lokálním výskytem na nejčastěji písčitých okrajích extenzívnějších polí a úhorech v přírodně zachovalejších lokalitách. V Čechách sbírán početněji naposledy v padesátých letech minulého století, poslední známý nález pocházel z roku 1966 (Litoměřice, VIII.1966, J. Pulpán lgt. det. et coll.) (Skoupý 2004). Nález z Klenče je spolu s nálezem J. Kavky z Brambor z roku 2018 (Kavka et al. 2022) potvrzením recentního výskytu v Čechách (cf. Resl et al. 2021).

Amara (***Amara***) ***nigricornis*** C. G. Thomson, 1857 [ČS/VU] – **Boh.:** Vimperk env. (6948) 18.V.2015 – 5 ex. na zarůstající pasece (KL).

Montánní druh, v ČR žije pouze na Šumavě. V jarním období lokálně a vzácně na lesních pasekách.

Amblystomus niger (Heer, 1841) – **Boh.:** Železnice (5558), 23.V.2017 – 1 ex. ve smyku bylinné vegetace v nivě Cidliny (VO); Bylany (5547), 24.X.2017 – 1 ex. a 5.I.2018 – 1 ex. v prosevu na mokřině (P. Krásenský lgt. et coll., HE det.) (HE); NPP Polabská černava (5653), 26.VI.2020 – 1 ex. (ZU). **Mor.:** Rakvice (7166), 4.VII.2011 – 6 ex. na polní mokřině 2,5 km JZ (MO); Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 1.VI.2015 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 7.VIII.2015 – 1 ex. na světlo (RE); Rakvice env., PP Trkmanec-Rybníčky (7167), 20.VII.2019 – 2 ex. na UV světlo (VA lgt. et coll., LT det.) (VA).

Druh rozmanitých stanovišť. Preferuje volné, osluněné a mírně vlhké plochy se sporou vegetací, často polní mokřiny. Od roku 1996 je pozorováno jeho šíření na Moravě (cf. Veselý et al. 2009). V Čechách byl poprvé zjištěn v roce 2012 (Vonička et al. 2014) a od té doby byl nalezen na více lokalitách.

Anisodactylus (***Anisodactylus***) ***nemorivagus*** (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Krňany-Teletín (6152), 1.–30.VI.2015 – 2 ex. v ZP v Teletínském lomu (MA lgt., VO det.) (VO). **Mor.:** Dětřichov u Moravské Třebové (6266), 23.IV.2015 – 2 ex. pod vřesem na okraji lesa (MO); Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 8.IV.2017 – 1 ♀ pod suchou vegetací na pastvině (LT).

Nehojný až vzácný druh nalézaný zpravidla jednotlivě, ale na rozmanitých stanovištích: na loukách v nivách řek, na písčitých travnatých úhorech, na lesních pasekách a světlinách i na pastvinách. Častější je v pahorkatinách a v podhůří. Zřejmě vyžaduje extenzívní způsob obhospodařování a přítomnost ploch s méně zapojenou vegetací. Dlouhodobě ubývající druh.

Anthracus longicornis (Schaum, 1857) [ČS/VU] – **Mor.:** Novosedly, PR Slanisko Novosedly (7164), 2.V.2014 – 3 ex. na okraji mokřiny (MO), 25.IV.–8.V.2015 – 1 ex. v ZP na slanisku, a 31.V.2015 – 1 ex. (RE); Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 28.III.–25.IV.2015 – 1 ex. v ZP na slanisku a 25.IV.2015 – 2 ex. (RE), 7.VIII.2015 – 1 ex. na světlo na slanisku (LT); Valtice env., NPP Rendezvous (7266), 26.VI.2018 – 1 ex. na UV světlo (VA lgt. et coll., LT det.) (VA); Břeclav-Pohansko (7267), 10.VII.2020 – 1 ex. na světlo (LB lgt. et coll., RE det.) (RE).

Lokální druh zachovalých mokřadů, slanisek a subhalofilních lokalit. Na jižní Moravě v posledních letech nalézaný zejména na slaniskách častěji.

Aptinus bombarda (Illiger, 1800) – **Mor.:** Čížov, Sloní hřbet (7161), 14.V.2013 – 1 ex. (KO); Starý Hrozenkov (7073), 1.–31.V.2015 – 5 ex. a 1.–31.VIII.2015 – 2 ex., vše v ZP (48°58′44″N, 17°52›1″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Komňa (6969), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (48°59′09″N, 17°49′25″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Medlovice (6969), 1.–30.VI.2015 – 2 ex. v ZP ((49°03′27″N, 17°16′02″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Želešice (6865), 7.VI.–27.VI.2017 – 2 ex. v ZP v doubravě jižně od řeky Bobravy (J. Podešva lgt., ST det., JK coll. (JK); PR Číhadlo (6766), 2.V.–4.VII.2018 – 24 ex., v ZP v bučině (suťový les) (FO lgt., JK det. et coll.) (JK); PR Březinka (6766), 27.V.–27.VI.2020 – 6 ex. v ZP v bučině (FO lgt., JK det. et coll.) (JK); PR Dřínová (6766), 30.IV.–27.VI.2020 – 8 ex. v ZP v bučině (suťový les) (FO lgt., JK det. et coll.) (JK); Luhačovice, Bílý kříž (6972), 24.IV.–23.V.2021 – 3 ex. v ZP (KO); PR U Výpustku (6766), 15.V.–8.VII.2021 – 37 ex. v ZP v bučině (suťový les) (FO lgt., JK det. et coll.) (JK).

Lokální brachypterní druh zachovalejších, především listnatých lesů pahorkatin a podhůří.

Asaphidion austriacum Schweiger, 1975 – **Mor.:** Únanov (7162), 20.VIII.2016 – 6 ex. (RE), 11.VI.2021 – 20 ex. a 10.VII.2021 – 2 ex. v kaolince (NA).

Druh žije na vlhkých, polozastíněných jílovitých, jílovitopísčitých až písčitých březích vod. Potvrzení stálého výskytu na lokalitě.

Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) – **Mor.:** Únanov (7162), 20.VIII.2016 – 2 ex. (RE).

Velmi lokální druh volných vlhčích hlinitých a hlinitopísčitých stanovišť. Potvrzení stálého výskytu na lokalitě.

Badister (***Badister***) ***unipustulatus*** Bonelli, 1813 – **Mor.:** Rakvice (7166), 2.VII.2011 – 1 ex. v mokřině 0,5 km V (MO); Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 1.VI.2015 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO).

Charakteristický druh zachovalých mokřadů a lužních lesů.

Badister (***Baudia***) ***peltatus peltatus*** (Panzer, 1796) [ČS/NT] – **Boh.:** Lysá nad Labem (5755), 1.VII.2015 – 1 ♂ ve světelném lapači v zámeckém parku (MA lgt., VO det.) (VO); Lysá nad Labem (5755), 11.VI.2020 – 1 ♂ v mokřadu Žabák (LT); Křenek (5753), 19.VI.2021 – 3 ex. v rákosině na břehu Křenecké tůně (VO). **Mor.:** Záhlinice (6770), 30.VII.2016 – 1 ♂ (LB lgt. et coll., RE det.) (RE).

Vzácný druh, častější u tůní v lužních lesích a na zachovalých mokřadech, místy se objevuje i u rybníků. Relativně často přilétá na světlo.

Badister (***Trimorphus***) ***dorsiger*** (Duftschmid, 1812) [ČS/VU] – **Mor.:** Břeclav-Pohansko, Pajdavé kúty (7267), 9.V.2013 – 1 ex. (KO lgt. et coll., VO det.) (KO).

Charakteristický druh zachovalých lužních lesů na jižní až střední Moravě.

Bembidion (***Bembidion***) ***humerale humerale*** Sturm, 1825 – **Boh.:** Praha-Jenerálka (5852), 12.IX.2017 – 2 ex. u mokřiny na dně lomu bývalé cihelny „Na Salátce“ (VE); Krásno, Krásenské rašeliniště (5842), 6.–8.V.2020 – 1 ex. v ZP na ploše s keříčky vřesu po těžbě rašeliny, 14.V.2020 – 1 ex. v rašeliníku na vrchovišti (HE).

Reliktní druh nížinných rašelinných i písčitých stanovišť.

Bembidion (***Bembidionetolitzkya***) ***ascendens*** K. Daniel, 1902 [ČS/VU] – **Mor.:** Hustopeče nad Bečvou (6473), 31.V.2015 – 4 ex., 11.V.2016 – 5 ex. a 11.VI.2017 – 2 ex., na štěrkové lavici řeky Bečvy u přítoku Mřenky (JK); Bystřice nad Olší (6378), 15.III.2020 – 5 ex. na štěrkovém břehu řeky Olše (RZ); Skalička (6472), 8.IV.2020 – 2 ex. na štěrkovém břehu řeky Bečvy (RZ); Nižní Lhoty (6376), 7.VII.2021 – 2 ex. (1 ex. immaturní) a 21.VIII.2021 – 1 ex. (RZ).

Velmi lokální reliktní druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion (***Bembidionetolitzkya***) ***conforme*** Dejean, 1831 [ČS/EN] – **Mor.:** Nižní Lhoty (6376), 21.X.2020 – 5 ex., 7.VII.2021 – 10 ex. (pozorováno více ex.), 16.VII.2021 – 1 ex. (pozorováno více ex.) a 21.VIII.2021 – 3 ex. (RZ).

Nehojný a velmi lokální reliktní druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion (***Bembidionetolitzkya***) ***varicolor varicolor*** (Fabricius, 1803) – **Mor.:** Hustopeče nad Bečvou (6473), 31.V.2015 – 2 ex., 10.VII.2015 – 3 ex., 19.IX.2015 – 4 ex. a 11.

VI.2017 – 1 ex. na štěrkové lavice řeky Bečvy u přítoku Mřenky (JK); Osek nad Bečvou (6571), 20.IX.2015 – 4 ex., na štěrkové lavici řeky Bečvy u Oseckého rybníka (JK).

Velmi lokální reliktní druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků.

Bembidion (***Diplocampa***) ***fumigatum*** (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Církvice (6058), 8.VIII.2020 – 1 ex. na světlo u rybníka Vrabcov (MK); Záboří nad Labem, PR Na hornické (5957), 11.V.2021 – 1 ex. a 18.V.2021 – 4 ex. v močálu, 19.VI.2021 – 1 ex. na světlo (MK). **Mor.:** Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 12.VII.2015 – 1 ex. na světlo (RE); Rakvice, Trkmanský dvůr (7167), 25.V.2016 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Záhlinice (6770), 30.VII.2016 – 1 ex. (LB lgt. et coll., RE det.) (RE); Rohatec, Soboňky (7069), 21.IV.2018 – 1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.); Stonava, nádrž Kateřina (6274), 25.VI.2019 – 1 ex. v rákosí v litorálním pásmu (D. Hrebeň lgt. et coll., ST det.) (ST); Ostrava-Heřmanice (6176), 2.IV.2020 – 1 ex. a 4.V.2020 – 7 ex. v rákosině (RZ); Dubňany, Kosteliska (7068), 1.VII.2020 – 3 ex. na světlo (KO lgt. et coll., RE det.) (RE) a 10.VII.2020 – 1 ex. na světlo (RE).

Hygrofilní druh s lokálním výskytem na zachovalých mokřadech s bohatou bylinnou vegetací. Na SV Moravě lokální vzácný druh.

Bembidion (***Emphanes***) ***tenellum tenellum*** Erichson, 1837 – **Boh.:** Mariánské Radčice (5448), 25.IV.2020 – 2 ex., 29.V.2020 – 1 ex. a 4.VII.2020 – 1 ex. (MO); Církvice (6058), 8.VIII.2020 – 2 ex. na světlo u rybníka Vrabcov (MK lgt. et coll., VE det.); Brambory (6058), 13.VIII.2020 – 1 ex. na světlo (MK lgt. et coll., VE det.); Záboří nad Labem, PR Na hornické (5957), 19.VI.2021 – 1 ex. na světlo (MK); Žehušice (6058), 10.VII.2021 – 2 ex. na světlo v zatopené pískovně (MK). **Mor.:** Hustopeče nad Bečvou (6473), 10.VII.2015 – 1 ex. u řeky Bečvy u přítoku Mřenky (JK).

Hygrofilní halofilní druh. V současné době se dále plošně šíří (cf. Veselý et al 2020). Někdy bývá častější než příbuzný, dříve hojnější druh *Bembidion* (*Emphanes*) *minimum* (Fabricius, 1792).

Bembidion (***Euperyphus***) ***fluviatile fluviatile*** Dejean, 1831 [ČS/NT] – **Boh.:** Černousy, PR Meandry Smědé (5056), 29.IV.2020 – 30 ex. (KL). **Mor.:** Ostrava-Polanka (6275), 6.IV.2017 – 3 ex. na kolmém břehu řeky Odry (RZ); Dolní Lutyně (6076), 20.VI.2018 – 2 ex., 7.IX.2021 – 1 ex. a 3.X.2021 – 2 ex. v pískovně (RZ).

Velmi lokální druh vegetací nezarostlých a neznečištěných písčitých a hlinitopísčitých břehů vod. Často v puklinách kolmých břehů v pískovnách.

Bembidion (***Euperyphus***) ***testaceum testaceum*** (Duftschmid, 1812) [ČS/EN] – **Mor.:** Hustopeče nad Bečvou (6473), 31.V.2015 – 2 ex. na štěrkové lavici řeky Bečvy u přítoku Mřenky (JK); Ostrava-Polanka (6275), 23.VI.2017 – 2 ex. na písčitém břehu řeky Odry (RZ); Bohumín (6076), 27.III.2020 – 2 ex., 31.III.2021 – 2 ex. a 13.VII.2021 – 2 ex. na štěrkovém břehu řeky Odry (RZ).

Druh zachovalých písčitých a štěrkových břehů řek a potoků.

Bembidion (***Hydrium***) ***laticolle*** (Duftschmid, 1812) [ČS/NT] – **Mor.:** Únanov (7162), 11.VI.2021 – 33 ex. v kaolince (NA).

Druh zachovalých písčitých a hlinitopísčitých břehů. Potvrzení stálého výskytu na lokalitě.

Bembidion (***Chlorodium***) ***pygmaeum*** (Fabricius, 1792) [ČS/NT] – **Mor.:** Havířov-Suchá, důl František env. (6176), 1.VII.2012 – více ex. pozorováno na rekultivovaném úložišti popílku s mezernatým porostem keřů (ST); Únanov (7162), 20.VIII.2016 – 1 ex. (RE), 11.VI.2021 – 7 ex. v kaolince (NA); Ostrava-Svinov (6175), 28.IV.2017 – 1 ex. pod kůrou kmene připlaveného povodní řeky Odry (RZ); Skalička (6472), 11.VI.2020 – 1 ex. (RZ); Dolní Lutyně (6076), 27.IV.2021 – 1 ex. v pískovně (RZ); Bystřice nad Olší (6378), 26.VII.2021 – 3 ex. na travnatém štěrkovém břehu řeky Olše (RZ); Prostřední Suchá (6176), 28.VII.2021 – 2 ex. (RZ).

Velmi lokální druh písčitých a hlinitých půd se sporou vegetací v přírodně zachovalých oblastech. Na SV Moravě je recentně známo více nálezů z rekultivovaných ploch než z břehových biotopů.

Bembidion (***Notaphus***) ***obliquum*** Sturm, 1825 – **Mor.:** Bohumín (6076), 7.VIII.2018 – 1 ex. na bahnitém břehu řeky Odry (RZ); Děhylov (6175), 20.IV.2020 – 1 ex. v rákosině (RZ).

Hygrofil, žijící na mokřadech s kyselým podkladem a na rašeliništích. V Čechách je v některých oblastech hojný, na Moravě a ve Slezsku jde o vzácnější druh.

Bembidion (***Ocydromus***) ***modestum*** (Fabricius, 1801) [ČS/VU] – **Boh.:** Suchdol nad Lužnicí (7055), 4.VI.2016 – 3 ex. v pískovně Cep (RE); Hradec Králové – Plačice (5860), 31.VII.2018 – 1 ex. na světlo (MM lgt. et coll., RE det.) (RE). **Mor.:** Hustopeče nad Bečvou (6473), 31.V.2015 – 3 ex., 19.IX.2015 – 2 ex., 11.V.2016 – 2 ex., 12.VIII.2016 – 1 ex. a 11. VI.2017 – 4 ex. na štěrkové lavici řeky Bečvy u přítoku Mřenky (JK); Osek nad Bečvou (6571), 20.IX.2015 – 10 ex. na štěrkové lavice řeky Bečvy u Oseckého rybníka (JK).

V Čechách v současnosti velmi lokální druh vázaný na volné písčité a štěrkopískové břehy vod.

Bembidion (***Peryphanes***) ***milleri milleri*** Jacquelin du Val, 1852 – **Boh.:** Lomnice, Velká Podkrušnohorská výsypka (5741), 22.V.2017 – 32 ex. ve vlhkém jílu na volné ploše (HE). **Mor.:** Dolní Lutyně (6076), 20.VI.2018 – 2 ex. v pískovně (RZ)

Druh vázaný na volné jílovité půdy, pravidelně nalézaný v cihelnách, hliništích a lomech.

Bembidion (***Peryphiolus***) ***monticola monticola*** Sturm, 1825 – **Boh.:** Záblatí-Zvěřenice (7049), 3.VI.2021 – 8 ex., 4.VII.2021 – 17 ex. na březích Blanice v PR Kaňon Blanice (LT). **Mor.:** Nové Heřminovy (5971), 11.VI.2016 – 6 ex. na štěrkové lavici řeky Opavy u soutoku s Jelením potokem (JK); Vsetín (6674), 20.V.2017 – 1 ex. na štěrkové lavici řeky Vsetínské Bečvy pod jezem u ulice U splavu (JK); Vyšní Lhoty (6376), 27.V.2017 – 1 ex. u Morávky (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Hrubý Jeseník – Ovčárna env. (5969), 14.VIII.2017 – 1 ex. (KL).

Lokální druh zachovalých štěrkopískových a hlinitých břehů podhorských toků.

Bembidion (***Peryphus***) ***bualei bualei*** Jacquelin du Val, 1852 (= *B. cruciatum veselyi* Fassati, 1958) – **Mor.:** Nové Heřminovy (5971), 11.VI.2016 – 2 ex. na štěrkové lavici řeky Opavy u soutoku s Jelením potokem (JK); Vyšní Lhoty (6376), 16.IV.2020 – 1 ex. (RZ); Bystřice nad Olší (6378), 28.VII.2020 – 1 ex. na štěrkovém břehu řeky Olše (RZ); Nižní Lhoty (6376), 21.X.2020 – 2 ex. (RZ).

Lokální druh zachovalých štěrkopískových břehů podhorských toků. Na Moravě jen v Beskydech.

Bembidion (***Peryphus***) ***subcostatum vau*** Netolitzky, 1913 (= *B. s. javurkovae* Fassati, 1944) [ČS/VU] – **Mor.:** Svatý Štěpán (6974), 28.III.2006 – 1 ex. (KO lgt., et coll., V. Křivan det.) (KO); Rohatec (7069), 21.IV.2018 – 1 ex. u řeky Moravy (VK lgt. et coll., RE det.) (RE); Skalička (6472), 8.IV.2020 – 32 ex. na štěrkovém břehu řeky Bečvy (RZ); Brumov-Bylnice (6974), 5.VII.2021 – 3 ex. na zastíněném štěrkovém břehu řeky Vláry (RZ).

Lokální druh zachovalých štěrkopískových a hlinitých břehů nížinných a podhorských toků.

Bembidion (***Philochthus***) ***neresheimeri neresheimeri*** J. Müller, 1929 [ČS/NT] – **Mor.:** Novosedly, PR Slanisko (7164), 28.III.2015 – 1 ex., 8.V.–31.V.2015 – 1 ex. v ZP a 31.V.2015 – 1 ex. (RE); Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 8.V.2015 – 1 ex. (RE); Rohatec, Soboňky (7069), 21.IV.2019 – 2 ex. a 19.V.2020 – 7 ex. (VK lgt. et coll., RE det.) (RE); Trávní Dvůr (7162) 15.VI.2021 – 8 ex. (KL).

Lokální druh zejména subhalofilních mokřadů. V ČR pouze na jižní Moravě.

Bembidion (***Plataphus***) ***prasinum*** (Duftschmid, 1812) [ČS/VU] – **Mor.:** Hustopeče nad Bečvou (6473), 11.VI.2017 – 1 ex. na štěrkové lavici řeky Bečvy u přítoku Mřenky (JK); Bystřice nad Olší (6378), 2.XI.2019 – 2 ex. na štěrkovém břehu řeky Olše (RZ); Bohumín (6076), 27.III.2020 – 1 ex. (RZ); Skalička (6472), 8.IV.2020 – 1 ex. a 11.VI.2020 – 1 immaturní ex. na štěrkovém břehu řeky Bečvy (RZ); Vratimov (6275), 2.VI.2020 – 1 immaturní ex. na štěrkovém břehu řeky Ostravice (RZ).

Velmi lokální druh zachovalých štěrkových břehů podhorských i nížinných toků.

Bembidion (***Semicampa***) ***gilvipes*** Sturm, 1825 – **Boh.:** Mariánské Radčice (5448), 29.V.–4. VII.2020 – 1 ex. v ZP (MO et VO).

Nehojný hygrofilní druh žijící v lužních lesích a na vlhkých loukách u větších a zachovalých mokřadů.

Bembidion (***Semicampa***) ***schueppelii*** Dejean, 1831 – **Boh.:** Sněžné (5663), 23.VII.2019 – 22 ex. na zarostlém hlinitém břehu říčky Olešenky (LT); Kačerov, PR Kačerovské rybníky (5764), 24.VII.2019 – 1 ex. vyšlapán na vlhké louce (LT). **Mor.:** Stupava, Stará hráz (6869), 18.IX.2014 – 3 ex. v nivě Kyjovky (VO); Paskov (6275), 1.V.2018 – 2 ex. na štěrkovém břehu řeky Ostravice (RZ); Skrbovice (5970), 2.VIII.2018 – 1 ex. u řeky Opavy (VK lgt. et coll., RE det.) (RE); Litovel-Březové (6368), 17.VI.2021 – 3 ex. (RZ); Bystřice nad Olší (6378), 26.VII.2021 – 1 ex. na štěrkovém břehu řeky Olše (RZ).

Lokální druh na zachovalých březích podhorských potoků a řek. Potvrzení recentního výskytu v Čechách (cf. Vonička et al. 2017).

Blethisa multipunctata multipunctata (Linnaeus, 1758) [ČS/NT] – **Boh.:** Chlum u Třeboně, NPR Vizír (7055), 3.VI.2016 – 1 ex. na břehu rybníka (RE). **Mor.:** Novosedly, PR Slanisko Novosedly (7164), 2.V.2014 – 2 ex. na okraji mokřiny (MO).

Lokální druh vázaný především na ploché, vegetací zarostlé nezastíněné břehy vod.

Bradycellus (***Bradycellus***) ***ruficollis*** (Stephens, 1828) – **Boh.:** Milovice, NPP Milovice-Mladá, 15.V.2021 – 1 ex. v prosevu vřesu (50°14′23″N, 14°53′59″E) (VO).

Callunobiont, žijící výhradně v zachovalých vřesových porostech.

Bradycellus (***Bradycellus***) ***verbasci*** (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Broumov, Rožmitál (5364), 17.VII.2015 – 1 ex. na světlo a 5.VIII.2015 – 1 ex. na světlo (MM lgt. et coll., RE det.) (RE); Podbořany, Krásný Dvůr (5746), 31.VII.2017 – 1 ex. na světlo v parku (KO lgt. et coll., RE det.) (KO). **Mor.:** Sidonie, PR Sidonie, 18.VII.2015 – 1 ex. na světlo (EE lgt. et coll, RE det.(RE); Šumice (6972), 16.VIII.2017 – 1 ex. na světlo (RE); Slup, PP Ječmeniště (7262), 1.VIII.2018 – 5 ex. na světlo (LM lgt., RE det. et coll.) (RE); Vizovice (6773), 7.VIII.2019 – 1 ex., (VK lgt. et coll., RE det.) (RE); Zlín-Kúty (6772), 14.VIII.2019 – 1 ex. na světlo (KO lgt. et coll., RE det.) (KO).

Široce rozšířený druh, ale skrytě žijící druh rozmanitých stanovišť. Jeden z druhů, jejichž přítomnost na lokalitě se obvykle odhalí až při odchytu na světlo.

Brachinus (***Brachinus***) ***crepitans*** (Linnaeus, 1758) [§O] – **Mor.:** Štramberk env., PP Kamenárka (6474), 29.VI.2013 – 1 ex. (VA lgt., L. Koloničný det. (VA).

Na severní Moravě ojedinělý druh, dosud známý jen z mála recentních lokalit.

Brachinus (***Brachinus***) ***elegans*** Chaudoir, 1842 (= *B. ganglbaueri advena* Schauberger, 1921) [§O, ČS/EN] – **Mor.:** Novosedly (7164), 31.V.–27.VI.2015 – 1 ex. v ZP na slanisku (RE); Násedlovice (7067), 30.III.–24.IV.2019 – 2 ex. v ZP u Trkmanky (RE); Ječmeniště (7262), 27.VI.2020 – 1 ex. na rozmezí pole a stepi (HE); Břeclav, Pohansko (7267), 10.VII.2020 – 1 ex. (LB lgt., RE det.) (RE).

Na jižní Moravě lokální a většinou vzácný druh vlhčích stanovišť.

Brachinus (***Brachinus***) ***psophia*** Audinet-Serville, 1821 [§O, ČS/EN] – **Mor.:** Rakvice (7166), 4.VII.2011 – 7 ex. na polní mokřině 2,5 km JZ (MO); Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 1.V.2014 – 1 ex. na okraji mokřiny (MO); Hostěradice (7063), 1.–31.VIII.2015 – 1 ex. v ZP (48°57′19″N, 16°16′39″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Mikulov (7165), 1.–31.VIII.2015 – 1 ex. v ZP (48°49′20″N, 16°39′45″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Kobylí, Smraďula (7067), 7.V.–29.V.2016 – 1 ex. v ZP, mokřina (RE); Žítková, PR Pod Žitkovským vrchem (7073). 13.V.2018 – 1 ex. (EE lgt., RE det.); Násedlovice (7067), 30.III.–24.IV.2019 – 148 ex. a 24. IV.–8.V.2019 – 35 ex. v ZP u Trkmanky (RE); Uherský Brod (6971), 28.III.2020 – 2 ♂♂, 19.IV.2021 – více ex. observ. (LA); Rohatec, Soboňky (7069), 19.V.2020 – 1 ex. VK lgt., RE det.) (RE); Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 27.VI.2020 – 4 ex. v ekotonu step/pole (MO).

Původně vzácný druh vázaný především na vlhká místa na loukách a pastvinách v okolí větších řek se na J a JV Moravě dále šíří (cf. Veselý et al 2020). Např. na Uherskobrodsku je od prvního nálezu v r. 2004 často pozorován na suchých mezích pod kameny, pod starou vegetací na okrajích polí, v časných jarních měsících někdy i v masovém počtu.

Brachinus (***Brachynidius***) ***explodens*** Duftschmid, 1812 [§O] – **Mor.:** Hrabyně (6174), 16.VIII.2016 – více ex. aktivujících večer pod lampami podél komunikace (L. Koloničný observ. et det.) (ST); Stonava, Křivý důl (6177), 12.VII.2020 – 1 ex. (P. Boža observ. et det.) (ST); Zábřeh u Hlučína (6074), 18.X.2020 – 6 ex. v náplavu Opavy (M. Mantič observ. et det.) (ST).

Do roku 2010 byly na SV Moravě známé jen zcela ojedinělé starší nálezy (Stanovský & Pulpán 2006). Poté se druh postupně začal objevovat na více lokalitách.

Broscus* (*Broscus*) *cephalotes (Linnaeus, 1758) – **Boh.:** Rvenice (5648), 2010 – 1 ex. v ZP (A. Véle lgt., KO det. et coll.) (KO); Ovčáry (5753), 2.VIII.2014 – 1 ex. na písčité pláži Křeneckého jezera (VO); Suchdol nad Lužnicí (7055), 23.V.2015 – 2 ex. v pískovně Cep II (KO). **Mor.:** Mikulov (7165), 1.–31.VIII.2015 – 1 ex. v ZP (48°49′20″N, 16°39′45″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Supíkovice (5669), 15.VII.2015 – 1 ex. v pískovně se sporou vegetací (JK observ. et. det.) (JK); Havířov-Suchá, důl František (6176), 6.VII.2015 – 1 ex. na složišti popílku se sporou vegetací (JK); Dolní Lutyně (6076), 20.VI.2018 – 1 ex. a 4.VII.2018 – 2 ex. v pískovně (RZ); Únanov (7162), 13.VIII.–15.IX.2021 – 1 ex. v ZP v kaolince (NA).

Druh volných, nezastíněných písčitých a písčitohlinitých stanovišť. Vyhledává především pískovny a hliniště. Občas i na okrajích písčitých polí a na březích řek, kde však znatelně ubývá.

Calathus* (*Neocalathus*) *cinctus Motschulsky, 1850 – **Boh.:** Lhota u Kestřan, NPR Řežabinec (6750), 3.IX.2018 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Roudnice nad Labem (5551), 3.–24.VI.2019 – 1 ex., 25.IX.–19.X.2019 – 68 ex. v ZP v pískovně (50°24′54″N, 14°13′23″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Praha – Malá Strana, vrch Petřín (5952), 1.–31.X.2020 – 10 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO). **Mor.:** Pouzdřany, Pouzdřanská step (7065), 29.VIII.2014 – 3 ex. (J. Ryšavý lgt. et 2 ex. coll., VO det. et 1 ex. coll.) (VO).

Xerofilní lokální druh obývající stepi, okraje polí, úhory a pískovny zejména v teplejších oblastech.

Callistus lunatus lunatus (Fabricius, 1775) – **Mor.:** Nechvalín (6968), 20.–30.VII.1997 – 1 ex. (KO); Mikulov (7165), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (48°49′20″N, 16°39′45″E) (MA lgt., VO det.) (VO).

Lokální druh. V Čechách vzácný, na Moravě je mnohem častější. Druh typický pro hliniště, vápencové lomy a jílovité a sprašové, vegetací spoře porostlé půdy.

Calosoma* (*Calosoma*) *maderae maderae (Fabricius, 1775) [§SO, ČS/VU] – **Mor.:** Ratišovice (7062), 6.VII.2019 – 1 ex. ve smíšeném lese navazujícím JZ (JK observ. et det.) (JK).

Xerofilní lokální druh obývající stepi, okraje polí, úhory a podobně. V ČR v současnosti rozšířený především na jižní Moravě. V Čechách uvádí nový nález z Prahy Häckel (2021).

Calosoma* (*Calosoma*) *sycophanta (Linnaeus, 1758) [§O, ČS/VU] – **Boh.:** Polička env., Pustá Rybná, Osada Světy (6262), 1.VII.2020 – 1 ex. (49°41‘38.0“N 16°08‘27.6“E), (D. Leitnerová observ., DS det. based on photography) (DS); Svitavy env., Polička (6263), 17.VII.2020 – 1 ex. na zahradě rodinného domu (M. Klusoňová observ., DS det. based on photography) (DS); Habří env., PR Rač (5349), 6.IX.2020 – 1 torzo (levá krovka), (50.61879°N, 13.92935°E) (L. Hrůzová & DS lgt.) (DS); Točná env., PR Šance (6052), 16.IX.2020 – 2 torza (2 nepárové krovky na dvou místech vzdálených asi 200 m) (49.96853°N, 14.41524°E) (H. Rothová lgt., det. et coll.) (DS). **Mor.:** Klentnice, NPR Děvín (7165), 27.VIII.2018 – 1 ♀ pod kamenem v lese (LT); Mikulovice, Chaloupky (7062), 3.VI.2019 – 1 ex. v doubravě (JK observ. et det.) (JK); Hluboké Mašlůvky, Bábovecký les (7062), 3.VI.2019 – 2 ex. v doubravě (JK observ. et det.) (JK); Božice (7163) 12.VI.2019 – 6 ex. v doubravě u zámečku Samota (JK observ. et det.) (JK); Březany (7164) 12.VI.2019 – 40 ex. v lese u Dolenic (JK observ. et det.) (JK); Ratišovice (7062), 18.VI.2019 – 4 ex. ve smíšeném lese JZ od obce (JK observ. et det.) (JK); Kravsko, Vápenice (7062), 6.VII.2019 – 5 ex. v doubravě (JK

observ. et det.) (JK); Želešice (6865), 25.VI.2020 – 1 ex., v doubravě V od obce (JK observ. et det.) (JK); Pohořelice (7065), 25.VI.2020 – 1 ex. v akátovém porostu v lese Proklatá (JK observ. et det.) (JK).

Lesní druh, žijící především na různých stromech a keřích, často i v alejích a na jednotlivých stromech. V ČR v současnosti rozšířený především na jižní Moravě. Pravděpodobně díky většímu počtu pozorovatelů přibývá počet pozorování v Čechách (viz též Häckel 2021). Až na nález z Klentnice jsou všechna pozorování na Moravě z porostů, kde vrcholila gradace bekyně velkohlavé (*Lymantria dispar*).

Carabus (***Carabus***) ***arvensis arvensis*** Herbst, 1784 [§O] – **Boh.:** Starý Rokytník (5461), 12.VI.–17.VII.2016 – 1 ex. v ZP (MO et VO); Brdy, PP Hřebenec (6448), 13.V.–3.VI.2018 – 2 ex. a 13.VIII.–16.IX.2018 – 2 ex. v ZP (49.57785°N, 13.76669°E) (SD et DS lgt., DS det.); Brdy, PP Třemešný vrch (6448), 29.IX.–13.V.2018 – 2 ex. v ZP (49.57506°N, 13.80758°E) (SD & DS lgt., DS det.). **Mor.:** Kepřník, vrchol (5868), 15.VII.2016 – 1 ex. na subalpínské louce (JK lgt., observ. et det.); Vrbno pod Pradědem, PR Skalní potok (5869), 2.VI.2020 – 5 ex. na okraji smíšeného suťového lesa (JK observ. et det.) (JK).

Lokálně se vyskytující druh polotevřených stanovišť. V nižších polohách žije zpravidla na písčinách a vřesovištích ve světlých borových lesích, v horách nejčastěji v alpínském pásmu.

Carabus (***Carabus***) ***arvensis eremita*** Fischer von Waldheim, 1823 [§O] – **Mor.:** Beskydy, Horní Lomná, Kyčmol (6477), 10.VII.2021 – 5 ex. v ZP (ST).

V Beskydech lokální poddruh pasek a lesních světlin.

Carabus (***Hygrocarabus***) ***variolosus variolosus*** Fabricius, 1787 [§SO, ČS/NT] – **Mor.:** PR Jelení bučina (5869), 11.VI.2018 – 2 ex. v prameništi v bučině (JK observ. et det.) (JK); Vrbno pod Pradědem, PR Suchý vrch (5870), 2.VI.2019 – 1 ex. v prameništi, JK observ. et det. (JK); Vrbno pod Pradědem, PR Skalní potok (5869), 19.VII.2020 – 5 ex. v prameništi ve smíšeném lese, JK observ. et det. (JK).

Reliktní lesní druh vázaný na vlhká místa v zachovalých bukových lesích.

Carabus (***Mesocarabus***) ***problematicus problematicus*** Herbst, 1786 [§O] – **Boh.:** Vysoká Pec, Kraví Skály (5446), 17.VII.2015 – 1 ex. ve staré bučině (suťový les) (JK observ. et det.) (JK).

Lesní druh, lokálně rozšířený zejména v jehličnatých lesích pahorkatin a středních horských poloh.

Carabus (***Platycarabus***) ***irregularis irregularis*** Fabricius, 1792 [§O, ČS/NT] – **Boh.:** Mimoň, vrch Ralsko (5354), 2.IV.2016 – 5 ex. ve dřevě (CH). **Mor.:** Vrbno pod Pradědem, PR Skalní potok (5869), 30.V.2020 – 3 ex. na břehu potoka a prameniště v bučině (suťový les) (JK observ. et det.) (JK); Březina, PR U Výpustku (6766), 15.VI.2021 – 1 ex. v bučině (suťový les) (JK observ. et det.) (JK).

Reliktní lesní druh vázaný na zachovalé, především suťové smíšené a bukové lesy. V současnosti na řadě lokalit ubývá.

Carabus (***Tachypus***) ***auratus auratus*** Linnaeus, 1761 [ČS/VU] – **Boh.:** Krásný Les (5249), 19.V.–13.VII.2015 – 2 ex. a 20.V.–2.VIII.2016 – 4 ex. v ZP na okraji louky 1,3 km V od obce

(MO); Mukařov (5351), 3.VII. 2016 – 23 ex. pozorováno aktivních na louce (CH); Dolní Habartice (5252), 25.V.2017 – 1 ex. (observ.) na hlinité polní cestě (VO), 25.–31.V.2017 – 5 ex. v ZP (MO et VO); Náčkovice (5351), 15.V.2019 – 15 ex. rozjetých na komunikaci, pozorován masívní výskyt na přilehlých polních cestách (KL).

V severních Čechách velmi lokálně se vyskytující druh otevřených stanovišť. I když je v místě výskytu občas hojný, počet lokalit v současnosti ubývá.

Carabus (***Tachypus***) ***cancellatus cancellatus*** Illiger, 1798 [ČS/NT] – **Boh.:** Chýnice, Zbuzovská vápenka (6051), 1.–31.V.2015 – 1 ex. v ZP (50°0′13″N, 14°16′10″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Vrbatův Kostelec – Cejřov (6161), 1.–31.V.2015 – 1 ex. v ZP (49°50′15″N, 15°56′49″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Tisem (6253), 1.–31.V.2015 – 2 ex. v ZP v lomu na vrchu Chlumec (49°45′25″N, 14°36′60″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Leštinka (6161), 1.V.–30.VI.2015 – 6 ex. v ZP v lomu Mikšov (49°50′18″N, 15°58′20″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Škvorec-Třebohostice, (5954), 1.V.–30.VI.2015 – 2 ex. v ZP v lomu na vrchu Na Plachtě (50°1′54″N, 14°43′36″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Manušice (5253), 10.V.–18.VI.2015 – 1 ex. v ZP (MO et VO); Milovice, NPP Milovice-Mladá, 15.V.–12.VI.2021 – 2 ex. v ZP (50°14′23″N, 14°53′59″E) (MO et VO) a 18.IV.– 31.VII.2021 – 5 ex. v ZP (50°14′06″N, 14°53′53″E) (MO et VO); Doubek (5954), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (50°01′29″N, 14°44′04″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Kunice-Všešímy (6054), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (49°55′13″N, 14°41′40″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Tisem (6253), 1.VI.–31.VIII.2015 – 2 ex. v ZP (49°45′07″N, 14°35′56″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Děčín-Březiny (5251), 31.V.–11.VII.2016 – 15 ex. v ZP (MO); NPR Karlštejn, Komárkova step, 10.V.–23.VII.2020 – 3 ex. v ZP (49.94016°N, 14.15816°E) (L. Hrůzová, D. Král & DS lgt., DS det. et coll.) (DS). **Mor.:** Maletín, Švédská cesta (6166), 23.IV.–15.VI.2015 – 1 ex. v ZP (MO et VO); Mikulov (7165), 1.–30.VI.2015 – 7 ex. v ZP (48°49′20″N, 16°39′45″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Staré Hamry, Černá Ostravice (6576), 5.VII.2018 – 1 ex. (ST).

Lokálně se vyskytující druh otevřených stanovišť, dříve obecný druh, hojný i na polích. Na SV Moravě dříve běžnější druh v současnosti téměř vymizel, v Beskydech jsou známé jen ojedinělé nálezy, převážně z lesních okrajů.

Cicindela (***Cicindela***) ***campestris campestris*** Linnaeus, 1758 [§O] – **Mor.:** NPR Králický Sněžník, Stříbrnická (5867), 30.V.2021 – 5 ex. na nezpevněné cestě v rozvolněné smrčině 1160 m n. m. (JK observ. et det.) (JK).

Široce rozšířený a lokálně hojný druh vyhledávající osluněná stanoviště s volným nebo nesouvisle zarostlým půdním povrchem, jako jsou pískovny, lomy, vřesoviště, lesní a polní cesty a meze. Zajímavý výskyt ve vyšší nadmořské výšce.

Cicindela (***Cicindela***) ***sylvatica sylvatica*** Linnaeus, 1758 [§O, ČS/NT] – **Boh.:** Doksy env. (5453), 10.V.2016 – 6 ex. pozorováno na písčité cestě mezi Doksy a Břehyní (CH).

Lesní druh vyhledávající zejména písčité paseky a lesní cesty v rozsáhlejších borových lesích. Mimo větší písčitá území se objevuje jen velmi sporadicky.

Cicindela (***Cicindela***) ***sylvicola*** Dejean, 1822 [§O] – **Boh.:** Králův Dvůr – Levín (6050), 18.–20.VII.2015 – 1 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO); Malá Veleň – Soutěsky (5251), 31.V. a 18.VI.2017 – desítky ex. na hlinitých cestách na okraji kamenolomu (MO observ.). **Mor.:**

Branná, lom (5886), IV.2012 – 5 ex. ve starém vápencovém lomu (JK observ. et. det.) (JK); Kolnovice (5669) IV.2013 – 5 ex., v ekotonu lesa a pískovny (JK observ. et. det.) (JK); Maletín (6166), 23.IV.2015 – 1 ex. na lesní cestě u lomu mezi stovkami ex. *C. campestris* (MO observ).

Druh s lokálním výskytem na volných osluněných písčitých a hlinitých místech: v pískovnách, v lomech, na písčitých lesních cestách a podobně.

Cychrus (***Cychrus***) ***attenuatus attenuatus*** (Fabricius, 1792) – **Boh.:** Malá Veleň – Soutěsky (5251), 25.V.–12.VII.2017 – 9 ex. v ZP pod vrchem Hlídka (MO et VO); Brdy, PR Fajmanovy skály a Klenky (6448), 16.IX.2018–3.V.2019 – 1 ex., 3.V.–7.VI.2019 – 3 ex. a 1. VII.–24.VIII.2019 – 1 ex. v ZP (49.58098°N, 13.72538°E) (SD et DS lgt., DS det. et coll.); Brdy, PR Chynínské buky (6448), 14.IX.2018–1.V.2019 – 1 ex., 1.V.–5.VI.2019 – 1 ex. a 1. VII.–22.VIII.2019– 1 ex. (49.58087°N, 13.73828°E) (SD et DS lgt., DS det. et coll.) (DS); Brdy, PP Míšovské buky (6448), 1.VII.–23.VIII.2019 – 1 ex. v ZP (49.59655°N, 13.73954°E) (SD et DS lgt., DS det. et coll.); Brdy, PP Hřebenec (6448), 13.VIII.–16.IX.2018 – 1 ex. v ZP (49.57785°N, 13.76669°E) (SD & DS lgt., DS det. et coll.) (DS). **Mor.:** Mokré Lazce, Přerovec (6173), 16.IV.2015 – 1 ex. pod dřevem v lese (ST); PR Číhadlo (6766), 23.V.–14. VI.2018 – 1 ex. v ZP v bučině (suťový les) (FO lgt., JK det. et coll. (JK); PR Jelení bučina (5869), 26.V. –19.VII.2018 – 4 ex. v ZP v bučině (suťový les s prameništi) (JK); PR Suchý vrch (5870), 19.V.–12.VII.2019 – 5 ex. v ZP v jehličnatém suťovém lese (JK); PR Březinka (6766), 30.IV.–22.VI.2020 – 4 ex. v ZP v bučině (FO lgt., JK det. et coll. (JK); PR Číhadlo (6766), 23.V.–14.VI.2018 – 1 ex. v ZP v bučině (suťový les) (FO lgt., JK det. et coll. (JK); PR Račí údolí (5667), 8.VI.–4.VII.2021 – 4 ex. v ZP v jedlové bučině (suťový les) (JK); PR U Výpustku (6766), 15.VI.–8.VII.2021 – 3 ex. v ZP v bučině (suťový les) (FO lgt., JK det. et coll. (JK); Beskydy – Horní Lomná, Kyčmol (6477), 10.VII.2021 – 1 ex. v ZP (ST); Dolní Lomná (6478) – 10.VII.2021 – 5 ex., 8.VIII.2021 – 5 ex., 13.IX.2021 – 1 ex. v ZP (ST); Košařiska (6478), 13.IX.2021 – 18 ex. v ZP (ST).

Reliktní lesní druh, vázaný na zachovalejší, nejčastěji suťové smíšené a bukové lesy. V Nízkém Jeseníku je jeho výskyt ojedinělý, v Beskydech lokální.

Cylindera (***Cylindera***) ***germanica germanica*** (Linnaeus, 1758) [§O, ČS/NT] – **Boh.:** NPP Mladá – Benátecký vrch (5755), 15.V.–30.VI.2018 – 2 ex. a 1.–17.VII.2018 – 1 ex. v ZP (ZU); Roudnice nad Labem, NPP Kleneč (5651), 8.VII.2021 – 1 ex. na štěrkopísčité cestě (MO). **Mor.:** Černotín (6472), 1.VI.–31.VIII.2015 – 2 ex. v ZP (49°32′28″N, 17°45′29″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Mikulov (7165), 1.VI.–31.VIII.2015 – 3 ex. v ZP (48°49′20″N, 16°39′45″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Míškovice (6771), 1.–30.VIII.2015 – 3 ex. v ZP (49°16′17″N, 17°31′52″E) (MA lgt., PV det.) (PV); Starý Hrozenkov (7073), 1.–30.VIII.2015 – 1 ex. v ZP v lomu (48°58′22″N, 17°52′10″E) (MA lgt., PV det.) (PV); Kurovice, Kurovický lom (6771), 1.–31.VIII.2015 – 2 ex. v ZP v lomu (49°16′25″N, 17°31′17″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Únanov (7162), 10.VII.2021 – 1 ex. v kaolince (NA).

Lokální druh teplejších stanovišť s volnou, nejčastěji jílovitou nebo hlinitou půdou s řídkou, nezapojenou vegetací. Zdá se, že v Čechách se počet lokalit mírně zvyšuje. Na Moravě, zejména ve sprašových oblastech, je mnohem častější.

Cylindera (***Eugrapha***) ***arenaria viennensis*** (Schrank, 1781) [§O] – **Mor.:** Únanov (7162), 10.VII.2021 – 1 ex. v kaolince (NA); Bohuslavice (6075), 29.VII.2021 – 10 ex. v pískovně (RZ observ., foto et det.) (RZ).

Velmi lokální druh žijící na většinou izolovaných písčitých a jílovitopísčitých místech bez vegetace. Často jde o druhotné plochy jako jsou pískovny, hliniště, skládky a odkaliště popílku.

Cymindis (***Cymindis***) ***angularis*** Gyllenhal, 1810 – **Boh.:** Hřivčice (5649), 25.IX.–19.X.2019 – 4 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (50°20′31″N, 13°56′27″E) (VO); Milovice, NPP Milovice-Mladá, 19.IX.–18.X.2020 – 2 ex. v ZP ((50°14′23″N, 14°53′59″E) (MO et VO); Teplice (5348), 6.–25.VIII.2020 – 4 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO); Záboří nad Labem (5958) 4.–11.V.2021 – 1 ex. a 2.–20.IX.2021 – 5 ex. v ZP v lese 1 km na J od obce (MK); Nová Lhota (6057), 28.IV.2021 – 1 ex. pod kamenem na stepní stráni (MK); Provodínské kameny (5353), 4.IX.2016 – 3 ex. (KL); Milovice, NPP Milovice-Mladá (5755), 11.X.2020 – 1 ex. (ZU). **Mor.:** Bzenec, PP Vojenské cvičiště (7069), 18.VI.2012 – 1 ex. (KO lgt. et coll., RE det.) (KO); Pouzdřany (7065), 27.IX.2021 – 1 ex. (RZ); Únanov (7162), 11.VI. –10.VII.2021 – 9 ex. a 13.VIII.–15.IX.2021 – 13 ex. v ZP v kaolince (NA).

Xerofilní druh přírodně zachovalých lokalit. Recentně nejčastější druh rodu.

Cymindis (***Cymindis***) ***axillaris axillaris*** (Fabricius, 1794) [ČS/VU] – **Boh.:** Husinec (5852), 11.X.2015–9.V.2016 – 6 ex. v ZP na skalní stepi (MO et VO).

Xerofilní stenotopní druh přírodně zachovalých lokalit, žije výhradně na stepích, skalních stepích, xerotermních pastvinách a otevřených vřesovištích.

Cymindis (***Cymindis***) ***cingulata*** Dejean, 1825 – **Mor.:** Stupava, Stará hráz (6869), 18.IX.2014 – 1 ex. v nivě Kyjovky (VO); Keprník, vrchol (5868), 25.VI.–17.IX.2016 – 5 ex. v ZP na subalpínské louce (JK); PR Číhadlo (6766), 23.V.–14.VI.2018 – 1 ex. v ZP v bučině (suťový les) (FO lgt., JK det. et coll.) (JK); Vrbno pod Pradědem, PR Suchý vrch (5870), 2.VI.–24.VI.2019 – 1 ex. v jedlině (suťový les) (JK); Huslenky, PP Uherská (6774), 28.IV.2020 – 1 ex., lgt. et coll. KO, RE det.; Lukov u Zlína, PP Vela (6672), 21.IV.–9.V.2021 – 1 ex. v ZP, 17.VI.2021 – 1 ex. (vše KO lgt. et coll., RE det.) (KO); Malenovice, PR Malenovický kotel (6476), 2.–16.VI.2021 – 1 ex. v ZP, 930 m n. m. (KO lgt. et coll., RE det.) (KO); Vlčková, PP Ondřejovsko (6672), 9.–26.V.2021 – 1 ex. v ZP (KO lgt. et coll., RE det.) (KO); Únanov (7162), 11.VI.–10.VII.2021 – 1 ex. a 13.VIII.–15.IX.2021 – 2 ex. do ZP v kaolince (NA).

Převážně v podhorských a horských oblastech v lesích lokálně a skrytě žijící, většinou jednotlivě nalézaný druh. Jeden z druhů, jejichž přítomnost na lokalitě se obvykle odhalí až při odchytu do zemních pastí.

Cymindis (***Cymindis***) ***humeralis*** Geoffroy, 1785 – **Boh.:** Hamr na Jezeře (5354), 26.V.2020 – 1 ex. (KL). **Mor.:** Želešice (6865), 7.VI. –27.VI.2017 – 4 ex. v ZP v doubravě J od řeky Bobravy (J. Podešva lgt., ST det., JK coll.) (JK).

Lokální druh krátkostébelných travnatých porostů, jako stepí, skalních stepí, pastvin, okrajů lomů atd. Dříve nejčastější druh rodu dlouhodobě ubývá.

Cymindis (***Tarsostinus***) ***macularis*** Fischer von Waldheim, 1824 [ČS/NT] – **Mor.:** Bzenec, střelnice (7069), 27.VIII.2009 – 1 ex. (KO lgt. et coll., V. Křivan det.) (KO).

Stenotopní psamobiont, potvrzení stálého výskytu v oblasti.

Cymindis* (*Tarulus*) *vaporariorum (Linnaeus, 1758) [ČS/VU] – **Boh.:** Srní u České Lípy (5353), 22.X.2017 – 1 ♀ v trouchnivém borovém pařezu na okraji vřesoviště (LT).

Reliktní a velmi lokální druh zachovalých lokalit, žije především v chladnějších polohách a na kyselých půdách.

Demetrias* (*Demetrias*) *atricapillus (Linnaeus, 1758) – **Boh.:** Čejetičky (5555), 24.II.2020 – 1 ex. (ZU); Mcely, NPR Čtvrtě (5756), 30.V.2021 – 3 ex., 7.VIII.2021 – 3 ex. a 26.IX.2021 – 2 ex., vždy pozorovány desítky ex. na jižním okraji NPR (ZU); Kosmonosy, PR Vrch Baba u Kosmonos (5555), 1.V.2021 – 1 ex. (ZU).

Expanzívní druh, častý zvláště na stanovištích s vyšší bylinnou vegetací typu mezí, úhorů a břehů vod. V Čechách se plošně říří a v řadě oblastí se stal běžnou součástí fauny.

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758) – **Boh.:** Praha-Dubeč, PP Lítožnice (5953), 29.VII.2017 – 5 ex. na dně vypuštěného rybníka (VE), z toho 1 ex. immaturní (VE); Praha-Běchovice (5953), 21.VIII.2017 – 1 ex. pod kamenem na okraji úhoru blízko VKP Křídový výchoz (VE); Bludov (6157), 9.IX.2017 – 1 ex. na polním mokřadu (MK); Praha-Šeberov, PP Hrnčířské louky (5953), 20.V.2018 – 1 ex. na vysychajících lučních mokřinách u rybníka Brůdek (VE); Markvarec (5748a), 12.V.2015 – 1 ex. (M. Michalega lgt. et coll., MO det.) (MO); Mariánské Radčice (5448), 29.V.2020 – 10 ex., více ex. observ. (MO et VO), 9.VI.2020 – 5 ex., více ex. observ. (P. Krásenský lgt. et det.), 4.VII.2020 – 3 ex., více ex. observ. (VO); Most-Komořany, Důl ČSA (5446), 12.VI.2020 – 1 ex. v mokřině při severním okraji velkolomu (MO); Velký Rečkov (5555), 16.VI.2020 – 1 ex. (ZU); Labské pískovce, PR Holý vrch (5250), 25.VIII.–24. IX.2020 – 1 ex. v okenní pasti (P. Brůha & M. Michalega lgt., MO det. et coll.) (MO); **Mor.:** Mohelnice-Křemačov (6267), 16.VI.2015 – více ex. na zaplavované louce v nivě Mírovky (MO et VO); Kojákovice (Jílovice), PR Ruda u Kojákovic (7054), 5.VI.2016 – 1 ex. na břehu rybníka (RE); Šumice (6972), 11.VI.2017 – 4 ex. (RE); Bílá Voda (5567), 15.IX.2017 – 1 ex. v kůrovcovém lapači při okraji paseky (ST); Vidnava (5669), 22.V.2018 – 1 ex. (T. Sitek lgt. et coll., ST det.) (ST); Břeclav, Pohansko (7267), 3.VI.2020 – 1 ex. (LB lgt. et coll., RE det.) (RE); Petřvaldík (6274), 23.VI.2020 – 1 ex. (M. Mantič lgt., coll. et det.) (ST); Zábřeh u Hlučína (6074), 18.X.2020 – 2 ex. v náplavu Opavy (M. Mantič lgt., coll. et det.) (ST); Staré Hamry, vodní nádrž Šance (6576), 14.VI.2017 – 1 ex. a 12.VII.2017 – 2 ex. na dně vypuštěné přehrady, v bahnité prohlubni u bývalého náspu (M. Roháčová lgt., coll. MBF, ST det.) (ST); PR Račí údolí (5667), 10.V.–6.VIII.2021 – 1 ex. v okenní pasti na břehu potoka v listnatém lese (JK); Hustopeče nad Bečvou (6473), 10.VII.2015 – 2 ex. pod vegetací na štěrkové lavici řeky Bečvy u přítoku Mřenky (JK); Sušice (6571), 3.VI.2021 – 1 ex. v letu na xerotermní louce na JV okraji obce (JK).

Vlhkomilný druh, původně typický pro vlhké louky v nivách větších řek. Dnes se mnohem častěji nachází na příležitostných stanovištích, jako jsou dna vypuštěných rybníků a luční a polní mokřiny. Již pouhý výčet nálezů dokládá, že zejména v Čechách původně velmi vzácný druh se postupně rozšířil na většinu území ČR. Na SV Moravě je dosud lokální a jednotlivě nalézaný, výskyt byl ale potvrzen i ve Vidnavském výběžku.

Dolichus halensis (Schaller, 1783) – **Boh.:** Zahrádky pr. Česká Lípa (5353), 10.IX.2016 – 13 ex. (KL); NPP Jestřebské slatiny (5353), 8.VII.–1.VIII.2018 – 1 ex. (ZU). **Mor.:** Mikulov, Janíčův vrch (7165), 1.–30.VI.2015 – 2 ex. a 1.–31.VIII.2015 – 22 ex. v ZP v lomu

(48°48′41″N, 16°39′30″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Míškovice (6771), 1.–31.VIII.2015 – 15 ex. v ZP (49°16′17″N, 17°31′52″E) (MA lgt., PV det.) (PV); Želešice (6865), 7.VI.–27.VI.2017 – 1 ex. v ZP v doubravě jižně od řeky Bobravy (J. Podešva lgt. ST det., JK coll.) (JK).

Xerofilní druh obývající zejména písčité a hlinitopísčité okraje polí a úhorů v teplejších oblastech. V Čechách jde o potvrzení výskytu na Českolipsku.

Dromius (***Dromius***) ***angustus angustus*** Brullé, 1834 – **Mor.:** Hodslavice, PR Trojačka (6474), 27.V.2020 – 1 ex. (KO lgt. et coll., RE det.) (KO); Poteč, lesní rezervace Ščúrnica (6874), 12.III.2006 – 1 ex. (KO lgt. et coll., V. Křivan det.) (KO); Beskydy – Velká Čantoryje (6378), 2.XI.2021 – 1 ex. pod kůrou smrku (RZ); Chlebovice (6375), 22.XII.2020 – 1 ex. (RZ); Frýdek-Místek (6375), 27.XII.2017 – 3 ex. pod kůrou jedle na kopci Štandl (RZ); Ostrava-Plesná (6174), 6.XII.2020 – 2 ex. (RZ); Poteč (6874), 19.XII.2021 – 3 ex. (RZ); Rožnov pod Radhoštěm (6574), 23.XII.2020 – 1 ex. (RZ); Skřipov (6173), 10.I.2021 – 1 ex. (RZ).

V Čechách vzácný a lokální, na Moravě častější druh, nalézaný zejména v zachovalých lesních porostech.

Dromius (***Dromius***) ***kuntzei*** Polentz, 1939 – **Mor.:** Poteč (6874), 19.XII.2021 – 1 ♂ pod kůrou jedle na okraji lesa (RZ).

Vzácný a velmi lokální druh. Vyhledává staré jedlové porosty.

Dromius (***Dromius***) ***laeviceps*** Motschulsky, 1850 [ČS/NT] – **Mor.:** Karviná (6177), 25.XI.2020 – 3 ex. a 17.XII.2021 – 10 ex. pod kůrou jírovce v zámeckém parku (RZ); Ostrava-Přívoz (6175), 15.XII.2021 – 1 ex. pod kůrou jírovce na bývalém hřbitově (RZ).

Vzácný druh, v ČR rozšířený především ve Slezsku. Od roku 2006 byly známé jen jednotlivé nálezy.

Dromius (***Dromius***) ***quadraticollis*** A. Morawitz, 1862 – **Mor.:** Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry (6576), 20.VII.2014 – 1 ex. na UV světlo (VA); Staré Hamry, Černá Ostravice (6576), 4.VII.2016 – 1 ex. (M. Roháčová lgt., coll. MBF, ST det.) (ST); Karviná-Doly (6177), 14.XI.2017 – 8 ex. a 10.XI.2018 – 1 ex. vše pod kůrou javoru (RZ); Frýdek-Místek (6375), 27.XII.2017 – 2 ex. pod kůrou jedle na kopci Štandl (RZ); Šilheřovice (6075), 11.II.2019 – 1 ex. v zámeckém parku (RZ); Ostrava-Svinov (6275), 31.XII.2019 – 3 ex. pod kůrou javoru (RZ); Velká Polom (6174), 20.XII.2020 – 1 ex. (RZ); Chlebovice (6375), 22.XII.2020 – 2 ex. (RZ); Palkovice-Myslík (6375), 25.XII.2020 – 1 ex. pod kůrou jedle (RZ); Luhačovice (68–6972), 27.XII.2020 – 1 ex. a 2.III.2021 – 3 ex. pod kůrou u pat starších jedlí v lese (P. Jáchymek lgt., LA det. et coll.) (LA); Horní Suchá (6176), 2.XI.2019 – 1 ex. pod kůrou javoru (RZ).

Lokální a vzácný druh, v ČR více rozšířený jen na SV Moravě. Z většiny zdejších dříve známých lokalit vymizel. Nálezy v Luhačovicích potvrzují výskyt v oblasti. Doposud zde bylo známo jen několik ojedinělých nálezů. Lesnímu porostu ale hrozí zánik v důsledku intenzivní těžby.

Dromius (***Dromius***) ***schneideri*** Crotch, 1871 – **Boh.:** Bělá pod Bezdězem, hájenka Bílý kámen (5454), 8.VII.2015 – 1 ex., feromonová past na kozlíčky rodu *Monochamus* na borovici, FO lgt., JK det. et coll. (JK); Břehyně (5454), 12.II.2016 – 15 ex. pod kůrou borovic (KL); Prášily, Šerlův dvůr (6846), 26.VIII.2017 – 1 ex. oklepem borových větví u říčky

Křemelná, 830 m n. m. (VA), 24.VIII.2019 – 1 ex. (KO lgt. et coll., VO det.) (KO). **Mor.:** Frýdek-Místek (6375), 27.XII.2017 – 2 ex. pod kůrou jedle na kopci Štandl (RZ); Ostravice (6476), 27.XII.2017 – 3 ex. pod kůrou borovice (RZ); Bílovec – Stará Ves (6273), 10.I.2021 – 1 ex. pod kůrou jírovce (RZ).

Lesní druh, vyhledávající zvláště borové porosty.

Drypta (***Drypta***) ***dentata*** (P. Rossi, 1790) – **Boh.:** Záboří nad Labem, PR Na hornické (5957), 19.V.2021 – 2 ex. v mokřadu (MK); Kutná Hora – Karlov (6057), 27.V.2021 – 1 ex. na rudeálu (MK); Kutná Hora – Turkaňk (6057), 16.IV.2021 – 1 ex. v detritu na louce (MK); Nové Dvory, PP Nový rybník (6058), 26.VII.2021 – 1 ex. v mokřadní vegetaci (MK); Zbyslav (6058), 29.III.2021 – 1 ex. pod kamenem a 25.IV.2021 – 1 ex. v mokřadu (MK); Žehušice (6058), 31.X.2021 – 2 ex. v padlé trouchnivé bříze (MK); Praha-Šeberov, PP Hrnčířské louky (5953), 19.IV.2018 – 2 ex. na svahu strouhy ústící do Kunratického potoka, 6.X.2018 – 40 ex. v trsech vysokých sítin na nesečené části louky V od rybníka Brůdek (VE), 6.IX.2020 – 2 ex. na vlhké louce (50.0041733N 14.5106414E) (Š. Zeman lgt., det. et coll.) (DS); Lysá nad Labem (5755), 11.VI.2020 – 4 ex. v mokřadu Žabák (LT).

Expanzívní druh vyhledávající poněkud vlhčí stanoviště s porosty vyšších trav. V Čechách se v současnosti plošně šíří (viz Stanovský et Boukal 2021). Populační hustota může být na vhodných místech i velmi vysoká, jak bylo pozorováno v PP Hrnčířské louky.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***agnatus*** (Motschulsky, 1844) – **Mor.:** Ostrava-Třebovice (6175), 16.V.2018 – 5 ex. na odkališti elektrárenského popílku (RZ); Proskovice (6275), 4.VI.2021 – 1 ex. na bahnitém nezarostlém břehu řeky Odry (RZ).

Lokální druh zachovalých volných písčitých a hlinitopísčitých břehů vod. Výskyt na odkališti naznačuje určitou adaptabilitu na náhradní biotopy.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***chalceus*** (Erichson, 1837) [ČS/CR] – **Mor.:** Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 25.IV.2015 – 1 ex. (RE); Rakvice, Trkmanský dvůr (7167), 20.IV.2016 – 2 ex. a 3.V.2017 – 11 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Rakvice env., PP Trkmanec-Rybníčky (7167), 20.VII.2019 – 5 ex. na UV světlo (VA lgt. et coll., P. Bulirsch det.) (VA); Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 24.VII.2021 – 9 ex. na UV světlo (VA lgt. et coll., LT det.) (VA).

Halobiont. Stálý recentní výskyt je znám jen z jihomoravských slanisek.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***chalybaeus gibbifrons*** (Apfelbeck, 1899) [ČS/CR] – **Mor.:** Rakvice env., PP Trkmanec-Rybníčky (7167), 20.VII.2019 – 1 ex. na UV světlo (VA lgt. et coll., P. Bulirsch det.) (VA); Břeclav, Pohansko (7267), 29.V.2021 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Valtice env., NPP Rendezvous (7266), 19.VI.2021 – 2 ex. na UV světlo (VA lgt. et coll., LT det.) (VA); Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 24.VII.2021 – 4 ex. na UV světlo (VA lgt. et coll., LT det.) (VA).

Halobiont. Stálý recentní výskyt je znám jen z jihomoravských slanisek.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***intermedius*** (Putzeys, 1846) [ČS/NT] – **Boh.:** Konětopy (5753), 3.VIII.2014 – 3 ex. v pískovně (VO); Chotíkov (5841), 4.X.2015 – 2 ex. na břehu Ohře (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Michalovy Hory, Kosí potok (6042), 4.X.2015 – 4 ex.

(EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Trutnov-Libeč (5361), 19.V.2016 – 2 ex. na břehu Debrnského potoka nad ústím do odkalovací nádrže (VO); Ludvíkov pod Smrkem (5057), 24.VII.2018 – 1 ex. v kolmém břehu Lomnice (HE lgt. et coll., P. Bulirsch det.) (HE). **Mor.:** Kozinec, břeh Olše (6176–6177), 15.VII.2012 – 1 ex. (KO lgt. et coll., RE det.) (KO); Dolní Lutyně (6076), 4.VII.2018 – 1 ex. v pískovně (RZ); Proskovice (6275), 4.VI.2021 – 2 ex. na bahnitém nezarostlém břehu řeky Odry (RZ).

Nehojný druh zachovalých hlinitých a bahnitých břehů vod.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***nitidus nitidus*** (Dejean, 1825) [ČS/NT] – **Mor.:** Ostrava--Polanka (6275), 23.VI.2017 – 1 ex. na štěrkovém břehu řeky Odry (RZ).

Nehojný a lokální druh žijící zejména na bahnitých a hlinitých březích nížinných vod.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***politus politus*** (Dejean, 1825) – **Boh.:** Hradec Králové, PP Na Plachtě (5861), 29.VI.2018 – 1 ex. na světlo (MM lgt. et coll., RE det.) (RE).

Častější druh rodu. Žije na písčitých a hlinitopísčitých březích vod.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***rufipes*** (Dejean, 1825) [ČS/VU] – **Mor.:** Miroslav, NPP Miroslavské kopce (7063), 6.IX.2014 – 1 ex. (KO lgt. et coll., VO det.) (KO); Konice (7162), 29.V.2021 – 16 ex. ve sprašové hlíně pod stěnou na plochách s řídkou vegetací (HE).

Vzácný, skrytě žijící stenotopní stepní druh.

Dyschiriodes (***Dyschiriodes***) ***salinus striatopunctatus*** (Putzeys, 1846) [ČS/RE] – **Mor.:** Valtice env., NPP Rendezvous (7266), 30.IV.2018 – 1 ex. na UV světlo (T. Sitek lgt. et coll., P. Bulirsch det.) (VA).

Halobiont, v ČR velmi vzácný druh. V Čechách vyhynulý, poslední známý nález na Moravě uvádí Skoupý (2004): Velké Němčice, VI.1980 – 2 ex. (J. Pulpán lgt., det. et coll.). Potvrzení výskytu na Moravě a v ČR po 38 letech.

Dyschiriodes (***Chiridysus***) ***strumosus*** (Erichson, 1837) [ČS/CR] – **Mor.:** Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 6.V.2017 – 1 ex. vyšlapán na nezastíněném holém bahnitém břehu potoka Včelínek (LT, revid. P. Bulirsch) (LT).

Halobiont, v ČR velmi vzácný druh. V Čechách byl nalezen na jediné, dnes již zaniklé lokalitě v Bylanech u Mostu (Strejček & Honců 1977, Skoupý 2004). Na jižní Moravě byl rozšířen na více lokalitách. Poslední publikovaný údaj z Nového Přerova pochází z roku 1990 (Benedikt & Těťál 1991). Potvrzení výskytu na Moravě a v ČR.

Dyschirius angustatus (Ahrens, 1830) [ČS/VU] – **Mor.:** Oleksovice, PP Oleksovické vřesoviště (7163), 29.V.2021 – 2 ex. v malé pískovně na volných nebo řídce porostlých plochách (HE).

Druh otevřených písčitých stanovišť, často žijící i na suchých bezvodých místech.

Dyschirius digitatus (Dejean, 1825) [ČS/NT] – **Boh.:** Bojmany, PP Žehušická obora (6058), 23.V.2017 – 1 ex. (MK lgt. et coll., VE det.) a 19.VIII.2021 – 6 ex. na břehu řeky Doubravy (MK). **Mor.:** Veselá (6772), 14.IX.2016 – 2 ex. na břehu Dřevnice (EE lgt. et coll, RE det.) (RE); Litovel-Březové (6368), 17.VI.2021 – 1 ex. (RZ).

V Čechách velmi lokální druh s vazbou na zachovalé břehy vod.

Elaphrus (***Elaphroterus***) ***aureus aureus*** P. W. J. Müller, 1821 – **Boh.:** Trutnov-Libeč (5361), 19.V.2016 – 2 ex. na břehu Debrnského potoka nad ústím do odkalovací nádrže (VO). **Mor.:** Bzenec (7069), 21.V.2021 – 1 ex. na písečném břehu řeky Moravy (RZ).

Lokální druh polostinných písčitých a hlinitopísčitých břehů neznečištěných řek.

Elaphrus (***Neoelaphrus***) ***uliginosus*** Fabricius, 1762 [ČS/NT] – **Boh.:** Most, Jezero Most env. (5447), 14.V.2012 – 1 ex. (M. Holec lgt., MO det. et coll.) (MO); Příbram-Placy (6349), 30.IV.2014 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt., VO det. et coll.) (VO); Praha-Šeberov, PP Hrnčířské louky (5953), 19.IV.2018 – 1 ex. na lučních mokřinách severně od rybníka Brůdek (VE). **Mor.:** Nové Mlýny, NPR Křivé jezero, 9.XI.2014 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 25.IV.2015 – 1 ex. (RE); Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 14.IV.2017 – 2 ex. vyšlapány z močálu na okraji pastviny (LT); Kunovice (6970), 13.V.2017 – 1 ex. v Abrahámově cihelně (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Oleksovice (7063), 27.VI.2020 – 1 ex. na zasolené mokré louce (HE); Zábřeh u Hlučína (6074), 18.X.2020 – 6 ex. v náplavu řeky Opavy (M. Mantič lgt., det. et coll.) (ST).

Nehojný a lokální druh s výskytem na plochých, podmáčených a vegetací zarostlých březích mělkých tůní a mokřin. Na SV Moravě je velmi vzácný, potvrzení recentního výskytu.

Harpalus (***Cryptophonus***) ***melancholicus melancholicus*** Dejean, 1829 [ČS/VU] – **Mor.:** Uherský Brod – Těšov (6971), 2.VIII.2021 – 1 ♂ ve světelném lapáku (FK lgt., LA det. et coll.) (LA).

Psamobiont, žijící téměř výhradně na volných vátých pískách, v Čechách vzácný a pravděpodobně ubývající druh. Nový pro Uherskobrodsko, nejbližší stálý výskyt je zřejmě v oblasti vátých písků na Bzenecku.

Harpalus (***Cryptophonus***) ***tenebrosus*** Dejean, 1829 – **Boh.:** Praha-Zbraslav (6052), 6.VI.2018 – 1 ex. v pískovně u soutoku Berounky a Vltavy (MA lgt., VO det.) (VO). **Mor.:** Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 12.VII.2015 – 1 ex. a 7.VIII.2015 – 1 ex., vše na světlo (RE); Hostěradice (7063), 1.–31.VIII.2015 – 1 ex. v ZP (48°57′19″N, 16°16′39″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Mikulov, Janíčův vrch (lom) (7165), 1.–31.VIII.2015 – 2 ex. v ZP (48°48′41″N, 16°39′30″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Nový Přerov, slanisko (7164), 12.IX.2015 – 1 ex. (RE); Slup, PP Ječmeniště (7262), 1.VIII.2018 – 6 ex. na světlo (LM lgt., RE det. et coll.) (RE); Dubňany, Kosteliska (7068), 10.VII.2020 – 1 ex. na světlo (RE); Štramberk (6474), 13.VIII.2021 – 2 ex. na světlo (RZ).

Xerofilní druh. V současnosti se plošně šíří zvláště na úhorech a ruderálních stanovištích s porosty *Daucus carota* v teplejších oblastech.

Harpalus (***Harpalus***) ***albanicus*** Reitter, 1900 – **Mor.:** Mikulov (7165), 19.VIII.2021 – 17 ex. na vinici pod vegetací (LT lgt. et det., 11 ex. coll. LT, 6 ex. coll. VO); Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 12.IV.2018 – 2 ex. (KL).

V ČR pouze na jižní Moravě. Nehojný druh zvláště vinařských oblastí.

Harpalus (***Harpalus***) ***anxius*** (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Praha – Císařský ostrov (5852), 31.VII.2018 – 1 ♂ do světelného UV lapače na hrázi Vltavy v areálu ÚČOV (VE).

Nejčastější psamobiont, na vhodných písčinách většinou hojný. Přílet na světlo však u tohoto druhu nebyl dosud pozorován ani publikován.

Harpalus (***Harpalus***) ***caspius*** (Steven, 1806) – **Boh.:** Praha – Malá Strana, vrch Petřín (5952), 8.V.–18.VII.2020 – 59 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO). **Mor.:** Pouzdřany, Pouzdřanská step (7065), 1.VI.2015 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Medlovice, Medlovický lom (6969), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (49°03′01″N, 17°15′50″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Mikulov (7165), 1.–30.VI.2015 – 2 ex. v ZP (48°49′20″N, 16°39′45″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Slatinky (6468), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (49°32′21″N, 17°5′0″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Hostěradice (7063), 1.–31.VIII.2015 – 1 ex. v ZP (48°57′19″N, 16°16′39″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Krčmaň (6469), 28.IV.2021 – 1 ex. (RZ).

Xerofilní druh. Jako většina stepních druhů vyžaduje extenzívní způsob obhospodařování a přítomnost míst s méně zapojenou vegetací.

Harpalus (***Harpalus***) ***flavescens*** (Piller et Mitterpacher, 1783) [ČS/NT] – **Boh.:** Hlízov (6057), 11.VIII.2021 – 2 ex. na písčině v lese 1km S od obce (MK); Srní (5353), 18.IX.2021 – 4 ex. v pískovně, po setmění pozorovnáno větší množství aktivních ex. (KL). **Mor.:** Bzenec (7069), 20.V.2021 – 2 ex. (RZ).

Psamobiont vázaný výhradně na volné váté písky, v místě výskytu bývají občas početné populace.

Harpalus (***Harpalus***) ***flavicornis flavicornis*** Dejean, 1829 [ČS/EN] – **Mor.:** Oleksovice, vrch Dvorská **(**7063), 28.V.2021 – 1 ex. při okraji pole (VE).

Stenotopní stepní druh, v ČR lokálně jen na jižní Moravě.

Harpalus (***Harpalus***) ***hirtipes*** (Panzer, 1796) [ČS/VU] – **Mor.:** Bzenec-Přívoz (7069), 13.VIII.2021 – 1 ex. na světlo (VK lgt. et coll., RE det.) (RE).

Psamobiont vázaný výhradně na volné váté písky. Nálezy na Bzenecku jsou v současnosti jen velmi sporadické.

Harpalus (***Harpalus***) ***laevipes*** Zetterstedt, 1828 – **Boh.:** Dobříš (6251), 1.–31.VIII.2015 – 1 ex. v ZP (49°45′39″N, 14°10′25″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Kunice-Všešímy (6054), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (49°55′13″N, 14°41′40″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Vrbatův Kostelec – Cejřov (6161), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (49°50′15″N, 15°56′49″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Tisem (6253), 1.VI.–31.VIII.2015 – 2 ex. v ZP (49°45′7″N, 14°35′56″E) (MA lgt., VO det.) (VO).

Spíše podhorský až horský druh, v nižších polohách jen lokálně, obvykle v lesních porostech v nivách potoků.

Harpalus (***Harpalus***) ***modestus*** Dejean, 1829 [ČS/NT] – **Boh.:** Zahořany (5451), 10.V.2014 – 2 ex. na bílé stráni (MO); Křenek, Křenecká tůň (5753), 9.V.2021 – 1 ex. na písčitém okraji pastviny (VO). **Mor.:** Novosedly (7164), 27.VIII.2019 – 1 ♀ v zarůstající části pískovny u Dyje (LT); Dubňany, Ptačí park Kosteliska (7068), 7.VI.2020 – 1 ex. (KO lgt. et coll., RE det.) (KO); Oleksovice, vrch Dvorská **(**7063), 28.V.2021 – 1 ex. při okraji pole (VE).

Xerofilní druh, častější pouze v písčitých oblastech. Jinde zpravidla jen velmi lokálně a jednotlivě.

Harpalus (***Harpalus***) ***picipennis*** Duftschmid, 1812 [ČS/NT] – **Boh.:** Hlízov (6057), 11.VIII.2021 – 2 ex. na písčině v lese 1km S od obce (MK). **Mor.:** Nové Mlýny, ostrovy

u Dolních Věstonic (7165), 2.V.–22.V.2020 – 2 ex. v ZP na písčině se sporou vegetací (JK lgt. et coll., ST det.) (JK); Sušice (6571), 3.VI.2021 – 10 ex. v ZP na xerotermní louce na JV okraji obce (JK lgt., ST det. et coll.) (JK).

Psamobiont vázaný na volné písčité plochy různého typu.

Harpalus (***Harpalus***) ***politus politus*** (Dejean, 1829) [ČS/NT] – **Boh.:** Bečov (5548), 22.IV.2020 – 6 ex. (KL).

Charakteristický stepní druh, v ČR známý především z xerotermních oblastí Českého krasu a Českého středohoří.

Harpalus (***Harpalus***) ***progrediens*** Schauberger, 1922 [ČS/NT] – **Boh.:** Černěves (5551), 27.VIII.2013 – 7 ex., 28.IV.2014 – 4 ex., vše v lužním lese u Labe (MO). **Mor.:** Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 31.V.–27.VI.2015 – 2 ex. v ZP (RE).

Lokální a zpravidla nehojný druh zachovalých vlhkých luk a lužních porostů v okolí větších vodních toků.

Harpalus (***Harpalus***) ***solitaris*** Dejean, 1829 – **Boh.:** Kubova Huť (7048), 4.VII.2021 – 1 ♀ na podmáčené louce pod Boubínem (CHKO Šumava) (LT).

Charakteristický druh lesních světlin a pasek. Častější je v horách, v nižších polohách se vyskytuje jen lokálně v písčitých lesích.

Harpalus (***Harpalus***) ***zabroides*** Dejean, 1829 [ČS/NT] – **Mor.:** Kurdějov env., PP Kamenný vrch (7066), 25.VII.2019 – 1 ♂ na UV světlo (VA lgt. et coll., LT det.) (VA); Oleksovice, vrch Dvorská (7063), 28.V.2021 – 1 ♂ při okraji pole (VE); Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 24.VII.2021 – 1 ♂ + 1 ♀ na UV světlo (VA lgt., det. et coll., LT revid.) (VA).

Lokální druh, vyskytující se především na sprašových půdách nejteplejších vinařských oblastí Čech a Moravy.

Chlaenius (***Chlaeniellus***) ***nigricornis*** (Fabricius, 1787) – **Boh.:** Příbram-Placy (6349), 30.IV.2014 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Vrbatův Kostelec – Cejřov (6161), 1.–31.V.2015 – 2 ex. v ZP (49°50′15″N, 15°56′49″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Onšovec (6256), 12.VIII.2017 – 3 ex. na břehu nádrže Švihov (MK); Praha-Zbraslav (6052), 30.IV.2018 – 1 ex. a 6.IX.2018 – 1 ex. u soutoku Berounky a Vltavy (MA lgt., VO det.) (VO); Lomnice, Velká Podkrušnohorská výsypka (5741), 17.V.2020 – 1 ex. na bahnitém břehu vodní nádrže s nižší vegetací (HE); Jakub, Ovčárecký mokřad (6058), 23.IV.2020 – 2 ex, 9.V.2020 – 1 ex. a 21.V.2020 – 2 ex. v mokřadu (MK); Zbyslav (6058), 15.VII.2021 – 3 ex. v mokřadu (MK).

Hygrofil, spíše jednotlivě se vyskytující na rozmanitých nezastíněných mokřadech.

Chlaenius (***Chlaeniellus***) ***nitidulus*** (Schrank, 1781) – **Boh.:** Lomnice, Velká Podkrušnohorská výsypka (5741), 28.V.2017 – 1 ex., 9.V.2020 – 3 ex. a 17.V.2020 – 2 ex. na bahnitém břehu vodní nádrže s nižší vegetací (HE). **Mor.:** Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 1.V.2014 – 1 ex. na okraji jezera (MO).

Nehojný druh, vyhledávající především nezastíněné hlinité nebo hlinitopísčité břehy vod s nezapojenou vegetací.

Chlaenius* (*Chlaeniellus*) *tristis tristis (Schaller, 1783) [ČS/NT] – **Boh.:** Chlum u Třeboně, NPR Vizír (7055), 22.V.2015 – 2 ex. a 3.VI.2016 – 1 ex., břeh rybníka (RE); Kojákovice (Jílovice), PR Ruda u Kojákovic (7054), 5.VI.2016 – 1 ex., břeh rybníka (RE); Onšovec (6256), 12.VIII.2017 – 3 ex. na břehu nádrže Švihov (MK); Mariánské Radčice (5448), 9.VI.2020 – 1 ex. (P. Krásenský lgt. et det.) (VO); Rohozec (6058), 4.–11.V.2021 – 1 ex. v ZP na vlhké louce (MK); Záboří nad Labem, PR Na hornické (5957), 11.V.2021 – 1 ex. v mokřadu (MK); Brambory (6058), 20.V.2021 – 1 ex. v mokřadu (MK); Zbyslav (6058), 1.VI.2021 – 1 ex. a 3. VII.2021 – 1 ex. v mokřadu (MK); Bohdaneč (6257), 6.VI.2021 – 1 ex. v rákosí v zatopeném kamenolomu (MK). **Mor.:** Lopeník, Mikulčin vrch (7072), 9.VI.2010 – 1 ex. na světlo (KO lgt. et coll., RE det.) (KO); Sedlec, NPR Slanisko u Nesytu (7266), 1.VI.2015 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Nové Mlýny, ostrovy u Dolních Věstonic (7165), 2.V.–22.V.2020 – 1 ex. v ZP v podmáčené louce (JK).

Vzácný a lokální hygrofilní druh žijící mezi vegetací na březích zachovalých nezastíněných mokřadů. Od roku 2011 je pozorováno šíření druhu na řadu nových lokalit (cf. Veselý et al. 2020).

Chlaenius* (*Chlaenites*) *spoliatus spoliatus (Rossi, 1792) – **Boh.:** Mariánské Radčice (5448), 28.III.–25.IV.2020 – 1 ex. v ZP, 29.V.2020 – 5 ex. (vše MO et VO), 9.VI.2020 – 3 ex. (P. Krásenský lgt. et det., více ex. observ.), vše pod zetlelou vegetací v okolí tůní v předpolí lomu Bílina (MO et VO). **Mor.:** Trkmanský dvůr pr. Rakvice (7167), 1.V.2014 – 1 ex. na okraji jezera (MO); Kobylí, Smraďula (7067), 7.V.2016 – 13 ex. v mokřině, 7.V.–29.V.2016 – 43 ex. v ZP na mokřině (RE); Dolní Lutyně (6076), 3.X.2021 – 3 ex. na břehu pískovny, pozorováno více ex. (RZ).

V ČR mimo jižní Moravu vzácný hygrofilní druh. Pozoruhodná je adaptace na tůně lomu Bílina, zřejmě související s výskytem obojživelníků.

Laemostenus* (*Pristonychus*) *terricola terricola (Herbst, 1784) [ČS/NT] – **Boh.:** Roudnice nad Labem (5551), 25.IX.–19.X.2019 – 2 ex. v ZP v pískovně (50°24′54″N, 14°13′23″E) (MA lgt., VO det.) (VO). **Mor.:** Čejč (7067), 16.–27.IX.2013 – 1 ex. v ZP (P. Kučera lgt. et coll., VO det.) (VO); Želešice (6865), 7.VI.–27.VI.2017 – 1 ex. v ZP v doubravě jižně od řeky Bobravy (J. Podešva lgt., ST det., JK coll.) (JK).

V norách, doupatech a jiných podzemních prostorách skrytě žijící druh. Často i synantropně ve sklepech.

Lebia* (*Lamprias*) *chlorocephala (J. J. Hoffmann, 1803) – **Boh.:** Škvorec-Třebohostice, vrch Na Plachtě (5954), 1.–31.VIII.2015 – 1 ex. v ZP v lomu (50°1′54″N, 14°43′36″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Praha-Dejvice, Šatovka (5852), 1.–18.V.2020 – 1 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO); Milovice, NPP Milovice-Mladá (5755), 9.V.2020 – 1 ex. (ZU); Strážov (5454), 20.VI.2021 – 1 ex., první nález na okrese Česká Lípa (KL).

Lokálně a nehojně se vyskytující druh. Obývá rozmanitá, většinou však přírodně zachovalejší stanoviště typu stepí, úhorů, xerotermních pastvin, okrajů lesů a luk v nivách.

Lebia* (*Lebia*) *cruxminor cruxminor (Linnaeus, 1758) – **Boh.:** Milovice, NPP Milovice-Mladá (5755), 22.XI.2020 – 1 ex. v prosevu pod vřesem (50°14′23″N, 14°53′59″E) (MO), 18.IV.–15.V.2021 – 1 ex. v ZP (MO et VO). **Mor.:** Biskupice (6972), 22.V.2006 – 1 ex. (KO);

Nedašov, PR Jalovcová stráň (6874), 8.VI.2006 – 1 ex. (KO); Strání, PP Hrnčárky (7072), 11.V.2011 – 1 ex. (KO); Štítná nad Vláří (6973), 22.V.2006 –1 ex. (49°04′36″N 17°58′57″E) (KO); Nedašova Lhota (6874), 18.IV.2008 – 1 ex. (KO); Supíkovice (5669), IV.2012 – 1 ex. na xerotermním trávníku v pískovně (JK observ. et. det.) (JK); Zlín-Příluky (6772), 15.VI.2012 – 1 ex. (KO); NPP Kosířské lomy, Vápenice (6468), IV.2014 – 1 ex. na xerotermním trávníku (JK observ. et. det.) (JK); Velké Meziříčí (6662), 21.–24.VII.2015 – 1 ex. (MA lgt., VO det.) (VO); Šumice (6972), 28.II.2017 – 2 ex. v prosevu a 11.VI.2017 – 1 ex. (RE); Bylnice, Na Stráži (6974), 2.III.2017 – 4 ex. v prosevu (RE); Šumice (6972) 5.III.2020 – 2 ex. v prosevu (RE); Drslavice, PR Vrchové (6971), 19.V.2020 – 4 ex. (RE).

Lokální a obvykle jednotlivě se vyskytující druh, nalézaný především smykem a sklepáváním vegetace. Žije na rozmanitých, většinou přírodně zachovalých stanovištích typu stepí, xerotermních pastvin a okrajů lesů.

Lebia (***Lebia***) ***humeralis*** Dejean, 1825 [ČS/CR] – **Mor.:** Kurdějov env., PP Kamenný vrch (7066), 25.VII.2019 – 1 ex. na UV světlo (VA).

Velmi vzácný xerofilní druh. Žije na tradičních vinicích, na křovinatých stráních, na lesostepích a ve světlých teplomilných lesích. Třetí nález potvrzující recentní výskyt na Moravě a v ČR (cf. Veselý et al. 2020).

Leistus (***Leistus***) ***piceus piceus*** Frölich, 1799 – **Mor.:** Ježov (6969), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (49°01′49″N, 17°13′30″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Komňa (6972), 25.VI.2011 – 1 ex. 2 km severně od obce (KO lgt. et coll.. RE det.) (KO); Osvětimany (6969), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP v Ježovském lomu (49°02′17″N, 17°13′31″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Strání, NPR Javorina (7172), 3.VII.2008 – 1 ex. a 27.VII.2010 – 1 ex. (KO lgt., et coll., RE det.) (KO).

Nehojný podhorský a horský druh, v nižších polohách pouze jako relikt na zachovalých vlhkých, chladných a stinných stanovištích.

Leistus (***Leistus***) ***terminatus*** (Panzer, 1793) – **Boh.:** Novohradské hory, Pohorská Ves env., Černé Údolí (7254), 29.–31.VII.1996 – 1 ex. (VA); Zadní Doubice – Brtnický most (5052), 28.VII.2016 – 2 ex., v prosevu u říčky Křinice (VA); Říčky v Orlických horách, PR Komáří vrch (5764), 20.VII.2019 – 1 ex. v ZP na louce pod vrcholem (950 m n. m.) (LT). **Mor.:** Hodonín – Černé bláto (7168), 8.VIII.2014 – 1 ♂ přilezl k UV světlu (VA).

Lokálně se vyskytující druh rozmanitých zachovalejších vlhčích stanovišť, zpravidla na kyselém podkladu.

Leistus (***Pogonophorus***) ***montanus corconticus*** Farkač et Fassati, 1999 – **Boh.:** Krkonoše – Vysoké Kolo (5259), 28.VIII.2014 – 1 krovka v pavučině v balvanité suti, 1500 m n. m. (VO), 9.V.–5.VII.2015 – 1 ex. v ZP (RZ). .

Reliktní horská rasa stenotopního druhu, vázaného na nezastíněná suťová pole.

Leistus (***Pogonophorus***) ***montanus kultianus*** Farkač et Fassati, 1999 – **Boh.:** Líska, Zlatý vrch (5152), 19.IX.2013 – 1 ex. na suti (MO); Svor, vrch Klíč (5253), 19.IX.2013 – 2 ex. na suti (MO); Hřensko, Pravčická brána (5151), 25.X.2014 – 1 ex. pod listím na okraji cesty (VO). **Mor.:** Horní Věstonice, NPR Děvín (7165), 31.V.2019 – 2 ♀♀, 14.X.2019 – 2 ♂♂ + 3 ♀♀ aktivní v noci na skalní věži Maturita na úpatí vrchu Obora (LT), 24.V.2019 – 1 ♂ aktivní

v noci na skalní věži Maturita (RE), VI.2021 – 2 ♂♂ + 4 ♀♀ aktivní v noci na skalní věži Trůn (EE lgt. et coll., 1 ♀ coll. RE) (RE).

Rasa stenotopního druhu, lokálně rozšířená od nížin do středních poloh. Vyhledává nezastíněná suťová pole. Novinkou je pozorování noční aktivity na skalách, kterou lze předpokládat i na ostatních lokalitách. V ČR byl dosud znám pouze v Čechách. Nový druh pro Moravu.

Leistus (***Pogonophorus***) ***rufomarginatus*** (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Česká Lípa, vrch Kozel (5352), 3.VI.2017 – 1 ex. na východním úpatí (CH); Peruc, PP V Hlubokém (5649), 6.VI.–6.VII.2016 – 2 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO); Horní Řasnice (5057), 16.X.2016 – 2 ex. v pískovně (CH); Malá Veleň – Soutěsky (5251), 25.V.–12.VII.2017 – 30 ex. v ZP pod vrchem Hlídka (MO et VO); Malá Veleň – Jedlka (5251), 18.VI.–12.VII.2017 – 1 ex. v ZP (MO et VO); Horní Řasnice (5057), 30.IX.2017 – 3 ex. v bývalé pískovně (KL); Borný (5454), 20.VI.2019 – 1 ex. (KL); Roudnice nad Labem (5551), 25.IX.–19.X.2019 – 1 ex. v pískovně (50°24′54″N, 14°13′23″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Mariánské Radčice (5448), 28.III.–4.VII.2020 – 11 ex. v ZP (MO et VO); Praha-Suchdol, PR Údolí Únětického potoka (5852), 3.–4.VI.2020 – 1 ex. (F. Harabiš lgt., VO det., coll. J. Růžička) (VO); Labské pískovce, PR Holý vrch (5250), 29.IX.–18.XI.2020 – 1 ex. v ZP v lese pod sutí (MO); Mcely, NPR Čtvrtě (5656), 18.IX.–17.X.2021 – 1 ex. v ZP, 18.IX.–17.X.2021 – 1 ex. v ZP (ZU). **Mor.:** Bzenec-Přívoz env., PR Oskovec (7069), 25.XI.2003 – 1 ex., VA lgt. et coll., P. Vonička det.; Míškovice (6771), 1.–30.VI.2015 – 2 ex. v ZP (49°16′17″N, 17°31′52″E) (MA lgt., PV det.) (PV); Osvětimany (6969), 1.–30.VI.2015 – 3 ex. v ZP v Ježovském lomu (49°2′17″N, 17°13′31″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Slezská Ostrava (6176) 27.V.2015 – 1 ex. v ZP na haldě Zárubek a 3.VI.2015 – 3 ex. v ZP na haldě Bezruč (OU lgt. et coll., ST det.) (ST); Hostěradice (7063), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (48°57′19″N, 16°16′39″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Ježov (6969), 1.–30.VI.2015 – 39 ex. v ZP ((49°01′49″N, 17°13′30″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Kokory (6570), 1.–30.VIII.2015 – 1 ex. v ZP v lomu (49°29′32″N, 17°23′02″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Medlovice (6969), 1.–30.VIII.2015 – 1 ex. v ZP (49°03′27″N, 17°16′02″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Mikulčice (7168), 8.–11.VI.2015 – 1 ex. (KO lgt. et coll., VO det.) (KO); Mikulov (7165), 1.–30.VIII.2015 – 1 ex. v ZP (48°49′20″N, 16°39′45″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Mikulov, Janíčův vrch (7165), 1.–30.VIII.2015 – 10 ex. v ZP v lomu (48°48′41″N 16°39′30″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Ostrava-Michálkovice (6176) 11.XI.2015 – 1 ex. a 15. XI.2016 – 2 ex. v ZP na haldě Ema (OU lgt. et coll., ST det.) (ST); Dětřichov u Moravské Třebové (6266), 22.V.–20.VI.2016 – 1 ex. v ZP (VO); Pitárné (5771), 22.X.2016 – 1 ex. (T. Sitek lgt. et coll. ST det.) (ST); Únanov (7162), 20.VIII.2016 – 2 ex. (RE), 11.VI.–10.VII.2021 – 3 ex. do ZP v kaolince (NA); Ostrata (6772), 6.V.2017 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE).

Původně druh hájů a listnatých lesů, který se v současnosti dále plošně šíří. Již pouhý výčet nálezů dokumentuje velké množství nových lokalit. Na SV Moravě je dosud lokální a jednotlivě nalézaný, výskyt byl nově potvrzen i v Osoblažském výběžku.

Licinus (***Licinus***) ***cassideus cassideus*** (Fabricius, 1792) [ČS/EN] – **Mor.:** Horní Věstonice (7165), 26.IX.2021 – 2 ex. (RZ); Pouzdřany (7065), 16.–27.IX.2013 – 2 ex. v ZP (P. Kučera lgt. et coll., VO det.) (VO), 27.IX.2021 – 1 ex. (RZ).

Vzácný a velmi lokální stenotopní brachypterní stepní druh. Predátor menších druhů ulitnatých plžů.

Licinus* (*Licinus*) *depressus (Paykull, 1790) – **Boh.:** Záboří nad Labem (5958), 2.–20. IX.2021 – 2 ex. v ZP v lese 1 km na J od obce (MK); Zbyslav (6058), 11.IX.2021 – 1 ex. na cestě (MK). **Mor.:** Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 31.V.–27.VI.2015 – 1 ex. v ZP (RE); Novosedly, PR Slanisko (7164). 27.VI.–12.VII.2015 – 1 ex. v ZP (RE); Ostrava – Mariánské hory (6175), 24.VIII.2017 – 1 ex. (RZ); Ostrava-Přívoz (6175), 10.VII.2018 – 2 ex. u skladové haly (RZ); Únanov (7162), 13.VIII.–15.IX.2021 – 3 ex. do ZP v kaolince (NA); Ostrava-Michálkovice (6176), 15.XI.2016 v ZP na haldě Ema (OU lgt. et coll., ST det.) (ST).

Druh obývající velmi rozmanitá přirozená i druhotná nelesní stanoviště. Zpravidla se vyskytuje jednotlivě. Predátor menších druhů ulitnatých plžů.

Licinus* (*Neorescius*) *hoffmannseggii (Panzer, 1802) [ČS/NT] – **Mor.:** PR U Výpustku (6766), 15.VI.–8.VII.2021 – 1 ex. v ZP v bučině (suťový les) (FO lgt., JK det. et coll.) (JK).

Stenotopní, bioindikačně významný druh obývající přírodně zachovalé smíšené a bukové lesy, často suťové a kamenité. V noci pronásleduje na kmenech stromů menší ulitnaté plže.

Limodromus krynickii (Sperk, 1835) [ČS/VU] – **Mor.:** Rohatec, Soboňky (7069), 10.III.2018 – 2 ex. (VK lgt. et coll., RE det.) (RE); Ivaň, PR Plačkův les a říčka Šatava (7065), 27.XII.2018 – 13 ex. zazimovaných ve dřevě padlých olší a topolů (LT); Nové Mlýny (7065), 22.V.–24. VI.2020 – 1 ex. v ZP v podmáčeném lese na ostrově u soutoku Svratky a Jihlavy (JK); Nové Mlýny (7165), 24.IX.2019 – 1 ex. na podmáčené louce na ostrově s kostelem svatého Linharta (JK); Dubňany, Kosteliska (7068), 28.III.2020 – 2 ex. v prosevu (EE lgt. et coll., RE det.) (RE), 9.IV.2020 – 2 ex., v prosevu (KO lgt. et coll., RE det.) (RE), 7.V.–2.VI.2020 – 23 ex. v ZP (RE), 30.V.–25.VI.2020 – 1 ex. v nárazové pasti (EE lgt. et coll., RE det.) (RE).

Charakteristický stenotopní vlhkomilný druh zachovalých lužních lesů. Jelikož jde o druh brachypterní, je pravděpodobné, že do nárazové pasti vlezl (viz též *Zabrus spinipes*).

Limodromus longiventris (Mannerheim, 1825) [ČS/VU] – **Mor.:** Dubňany, Kosteliska (7068), 9.V.–30.V.2020 – 1 ex. v nárazové pasti (EE lgt. et coll., RE det.) (RE), 7.V.–2. VI.2020 – 23 ex. v ZP (RE).

Vlhkomilný druh, charakteristický pro lužní lesy u větších řek.

Masoreus* (*Masoreus*) *wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813) – **Boh.:** Provodínské kameny (5353), 4.IX.2016 – 4 ex. (KL); Nová Lhota (6057), 15.IV.2018 – 1 ex. v detritu na stepní stráni (MK); Praha – Císařský ostrov (5852), 13.IX.2019 – 1 ex. aktivní v noci na okraji travnaté plochy v areálu ÚČOV (VE); Teplice (5348), 14.VII.–6.VIII.2020 – 1 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO).

Reliktní xerofilní druh, žijící na nejsušších místech stepí, skalních stepí a písčin.

Microlestes fissuralis (Reitter, 1901) – **Boh.:** Praha – Malá Strana, vrch Petřín (5952), 19.V.–20.X.2020 – 16 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO); Nová Lhota (6057), 28.IV.2021 – 1 ex. v detritu na stepní stráni (MK). **Mor.:** Novosedly, (7165), 3.V.2014 – 1 ♂ v pískovně 1,9 km SV (MO); Mikulov (7165), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (48°49′20″N, 16°39′45″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Dyjákovičky-Ječmeniště (7262), 27.VI.2020 – 1 ♂ v ekotonu step/pole (MO); Únanov (7162), 11.VI.2021 – 1 ex. v kaolince (NA).

Xerofilní druh, lokálně na druhotných i přirozených stanovištích v teplejších oblastech.

Microlestes plagiatus (Duftschmid, 1812) [ČS/RE] – **Mor.:** Stěbořice (6072), 27.VI.2020 – 1 ex. smykem vegetace při břehu eutrofizovaného rybníčku mezi poli (ST).

Spíše vlhkomilnější druh, vyhledává jílovitá a hlinitá místa u řek, ale i v hliništích apod. Z ČR je dispozici jen několik historických údajů z Moravy ze začátku 20. století (Skoupý 2004, Stanovský & Pulpán 2006). Již dlouho považován za vyhynulého (Pulpán & Hůrka 1993, Veselý et al. 2017). Uvedený nález je potvrzením výskytu na Moravě a v České republice po více než 100 letech.

Miscodera arctica (Paykull, 1798) [ČS/VU] – **Boh.:** Horní Řasnice (5057), 16.X.2016 – 6 ex. a 30.IX.2017 – 6 ex. v bývalé pískovně (KL), 16.X.2016 – 2 ex. (CH).

V ČR velmi vzácný druh, do roku 2007 známý pouze z okolí Bzence na jihovýchodní Moravě. V tomto roce byl nalezen na Liberecku v bývalé pískovně v Horní Řasnici (Vonička 2008). Potvrzení stálého výskytu na lokalitě.

Molops (***Molops***) ***elatus elatus*** (Fabricius, 1801) – **Boh.:** Peruc, PP V Hlubokém (5649), 1.V.–6.VII.2016 – 49 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO); Hřivčice (5649), 16.V.–3.VI.2019 – 6 ex. a 25.IX.–19.X.2019 – 1 ex. v ZP (50°20′31″N, 13°56′27″E) (MA lgt., VO det.) (VO); PP Mrzínov (5653), 18.V.–14.VI.2020 – 1 ex. a 8.–28.VII.2020 – 1 ex. v ZP (ZU); Praha – Malá Strana, vrch Petřín (5952), 24.VI.–18.VII.2020 – 6 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO). **Mor.:** PR Číhadlo (6766), 2.V.–14.VI.2018 – 4 ex. v ZP v bučině (suťový les) (FO lgt., JK det. et coll.) (JK); PR Březinka (6766), 30.IV.–27.V.2020 – 5 ex. v ZP v bučině (FO lgt., JK det. et coll. (JK); PR Dřínová (6766), 30.IV.–22.VI.2020 – 7 ex. v ZP v bučině (suťový les) (FO lgt., JK det. et coll. (JK); Dolní Moravice, PR Franz-Franz (6069), 11.V.–27.VII.2021 – 12 ex. v ZP ve smíšeném a listnatém lese (JK); PR U Výpustku (6766), 15.V.–8.VII.2021 – 2 ex. v ZP v bučině (suťový les) (FO lgt., JK det. et coll. (JK).

Lokální druh suťových listnatých lesů pahorkatin a podhůří.

Nebria (***Eunebria***) ***jockischii hoepfneri*** Dejean, 1826 – **Boh.:** Zdobnice (5764), 20.VII.2019 – 1 ♀ pod kamenem u potoka v Čertově dole (CHKO Orlické hory) (LT). **Mor.:** Beskydy, NPR Mionší (6478), 5.VII.2013 – 1 ex. (KO lgt. et coll., VO det.) (KO); Čeladná (6475), 14.V.2020 – 2 ex. na břehu potoka v jehličnatém lese (RZ); Vidly (5869), 17.VIII.2016 – 2 ex. na balvanitém břehu řeky Střední Opavy (JK); Kouty nad Desnou (5968), 6.IX.2018 – 1 ex. na štěrkové lavici Poniklého potoka (JK); PR Skalní potok (5869), 30.V.2020 – 1 ex. na kamenitém břehu potoka (JK).

Lokální druh štěrkových břehů horských a podhorských toků.

Nebria (***Eunebria***) ***picicornis picicornis*** (Fabricius, 1801) [ČS/VU] – **Mor.:** Nižní Lhoty (6376), 16.VII.2021 – 2 ex. a 21.VIII.2021 – 7 ex. (RZ).

Velmi lokální druh zachovalých štěrkopískových břehů podhorských toků. Potvrzení stálého výskytu na lokalitě.

Nebria (***Paranebria***) ***livida livida*** (Linnaeus, 1758) [ČS/NT] – **Boh.:** Suchdol nad Lužnicí (7055), 23.V.2015 – 21 ex. (KO lgt., det. et coll., 5 ex. coll. P. Moravec, 5 ex. coll. P. Vonička) (KO), 23.V.2015 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE), 23.V.2015 – 29 ex. (RE), 4.VI.2016 – 3 ex. (RE), 5.VI.2018 – 3 ex. v pískovnách Cep I a Cep II (LT), 20.VIII.2018 – 7 ex. v pískovně (RZ).

Velmi lokální druh neznečištěných písčitých břehů stojatých i tekoucích vod.

Notiophilus germinyi Fauvel, 1863 – **Boh**., České středohoří, Hnojnice (5549), 14.V.2015 – 10 ex. pod detritem a plevelem poblíž NPP Kamenná slunce (MI); Krkonoše – Vysoké Kolo (5259), 9.V.–5.VII.2015 – 3 ex. v ZP a 5.VII.–27.IX.2015 – 2 ex. v ZP (RZ).

Lokální druh zachovalých otevřených suchých stanovišť, např. stepí a vřesovišť, od nížin do alpínského pásma.

Notiophilus laticollis Chaudoir, 1850 [ČS/VU] – **Mor.:** Uherčice (7065), 29.V.2020 – 3 ex., 25.VI.2020 – 3 ex. a 27.V.2021 – 1 ex. pod suchou vegetací na rozhraní pole a lesa Ke Kolbám (LT); Pouzdřany (7065), 27.IX.2021 – 1 ex. (RZ).

Xerofilní druh s velmi lokálním výskytem v nejteplejších oblastech. Zejména na spraš ových a vápnitých půdách s nízkou nezapojenou vegetací.

Notiophilus rufipes Curtis, 1829 – **Boh.:** Husinec (5852), 4.IX.2015 – 8 ex. v dubovém lese, 11.X.2015–6.VII.2016 – 15 ex. v ZP v dubovém lese (MO et VO) a 6.VI.2016 – 2 ex. na ekotonu les/pole (VO); Peruc, PP V Hlubokém (5649), 10.V.–6.VII.2016 – 4 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO); Dománovice (5858), 14.V.2017 – 42 ex. v prosevu spadaného listí u pat stromů v dubovém lese (LT); Hřivčice (5649), 16.V.–3.VI.2019 – 1 ex. v ZP (50°20′09″N, 13°55′15″E (MA lgt., VO det.) (VO); Praha – Malá Strana, vrch Petřín (5952), 8.V.–24. IX.2020 – 20 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO); Křenek, Křenecká tůň (5753), 9.V.2021, 11.IV.–19.VI.2021 – 6 ex. v ZP a 9.V.2021 – 1 ex. (VO); Bojmany, PP Žehušická obora (6058), 4.–11.V.2021 – 1 ex. v ZP v dubovém lese (MK); Roztěž-Lázně (6057), 18.V.2021 – 1 ex. pod listím v dubovém lese (MK). **Mor.:** Pozděchov (6773), 1.VI.2016 – 1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.); Ublo (6773), 26.V.2019 – 1 ex., 6.VII.2019 – 1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.); Břeclav-Pohansko (7267), 31.V.2019 – 1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.) (RE).

Donedávna poměrně vzácný a lokální stenotopní druh teplomilných hájů a lesostepí se v současnosti dále plošně šíří i mimo teplejší oblasti.

Ocys quinquestriatus quinquestriatus (Gyllenhal, 1810) – **Mor.:** Horní Věstonice (7165), 28.X.2019 – 14 ex. aktivních v noci na vápencových skalách v CHKO Pálava (LT), 26.IX.2021 – 5 ex. a 27.IX.2021 – 4 ex. (RZ); Pavlov (7165), 16.V.2021 – 1 ex. (RZ).

Široce rozšířený, ale skrytě žijící a poměrně zřídka nalézaný druh. Nejčastěji byl nalézán synantropně na skládkách cihel, zbořeništích, ve sklepech a na podobných místech. Podle nových zjištění se zdá, že jeho primárními biotopy jsou skály a skalní sutě, stejně jako u druhu *Leistus montanus*.

Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790) – **Boh.:** Praha-Jenerálka (5852), 12.IX.2017 – 1 ♀ na dně lomu bývalé cihelny „Na Salátce“ (VE); Ejpovice (6247), 2.IX.2019 – 1 ♀ pod kamenem v pískovně (LT); Uhelná (5155) 16.IX.2021 – 1 ex. v pískovně (KL). **Mor.:** Mrsklesy (6370), 16.VI.2016 – 1 ex. na bývalém vojenském cvičišti (L. Koloničný lgt., det. et coll.) (ST), 14.IV.2018 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE).

Lokální druh, rozšířený spíše v pahorkatinách a v podhůří na hlinitých a písčitých půdách, charakteristický je zvláště pro hliniště cihelen a odvaly lomů. Zřejmě ubývající druh.

Olisthopus sturmii (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Týnčany (6451–6452), 25.VIII.2002 – 1 ex. (A. Trmal lgt. et coll., L. Kašpar det., MO revid.) (MO); České středohoří, Hnojnice (5549), 14.V.2015 – 2 ex. pod detritem a plevelem poblíž NPP Kamenná slunce (MI).

Reliktní, lokálně občas i hojný druh lesostepí a stepí. Další nález v Týnčanském krasu na Sedlčansku, potvrzení starších údajů: Skoupý pr. Petrovice (6452), 7.IX.1984 – 2 ex. a 4.V.1985 – 1 ex. (A. Trmal lgt. et coll.) (Trmal 2008). Všechny tři ex. det. M. Honců a MO revid.

Oodes gracilis A. Villa et G. B. Villa, 1833 [ČS/NT] – **Boh.:** Chlumec nad Cidlinou, PP Pamětník (5858), 14.V.2017 – 1 ex. (MM lgt. et coll., RE det.) (RE); Dubňany, Kosteliska (7068), 18.IV.2020 – 2 ex. na mokřině (EE lgt. et coll., RE det.) (RE), 7.V.2020 – 3 ex. na mokřině (RE), 10.VII.2020 – 2 ex. (RE); Záboří nad Labem, PR Na hornické (5957), 11.V.2021 – 4 ex. v mokřadu (MK).

Druh zachovalejších mokřadů a rákosin, vzácněji nalézaný i v lužních lesích.

Ophonus (***Metophonus***) ***melletii melletii*** (Heer, 1837) – **Mor.:** Ostrava-Výškovice (6275), 29.VII.2019 – 1 ex. a 2.VIII.2019 – 1 ex. na světlo (J. Tomčík lgt. et coll., VE det.) (ST).

Široce rozšířený, ale na SV Moravě velmi vzácný druh.

Ophonus (***Metophonus***) ***schaubergerianus*** (Puel, 1937) – **Mor.:** Šenov (6176), 23.VII.2020 – 1 ex. na cestě vedle louky (RZ); Petřvald (6176), 6.VI.2021 – 1 ex. na cestě vedle louky (RZ).

Dříve poměrně hojný druh, žijící spíše na vlhčích stanovištích, například v nivách potoků a řek. V současnosti ubývá, zejména v nížinách.

Ophonus (***Metophonus***) ***subsinuatus*** Rey, 1886 [ČS/NT] – **Boh.:** Kutná Hora – Malín (6057), 12.VIII.2020 – 1 ex. na světlo (D. Kavka lgt. et coll., VE det.) (MK). **Mor.:** Zlín-Kúty (6772), 14.VIII.2019 – 2 ex. na světlo (KO lgt. et coll., RE det.) (KO); Ostrava-Výškovice (6275), 29.VII.2019 – 2 ex. a 9.VIII.2020 – 1 ex. na světlo (J. Tomčík lgt. et coll., VE det.) (ST).

Monofág na kopru vonném (*Anethum graveolens*) (viz Veselý et Resl 2021). V Čechách jde o čtvrtý nález (cf. Resl et Mikát 2020). Ostravské nálezy potvrzují výskyt na SV Moravě.

Ophonus (***Ophonus***) ***ardosiacus*** (Lutshnik, 1922) – **Boh.:** Svatava, výsypka Matyáš (5741), 4.VIII.2016 – 1 ex. na světlo (J. Pávek lgt. et coll., HE det.) (HE); Praha-Suchdol (5852), 26.VII.2021 – 1 ex. na světlo (NA). **Mor.:** Mikulov, Janíčův vrch (7165), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. a 1.–31.VIII.2015 – 57 ex. v ZP v lomu (48°48′41″N, 16°39′30″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Mikulov env., Za Turoldem (7165), 16.IX.2021 – 4 ex. (NA).

V ČR původně jen na jižní Moravě lokálně žijící druh. V Čechách byl poprvé prokazatelně nalezen v roce 2010 na Sokolovsku (Veselý et al. 2012), odkud se postupně rozšířil do velkých oblastí západních, severních a středních Čech, včetně Prahy. V porostech *Daucus carota* se pravidelně nachází ve společnosti *Ophonus diffinis*.

Ophonus (***Ophonus***) ***diffinis*** (Dejean, 1829) – **Boh.:** Velká Bukovina – Malá Bukovina (5252), 31.V.2017 – 1 ex. pod hroudou na okraji pole (MO); Blažim (5547), 18.VIII.2018 – 2 ex. na skládce elektrárenského popílku (MO). **Mor.:** Mikulov, Janíčův vrch (7165), 1.–31.VIII.2015 – 20 ex. v ZP v lomu (48°48′41″N, 16°39′30″E) (MA lgt., VO det.) (VO).

Fytofágní xerotermní druh. V Čechách jde v současnosti v teplejších oblastech o široce rozšířený druh.

Ophonus (***Ophonus***) ***sabulicola*** (Panzer, 1796) [ČS/VU] – **Boh.:** České středohoří – vrch Oblík (5548), 8.VIII.2021 – 21 ex. a 12. VIII.2021 – 1 ex. (NA).

Lokální xerofilní druh žijící především na vápencových půdách a spraších. Nálezy mimo oblast Českého středohoří a Českého krasu jsou jen ojedinělé. Potvrzení stálého výskytu na lokalitě.

Ophonus (***Ophonus***) ***stictus*** Stephens, 1828 [ČS/NT] – **Boh.:** Milovice, NPP Milovice-Mladá (5755), 15.V.–30.VI.2018 – 1 ex. a 26.V.–23.VI.2019 – 1 ex. v ZP (ZU). **Mor.:** Medlovice (6969), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (49°03′27″N, 17°16′02″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Mikulov, Janíčův vrch (lom) (7165), 1.–31.VIII.2015 – 1 ex. v ZP (48°48′41″N, 16°39′30″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Dolní Dunajovice, NPP Dunajovické kopce (7165), 15. IX.2021 – 76 ex. (NA).

Velmi lokální druh různých otevřených stanovišť v přírodně zachovalejších oblastech. Pravidelně v porostech *Peucedanum cervaria* a *Libanotis pyrenaica*.

Paradromius (***Manodromius***) ***ruficollis*** (Motschulsky, 1844) [ČS/VU] – **Mor.:** Hrubý Jeseník, Karlov pod Pradědem – Velká kotlina (5969), 2.VIII.2007 – 5 ex., 1100–1200 m n. m. (VA); Hrubý Jeseník, Ovčárna env. (5969), 14.VIII.2017 – 3 ex. (KL).

Horský druh obývající otevřená travnatá stanoviště, často v blízkosti horských potoků. V ČR recentně jen v Hrubém Jeseníku. Potvrzení výskytu na lokalitě.

Paradromius (***Paradromius***) ***longiceps*** (Dejean, 1826) – **Boh.:** Lužnice, Malý Panenský rybník (6954), 14.V.2015 – 2 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Hradec Králové (5860), 30.VI.2015 – 1 ex. na ploše VKP U Velkého jezera (MM lgt. et coll., RE det.) (RE); Záboří nad Labem, PR Na hornické (5957), 18.V.2021 – 2 ex. v rákosině (MK); Nové Dvory, PP Nový rybník (6058), 26.VII.2021 – 2 ex. v rákosině (MK).

Skrytě žijící druh rozsáhlejších rákosin.

Parophonus (***Ophonomimus***) ***hirsutulus*** (Dejean, 1829) – **Boh.:** Praha-Kyje (5953), 6.VII.2021 – 1 ♀ do světelného UV lapače (VE). **Mor.:** Hodonín – Černé bláto (7168), 6.VII.2019 – 1 ♂ + 1 ♀ na UV světlo (VA); Uherský Brod (6971), 12.VII.2019 – 1 ex. na světlo (FK lgt., RE det. et coll.) (RE); Hrasťovice, PR Rovná hora (6971), 13.VII.2019 – 2 ex. na světlo (LM lgt., RE det. et coll.) (RE); Uherský Brod – Těšov (6971), VI.2020 – 1 ♂ a 18. VI.2021 – 1 ♀ ve světelném lapáku (FK lgt., LA det. et coll.) (LA); Šumná (7061), 27.VI.–3. VII.2020 – 2 ex. (J. Kadlec lgt., VO det., coll. J. Kadlec et VO) (VO); Valtice env., NPP Rendezvous (7266), 19.VI.2021 – 7 ex. na UV světlo (VA lgt. et det., coll. VA et LT) (VA).

Xerofilní expanzívní druh, který se objevil v roce 2010 na jižní Moravě (Linhart 2011) a v následujícím roce i v Čechách (Vonička et al. 2017). V současnosti se dále šíří v teplejších oblastech ČR. Je zjišťován hlavně odchytem na světlo.

Parophonus (***Parophonus***) ***dejeani*** (Csiki, 1932) – **Mor.:** Hostěradice (7063), 1.–30. VI.2015 – 1 ex. v ZP v lomu (48°56′56″N, 16°16′37″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Uherčice (7065), 9.V.2020 – 1 ♂ + 1 ♀ a 29.V.2020 – 1 ♂ pod suchou vegetací na rozhraní pole a lesa Ke Kolbám (LT); Oleksovice, vrch Dvorská (7063), 28.V.2021 – 57 ex. pod ptačincem na okraji pole a lesa (HE); Oleksovice, vrch Kamenec (7063–7163), 28.V.2021 – 1 ex. pod řídkou vegetací ve sprašové hlíně (HE).

Xerofilní druh, vyskytující se v nejteplejších oblastech jižní Moravy. Od roku 2003 se zde šíří a je zde nalézán na více lokalitách a stále početněji (cf. Křivan et al. 2009). V Oleksovicích byl dokonce pozorován masový výskyt.

Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 [ČS/NT] – **Boh.:** Krkonoše – Vysoké Kolo (5259), 5.VII – 27.IX.2015 – 1 ex. v ZP (RZ); Jizerka (5257), 20.V.2020 – 4 ex. vyšlapány v rašelinových prohlubních v lese (KL).

Stenotopní a reliktní druh rašelinišť a kyselých půd. Lokálně zvláště na horských rašeliništích.

Patrobus septentrionis australis J. R. Sahlberg, 1875 [ČS/VU] – **Mor.:** Děhylov (6175), 8.IX.2020 – 3 ex. a 15.IX.2021 – 7 ex. na břehu rybníka (RZ); Polanka nad Odrou (6275), 1.VIII.2021 – 1 ex. a 20.VIII.2021 – 1 ex. vyšlapán z vegetace v litorálním pásmu rybníka Malý Vaček (ST).

Vzácný a lokální hygrofilní druh. Na SV Moravě recentně známy dvě lokality. Potvrzení výskytu v Poodří.

Pedius longicollis (Duftschmid, 1812) – **Mor.:** Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 7.VIII.2015 – 2 ex. na světlo (RE).

Spíše hygrofilní druh, vyhledávající jílovité půdy. Na světlo létá zřídka kdy.

Perigona (***Trechicus***) ***nigriceps*** (Dejean, 1831) – **Boh.:** Bojmany, PP Žehušická obora (6058), 10.VIII.2012 – 1 ex. na světlo (MK); Hradec Králové – Lovčice, NPR Kněžičky (5858), 28.VIII.2016 – 1 ex. na světlo (MM lgt. et coll., RE det.) (RE); Podbořany, Krásný Dvůr (5746), 31.VII.2017 – 1 ex. na světlo v parku (KO lgt. et coll., RE det. (KO); Malovidy (6155), 4.VIII.2017 – 1 ex. na světlo (MK); Kutná Hora – Malín (6057), 12.VIII.2020 – 1 ex. na světlo (D. Kavka lgt., MK det. et coll.); Žehušice (6058), 14.VIII.2021 – 1 ex. na světlo v zatopené pískovně (MK). **Mor.:** Bzenec-Přívoz (7069), 20.VII.2006 – 1 ex. na UV světlo (VA); Moutnice env., Nesvačilka (6966), 22.VIII.2008 – 2 ex. v noci na tlející hromadě obilek (VA); Petřvald (7166), 10.III.2013 – 5 ex. prosevem detritu na hořící haldě Hedvika (VA); Ostrava-Radvanice, halda Hedvika (6176), 1.I.2016 – 1 ex. pod kousky dřeva v mechu na prohřátém povrchu hořící haldy (ST); Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry – Polaň (6576), 2.VIII.2017 – 2 ex. na UV světlo na okraji smrkového lesa v údolí Stupného potoka, 600 m n. m. (VA); Zlín (6772), 18.VIII.2019 – 1 ex. na světlo (EE lgt. et coll., RE det.) (RE).

Skrytě žijící, ale čile létající druh vázaný na tlející rostlinný materiál. Na SV Moravě lokální druh sekundárních biotopů.

Perileptus (***Perileptus***) ***areolatus areolatus*** (Creutzer, 1799) [ČS/NT] – **Boh.:** Bojmany (6058), 10.VIII.2012 – 2 ex. na světlo u řeky Doubravy (MK); Černěves (5551), 24.V.2014 – 2 ex. v náplavu na břehu Labe (MO); Roztoky u Křivoklátu (5949), 27.V.2016 – 2 ex. (LB lgt. et coll., RE det.) (RE); Kobylnice-Lanžov (5958), 24.IV.2017 – 1 ex. na břehu řeky Doubravy (MK); Praha-Zbraslav (6052), 30.IV.2018 – 1 ex., 9.V.2018 – 2 ex., 21.V.2018 – 1 ex., 6.VI.2018 – 2 ex., 19.VI.2018 – 1 ex. a 6.IX.2018 – 1 ex. u soutoku Berounky a Vltavy (MA lgt., VO det.) (VO); Dolní Žleb – přívoz (5151), 28.VIII.2018 – více ex. na břehu Labe (MO et VO); Hřensko env. (5151), 28.VIII.2018 – víc ex. na břehu Labe pod vyhlídkou Belvedere (MO

et VO); Lomnice, Velká Podkrušnohorská výsypka (5741), 24.IV.2020 – 1 ex. na jílovité ploše s řídkou vegetací (R. Kmeco lgt., HE det. et coll.) (HE). **Mor.:** Hustopeče nad Bečvou (6473), 31.V.2015 – 7 ex., 10.VII.2015 – 2 ex., 19.IX.2015 – 1 ex., 11.V.2016 – 1 ex., 12.VIII.2016 – 1 ex. a 11.VI.2017 – 1 ex. na štěrkové lavici řeky Bečvy u přítoku Mřenky (JK); Dobrá (6376), 17.VI.2018 – 3 ex. (RZ); Dolní Lutyně (6076), 16.VII.2018 – 1 ex. v pískovně (RZ); Karviná-Ráj (6177), 18.IV.2020 – 1 ex. na břehu Olše (P. Boža lgt. et coll., ST det.) (ST); Skalička (6472), 11.VI.2020 – 1 ex. na štěrkovém břehu řeky Bečvy (RZ); Bystřice nad Olší (6378), 28.VII.2020 – 1 ex. na štěrkovém břehu řeky Olše (RZ); Nižní Lhoty (6376), 6.VII.2021 – 3 ex. (RZ); Staré Hamry, vodní nádrž Šance (6576), 18.VI.2017 – 2 ex. a 24.VIII.2017 – 1 ex. na štěrkové lavici na vyschlém dně přehrady (M. Roháčová lgt., coll. MBF, ST det.) (ST).

Lokálně hojný stenotopní druh vázaný na zachovalé štěrkové břehy potoků a řek. Adaptabilita na druhotné biotopy byla doposud pozorována jen v pískovnách v dosahu řek. Nález na Velké Podkrušnohorské výsypce je v tomto ohledu zcela mimořádný.

Philorhizus quadrisignatus (Dejean, 1825) – **Boh.:** Černěves (5551), 27.VIII.2013 – 1 ex. (mrtvý) pod kůrou klenu na okraji lužního lesa (MO). **Mor.:** Břeclav-Pohansko (7267), 7.V.2002 – 1 ex. v noci na dřevě (VA); Hukvaldy (6375), 29.XII.2018 – 2 ex. pod kůrou platanu (RZ); Šilheřovice (6075), 11.II.2019 – 1 ex. (RZ); Kněžpole, PR Kanada (6870), 1.V.2019 – 2 ex. (VK lgt. et coll., RE det.) (RE); Ostrava-Přívoz (6175), 26.XI.2019 – 1 ex. pod kůrou topolu (RZ); Frýdek-Místek (6375), 23.II.2020 – 1 ex. pod kůrou javoru na kopci Štandl (RZ); Bílovec – Stará Ves (6273), 10.I.2021 – 2 ex. pod kůrou jírovce (RZ).

Velice lokální a vzácný druh, v Čechách hlavně v okolí Labe a Vltavy.

Philorhizus sigma (P. Rossi, 1790) – **Boh.:** Přelouč, Labišťata (5959), 18.XI.2016 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); **Mor.:** Záhlinice (6770), 30.IV.2017 – 1 ex. (LB lgt. et coll., RE det.) (RE); Ostrava – Mariánské Hory (6175), 5.I.2018 – 1 ex. a 29.I.2018 – 1 ex. pod kůrou topolu u řeky Odry (RZ); Ostrava-Hrabůvka (6275), 13.VII.2021 – 1 ex. sklepán z vrby u břehu řeky Ostravice (RZ).

Velmi lokální a vzácný druh, žijící zpravidla v dosahu větších řek.

Platyderus* (*Platyderus*) *rufus rufus (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Roudnice nad Labem, ostrov Labe (5551), 14.XI.2018 – 1 ex. zimující pod kůrou padlého stromu (MO); Dobřínský háj u Roudnice (5551), 19.IV.2021 – 2 ex., 5.V.2021 – 2 ex. a 10.XI.2021– 1 ex. ve dřevě v lužním lese (CH), 19.IV.2021 – 2 ex. (KL). **Mor.:** Únanov (7162), 11.VI.2021 – 3 ex. v kaolince (NA).

Lokální a nehojný lesostepní druh. V ČR na jižní Moravě, v Čechách na několika lokalitách v jihovýchodních Čechách, v okolí Kralup. Postupně se šíří podél dolního Labe.

Platynus livens (Gyllenhal, 1810) – **Boh.:** Dráchov (6754), 2.–5.IV.2017 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Terezín, PP Mokřad pod Terezínskou pevností (5450), 21.III.2017 – 1 ex. a 5.I.2018 – 1 ex. zimující v padlé vrbě (MO).

Charakteristický druh zachovalých lužních lesů.

Poecilus* (*Poecilus*) *punctulatus (Schaller, 1783) [ČS/VU] – **Mor.:** Uherčice (7065), 29.V.2020 – 1 ♀ pod kamenem na okraji pole, 27.V.2021 – 1 ♂ pod dřevem na okraji lesní cesty v polesí Ke Kolbám (LT).

Stepní druh s lokálním výskytem v přírodně zachovalých oblastech.

Poecilus* (*Poecilus*) *sericeus sericeus Fischer von Waldheim, 1824 [ČS/VU] – **Mor.:** Mikulov, lom Svatý kopeček (7165), 23.V.2012 – 1 ex. (P. Šťastná lgt., MO det. et coll.) (MO); Mikulov, Janíčův vrch (7165), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. a 1.–31.VIII.2015 – 3 ex. v ZP v lomu (48°48′41″N, 16°39′30″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Želešice (6865), 21.VII.–15.VIII.2017 – 2 ex. v ZP v doubravě jižně od řeky Bobravy (J. Podešva lgt., ST det., coll. JK) (JK).

Stepní druh s lokálním výskytem v teplejších, přírodně zachovalých oblastech. Dlouhodobě ubývající druh. Nález v doubravě je pozoruhodný.

Pogonus* (*Pogonus*) *luridipennis (Germar, 1822) [ČS/CR] – **Boh.:** Praha-Dubeč, PP Lítožnice (5953), 22.VII.2017 – 1 f * na světlo na dně vypuštěného rybníka (VE).

Halobiont, vyhledávající hlinité i písčité břehy porostlé řídkou vegetací. V ČR zjištěn pouze několikrát, a to především na jižní Moravě. Jde o třetí známý nález z Čech (cf. Tropek et al. 2014). Za příznivých let tento druh zřejmě podniká dlouhé přelety severním a severozápadním směrem, při kterých aktivně vyhledává místa alespoň s minimálním zasolením.

Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) [ČS/NT] – **Boh.:** Praha-Dubeč (5953), 17.VII.2015 – 1 ex., 6.VIII.2015 – 1 ♀ a 8.VIII.2015 – 1 ♂ na světlo na dně vypuštěného rybníka Slatina (VE); Praha-Dubeč, PP Lítožnice (5953), 31.VII.2017 – 3 ex. a 29.VII.2018 – 2 ♀♀ na světlo na dně vypuštěného rybníka (VE); Praha – Císařský ostrov (5852), 31.VII.2018 – 2 ex., 9.VIII.2019 – 1 ex. a 13.VIII.2020 – 1 ex. do světelného UV lapače na hrázi v areálu ÚČOV (VE); Kutná Hora – Malín (6057), 12.VIII.2020 – 1 ex. na světlo (D. Kavka lgt., MK det. et coll.); Církvice (6058), 8.VIII.2020 – 3 ex. na světlo u rybníka Vrabcov (MK); Praha-Běchovice (5953), 6.IX.2020 – 2 ex. pod kamenem v okolí VKP Křídový výchoz Na vrchách (VE); Encovany, PR Holý vrch (5451), 17.XII.2020–4.V.2021 – 1 ex., 4.V.–3.VIII.2021 – 4 ex. a 3.VIII.–10.IX.2021 – 3 ex. v podzemních pastech na bílé stráni (VE et MO); Žehušice (6058), 14.VIII.2021 – 1 ex. na světlo v zatopené pískovně (MK); Kosmonosy (5555), 15.VIII.2021 – 1 ex. na světlo (ZU). **Mor.:** Medlovice (6969), 1.–30.VI.2015 – 1 ex. v ZP (49°3′27″N, 17°16′02″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Záhlinice (6770), 22.VII.2015 – 1 ex. na světlo (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Dobré Pole, PR Slanisko Dobré Pole (7165), 7.VIII.2015 – 2 ex. na světlo (RE); Bzenec, PP Vojenské cvičiště (7069), 25.VI.2016 – 1 ex. na světlo (KO); Zlín-Kúty (6772), 25.VII.2016 – 1 ex. na světlo (KO); Košíky (Chřiby) (6870), 19.V.2017 – 4 ex. aktivní v noci na cestě mezi pastvinou a lesem (LT); Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry – Polaň (6576), 2.VIII.2017 – 1 ex. na UV světlo na okraji smrkového lesa v údolí Stupného potoka, 600 m n. m. (VA); Násedlovice, Trkmanka (7067), 24.IV.–8.V.2019 – 1 ex. v ZP (RE); Rohatec, Soboňky (7069), 11.VIII.2019 – 1 ex. na světlo, LM lgt., RE det. et coll.; Zlín (6772), 25.VI.2021 – 1 ex. na světlo (EE lgt. et coll., RE det.) (RE).

Druh žijící v puklinách jílovitých půd se sporou vegetací. Lokálně zejména na jílovcových, slínovcových a opukových svazích (bílé stráně) a na pastvinách v okolí řek s přirozeným vodním režimem. Kolem roku 2010 začalo plošné šíření druhu v Čechách i na Moravě. Uvedený výčet nálezů dokumentuje velké množství nových lokalit.

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) – **Boh.:** Litoměřice-Želetice (5450), 11.X.2018 – 8 ex. v trouchu poraženého mrtvého jírovce (MO); Záboří nad Labem, PR Na hornické (5957), 19.VI.2021 – 7 ex. na světlo (MK). **Mor.:** Skalička (6472), 11.VI.2020 – 1 ex. pod vegetací na písčitém břehu řeky Bečvy (RZ).

Skrytě žijící druh vázaný na rozmanitý vlhký tlející rostlinný materiál.

Stenotopní lesostepní až stepní druh. Potvrzení stálého výskytu na jediné známé lokalitě v ČR.

Pterostichus (***Adelosia***) ***macer macer*** (Marsham, 1802) – Boh.: Praha-Běchovice (5953), 17.IV.2020 – 1 ex. u jílovité polní cesty při západním okraji Klánovického lesa (VE). Mor.: Drslavice, PR Vrchové (6971), 13.VI.–31.VIII.2020 – 30 ex. v podzemní pasti (RE).

Lokální, místy hojný druh. Vyhledává jílovité půdy, v jejichž puklinách se skrývá.

Pterostichus (***Argutor***) ***cursor*** (Dejean, 1828) [ČS/EN] – Mor.: Novosedly, PR Slanisko (7164), 31.V.2015 – 5 ex. (RE); Bořetice (7167, 24.V.2015 – 1 ex. v mokřině (RE).

Halofilní hygrofil, v ČR lokálně na zachovalých, vegetací zarostlých březích mokřadů jižní Moravy.

Pterostichus (***Calopterus***) ***pilosus pilosus*** (Host, 1789) – Mor.: Krásná, PR Lysá hora (6476), 9.VI.2019 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE).

V ČR pouze v Beskydech. Lesní druh vyšších poloh.

Pterostichus (***Cophosus***) ***cylindricus*** Herbst, 1784 [ČS/VU] – Mor.: Radějov, PR Kútky (7170), 26.VI.2010 – 1 ex. (KO); Lednice (7166), 1.VII.2016 – 1 ex. na nivní louce v zámeckém areálu u Minaretu (JK).

Na jižní Moravě v současnosti jen zřídka nalézaný a velmi lokální druh. Žije zejména na loukách v nivách řek.

Pterostichus (***Cryobius***) ***negligens negligens*** (Sturm, 1824) – Boh.: Krkonoše – Vysoké Kolo (5259), 28.VIII.2014 – 10 ex. a 5.IX.2014 – 2 ex., 1500 m n. m. (VO), 9.V.–5.VII.2015 – 3 ex. v ZP (RZ); Bořetín (5353), 14.IV.2016 – 5 ex. a 18.IV.2019 – 3 ex. v kamenném poli na vrchu Kozly (KL).

Reliktní chladnomilný druh, v Krkonoších velmi lokálně v kamenných sutích v alpínské zóně. Potvrzení stálého výskytu.

Pterostichus (***Cryobius***) ***pumilio pumilio*** (Dejean, 1828) – Boh.: Záblatí-Zvěřenice, PR Kaňon Blanice (7049), 4.VII.2021 – 2 ex. pod dřevem v lese v údolí Blanice (LT).

Horský lesní druh. Na Šumavě široce rozšířený.

Pterostichus (***Eosteropus***) ***rufitarsis cordatus*** Letzner, 1842 [ČS/NT] – Boh.: Říčky v Orlických horách (5764), 18.V.2019 – 1 ♂ + 2 ♀♀ pod kameny a dřevem v PR Komáří vrch (LT); Zdobnice (5764), 20.VII.2019 – 2 ♀♀ pod kameny v sedle nad Čertovým dolem (CHKO Orlické hory) (LT). Mor.: Čeladná, hora Smrk (6476), 10.VIII.1998 – 1 ex. (KO lgt. et coll., L. Spitzer det.) (KO); Bílá, NPR Salajka (6576), 29.IX.2009 – 1 ex. (KO lgt. et coll., V. Křivan det.) (KO), 9.VI.2014 – 1 ex. (KO lgt. et coll., VO det.) (KO); PR Jelení bučina (5869), 8.IX.2018 – 1 ex. v padlém kmenu buku (JK); PR Suchý vrch (5870), 19.V.2019 – 2 ex. na okraji suti porostlé mechem (JK); PR Rašeliniště na Smrku (5768), 28.VI.–18. VII.2020 – 20 ex. v ZP v rašelinné smrčině (JK); Lví hora (5768), 10.VII.2020 – 1 ex. v zemní pasti (R. Kočvara lgt., JK det. et coll.) (JK); PR Skalní potok (5869), 10.VII.2020 – 1 ex. v padlém kmenu smrku (JK).

Vzácný a lokální reliktní lesní druh, nalézaný především v zachovalých horských lesích.

Pterostichus (***Feronidius***) ***incommodus*** Schaum, 1858 [ČS/EN] – Mor.: Louka, PR Hloží (7070), 1.V.2015 – 1 ♂ + 1 ♀ pod kameny na pastvině (LT), 2 ex. (RE).

Stenotopní lesostepní až stepní druh. Potvrzení stálého výskytu na jediné známé lokalitě v ČR.

Pterostichus (***Feronidius***) ***melas melas*** (Creutzer, 1799) – **Boh.:** Chýnice, Zbuzovská vápenka (6051), 1.V.–31.VIII.2015 – 9 ex. v ZP (50°00′13″N, 14°16′10″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Milý, PR Milská stráň (5749), 5.V.2015 – 2 ex. v lesostepi (MO); Praha-Vokovice, Bořislavka (5952), 1.–15.VI.2018 – 9 ex. v ZP (MA lgt., VO det.) (VO); Hřivčice (5649), 25.IX.–19.X.2019 – 3 ex. v ZP (50°20′31″N, 13°56′27″E) (MA lgt., VO det.) (VO); **Mor.:** Starý Hrozenkov (7073), 1.–30. VI.2015 – 2 ex. v ZP v lomu (48°58′22″N, 17°52′10″E) (MA lgt., VO det.) (VO), 1.VI.–31. VIII.2015 – 13 ex. v ZP (48°58′44″N, 17°52‘01″E) (vše MA lgt., VO det.) (VO); Mikulov (7165), 1.–31.VIII.2015 – 1 ex. v ZP (48°49′20″N, 16°39′45″E) (MA lgt., VO det.) (VO).

Poměrně lokální druh hájů, listnatých lesů a lesostepí.

Pterostichus (***Melanius***) ***aterrimus aterrimus*** (Herbst, 1784) [ČS/VU] – **Boh.:** Ražice, NPR Řežabinec (6750), 24.III.2015 – 1 ex. (J. Ryšavý lgt. et coll., VO det.) (VO); Horní Ředice (5961), 12.IX.2015 – 1 ♂ (VE), 29.V.2016 – 1 ex. (MI).

Velmi lokální a zpravidla vzácný reliktní hygrofilní druh vázaný na přírodně zachovalé mokřady.

Pterostichus (***Melanius***) ***elongatus*** (Duftschmid, 1812) [ČS/NT] – **Mor.:** Rakvice – Trkmanský dvůr (7167), 3.V.2017 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE).

V ČR jen na jižní Moravě. Obývá zachovalé nezastíněné mokřady. V současnosti se šíří na nové lokality.

Pterostichus (***Pseudomaseus***) ***gracilis gracilis*** (Dejean, 1828) [ČS/VU] – **Boh.:** Lysá nad Labem (5755), 11.VI.2020 – 1 ♂ v mokřadu Žabák (LT). **Mor.:** Záhlinice (6770), 22.VII.2015 – 2 ex. na světlo (EE lgt. et coll., RE det.) (RE).

Hygrofil žijící na nezastíněných březích zachovalých mokřadů. V Čechách velmi lokální, na jižní Moravě poněkud častější.

Sinechostictus (***Pseudolimnaeum***) ***doderoi*** (Ganglbauer, 1891) [ČS/NT] – **Mor.:** Pozděchov (6773), 1.VI.2016 – 1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.) (RE); Kozlov (6471), 1.V.2017 – 1 ex. na stinném břehu potoka Jezernice (RZ); Morávka (6477), 16.IV.2020 – 1 ex. na stinném břehu potoka Slavíč (RZ); Pozděchov, Vizovické vrchy (6773), 13.V.2018 – 1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.); Vizovice (6773), 8.VI.2021 – 1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.); Troják (6672), 5.X.2021 – 1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.); Staré Hamry (6576), 2.IX.2016 – 1 ex. u Velkého potoka (T. Sitek lgt. et coll., ST det.) (ST).

Lokální, vzácný druh zastíněných břehů lesních potoků.

Sinechostictus (***Sinechostictus***) ***millerianus*** (Heyden, 1883) – **Boh.:** Záblatí-Zvěřenice (7049), 4.VII.2021 – 5 ex. na štěrkovo-kamenitém břehu Blanice u Řepešínského mlýna před hranicí PR Kaňon Blanice (LT).

Lokální a vzácný druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků. Potvrzení stálého výskytu na jedné ze dvou lokalit vČechách (cf. Veselý et al. 2020).

Sinechostictus (***Sinechostictus***) ***stomoides stomoides*** (Dejean, 1831) – **Boh.:** Bernartice-Křenov (5361), 19.V.2016 – 1 ex. ve štěrkopísku na břehu potoka Ličná (VO). **Mor.:** Stupava (6869), 19.V.2017 – 3 ex. na štěrkovo-jílovitém břehu Kyjovky v PP Stará hráz (LT); Skrbovice (5970), 2.VIII.2018 – 3 ex. u řeky Opavy (VK lgt. et coll., RE det.) (RE); Malenovice, PP Vo-

dopády Satiny (6476), 27.IV.–17.V.2019 – 2 ex. (KO lgt. et coll., VO det.) (KO); Karolínka, Pluskoveček (6675), 31.V.–13.VI.2021 – 1 ex. v ZP (KO lgt. et coll., RE det.) (RE); Kouty nad Desnou (5868), 6.IX.2018 – 4 ex. na štěrkové lavice Poniklého potoka (JK); PR Skalní potok (5869), 30.V.2020 – 3 ex. na kamenitém břehu potoka (JK); Nové Heřminovy (5971), 11.VI.2016 – 1 ex. na štěrkové lavici řeky Opavy u soutoku s Jelením potokem (JK); Hradec nad Moravicí (6173), 15.IV.2015 – 2 ex. ve štěrku na břehu potoka v údolí Moravice (ST).

Lokální druh zachovalých štěrkových břehů podhorských toků, nejčastější druh podrodu. V Nízkém Jeseníku vzácný druh.

Stenolophus (***Stenolophus***) ***discophorus*** (Fischer von Waldheim, 1823) [ČS/NT] – **Boh.:** Praha-Dubeč (5953), 7.VIII.2015 – 1 ex. na světlo na dně vypuštěného rybníka Slatina (VE); Kutná Hora – Malín (6057), 28.VII.2020 – 1 ex. na světlo (D. Kavka lgt., MK det. et coll.); Církvice (6058), 8.VIII.2020 – 1 ex. na světlo u rybníka Vrabcov (MK); Žehušice (6058), 10.VII.2021 – 1 ex. na světlo v zatopené pískovně (MK); Záboří nad Labem, PR Na hornické (5957), 13.VIII.2021 – 1 ex. v mokřadu (MK). **Mor.:** Bzenec (7069), 21.V.2021 – 1 ex. na břehu řeky Moravy (RZ).

Zejména v teplejších oblastech lokálně rozšířený druh hlinitopísčitých a písčitých břehù vod. Častější na dnech vypuštěných rybníků. V Čechách jde o další nálezy od potvrzení recentního výskytu v roce 2008 (cf. Vonička et al. 2017).

Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Němčice (5960), 11.I.2020 – 2 ex. v prosevu, (Z. Šeda lgt., det. et coll.) (ZU). **Mor.:** Rakvice (7166), 4.VII.2011 – 2 ex. na polní mokřině 2,5 km JZ (MO).

Druh žije na rozmanitých stanovištích, častější bývá na vlčích místech, například na okrajích lužních porostů. Na jihovýchodní Moravě v současnosti zcela běžný druh, který se zjevně šíří dále na sever. V Čechách byly doposud známé jen čtyři exempláře ze dvou lokalit: Korunka a vrch Rovný u Stadic (Veselý et al. 2002; Skoupý 2004). Potvrzení výskytu v Čechách.

Syntomus pallipes (Dejean, 1825) – **Boh.:** Husinec (5852), 26.III.–6.VII.2016 – 14 ex. v ZP v dubovém lese (MO et VO), 6.VI.2016 – 2 ex. v ekotonu les/pole (MO); Hřivčice (5649), 3.–24.VI.2019 – 3 ex. v ZP (50°20′31″N, 13°56′27″E) (MA lgt., VO det.) (VO); Nová Lhota (6057), 28.IV.2021 – 1 ex. v detritu na stepní stráni (MK); Týnec nad Labem (5958), 19.IX.2021 – 2 ex. při úpatí skalek na břehu Labe (VE); Kunětická hora (5960), 27.X.2021 – 6 ex. v prosevu (ZU); Horky nad Jizerou (5655), 3.XII.2021 – 1 ex. v prosevu (ZU).

V Čechách lokální xerofilní druh, rozšířený zvláště podél dolních toků Labe a Vltavy.

Tachys (***Paratachys***) ***fulvicollis*** (Dejean, 1831) – **Boh.:** Český Brod – Štolmíř (5955), 21.VII.2016 – 1 ex. na světlo na zahradě v obci (LT); Církvice (6058), 8.VIII.2020 – 2 ex. na světlo u rybníka Vrabcov (MK); Záboří nad Labem, PR Na hornické (5957), 19.VI.2021 – 1 ex. na světlo (MK). **Mor.:** Krumvíř (7067), 31.V.2008 – 1 ex. na světlo (KO lgt., et coll., V. Křivan det.) (KO); Velké Bílovice, PP Zimarky (7167), 31.V.2008 – 1 ex. na světlo (KO lgt., et coll., V. Křivan det. (KO); Zlín (6772), 1.VI.2015 – 1 ex. na světlo (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Dubňany, Kosteliska (7068), 1.VII.2020 – 1 ex. na světlo (KO lgt. et coll., RE det.) (RE); Čejč, PP Bílý Kopec (7067), 14.VII.2021 – 1 ex. na světlo (LB lgt. et coll., RE det.) (RE).

Nehojný halofilní druh, nalézaný nejčastěji na zasolených místech, na bahně vypuštěných rybníků nebo při odchytu na světlo. Jednotlivé nálezy pocházejí i z břehů zatopených pískoven a z močálů.

Tachys (***Paratachys***) ***micros*** (Fischer von Waldheim, 1828) – **Boh.:** Praha-Zbraslav (6052), 21.V.2018 – 1 ex. u soutoku Berounky a Vltavy (MA lgt., VO det.) (VO); Ledečko (6155), 19.V.2017 – 1 ex. na břehu řeky Sázavy (MK); Broumov, Rožmitál (5364), 22.VIII.2017 – 1 ex. (MM lgt. et coll., RE det.) (RE); Velké Karlovice (6675), 12.V.2021 – 1 ex. (KO lgt. et coll., RE det.) (RE); Bojmany (6058), 29.VI.2021 – 5 ex. na břehu řeky Doubravy (MK). **Mor.:** Hustopeče nad Bečvou (6473), 31.V.2015 – 8 ex. a 12.VIII.2016 – 1 ex.na štěrkové lavici řeky Bečvy u přítoku Mřenky (JK); Vsetín (6674), 20.V.2017 – 3 ex. na štěrkové lavici řeky Vsetínské Bečvy pod jezem u ulice U splavu (JK); Veselá (6772), 14.IX.2016 – 1 ex. na břehu řeky Dřevnice (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Rohatec, Soboňky (7069), 21.IV.2018 – 1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.) (RE).

Stenotopní druh žijící na štěrkových a písčitých březích dolních toků řek, výjimečně i v hliništích.

Tachys (***Paratachys***) ***turkestanicus*** Csiki, 1928 – **Mor.:** Ostrava-Koblov (6175), 27.IV.2018 – 2 ex. (L. Koloničný lgt. et coll., VE det.) (ST); Lanžhot, Obora Soutok (7367), 8.V.2020 – 1 ex. (VK lgt. et coll., RE det.).

Lokální druh vlhčích, otevřených hlinitopísčitých stanovišť, nejčastěji nalézaný na březích vod a v hliništích. Na SV Moravě vzácný.

Tachyura (***Tachyura***) ***quadrisignata quadrisignata*** (Duftschmid, 1812) – **Boh.:** Záblatí-Zvěřenice (7049), 3.VI.2021 – 41 ex. a 4.VII.2021 – 17 ex. na štěrkovo-kamenitém břehu Blanice v PR Kaňon Blanice (LT).

Druh zachovalých štěrkopískových a písčitých břehů řek.

Tachyura (***Tachyuropsis***) ***dulcis*** (Andrewes, 1925) – **Mor.:** Ostrava-Radvanice (6176), 23.I.2016 – 1 ex., 27.XII.2017 – 1 ex., 3.II.2018 – 23 ex. a 18.IV.2018 – 1 ex., vše v termicky aktivních částech odvalu Hedvika (RZ), 26.II.2021 – 5 ex. pod vlhkým mechem a kamínky na prohřátém povrchu hořící haldy Hedviky (ST); Slezská Ostrava (6175), 5.I.2020 – 3 ex. v termicky aktivní části haldy Ema (RZ).

Adventivní druh, z ČR je znám jen ze dvou termicky aktivních hald na okraji Ostravy.

Thalassophilus longicornis (Sturm, 1825) [ČS/NT] – **Mor.:** Vyšní Lhoty (6376), 14.VI.2008 – 1 ex. na štěrkové pláži u řeky Morávky (VA); Skalička (6472), 8.IV.2020 – 4 ex. pod kusem dřeva na písčitém břehu řeky Bečvy (RZ); Karviná-Ráj (6177), 27.V.2020 – 1 ex. na břehu řeky Olše (P. Boža lgt. et coll., ST det.) (ST).

Stenotopní druh vázaný výhradně na zachovalé štěrkové břehy podhorských a nížinných toků.

Trechoblemus micros (Herbst, 1784) – **Boh.:** Zeměchy (5648), 13.X.2016 – 1 ex. (MO); Mariánské Radčice (5448), 28.III.–25.IV.2020 – 1 ex. v ZP v předpolí lomu Bílina (MO et VO). **Mor.:** Zábřeh u Hlučína (6074), 18.X.2020 – 3 ex. v náplavu Opavy (M. Mantič lgt., coll. et det.) (ST).

V podzemních dutinách žijící druh. Častěji bývá nalézán jen v náplavech v nivách řek, v jeskyních a v norách hlodavců. Na SV Moravě vzácně v údolních nivách větších řek.

Trechus (***Epaphius***) ***rivularis*** (Gyllenhal, 1810) – **Boh.:** Boží Dar, NPR Božídarské rašeliniště (5543), 13.VI.2021 – 1 ex. v prosevu na mokré louce s rašeliníkem, 1030 m n. m. (J. Pávek lgt. et coll., HE det.) (HE); Chlum u Třeboně (7055), 5.VI.2016 – 1 ex. v mokřině u Purkrabského rybníka (MI).

Velmi lokální, stenotopní druh rašelinišť a podmáčených rašelinných luk od nížin do hor. Obě lokality byly doposud neznámé. NPR Božídarské rašeliniště představuje novou nejvýše položenou lokalitu druhu v ČR. Doposud to bylo Polské rašeliniště, 830 m (= Polské bažiny v PR Prameniště Chomutovky) taktéž v Krušných horách (cf. Bašta et al. 2002, Kaláb 2003).

Trechus (***Trechus***) ***amplicollis*** Fairmaire, 1859 – **Boh.:** Říčky v Orlických horách (5764), 24.VII.2019 – 6 ex. na podmáčené louce pod vrcholem Komářího vrchu (LT); Kačerov, PR Kačerovské rašeliniště (5764), 27.VII.2019 – 17 ex. na zastíněném lesním rašeliništi (LT); Bartošovice v Orlických horách, PR Rašeliniště pod Předním vrchem (5865), 27.VII.2019 – 13 ex. na lesním rašeliništi (LT); Jizerka (5257), 8.VIII.2017 – 6 ex., 12.VIII.2019 – 1 ex. a 23.V.2020 – 5 ex. vyšlapáno v rašelinových prohlubních v lese (KL). **Mor.:** Jeseníky – Velký kotel (5969), 15.VIII.2021 – 1 ex. (RZ); Hrubý Jeseník, Karlov pod Pradědem – Velká kotlina (5969), 2.VIII.2007 – 1 ex., 1100–1200 m n. m. (VA lgt. et coll., VO det.) (VA); Hrubý Jeseník, Ramzová env., Vozka (5868), 7.IX.2006 – 2 ex. v rašeliništi ve smrkovém lese, 1330 m n. m. (VA lgt. et coll., VO det.) (VA); Rejvíz (5769), 25.VII.2008 – 3 ex. v rašelinné depresi ve smrkovém lese, 1330 m n. m. (VA); Moravskoslezské Beskydy, Čeladná env., PR V Podolánkách (6576), 29.IX.2007 – 2 ex. v rašelinných depresích ve smrkovém lese (VA).

Lokální reliktní druh lesních rašelinišť a podmáčených půd v horách a podhůří.

Trechus (***Trechus***) ***austriacus*** Dejean, 1831 – **Boh.:** Husinec (5852), 11.X.2015–30.I.2016 – 1 ex. a 26.III.–9.V.2016 – 1 ex. v ZP v dubovém lese (MO et VO). **Mor.:** Oleksovice (7063), 29.V.2021 – 1 ex. mezi domem a loukou v zastavěném území (HE).

Široce rozšířený, ale skrytě žijící a jen lokálně nalézaný druh. Častěji je nalezán v různých podzemních prostorách nebo synantropně na skládkách, rumištích, ruderálech a podobných místech.

Trechus (***Trechus***) ***montanellus*** Gemminger et Harold, 1868 [ČS/VU] – **Mor.:** Hrubý Jeseník, Karlov pod Pradědem – Velká kotlina (5969), 2.VIII.2007 – 3 ex., 1100–1200 m n. m. (VA lgt. et coll., VO det.) (VA); Hrubý Jeseník – Ovčárna env. (5969), 14.VIII.2017 – 5 ex. (KL).

Velmi lokální montánní druh, obývající různé typy vlhkých až velmi vlhkých stanovišť.

Trechus (***Trechus***) ***obtusus obtusus*** Ericsson, 1837 – **Boh.:** Pardubičky (5960), 17.XI.2016 – 1 ex. v prosevu (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Vysoká Lípa – Zadní Jetřichovice (5152), 14.X.2017 – 1 ♀ u říčky Křinice (VA lgt. et coll., L. Koloničný det.) (VA); Zadní Doubice – Brtnický most (5052), 28.VII.2016 – 1 ♀ u říčky Křinice (VA lgt. et coll., L. Koloničný det.) (VA); Praha – Císařský ostrov (5852), 25.VII.2019 – 1 ex. do světelného UV lapače na hrázi v areálu ÚČOV (VE).

Spíše hygrofilní druh, v Čechách na většině území poměrně hojný. V populaci zpravidla výrazně převažují brachypterní jedinci, a tak jsou odchyty na světlo velmi ojedinělé.

Trechus (***Trechus***) ***pilisensis sudeticus*** Pawłowski, 1975 – **Boh.:** Jevany, NPR Voděradské bučiny (6054), 10.V.2015 – 9 ex. na částečně zastíněných březích potoka (LT lgt., det. et coll., 1 ex. coll. MO, 1 ex. coll. VO (LT); Staré Město pod Landštejnem, Kamenný vrch (6957), 5.VII.2015 – 11 ex. na lesním prameništi (LT).

Lesní druh, rozšířený zvláště v podhorských a horských lesích. Vyhledává břehy potoků, mokřady a prameniště. V nižších polohách lokálně a vzácně, především ve zbytcích původních bukových porostů.

Trechus (***Trechus***) ***pulchellus pulchellus*** Putzeys, 1845 – **Boh.:** Zadní Doubice, Brtnický most env. (5052), 18.VII.2014 – 1 ex. na břehu řeky Křinice spolu s *T. splendens* Gemminger et Harold, 1868 (MO); Sněžné (5663), 23.VII.2019 – 2 ex. na zarostlém hlinitém břehu říčky Olešenky (LT); Kačerov, PR Kačerovské rašeliniště (5764), 27.VII.2019 – 2 ex. na zastíněném lesním rašeliništi (LT); Říčky v Orlických horách, PR Komáří vrch (5764), 24.VII.2019 – 3 ex. v prameništi na západním úbočí Komářího vrchu (LT).

V horských a podhorských polohách hojný lesní druh, v nižších polohách jen lokálně a vzácně, především ve zbytcích původních bukových porostů.

Trechus (***Trechus***) ***striatulus*** Putzeys, 1847 – **Boh.:** Krkonoše – Vysoké Kolo, 28.VIII.2014 – 16 ex. a 5.IX.2014 – 5 ex., 1500 m n. m. (VO). **Mor.:** Trojanovice, Pustevny-Záryje (6575), 24.X.2015 – 1 ex. (EE lgt. et coll., RE det.) (RE); Keprník, vrchol (5868), 1.VI.–17.IX.2016 – 300 ex. v ZP na subalpínské louce, v porostech kleče a na plochách po odstranění kleče (JK); PR Jelení bučina (5869), 12.V.–26.V.VI.2018 – 1 ex. v ZP v bučině (JK); PR Suchý vrch, vrchol (5870), 2.6 – 24.VI.2019 – 1 ex. v ZP v menší suti v jedlině (JK).

Stenotopní horský druh, častý především v alpínském pásmu.

Zabrus (***Pelor***) ***spinipes spinipes*** (Fabricius, 1798) [ČS/VU] – **Mor.:** Pohořelice (7065), 27.V.–25.VI.2020 – 1 ex. v okenní pasti na akátu v lese Proklatá (J. Podešva lgt., JK det. et coll.) (JK); Oleksovice, vrch Dvorská (7063), 26.VI.2020 – 15 ex. na okraji pole s pohankou (HE).

Reliktní stepní druh. Lokálně ve stepní oblasti jižní Moravy. Les Proklatá není souvislý lesní porost. Jelikož jde o druh brachypterní, je pravděpodobné, že do okenní pasti vlezl (viz též *Limodromus krynickii*).

ZÁVĚR

V prezentovaném přehledu zajímavých nálezů lze vyzvednout jako nejdůležitější následující: *Dyschiriodes* (*Dyschiriodes*) *salinus striatopunctatus* (Putzeys, 1846), *Dyschiriodes* (*Chiridysus*) *strumosus* (Erichson, 1837), *Lebia* (*Lebia*) *humeralis* Dejean, 1825 a *Microlestes plagiatus* (Duftschmid, 1812). Uvedené nálezy potvrzují recentní výskyt v ČR a na Moravě. Nové nálezy druhu *Agonum* (*Olisares*) *hypocrita* (Apfelbeck, 1904) potvrzují recentní výskyt v ČR. Nálezy druhů: *Amara* (*Zezea*) *tricuspidata* Dejean, 1831, *Bembidion* (*Semicampa*) *schueppelii* Dejean, 1831, *Ophonus* (*Metophonus*) *subsinuatus* Rey, 1886, *Pogonus* (*Pogonus*) *luridipennis* (Germar, 1822) a *Syntomus obscuroguttatus* (Duftschmid, 1812) představují

potvrzení recentního výskytu v Čechách. *Leistus* (*Pogonophorus*) *montanus kultianus* Farkač et Fassati, 1999 je nový pro Moravu.

Díky v novodobé historii dosud nevídaným klimatickým změnám se stává faunistika střevlíkovitých brouků velmi dynamickým oborem. Orientovat se v ní vyžaduje soustavné a dlouhodobé úsilí při sběru informací v terénu. Díky členům Carabidologické sekce a jejím spolupracovníkům jsou k dispozici doklady pronikání a šíření neobvykle velkého počtu druhů na našem území. Migrace probíhá nejčastěji nejobvyklejší migrační trasou směřující z jižní a jihovýchodní Moravy dále na sever a západ, popřípadě dále přes východní Čechy do Polabí, podobně, jak ji zdokumentovali Stanovský & Boukal (2021) na příkladu druhu *Drypta* (*Drypta*) *dentata* (P. Rossi, 1790). Z dalších druhů uváděných v tomto příspěvku jde o *Acupalpus* (*Acupalpus*) *maculatus* (Schaum, 1860), *Agonum* (*Olisares*) *angustatum* Dejean, 1828, *Amblystomus niger* (Heer, 1841), *Brachinus* (*Brachinus*) *psophia* Audinet-Serville, 1821, *Parophonus* (*Ophonomimus*) *hirsutulus* (Dejean, 1829) a *Parophonus* (*Parophonus*) *dejeani* (Csiki, 1932).

U řady dalších druhů dochází ke změnám populační dynamiky. Druhy původně se vyskytující vzácně nebo lokálně, se stávají expanzívními a rozšiřují svůj areál. Jde o následující druhy: *Acupalpus* (*Acupalpus*) *dubius* (Schilsky, 1888), *Agonum* (*Olisares*) *lugens* (Duftschmid, 1812), *Bembidion* (*Emphanes*) *tenellum tenellum* Erichson, 1837, *Demetrias* (*Demetrias*) *atricapillus* (Linnaeus, 1758), *Diachromus germanus* (Linnaeus, 1758), *Harpalus* (*Cryptophonus*) *tenebrosus* Dejean, 1829, *Chlaenius* (*Chlaeniellus*) *tristis tristis* (Schaller, 1783), *Leistus* (*Pogonophorus*) *rufomarginatus* (Duftschmid, 1812), *Notiophilus rufipes* Curtis, 1829, *Ophonus* (*Ophonus*) *ardosiacus* (Lutshnik, 1922), *Platyderus rufus* (Duftschmid, 1812) a *Polistichus connexus* (Geoffroy, 1785). U většiny z nich se přitom rozšiřují i jejich doposud zdánlivě stabilní biotopové preference.

Naproti tomu některé druhy jsou na ústupu. Jednak se snižuje jejich populační hustota, jednak v řadě případů dochází i k jejich úplnému vymizení z dosud obývaných lokalit. Tato skutečnost se však dokumentuje hůře, zvláště jde-li o druhy dříve značně rozšířené až obecné, které nejsou obvykle podrobněji sledovány. Z druhů uváděných v tomto příspěvku jsou to: *Acupalpus* (*Ancylostria*) *interstitialis* Reitter, 1884, *Amara* (*Amara*) *spreta* Dejean, 1831, *Anisodactylus* (*Anisodactylus*) *nemorivagus* (Duftschmid, 1812), *Broscus cephalotes* (Linnaeus, 1758) *Carabus* (*Platycarabus*) *irregularis irregularis* Fabricius, 1792, *Carabus* (*Tachypus*) *auratus auratus* Linnaeus, 1761, *Carabus* (*Tachypus*) *cancellatus cancellatus* Illiger, 1798, *Cymindis* (*Cymindis*) *humeralis* Geoffroy, 1785, *Harpalus* (*Cryptophonus*) *melancholicus melancholicus* Dejean, 1829, *Olisthopus rotundatus rotundatus* (Paykull, 1790), *Poecilus* (*Poecilus*) *sericeus sericeus* Fischer von Waldheim, 1824.

Uvedené skutečnosti se samozřejmě netýkají jen území České republiky. Jejich prezentace v širším pojetí by ale daleko přesáhla rozsah tohoto příspěvku.

ERRATA

VESELÝ P., RESL K., STANOVSKÝ J., FARKAČ J., GRYCZ F., CHVALKOVSKÝ J., KAŠPAR L., KMECO R., LÁSKA R., LINHART M., MIKYŠKA A., MLEJNEK R., MORAVEC P., TĚŤÁL I., VONIČKA P & SOMMER D. 2020: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 2007–2014 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 2007–2014, supplemented with earlier data). *Klapalekiana* **56**: 87–130.

– str. 88, řádek 25: za text „KM – Rudolf KMECO," doplnit „**KU – Petr KUČERA**"
– str. 92, řádek 4: „Lanžhot, PR Soutok" opravit na „**Lanžhot, Soutok**". Dále v textu ještě opravit 8×: 93/23, 99/31, 100/6, 110/17, 111/6, 117/20, 122/12, 126/18.
– str. 93, řádek 41: vypustit (*Dyschirius*)
– str. 93, řádky 44–46: vypustit „Nálezy na lokalitě Hamr na Jezeře byl potvrzen výskyt na Českolipsku a v celém Libereckém kraji po téměř 100 letech (cf. Kral 1915)"
– str. 94, řádek 1: vypustit (*Dyschirius*)
– str. 96, řádek 31: „březů" opravit na „**břehů**"
– str. 98, řádek 20: „*millerianum*" opravit na „***millerianus***"
– str. 111, řádek 35: „intezivně" opravit na „**intenzivně**"
– str. 120, řádek 8: „(VE)" opravit na „**(DS)**"
– str. 128, řádek 15–16: vypustit KRAL H. 1915: Die Käfer aus em Gebiete des Kummergebirges. *Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenbach* **42**: 49–100.

LITERATURA

BAŠTA J., KALÁB J. & MORAVEC P. 2002: Distribution and ecology of Epaphius rivularis (Coleoptera: Carabidae) in the Czech Republic. *Klapalekiana* **38**: 163–171.

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1988). *Zpravodaj Západočeské Pobočky Československé Společnosti Entomologické v Plzni* **6–7** (1988–1989): 13–31 (in Czech, German title).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk za rok 1988. (Interessante Funde der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) in der Tschechoslowakei im Jahre 1989 und der Nachtrag zu den Funden im Jahre 1988). *Zpravodaj Západočeské Pobočky Československé Společnosti Entomologické v Plzni* **8**: 19–40 (in Czech, German summary).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1990 and supplement of prior period collections). *Zpravodaj Západočeské Pobočky Československé Společnosti Entomologické v Plzni, Series Carabidologica* **1**: 9–39 (in Czech, English abstract).

BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of carabids (Coleoptera, Carabidae) in Czechoslovakia in the year 1991 and supplementary data of prior period collections). *Zpravodaj Západočeské Pobočky Československé Společnosti Entomologické v Plzni*, *Series Carabidologica* **2**: 15–30 (in Czech, English summary).

FEDORENKO D. N. 1996: *Reclassification of world Dyschiriini, with a revision of the Palearctic fauna* (*Coleoptera, Carabidae*). Pensoft Publ., Sofia, Moscow & St. Petersburg, 224 pp.

HÄCKEL M. 2021: Příspěvek k poznatkům o rozšíření druhů rodu Calosoma (Coleoptera: Carabidae) na území hlavního města Prahy. (Contribution to the knowledge of the distribution of species of the genus Calosoma (Coleoptera: Carabidae) in the territory of the capital city of Prague). *Klapalekiana* **57**: 233–235.

HŮRKA K. 1996: *Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Carabidae České a Slovenské republiky*. Kabourek, Zlín, 565 pp. (in English and Czech).

KALÁB J. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 167. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **39**: 135.

KAVKA M., VEVERKA T. & HEJKAL J. 2022: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) na písčitých polích u Brambor a Horušic (střední Čechy). (Interesting findings of beetles (Coleoptera) on sandy fields near the Brambory and Horušice villages (central Bohemia)). *Elateridarium* **16**: 157–171 (in Czech, English abstract).

LINHART M. 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 308. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **47**: 54.

LÖBL I. & LÖBL D. 2017 (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden & Boston, 1443 pp.

MARGGI W. 2017: New Nomenclatural and Taxonomic Acts, and Comments. Carabidae: Harpalinae: Pterostichini. P. 19. In: LÖBL I. & LÖBL D. (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden & Boston, 1443 pp.

PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana* **32 (Supplementum)**: 1–115 (in Czech, English abstract).

PULPÁN J. & HŮRKA K. 1993: Carabidae. Pp. 12–22. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. *Folia Heyrovskyana* **Supplementum 1**: 3–172 (in English and Czech).

RESL K., LINHART M. & LÁSKA R. 2021: Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) lokality Bzenec-Přívoz. (Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the locality Bzenec-Přívoz). *Acta Carpathica Occidentalis* **12**: 103–133 (in Czech, English summary).

RESL K. & MIKÁT M. 2021: Faunistic records from the Czech Republic – 498. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **56**: 304.

SCHMIDT J. 1994: Revision der mit Agonum (s.str.) viduum (Panzer, 1797) verwandten Arten (Coleoptera, Carabidae). *Beiträge zur Entomologie* **44**: 3–51.

SKOUPÝ V. 2004: *Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána. Ground beetles (Coleoptera. Carabidae) of the Czech and Slovak republics of Jan Pulpán's collection.* Jan Farkač, Vladimír Skoupý & Public History, Praha, 213 pp. + CD (in Czech and English).

STANOVSKÝ J. & PULPÁN J. 2006: *Střevlíkovití brouci Slezska (Coleoptera, Carabidae) (severovýchodní Moravy)*. (*Die Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) der Schlesien (nordöstlich Mähren)*). Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, 159 pp. (in Czech and German, English abstract).

STANOVSKÝ J. & BOUKAL J. 2021: Výskyt a šíření střevlíčka Drypta dentata (Coleoptera: Carabidae) v České republice. (The occurrence and spreading of the ground beetle Drypta dentata (Coleoptera: Carabidae) in the Czech Republic). *Západočeské Entomologické Listy* **12**: 65–79 (in Czech, English abstract).

STREJČEK J. & HONCŮ M. 1977: Průzkum hmyzu státní přírodní rezervace Slanisko na Mostecku. (Erforschung der Insekten des staatlichen Naturschutzgebietes Slanisko in der Nähe von Most). *Sborník Severočeského Musea, Přírodní Vědy* **9**: 31–45 (in Czech, German summary).

TRMAL A. 2008: Příspěvek k poznání brouků na Sedlčansku. (A contribution to knowledge of the beetle fauna (Coleoptera) in the Sedlčany region (Central Bohemia). *Vlastivědný Sborník Středního Povltaví* **1**: 78–179 (in Czech, English abstract).

TROPEK R., PLÁTEK M., ČÍŽEK O. & ČERNÁ I. 2014: Výskyt střevlíka Pogonus luridipennis (Germar, 1823) (Coleoptera: Carabidae) v Čechách po 143 letech. (Occurence of Pogonus luridipennis (Germar, 1823) (Coleoptera: Carabidae) in Bohemia after 143 years). *Elateridarium* **8**: 118–119 (in Czech, English abstract).

VESELÝ P., MORAVEC P. & STANOVSKÝ J. 2017: Carabidae (střevlíkovití). Pp. 295–301. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates. *Příroda* (Praha) **36**: 1–612 (in Czech and English).

VESELÝ P. & RESL K. 2021: Bionomie, životní cyklus a rozšíření druhu Ophonus (Metophonus) subsinuatus Rey, 1886 (Coleoptera: Carabidae) ve střední Evropě. (Bionomy, life cycle and distribution of species Ophonus (Metophonus) subsinuatus Rey, 1886 (Coleoptera: Carabidae) in Central Europe). *Klapalekiana* **57**: 301–311 (in Czech, English abstract).

VESELÝ P., RESL K. & TĚŤÁL I. 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 1997–2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 1997–2001 with supplementary pre- 1997 data). *Klapalekiana* **38**: 85–109 (in Czech, English summary).

VESELÝ P., RESL K., STANOVSKÝ J., FARKAČ J., GRYCZ F., KAŠPAR L., KMECO R., KOPECKÝ T., KŘIVAN V., LÁSKA R., MIKYŠKA A., MLEJNEK R., MORAVEC P., NAKLÁDAL O., PROUZA J., ŘÍHA J., VONIČKA P. & ZÚBER M. 2009: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2002–2006 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from the Czech Republic in the years 2002–2006 with supplementary earlier data). *Klapalekiana* **45**: 83–116 (in Czech, English summary).

VESELÝ P., RESL K., STANOVSKÝ J., FARKAČ J., GRYCZ F., CHVALKOVSKÝ J., KAŠPAR L., KMECO R., LÁSKA R., LINHART M., MIKYŠKA A., MLEJNEK R., MORAVEC P., TĚŤÁL I., VONIČKA P & SOMMER D. 2020: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 2007–2014

a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 2007–2014, supplemented with earlier data). *Klapalekiana* **56**: 87–130 (in Czech, English summary).
VESELÝ P., ŠLACHTA M., BLÍZEK J. & HEJKAL J. 2012: Pozoruhodný výskyt střevlíka Ophonus (Ophonus) ardosiacus (Lutshnik, 1922) v západních Čechách. (Noteworthy occurence of ground beetle Ophonus (Ophonus) ardosiacus (Lutshnik, 1922) in Western Bohemia). *Erica* (Plzeň) **19**: 129–137 (in Czech, English summary).
VESELÝ P. & TĚŤÁL I. 1998: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska v letech 1992–96 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting findings of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from Bohemia, Moravia and Slovakia in the years 1992–96 with supplementary data on earlier records). *Klapalekiana* **34**: 99–131 (in Czech, English summary).
VONIČKA P. 2008: Faunistic records from the Czech Republic – 269. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **44**: 302.
VONIČKA P., BRÁDKA J., GRYCZ F., LINHART M., MAJER J., MORAVEC P., RESL K. & VESELÝ P. 2017: Faunistic records from the Czech Republic – 433. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **53**: 383–387.
VONIČKA P., VESELÝ P. & LINHART M. 2014: Faunistic records from the Czech Republic – 375. Coleoptera: Carabidae. *Klapalekiana* **50**: 262.

VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/7698185C778DA46FC125654B0044DDBC/%24file/V%20395_1992.pdf

SUMMARY

We present new faunistic records of 219 rare or little known species of the family Carabidae from the Czech Republic obtained from 19 collections. Notes on the biology and habitats of most of species are included. The following records are particularly interesting: *Dyschiriodes* (*Dyschiriodes*) *salinus striatopunctatus* (Putzeys, 1846), *Dyschiriodes* (*Chiridysus*) *strumosus* (Erichson, 1837) and *Microlestes plagiatus* (Duftschmid, 1812) (confirmation of recent presence in Moravia and the Czech Republic), *Amara* (*Zezea*) *tricuspidata* Dejean, 1831, *Bembidion* (*Semicampa*) *schueppelii* Dejean, 1831, *Ophonus* (*Metophonus*) *subsinuatus* Rey, 1886, *Pogonus* (*Pogonus*) *luridipennis* (Germar, 1822) and *Syntomus obscuroguttatus* (Duftschmid, 1812) (confirmation of recent presence in Bohemia), *Agonum* (*Olisares*) *hypocrita* (Apfelbeck, 1904) (confirmation of recent presence in Bohemia and the Czech Republic). Other significant finds for Bohemia include: *Acupalpus* (*Acupalpus*) *brunnipes* (Sturm, 1825) (light trap), *Calosoma* (*Calosoma*) *sycophanta* (Linnaeus, 1758), *Miscodera arctica* (Paykull, 1798), *Parophonus* (*Ophonomimus*) *hirsutulus* (Dejean, 1829) and *Stenolophus* (*Stenolophus*) *discophorus* (Fischer von Waldheim, 1823). Among significant finds for Moravia are: *Leistus* (*Pogonophorus*) *montanus kultianus* Farkač et Fassati, 1999 (new species for Moravia), *Dromius* (*Dromius*) *laeviceps* Motschulsky, 1850, *Dromius* (*Dromius*) *quadraticollis* A. Morawitz, 1862, *Lebia* (*Lebia*) *humeralis* Dejean, 1825 and *Patrobus septentrionis australis* J. R. Sahlberg, 1875.

The number in parentheses after the locality name represents the grid mapping square code used for faunistic research in the Czech Republic (Pruner & Míka 1996). The following shortcuts are used: Boh. = Bohemia; J = south; JV = south-east; JZ = south-west; MBF = Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, Czech Republic; Mor. = Moravia; NPP = National Natural Monument; NPR = National Nature Reserve; observ. = observed; OU = University of Ostrava; PP = Natural Monument; PR = Nature Reserve; revid. = revised; SV = north-east;

UV = ultraviolet light; ÚČOV = Central Wastewater Treatment Plant (Prague); V = east; ZP = pitfal trap(s); [§KO] = Critically Endangered according to public notice MŽP ČR No. 395/1992 Sb.; [§O] = Endangered according to public notice MŽP ČR No. 395/1992 Sb.; [ČS/CR] = Critically Endangered, [ČS/EN] = Endangered, [ČS/RE] = Regionally Extinct, [ČS/NT] = Near Threatened, [ČS/VU] = Vulnerable (statuses according to family Carabidae in the Red List of threatened species of Czech Republic, see Veselý et al. (2017)).