


Výzva ke spolupráci při mapování nálezů číhalky Atherix ibis (F.), Rhagionidae (Diptera).

K. Spitzer

Mezi ethologicky velmi zajímavé druhy dvoukřídlého hmyzu patří nesporně číhalka Atherix ibis (F.). Oplozené samičky vytvářejí v době kladení vajíček velice nápadné shluky stovek jedinců navzájem téměř stmelených masou vajíček. Tyto roje se vždy vytvářejí nad hladinou vodních toků - na větvích nebo konstrukcích dřevěných a betonových mostů. Malé larvy se ze shluků uvolňují, padají do vody, kde po 1-2 letech dokončují vývoj. Postupující znečišťování našich řek je hlavní příčina mizení A. ibis (F.) a bylo by proto velmi záslužné sledovat současný stav rozšíření, neboť začátkem století areál tohoto druhu zahrnoval téměř celé území Československa a nyní zde zbývá pravděpodobně již jen málo lokalit.

Samičky číhalky Atherix ibis (F.) jsou středně velké (8,5 - 11 mm), zavalité, černošedě zbarvené,mouchy, křídla jsou skvrnitá. Nápadné shluky, na předmětech nad voudou řek a potoků,připomínající včelí roje, nevytvářejí žádné jiné druhy dvoukřídlých. Roje se často, pravidelně po mnoho let usazují vždy na témže místě nad vodním tokem. Jejich tvorba začíná zpravidla v červnu, odumírají během července a srpna. Iniciální bod shluku může být jediná první kladoucí samička nebo zbytky loňského roje, kolem kterých se shlukují číhalky často až do množství několika set, výjimečně i tisíců kusů (viz též Živa 18(3):103, 1970).

Autor této výzvy bude vděčný za všechny zprávy o pozorovaných rojích číhalky Atherix ibis (F.) s uvedením přesného místa nálezu

(místo, řeka atd.), data, počtu shluků a doložením několika kusy ♀♀. Spolupráce bude při publikování výsledků průzkumu náležitě oceněna. Hlášení a vzorky materiálu zasílejte na adresu: Ing. Karel Spitzer CSc., Vysoká škola zemědělská, PEF, ul. V. Sinkuleho 5, 370 05 České Budějovice. Chraňte objevené roje číhalky Atherix ibis (F.) před zbytečným poškozováním.

