

STŘEVLIČI NA LOKALITĚ HOSTOŮŇ U Kladna (CARABIDAE, COLEOPTERA)

Laufkafer des Fundortes Hostouň bei Kladno in Mittelböhmen
(Carabidae, Coleoptera)

F. Huja

Uvádím seznam druhů čeledi Carabidae (bez podčeledi Carabinae) nalezených na zajímavé lokalitě vých. obce Hostouň u Kladna. Lokalita, jejímž středem protéká Sulevický potok, leží cca 250 m n. m. a měří 100 x 100 m. V minulosti zde byl široký náplav jílu a opuky, asi před 20 lety se zde provedly meliorační práce a vytvořilo se kamenné koryto pro potok. Podél něho se táhne široký úhor, odvodněné okolí živoří a úroda na něm je minimální. Některé druhy zde někdy byly velmi přemnožené, takže např. 1. VI. 1969 se vyskytovaly masově Amara majuscula, A. convexiuscula, A. ingenua, Harpalus rufibarbis, Synuchus nivalis, Lasiotrechus discus. Celkem jsem zjistil 91 druhů. Sběry byly prováděny v letech od r. 1965 do r. 1970 pravidelně od II. do XII. měsíce. Za determinaci sběrů děkuji p. Z. Kučerovi a O. Voříškovi z Kladna a J. Pulpánovi z Prahy.

Druh Art	Měsíc (Monat)											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. <u>Leistus ferrugineus</u> (L.)				10		15		10	5			
2. <u>Notiophilus aestuans</u> (Mots.)				3			2					
3. <u>Notiophilus palustris</u> (Dft.)				15		10		10	2			1
4. <u>Notiophilus biguttatus</u> (F.)							2					
5. <u>Elaphrus riparius</u> (L.)							5					
6. <u>Loricera pilicornis</u> (F.)				8	5			6				
7. <u>Clivina fossor</u> (L.)			10				7		3			2
8. <u>Clivina contracta</u> (Geoffr.)				5		3						
9. <u>Dyschirius globosus</u> (Hrbst.)				10	10							
10. <u>Asaphidion flavipes</u> (L.)					3			3	2			3
11. <u>Bembidion lampros</u> (Hrbst.)				5		4		6	3			
12. <u>Bembidion properans</u> (Steph.)			4		7							

"Zprávy Českoslov. spol. entomol. ČSAV, Praha, 9, 1973."

Druh Art	Měsíc (Monat)											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
13. <u>Bembidion tetracolum</u> Say = <u>ustulatum</u> auct. nec (L.)				4			2					
14. <u>Bembidion gilvipes</u> (Strm.)				10		6		8				
15. <u>Bembidion quadripustulatum</u> (Serv)				5	10							
16. <u>Bembidion quadrimaculatum</u> (L.)			3			7						2
17. <u>Bembidion obtusum</u> (Serv.)		50		20				10				
18. <u>Bembidion biguttatum</u> (F.)				30		10						
19. <u>Bembidion unicolor</u> (Chaud.)			2									
20. <u>Bembidion lunulatum</u> (Geoffr.)					5		2					
21. <u>Tachys bistriatus</u> (Dft.)				1	2							
22. <u>Trechus secalis</u> (Payk.)					20	30						
23. <u>Trechus quadristriatus</u> (Schrnk.)					10		12		5			
24. <u>Trechoblemus micros</u> (Hrbst.)			2		5				5		2	
25. <u>Lasiotrechus discus</u> (F.)						30			10			
26. <u>Patrobus atrorufus</u> (Stroem.)					5	2						
27. <u>Panagaeus cruxmajor</u> (L.)				2								
28. <u>Chlaenius vestitus</u> (Payk.)				3		7						
29. <u>Chlaenius nitidulus</u> (Schrnk.)				10		5						
30. <u>Chlaenius nigricornis</u> melano- cornis (Dej.)				5		3						
31. <u>Badister bipustulatus</u> (F.)			30									
32. <u>Badister lacertosus</u> Strm.			20			5						
33. <u>Badister meridionalis</u> (Puel.)				5								
34. <u>Badister sodalis</u> (Dft.)			10		7							
35. <u>Harpalus seladon</u> Schaubg.					10							
36. <u>Harpalus schaubergerianus</u> Puel. ¹⁾				50			20					
37. <u>Harpalus puncticollis</u> (Payk.)					30							
38. <u>Harpalus melleti</u> Heer					2							
39. <u>Harpalus rufipes</u> (De Geer.)					8				2			
40. <u>Harpalus aeneus</u> (F.)				10				10		3		
41. <u>Harpalus distinguendus</u> (Dft.)					5	4						
42. <u>Harpalus latus</u> (L.)				3								
43. <u>Harpalus luteicornis</u> (Dft.)					2							
44. <u>Harpalus rubripes</u> (Dft.)				10	5		5	15				
45. <u>Harpalus anxius</u> (Dft.)				1								
46. <u>Harpalus subcylindricus</u> Dej.					4							
47. <u>Harpalus punctatulus</u> (Dft.)				20	10							
48. <u>Acupalpus flavicollis</u> (Strm.)				8								
49. <u>Acupalpus meridianus</u> (L.)				20		3						

Druh Art	Měsíc (Monat)											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
50. <u>Acupalpus teuronus</u> (Schrnk.)					1							
51. <u>Bradycellus harpalinus</u> (Serv.)				4						1		
52. <u>Bradycellus collaris</u> (Payk.)				20	30							
53. <u>Trichocellus placidus</u> (Gyll.)								3				
54. <u>Dichirotrichus rufithorax</u> (Sahl.)				10			6					
55. <u>Anisodactylus binotatus</u> (F.)					5	7		4				
56. <u>Amara similata</u> (Gyll.)							10	4				
57. <u>Amara ovata</u> (F.)					10			20				
58. <u>Amara communis</u> (Pnz.)					4	8						
59. <u>Amara litorea</u> Thom.				1		1						
60. <u>Amara aenea</u> (De Geer)					20			5				
61. <u>Amara familiaris</u> (Dft.)					11	8						
62. <u>Amara ingenua</u> (Dft.)					20		3					
63. <u>Amara municipalis</u> (Dft.)								3		1		
64. <u>Amara bifrons</u> (Gyll.)							10	10				
65. <u>Amara consularis</u> (Dft.)		3		30				5				
66. <u>Amara aprocaria</u> (Payk.)							1					
67. <u>Amara majuscula</u> Chaud.					50	stovky		10				
68. <u>Amara aulica</u> (Pnz.)				20		10						
69. <u>Amara convexiuscula bohémica</u> Fass.							50					
70. <u>Stomis pumicatus</u> (Pnz.)				10			10			20		
71. <u>Pterostichus cupreus</u> (L.)				20				10				
72. <u>Pterostichus versicolor</u> Strm. ²⁾				2	4							
73. <u>Pterostichus niger</u> (Schall.)				10		5	4					
74. <u>Pterostichus melanarius</u> (Ill.) ³⁾			10					12		4		
75. <u>Pterostichus nigrita</u> (F.)			10		4		8				3	
76. <u>Pterostichus anthracinus</u> (Ill.)			7	10		3						
77. <u>Pterostichus strenuus</u> (Pnz.)			12			5		7				
78. <u>Pterostichus melas</u> (Creutz.)					6	4						
79. <u>Calathus fuscipes</u> (Goeze)						8		3				
80. <u>Calathus melanocephalus</u> (L.)				4		5				2		
81. <u>Calathus mollis</u> (Marsh.)					1							
82. <u>Synuchus nivalis</u> (Pnz.)						50	20					
83. <u>Agonum muelleri</u> (Hrbst.)				5		3		3				
84. <u>Agonum moestum</u> (Dft.)								3	7			
85. <u>Agonum viduum</u> (Pnz.)				3		2						
86. <u>Agonum fuliginosum</u> (Pnz.)				40	20		10					5
87. <u>Agonum thoreyi</u> (Dej.)					3							

Druh Art	Měsíc (Monat)											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
88. <u>Agonum assimile</u> (Payk.)				5		3		2				
89. <u>Agonum ruficorne</u> (Goeze)				30	20							
90. <u>Agonum dorsale</u> (Pont.)			20					10		5		
91. <u>Lebia chlorocephala</u> (Hoffm.)				2								

- 1) = rufibrubis auct. nec. (F.)
2) = coerulescens auct. nec. (L.)
3) = vulgaris auct. nec. (L.)

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Autor hat während der Jahre 1965 bis 1970 regelmässig Carabiden (ohne Carabinae) auf einem Standort bei Hostouň (250 m) bei Kladno (westlich von Prag) gesammelt. Die Lokalität misst 100 x 100 m und wird von dem Bach Sulevický potok durchflossen. Es handelt sich im Wesentlichen um ein braches Land, welches nach vor 20 Jahren durchgeführten Meliorations - und Entwässerungsarbeiten entstanden ist. Einige Arten haben sich hier manchmal übermehrt, so wurden z. B. am 1.VI.1969 die im zweiten Absatz angeführten Arten sehr zahlreich gesammelt. In der Tabelle werden die 91 festgestellten Arten angeführt und die Zahl der gefundenen Stücke in einzelnen Monaten angegeben. "Stovky" heisst Hunderte.

Adresa autora (Anschrift des Autors): František Huja, Hostouň 41, u Kladna