A.(Ceratapion) carduorum Kirby.
Jednotlivé exempláře po celé oblasti, na Cirsium palustre (celkem 7 ex.).

A.(Omphalapion) hookeri Kirby.
Velmi lokálně (Rumburk, Lobendava) na Tripleurospermum maritimum (celkem 7 ex.).

A.(Synapion) ebeninum Kirby.
2 ex. u Rumburka na Vicia cracca.

A.(Leptapion) meliloti Kirby.
2 ♀♀ na ruderálu v Dolních Křečanech na Medicago lupulina! ve smíšeném společenstvu Melilotus albus a Medicago lupulina.

A.(Leptapion) loti Kirby.
Jednotlivé exempláře porůznu po celé oblasti, na Lotus corniculatus (celkem 9 ex.).

(Pokračování ve 3.čísle).

TAXONOMICKÁ POZNÁMKA O DRUHU CHRYSOLINA ASCLEPIADIS (VILLA) (COL., CHRYSOMELIDAE).

Leo H e y r o v s k ý

U druhu Chrysolina asclepiadis (Villa), který žije u nás vzácně a sporadicky na xerothermních biotopech na Vincetoxicum officinale, rozeznává Dr.J.Müller dvě rasy, odlišující se velmi nápadně formou štítu. Typická forma, žijící jižně od Alp v Italii (Piemontu, Lombardsku a Benátsku) a v Jugoslavii (Istrie) má štít formy téměř lichoběžníkové s největší šíří na basi. Naproti tomu rasa středoevropská, popsaná jím jako ssp.bohemica J.Müller (Atti Mus.Trieste, 1948: 95) má štít se stranami k předním rohům silně zaokrouhlenými, s největší šíří asi uprostřed okrajů. Tato rasa byla popsána ze Švýcar a z Čech. Všechny české kusy patří tedy k ssp.bohemica. Chrysolina asclepiadis (Villa) byla považována dříve za rasu druhu Chr.aurichalcea Mannerh., dr.Müller ji však považuje za samostatný druh. Tím doplňuji svůj údaj o tomto brouku v článku "Příspěvek k faunistice a bionomii československých Coleopter"(Čas.Čs.Spol.ent.,1960:404).