

K POZNÁNÍ MOTÝLŮ OKOLÍ SOKOLOVA V ČECHÁCH (LEP.)

Zur Kenntnis der Schmetterlinge der Umgebung von Hřebený bei Sokolov in Böhmen (Lep.)

M. Benetka

Studované území - osada Hřebený s okolím - se prostírá v západní části Krušnohorské soustavy 8 km severně od Sokolova (dříve Falknova). Průměrná nadmořská výška je 600 m, terén velmi členitý s hlubokými zářezy potoků a říček. Převládá smíšený les, roste zde ponejvíce bříza. Zbytek tvoří pastviny, mokré louky a pole. Charakter květeny je podhorský až horský.

Za 23 let působení jsem zde zjistil 555 druhů Lepidopter, z toho 73 Rhopalocer a 482 Heterocer. Noční motýly jsem lovil převážně na světlo v místnosti, a to na 500 W žárovku, v posledních dvou letech na rtuťové výbojkové světlo (250 W). Ze zajímavějších a vzácnějších druhů uvádím:

Euphydryas aurinia Rott. - Hřebený, Krajková, Libnov. Téměř každý rok hojný, hl. VI. a VII.

Heodes alciphron Rott, - Údolí říčky Svatavky u osady Luh 14. VII. 1957 3 ♂, 2 ♀; Ovčí rybník u Krajkové, vlhké louky 14. VII. 1959 4 ♂, 3 ♀, 1961 2 ♂, 1 ♀.

Carterocephalus palaemon Pall. - Hřebený, Luh, okraje lesů a přilehlé louky. Téměř každý rok, jednotlivě.

Parasemia plantaginis L. - Hřebený, okraje lesů a lesní světliny, VI.-VII. jednotlivě. Převládá f. matronalis Frr.

Trichiura crataegi L. - VIII.-IX. 1953 4 ♂, 1970 7 ♂; na světlo.

Cosmotriche lunigera Esp. - 22.VII. 1953 1 ex., VI. 1969 3 ex., VI. 1970 11 ks ♂; na světlo.

Lemonia taraxaci Esp. - 20.-27.VIII. 1957 6 ♂, 1 ♀, v dalších letech nebyl pozorován.

Endromis versicolora L. - IV.-V. každým rokem několik ♂ i ♀; na světlo.

Cerura bicuspis Bkh. - 27.V.-6.VI. 1970 5 ♂, na světlo.

Stauropus fagi L. - Počátek VI. 1970 8 ex. na světlo.

"Zprávy Českoslov. spol. entomol. ČSAV, Praha, 9, 1973."

Tethea fluctuosa Hb. - VII.1967-1970, vždy 2-4 ex.
Tethea duplaris L. - Jako předešlý.
Zeuzera pyrina Esp. - 23.VII.-9.VIII.1970. 9 ♂, na světlo.
Panthea coenobita Esp. - 4.-12.VII.1970, velmi hojný, na světlo.
Acronicta alni L. - 11.-23.VI.1970 16 ♂, 1 ♀ na světlo; 1 ex. f. steinerti Casp.
Agrotis polygona F. - 29.VII.-6.VIII.1970 5 ♂, na světlo.
Rhyacia lucipeta Schiff. - VII.-VIII. 1-3 ex. téměř každý rok.
Eurois occulta L. - jako předešlý.
Eriopygodes imbecilla F. - 23.VI.-5.VII.1969 4 ex.; VII.1970 5 ex.; na světlo.
Phytometra bractea F. - 3.VII.1961 1 ex., 5.VII.1963 1 ex., VII. 1969 11 ex., VII. 1970 5 ex.; na světlo.
Phytometra festucae L. - VII.1969 4 ex., VII.1970 6 ex.; na světlo.
Phytometra jota L. - VI.-VII., několik ex. téměř každý rok.
Phytometra pulchrina Haw. - VI.-VIII., téměř každý rok, hojnější než předešlý.
Phytometra confusa Steph. - 11.VI.1970 1 ex., na světlo.
Anaitis praeformata Hbn. - VI.-VII., téměř každý rok, jednotlivě.
Campaea margaritata L. - VII., několik ex. téměř každý rok.
Abraxas sylvata Scop. - VI.-VIII., každý rok hojně; 11.VII.1970 1 ex. f. pantarioides Spitz.
Cidaria flavofasciata Thnbg. - 11.VII.1970 1 ex., na světlo.
Eustroma reticulata Schiff. - 26.VII.1967 1 ex., VI.1969 2 ex., 8.VI.1970 2 ex..
Trichopteryx sertata Hbn. - 20.VII.1970 3 ex., na světlo.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im Gebiete beim Dorf Hřebeň, 8 km nördlich von Sokolov (ehemals Falkenau) in Westböhmen konnte der Verfasser während seiner 23 jährigen Sammeltätigkeit insgesamt 555 Lepidopterenarten, davon 73 Rhopulocera falter, und 482 Heterocera feststellen. Das Verzeichnis gibt Funde bemerkenswerter Arten an.

L i t e r a t u r a

KOCH, M. 1955, 1956, 1958, 1961, : Wir bestimmen Schmetterlinge 1, 2, 3, 4, Berlin. -
KOMÁREK, J., Tykač, J., 1949: Klíč a atlas motýlů. Praha. - SCHWARZ, R., 1948, 1949,
1953: Motýli 1, 2, 3. Praha.

Adresa autora (Anschrift des Autors): Mir. Benetka, Hřebeny 31, 35708 Krajková, okres
Sokolov.

