THEOPHILEA CYLINDRICOLLIS PIC, (COL.CERAMBYCIDAE)
NOVÝ DRUH TESAŘÍKA NA ÚZEMÍ ČSSR
EINE NEUE ART FÜR DIE TSCHECHOSLOWAKEI

Jaroslav S e k e r a


Při sběru hmyzu v okolí Komárna na jižním Slovensku jsem ve dnech 1. až 3.června 1974 sesmýkal několik exemplářů tesaříka Theophilea cylindricollis Pic 1895. Lokalitou byl travnatý porost na kterém se také vyskytuje blízce příbuzný druh Calamobius filum (Rossi)1790, kterého jsem v blízkém okolí sesmýkal také několik kusů.

Heyrovský 1967 uvádí, že druh Theophilea cylindricollis Pic je pravděpodobně pontického původu, který byl popsán z Turecké Armé - nie. Později byl nalézán v SSSR na Kubani 1931, v Doněcké pánvi 1948 (Plavilščikov)a v roce 1964 již v jižním Maďarsku (Dr.Křeček).Dále byl zjištěn v Bakoňském pohoří u města Zirc.Nejnovější nálezy jsou hlášeny z okolí Balatonského jezera u obce Balatonföldvar (Gaskó Kálmán).

Expanzivní rozšíření tohoto druhu dosáhlo již jižního území našeho státu u Komárna. Doklady odtud v coll.Sekera.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Theophilea cylindricollis Pic,1895, welche bisher aus Türkisch - Armenien, Kuban, Südrussland und Ungarn bekannt war, wurde in der Südslowakei bei Komárno 1.-3.VI.1974 Sekera lgt.et coll. in Gesellschaft von Calamobius filum(Rossi)gefunden.



L i t e r a t u r a

HEYROVSKY L.,1967, Theophilea cylindricollis Pic, eine neue Bockäfergatun für Mitteleuropa.Acta entomol.bohemoslovaca Tom.64:235.

KASZAB Z.,1971, Cincerék-Cerambycidae. Fauna Hungariae. 106:251.

Adresa autora (Anschrift des Autors) :
Ing.Jaroslav Sekera, Wolkerova 1, PSČ 767 01 Kroměříž.

P o z n á m k a

Pro informaci čtenářů uvádíme stručný klíč k určení druhu Theophilea cylindricollis Pic v porovnání s druhem Calamobius filum(Rossi.)


(s laskavým svolením p.Dr.Heyrovského.)

1 (2) Tykadla samečka jsou delší skoro dvakrát,samičky jeden a půlkrát než tělo,dole bez ochlupení.Třetí článek tykadel je o málo delší než první.
První článek zadních tarsů krátký, druhý je dlouhý jako třetí.
Krovky jemně, zhuštěně, přiléhavě tomentovány.
Délka těla 5 - 11 mm


C a l a m o b i u s Guér.

2 (1) Tykadla samečka jsou o málo delší, samičky sotva tak dlouhé jako tělo , na spodní straně skoro až ke špičce jemně obrvené. Třetí článek tykadel je skoro dvakrát delší než první.
První článek předních tarsů dlouhý,druhý mnohem delší než třetí.
Krovky kovově zelené nebo tmavě zelené , holé, jenom na špičce řídce obrvené.
Délka těla 7 - 10 mm

T h e o p h i l e a Pic



Calamobius filum Rossi ♂



Theophilea cylindricollis Pic ♂