num finitimarum. Acta Zool.Acad.Sci.Hung., 1: 187. E r d ő s J., 1957: Series Encyrtidarum novarum hungaricarum. Acta Zool. Acad.Sci.Hung., 3: 5. E r d ő s J., 1960: Synonymiae novae Euryytomidarum et Cleonymidarum necnon species novae Encyrtidarum, praesertim in territorio reservato Batorliget collectarum. Acta Zool.Acad.Sci.Hung., 6: 305. H o f f e r A., 1954: Encyrtidae (Hymenoptera - Chalcidoidea), quae in reservationibus naturae in Čechoslovakia occurrunt. Pars II. Ochrana přírody, 9: 169. H o f f e r A., 1960: A revision of the Czechoslovak genera of the subfamily Encyrtinae with a reduced number of funicle segments. Acta Faun.Ent.Mus.Nat.Pragae, 6: 93. M e r c e t R.G., 1919: Encírtinos de España. Bol.R.Soc.Esp.Hist.Nat., 19: 96. M e r c e t R.G., 1921: Fauna Ibérica. Him.Fam.Encírtidos. Madrid. Pp.732. P e r k i n s R.C.L., 1906: Leaf-hoppers and their natural enemies. (CIII.). Bull.Div.Ent.Exp.St.Hawaiian Sugar Planters Ass., 1: 239. P e r k i n s R.C.L., 1907: Parasites of Leaf-hoppers. Exp.St.Hawaiian Sugar Planters Ass., 4; pp. 66. P e r k i n s R.C.L., 1912: Parasites of the family Dryinidae. Bull.Expt.St.Hawaiian Sugar Planters Ass., 11: 5. S a n t i s L. de, 1963: Estudio monografico de los Encírtidos de la Republica Argentina. Ann.Com.Inv.Cient.Prov.Bs.As., 4; pp.422. - T i m b e r l a k e P.H., 1922: Descriptions of new genera and species of Hawaiian Encyrtidae (Hymenoptera). (III.) Proc.Hawaii Ent.Soc., 5: 135. T r j a p i t z i n V.A., 1964: Encyrtidi (Hymenoptera, Encyrtidae) - parasity Driinid (Hymenoptera, Dryinidae) v faunĕ SSSR. Zool.Žurn., 43: 142.

DVĚ NOVÉ GEOMETRIDY PRO ČESKOSLOVENSKO.
(POZNÁMKY K PRODROMU LEPIDOPTER SLOVENSKA.)

Jiří Š m e l h a u s

Ve Slovenském ráji chytil Andrej Reiprich bezvadnou samičku druhu Calostigia (= Larentia partim.) kollariaria H.S. O tomto nálezu bude uveřejněn podrobnější referát v časopise "Biológia". Určení tohoto druhu nebylo snadné a podle fotografie nálezce určil s jistotou tento exemplář R.Lőberbauer (Steyrermühl). V Prodromu Slovenska (1964) uvádí Hrubý Niesiołowského

nález C.kollariaria z Polských Tater a zároveň připojuje poznámku "možná aj na Slovensku".

Hrubý v Prodromu Slovenska uvádí drobným tiskem též příbuzný druh Calostigia austriacaria H.-S. z Bujačie (Bel.Tatry) a píše, že Schwingenschussův nález je nepravděpodobný, doposud nepotvrzený. K tomuto druhu mně laskavě sdělil R.Löberbauer: Samičku, kterou v Bujačie chytil L.Schwingenschuss (Mitteilungen über eine Sammeltour in die Zentralkarpathen. Verh.d.zool.-bot.Ges. Wien, 65:(75) - (84), 1915) měl před sebou a o tomto druhu se Schwingenschussem debatoval. Určení je naprosto správné! Druh nebyl později v Tatrách nalezen asi hlavně proto, že C.austriacaria létá už v době tání sněhu v nadmořské výšce 1500-1600 m a výše a jeho biotopem jsou skály takřka bez vegetace. V té době - koncem května a začátkem června - málokdo chytá v těch výškách, bývají nepříznivé podmínky pro lov na světlo; přes den sedí motýli ve skalních štěrbinách a jsou nenápadným zbarvením přizpůsobeni okolí. Není ani divu, že není znám další nález.

Tatry jsou navštěvovány motýláři v pozdější době. V červenci 1964 chytal v Belanských Tatrách Dr.J.Z.Novák, potvrdil výskyt některých druhů Rhopalocer a kromě toho chytil ve dne jeden exemplář píďalky Coenotephria (= Larentia partim.) incultraria H.S. asi ve výši 1800 m (determinoval Jaroslav Wichra). Dále chytil několik kusů druhu Psolos canaliculata Hochenw.ssp. schwingenschussi Wehrli (syn.Pseudos trepidaria Hb.) mezi Protěží a Bujačie.

V Prodromu lepidopter Slovenska na str. 538 má znít správně jméno druhu Orthonama vittata Bkh. (Pro tiskovou chybu uvedeno nesprávně vittana).

ZWEI NEUE GEOMETRIDEN-ARTEN FÜR DIE TSCHECHOSLOWAKEI.

Neue sichere Arten für die Slowakei (zugleich auch für die ganze ČSSR): Calostigia (= Larentia partim.) kollariaria H.-S. und Calostigia austriacaria H.-S. Die erste Art hat Herr Andrej Reiprich in Slovenský Ráj bei Zipser Neudorf gefangen, die zweite Art war schon bekannt und von L.Schwingenschuss publiziert. Hrubý jedoch in seinem Prodromus Lepidopterorum Slovaciae bezweifelt diese Angabe, weil diese Art nicht mehr bei Bujačie gefunden ist. R.Löberbauer, der auch C.kollariaria determinier-

te, schrieb mir, dass das von Schwingenschuss gefangene Weibchen ihm vorgelegen hat und dass die Angabe einwandfrei richtig ist. Ausserdem fliegt C.austriacaria unmittelbar nach der Schneeschmelze, vielleicht besser gesagt während der Schneeschmelze, in Höhenlagen von etwa 1500 - 1600 m aufwärts, und in dieser Zeit sammelt niemand dort!

ZPRÁVY OSOBNÍ.

Dr.Aug.Hoffer - mladý pětapadesátník.

Dne 21.dubna 1965 dovršil Dr.Aug.Hoffer svých 55 let. K jeho jubileu připojuji svou malou vzpomínku na jeho bohatou a houževnatou entomologickou činnost. V roce 1962 jsem dostal od přítele Dr.Hoffera nepreparovaný materiál zlatěnek. Při zpracovávání tohoto materiálu jsem poznal jeho entomologickou činnost.

Jeho sběry v zlatěnkách začínají rokem 1930. Od té doby objevují se ročně jeho sběry z nejrůznějších lokalit - z ciziny: Rumunsko, Jugoslavie a Bulharsko; z bývalé Podk.Rusi: Berehovo, Sevljuš a Užhorod; v Čechách chytal na 18 místech, které navštívil 44x, na Moravě 41 míst navštívil 92x a na Slovensku 24 míst 65x.

Celkem uskutečnil přes 200 exkursí do 89 míst. Výběr míst dokazuje velkou znalost a orientaci Dr.Hoffera pro výskyt hymenopter a některá místa byla i poprvé entomologicky navštívena. Při těchto exkursích chytil Dr.Hoffer 2980 kusů zlatěnek, z nichž bylo napreparováno 1100 kusů. Celkem chytil Dr.Hoffer 61 druhů zlatěnek z 90 druhů (počítaje v to i druhy možné) podle "Fauny ČSR" - sv.3. Zlatěnky od Dr.Balthasara. Zlatěnky vesměs determinoval Dr.Balthasar a Dr.Pádr. V počtu druhů nejsou uvedeny aberace, kterých je rovněž v materiálech hojně. V materiálu Dr. Hoffera jsou sběry od roku 1930 do roku 1951. Je přirozeno, že těchto více než 200 exkursí nevyčerpává sběratelskou činnost Dr.Hoffera. Jeho vědecká činnost vedla a vede Dr.Hoffera do míst, kde zlatěnky se buď nevyskytují, nebo jen velmi spoře. Dnešní vzpomínka je čistě vzpomínkou při chytání zlatěnek a i ta je pouze statistikou malého pracovního úseku vědecké činnosti Dr.Hoffera.