TESAŘÍKOVITÍ Z KRKONOŠ A JIZERSKÝCH HOR (COL.,CERAMBYCIDAE)

CERAMBYCIDAE AUS DEM RIESENGEBIRGE UND ISERGEBIRGE (COLEOPTERA)

Petr Čermák Kristian Pospíšil

Výzkum byl prováděn v letech 1952 - 1972 v areálu podhorském i horském, všude tam, kde byl předpoklad výskytu tesaříkovitých, na lokalitách v okolí Trutnova, Špindlerova Mlýna, Velké Úpy, Janských Lázní, Pece, Dvoraček, Harrachova, Bedřichova, v údolí Mumlavy,v okolí horských potoků i v pásmu kosodřeviny.

Zjištěno bylo poměrně málo druhů, celkem 41, vzhledem k nepříznivým podmínkám v těchto horách. Hlavní příčinou malého počtu druhů tesaříkovitých je nedostatek živin v půdě, málo vápna, převaha žulového podkladu a nedostatek listnatých porostů. Nejvíce druhů se vyskytovalo v pásmu, kde mimo převládajících porostů smrků-Picea excelsa Link. je vtroušen buk-Fagus silvatica L., jeřáb-Surbus aucuparia L., klen-Acer pseudoplatanus L. a jilm drsný-Ulmus scabra Müll. .

V subalpinském pásmu, kde převládá borovice - kosodřevina-Pinus mugo ssp. pumilio Willk., nebyl žádný druh tesaříkovitých nalezen. Není vyloučen výskyt dalších druhů, ale spíše na polské straně Krkonoš.

Prioninae

Prionus coriarius (L.)-Harrachov-Nový Svět, borové a smrkové pařezy, 7 - 8., vz.

Cerambycinae

Rhagium bifasciatum (F.)-všude v horském pásmu na smrkovém dříví a na květech jeřábů, 5 - 7., hoj.

Rhagium mordax (Deg.)-všude na dříví, 3. - pod korou břízy, řídce

Rhagium inquisitor (L.)-všude na smrkových pařezech, od podzimu do jara imaga pod kůrou v kolébce, hoj.

Toxotus cursor (L.)-na starých smrkových pařezech, 6 - 8., někdy hojně.

Pachyta quadrimaculata (L.)-na květech, Janské Lázně,Velká Úpa 6-7.,vz.

Evodinus clathratus (F.)-na květech jeřábu, okoličnatých a rdesnu-hadí kořen, 5 - 8., místy hojný.

Gaurotes virginea (L.)-v horském pásmu, údolí Mumlavy na květech,6-7. vzácný.

Pidonia lurida (F.)-na lesních loukách na květech, 7., nehojná.

Grammoptera ruficornis (F.)-na okoličnatých květech, 7., řídce.
Allosterna tabacicolor (Deg.)- na okoličnatých květech, 7., řídce.
Leptura maculicornis Deg.-všude na okoličnatých květech, 7., hoj.
Leptura rubra L. -horské paseky, na dříví a květech, 7.-8., místy hojná.
Leptura sanguinolenta L. - na okoličnatých, na dříví /♀/ 7. - 8.,hoj.
Leptura dubia Scop. - na květech a na dříví, 7. - 8., ne vzácně.
Leptura virens L. - Harrachov, Mumlava, 7., v.vz.
Vadinia livida (F.)-na květech, 6-7., hojná.
Judolia sexmaculata (L.)-v horském pásmu na květech rdesna-hadí kořen, 7. - 8., místy hojná.
Judolia cerambyciformis (Schr.)- všude na různých květech, 6-7., hoj.
Strangalia quadrifasciata (L.)-Příchovice, Harrachov, na květech, 7-8.,
Strangalia maculata (Poda)-v podhorském pásmu na květech, 7., ne vz.
Strangalia melanura (L.)-všude na květech, 6.- 8., hoj.
Strangalia nigra (L.) - v podhůří na květech, 7., ne vz.
Spondylis buprestoides (L.)-H.Rokytnice, na smrkovém dříví, 8., vz.
Asemum striatum (L.)- Harrachov, na bor.dříví a pařezech, 7-8., ne vz.
Tetropium castaneum (L.)- v horském pásmu na smrk.dříví a pařezech,7.,h.
Tetropium fuscum (F.)- Trutnov, na smrk.dříví a pařezech pod kůrou, 7. vzácně.
Tetropium gabrieli Wse.-Trutnov, na modřín.pařezech, 6., vzácně.
Saphanus piceus (Laich.)- Harrachov, Nový Svět, H.Rokytnice,Příchovice, pod kameny a na pařezech, 7. - 8., vzácně.
Obrium brunneum (F.)-horské paseky, ve stínu všude na květech,7-8.,vz.
Molorchus minor (L.)-všude na okoličnatých květech, 6.- 7., hoj.
Aromia moschata (L.)-na jívách a okoličnatých květech, Harrachov, Kořenov, 7. - 8., ne vz.
Rhopalopus ungaricus (Hbst.)-Harrachov,Kořenov, na javoru, 7., v.vz.
Callidinm violaceum (L.)-všude na smrkovém dříví, 6-8., d.hoj.
Callidium aeneum Deg.- Trutnov, na smrkovém dříví, 6., vz.
Phymatodes testaceus (L.)-Harrachov, na bukovém dříví, 7., ne vz.

L a m i i n a e

Pogonocherus fasciculatus (Deg.)- na smrk.dříví, Harrachov, H.Rokytnice, 7. - 8., ne vz.
Agapanthia villosoviridescens (Deg.)- Harrachov, Vosecká bouda, Vel.Úpa, na bodláku, 7., ne vz.
Saperda carcharias (L.)- Harrachov, Příchovice, na osikách, 7., vz.
Saperda populnea (L.)- všude na osikách, 6. - 7., hoj.
Oberea oculata (L.) - na jívách, osikách, Harrachov, Jan.Lázně,6-8.,vz.

Zusammenfassung

Sammlung von Bockäfern (Cerambycidae) im Riesengebirge und im Isergebirge in den Jahren 1952 - 1972. Es wurden verhältnismässig wenig Gattungen wegen ungünstiger Bedingungen für die Entwicklung der Gattungen dieser Art festgestellt.

Literatura

Heyrovský L., 1955 : Tesařikovití, ČSAV Praha, Fauna ČSR.

Obenberger J., 1952 : Krkonoše a jejich zvířena, Přírodověd. vyd. p.11,50,71-78,158-160.

Reitter E. 1912, Fauna Germanica, K.G.Lutz Verlag, IV.

Veselý J., 1954 : Příroda Časkoslovenska, její vývoj a ochrana Orbis Praha, p. 96-104.

Adresa autorů (Anschriften der Autoren) :

Petr Čermák, Ruská 90, 100 00 Praha 10 - Vršovice,
Kristian Pospíšil, Grafická 35, 150 00 Praha 5 - Smíchov.