NOVÉ POZNATKY O PESTŘENKÁCH KRKONOŠ (DIPTERA,SYRPHIDAE)

NEUE KENNTNISSE ÜBER DIE SCHWEBFLIEGEN DES RIESENGEBIRGES

Jiří Čepelák

Údajů o fauně Krkonošského národního parku je stále nedostatek. Poslední o pestřenkách shrnul v r.1970 Moucha, který výsledky rozdělil i s ohledem na polskou stranu. Z české strany uvedl 113 a z Krkonoš celkem 152 druhů.

Ve svém příspěvku uvádím 77 druhů, které pochází z příležitostních sběrů O.Ptáčka a Dr.M.Slamečkové,CSc.,z katedry hydinárstva a zoológie,Vysoké školy polnohospodárske v Nitre.Z nich je 16(+) nových pro českou stranu, 13(x) pro celé Krkonoše a 10(*)i pro faunu Čech.

Přehled lokalit a jejich pořadí v tabulce

1. Pec pod Sněžkou, 756 m - 16.6.1958, sbírala M.Slamečková;
2. Pec pod Sněžkou-Vyhlídka, 800 m - 15.6.1958, sbírala M.Slamečková;
3. Růžová hora, 1390 m - 17.6.1958, sbírala M.Slamečková;
4. Lučiny (Bobí louky), 1100 m - 14.6.1957, sbíral O.Ptáček;
5. Horní Lysečiny, 650 m - 29.6.1965, sbíral O.Ptáček;
6. Horní Albeřice, 750 m - 10.- 15.6.1957, sbíral O.Ptáček;
7. Horní Albeřice, 750 m - 2.- 3.9.1959, sbíral O.Ptáček;
8. Horní Albeřice, 750 m - 4.- 5.9.1959, sbíral O.Ptáček;
9. Horní Albeřice, 750 m - 9.9.1959, sbíral O.Ptáček;
10. Horní Albeřice, 750 m - 10.- 11.9.1959, sbíral O.Ptáček;
11. Horní Albeřice, 750 m - 28.6.1965, sbíral O.Ptáček;
12. Rýchory, (obec), 650 m - 27.6.1965, sbíral O.Ptáček.

Zusammenfassung

In dem Artikel legt der Autor weitere Angaben über die Schwebfliegen des Riesengebirges (Krkonošský národní park) vor. Er knüpft an die letzte zusammenfassende Übersicht von Moucha (1970) an. Aus 77 Arten sind 16(+) neu für die tschechische Seite, 13(x) für gesamtes Gebirge und 10(*) für die Fauna Böhmen.

Literatura

Dušek J., Láska P., 1971: Syrphidae in Check List of Czechoslovak Insects, Diptera. Národní muzeum Praha. Rotaprint.

Moucha J., 1970: Zur Kenntnis der Syrphiden-Fauna der Riesengebirges Krkonošský národní park . Informationsber.d.landwirtsch. Hochsch. Nitra. Biol.Grundl.d.Landwirtsch. 8: 141 - 146.

Tabulka :

Druh (Art)	Lokalita (Lokalität) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Volucella bombylans L.	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	4
bombylans plumata Deg.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Eristalis alpina Panz.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
arbustorum L.	-	1	1	-	4	-	-	-	2	1	1	1
horticola Deg.	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
nemorum L.	4	1	1	1	-	12	-	1	1	2	3	3
pertinax Scop.	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
rupium F.	3	-	-	2	-	3	-	-	-	1	-	1
tenax L.	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-
Myathropa florea L.	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1	1
Helophilus pendulus L.	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
+ Merodon equestris nobilis Mg.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sericomyia silentis Harr.	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
Arctophila bombiformis Fall.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Blera fallax L.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Xylota ignava Panz.	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	3	-
segnis L.	2	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Syritta pipiens L.	-	-	-	-	-	1	4	-	3	1	1	-
+** Rhingia campestris Meig.	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
+* Ferdinandea nigrifrons Egg.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
+** Cheilosia albipila Meig.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
albitarsis Meig.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
barbata Loew	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	-	-
canicularis Panz.	4	1	1	-	-	4	1	-	1	-	-	-
+* chloris Meig.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
frontalis Loew	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
+* gigantea Zett.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
impressa Loew	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
+** impudens Beck.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
loewi Beck.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
+** melanura Beck.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+** nigripes Meig.	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-
pagana Meig.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Orthoneura nobilis Fall.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
+* Chrysogaster brevicornis Lw.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pipizella virens F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Pipiza quadrimaculata Panz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Druh (Art)	Lokalita (Lokalität) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Melanostoma mellinum L.	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
mellinum incompletum Bk.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Platycheirus albimanus F.	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	3	1
angustatus Zett.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
clypeatus Meig.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
manicatus Meig.	-	3	-	-	1	7	2	1	-	-	1	4
melanopsis Loew	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+x ovalis Beck.	1	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
peltatus Meig.	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
scutatus Meig.	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	1
+x* tarsalis Schum.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Episyrphus balteatus Deg.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
cinctellus Zett.	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Megysyrphus annulipes Zett.	1	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Chrysotoxum arcuatum L.	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
fasciolatum Deg.	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Dasysytphus friuliensis Goot	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	1
lunulatus Meig.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Scaeva pyrastri L.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
selenitica Meig.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
+x*Metasyrphus braueri Egg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
corollae F.	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2
lapponicus Zett.	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
luniger Meig.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
nitens Zett.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Leucozona lucorum L.	-	-	5	-	-	7	-	-	-	-	-	1
Syrphus ribesii L.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-
torvus O.S.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
vitripennis Meig.	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
Epistrophe euchroma Kow.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
nitidicollis Meig.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
+x*Phalacrodira annulata Zett.	-	-	1	-	1	1	2	-	2	-	-	4
lineola Zett.	1	1	3	4	-	4	-	-	-	-	-	-
vittigera Zett.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Melangyna compositarum Verr.	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1
umbellatarum F.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Sphaerophoria menthastri L.	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2
scripta L.	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-

Druh (Art)	Lokalita (Lokalität) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neoasia floralis Meig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
podagrica F.	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
+ Chamaesyrphus scaevoides Fll	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
+x*Microdon latifrons Loew	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Adresa autora (Anschrift des Autors) :

Doc.Dr. Jiří Čepelák, CSc., Cyrilometodejské nám.4, 949 01 Nitra.

O P R A V A (Korrektur)

článku (des Artikels)

Milan Sláma : Několik kritických poznámek k údajům na lokalitních štítcích

ve třetím čísle ročníku 1976 na straně 102 předposlední řádek dole má být správně :

" ex ovo, ex larve, ex pupa " .