ZPRÁVA O POZOROVÁNÍ TAŽNÝCH MOTÝLŮ V ČESKOSLOVENSKU V LETECH 1972 - 1974, 1975, 1976

BERICHT ÜBPR WANDERFALTERBEOBACHTUNGEN IN DER TSCHECHOSLOWAKEI IN DEN JAHREN 1972 - 1974, 1975, 1976

Václav Felix Petr Pipek Miloslav Soldát

V těchto sděleních navazujeme na předchozí zprávy o tažných motýlech v Československu (FELIX,1971; FELIX,SOLDÁT,1972).Rozčlenění zpráv do jednotlivých skupin údajů ponecháváme pro jejich snadné srovnání stejné jako v předchozích zprávách:

A. Počet pozorovatelů.

B. Počet pozorovacích míst.

C. Počet pozorovacích dnů. Tento údaj je uváděn neredukovaně, tzn. byl-li motýl pozorován na dvou místech téhož dne, započítáváme 2 pozorovací dny. Tímto způsobem byly uváděny pozorovací dny již v předchozích zprávách.

D. Počet pozorovaných kusů. Uvádíme formou tabulky podle jednotlivých měsíců, odděleně uvádíme údaje získané ze světelných lapačů pod příslušnými šiframi (No - dr.Ivo Novák,Praha-Ruzyně; Mk - Ing.J.Marek, Brno-Černá Pole; JČ - spolupracovníci z Jižních Čech : Ing. K.Spitzer, J.Levý, M.Sláma).

E. První pozorování v roce.

F. Pozorování hojnějšího výskytu.

G. Přímé pozorování migrace.

H. Poslední pozorování v roce.

Před názvem každé lokality vyznačujeme, o kterou část území Československa jde, a to těmito zkratkami: Č - Čechy, M - Morava a Slezsko, S - Slovensko. Zajímavější příležitostná pozorování ze zahraničí uvádíme v závorkách. V textu užíváne těchto zkratek: lar. - housenka,pup. - kukla,im. - motýl (imago), ex. - exemplář. Pokud není uveden počet ex. jde o pozorování jen jednoho exempláře. V nomenklatuře se opět přidržujeme Hrubého 1964.

Zprávy Československé spol. entomologické ČSAV, Praha, 14, 1978

Ve zprávách jsou shrnuta pozorování těchto spolupracovníků:
(v textu uvádíme pouze zkratky jejich příjmení)

Bi - Bilický, Bochov
Ča - Čapek M., Praha
Če - Černý K., Praha
Čr - Čermák R., Velká Bučina
Čv - Červinka L., Praha
El - Elsner G., Praha
Fr - Franz J., Javorná
Fx - Felix V., Praha
Gw - Gottwald A., Uher.Hradiště
Ha - Hlaváč V., Praha
Hb - Holub O., Praha
Hc - Hluchý M., Mikulov
Hg - Herget J., Holoubkov
Hj - Hájek J., Svratka
Hl - Hladký M., Ivančice
Hn - Hroník J., Praha
Ho - Holeček O., Náchod
Hř - Hřeben K., Jihlava
Hs - Halouska J., Břeclav
Hš - Háša J., Praha
Hu - Hubený J., Klatovy
Ja - Jakeš O., Brno
JČ - světelné lapače v jižních Čechách: Kr, Le, Sp
Jn - Janovský M., Havířov
Ka - Kamínek J., Mladá Boleslav
Kf - Kulfan M., Myjava
Kl - Kolář Z., Jihlava
Kp - Kropáček F., Dobšín
Kr - Krampl F., Písek
Kš - Košťál M., Hradec Králové
Kt - Kletečka Z.ml., Plzeň
Kx - Král F., Frant.Lázně
Ky - Korynta J., Kosoř u Prahy
La - Laštůvka Z., Brno
Le - Levý J., Písek
Lh - Lehečka F., Písek
Lš - Lekeš V., Rožďalovice okr.Nymburk
Mk - Marek J., Brno
Ml - Mlejnek J., Praha
Mt - Matějka J., Praha
Mu - Musil H., Liberec
No - Novák I., Praha
Pd - Podaný Č., Benátky n/Jiz.
Pi - Pipek P., Praha
Pk - Poláček V., Brandýs n/Lab.
Po - Pour J., Jihlava
Rt - Rotter M., Kvasina u Rychnova
Sd - Soldát M., Praha
K jeho jménu se pojí řada pozorovatelů-laiků k čeledi lišajů. Jedná se o účastníky akce "Hledejte smrtihlava", která je organizována ve spolupráci s časopisem "ABC mladých techniků a přírodovědců".
Sg - Schmöger K., Jihlava
Sk - Skýva J., Praha
Sm - Sláma M., Praha
Sn - Stonawski K., Třinec
Sp - Spitzer K., České Budějovice
St - Soldát B., Břeclav
Šm - Šmelhaus J., Praha
Šp - Štěpánek M., Praha
Tl - Traxler L., Příbram
Va - Vavroušek J., Mikulovice
Ve - Verner J., Týnec nad Labem
Vi - Vítek P., Liberec
Vl - Valenta M., Břeclav
Ze - Zelený J., Praha
Zl - Zlámal J., Moravský Písek

1972 - 1974

Václav Felix Petr Pipek Miloslav Soldát

PIERIDAE

Aporia crataegi (L.)

Dostali jsme jen několik hlášení, hlavně z okolí Příbrami, kde byl tento druh pozorován i v minulých letech.
1972: Č - Příbram-Březové Hory 18.VI. /Ze/; Č - Orlov u Příbrami 2.VII. 2 im., 3.VII. 3 im., 5.VII. 1 im. /Hn/; M - Pavlovské vrchy 10.VI., M - Pouzdřany 18.VI. /La/.
1973: Č - Příbram-Březové Hory 30.VI. 18 im., 1.VII. 13 im. 7.VII. 1 im./Ze/. Dále došlo hlášení o lokálním přemnožení na východním Slovensku : S - Michalovce 22. až 24.V. /Kf/.
1974: M - Zádveřice,okr. Gottwaldov VI. 1 im. /Km/; M - Ivančice,okr. Brno-venkov 7., 17. a 20.VI. à 1 im. /Hl/; S - Sečovce-Michalovce-Humenné 8.VI. 25 im. /Pk/.

Pieris brassicae (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972 : 14, 1973 : 18, 1974 : 12
B. Počet pozorovacích míst :

	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	celý rok
1972	2	4	13	15	13	5	52
1973	2	15	9	11	23	3	63
1974	3	13	9	9	11	9	54

C. Počet pozorovacích dnů :

1972	3	12	40	46	44	8	153
1973	2	39	18	60	77	6	202
1974	3	21	26	21	76	25	172

D. Počet pozorovaných kusů :

1972	5	51	105	625	792	14	1592
1973	4	127	33	456	2542	35	3197
1974	14	97	68	325	2310	80	2894

1972

E. První pozorování: M - Ivančice,okr.Brno-venkov 17.IV. /Hl/;
Č - Liberec 24.IV. /Mu/.

F. Hojnější výskyt: Č - Liberec 22.-25.VII. cca 200 im. /Mu/;
Č - Liberec 28., 29., 31.VII.-3.VIII. cca 210 im. /Mu/;
Č - Liberec 6.-14.VIII. cca 260 im. /Mu/;
Č - Davle okr. Praha-Západ 1.-8.VIII. cca 140 im. /Šp/;
S - Vysoké Tatry - okolí Štrbského Plesa 15.VII. cca 100 im. /Ka/

H. Poslední pozorování: M - Ivančice okr. Brno-venkov 18.IX. /Hl/;
Č - Kvasiny okr. Rychnov nad Kněžnou 19.IX. 2 im. /Rt/;
M - Krásná okr. Frýdek-Místek 28.IX. 2 im. /Ja/

1973

E. První pozorování: M - Mikulov okr. Břeclav 28.IV. 2 im. /La/;
Č - Karlštejn okr. Praha-Západ 30.IV. 2 im. /Sd/

F. Hojnější výskyt: Č - Chlomek u Davle okr. Praha-Západ 1.-11.VIII. cca 930 im. /Šp/;
Č - Liberec 31.VII.-19.VIII. cca 800 im. /Mu/

G. Migrace: S - Stankovany - Lubochňa 1.VIII. východním směrem /Pd/;
S - Račkova dolina, Tichá dolina okr. Liptovský Mikuláš 2.VIII. jižním směrem /Če/

H. Poslední pozorování: Č - Tupadly okr. Mělník 16.IX. /Pk/;
Č - Liberec 11.IX. /Mu/

V roce 1973 došla dokonce dvě hlášení o migraci. První sledoval Č. Podaný se svojí manželkou. Hlavní tah začal 1.VIII. v 6 hodin ráno a trval do 9,30 hodin dopoledne téhož dne. Směřoval od Stankovan po pravém břehu Váhu, podél mostu v Lubochni na druhý břeh na východ. Menší hejna se objevila mezi Vrútkami směrem na Kralovany a pak mezi Žilinou a Vrútkami.

Druhý tah pozoroval K. Černý v okrese Liptovský Mikuláš /Račkova dolina, Tichá dolina/ 2.VIII. "Mraky bělásků" letěli jižním směrem. Srovnáme-li obě hlášení, nelze vyloučit, že šlo v obou případech pouze o jedinou migraci, sledovanou ze dvou různých míst v rozpětí dvou dnů. Migrace z 1.VIII. směřovala od Stankovan a Lubochni východním směrem, tedy k Liptovskému Mikuláši, kde mohla být pozorována 2.VIII.

1974

E. První pozorování: Č - Praha - Nové Město 8.IV. /Sd/;
Č - Machnin okr. Liberec 10.IV. /Mu/;
M - Břeclav - Poštorná 25.IV. 2 im. /Ja/

F. Hojnější výskyt nebyl pozorován

H. Poslední pozorování: Č - Davle - Chlomek okr. Praha-Západ 20.IX. 7 im. /Šp/;
M - Břeclav-Poštorná 28.IX. 3 im. a 29.IX. /Ja/

Pontia daplidice (L.)

V letech 1972 až 1974 jsme dostali jen několik ojedinělých hlášení o výskytu tohoto druhu:
1972: Č - Davle okr. Praha-Západ 18.VII. /Šp/; Č- Praha-Hlubočepy 24. VIII. 2 im., 25.VIII. 2 im., 29.VIII./Čv/; Č - Praha-Strašnice 4.IX. /Fx/; S - Remetské Hámre okr. Michalovce 22.VII. 10 im. /La/
1973: Č - Stará Huť u Dobříše 19.IV. /Čv/; M - Uherské Hradiště 7.VII. /Gw/; M - Klentnice okr. Břeclav 11.IX. /St/; Č - Mladotice okr. Písek 3.VII. /Hn/
1974: M - Ivančice okr. Brno-venkov 10.VII. /Hl/

Colias crocea (Fourcr.)

A. Počet pozorovatelů: 1972 : 9, 1973 : 6, 1974: 6
B. Počet pozorovacích míst:

	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1972	1	5	5	4	1	16
1973	-	1	3	1	2	7
1974	-	4	10	3	-	17
C. Počet pozorovacích dnů:						
1972	2	10	11	4	1	28
1973	-	1	3	1	5	10
1974	-	6	12	4	-	22
D. Počet pozorovaných kusů:						
1972	10	31	38	23	10	112
1973	-	1	3	2	5	11
1974	-	21	35	9	-	65

1972

E. První pozorování: M- Visolaje okr. Frýdek-Místek 21.VI. 4 im. /Ja/
F. Hojnější výskyt: M- Ivančice okr. Brno-venkov 10.-18.VII. 10 im. a 15.-31.VIII. 19 im. /Hl/;
S - Kamenica nad Hronom 22.IX. 18 im./Čv/
H. Poslední pozorování: S- Malé Ludince 23.IX. 2 im. /Čv/;
S - Hontianská Vrbica 23. IX. 2 im. /Čv/;
M - Pavlovské vrchy - Tabulová hora 8.X. 10 im /La/;
SSSR - Západní Ukrajina - Čop 10.X. /Fx/

1973

E. První pozorování: M - Ostrožská Nová Ves 11.VII. /Gw/

H. Poslední pozorování: M - Uherské Hradiště 10.X. /Gw/;
Č - Rožďalovice okr. Nymburk 31.X./Lš/

1974

E. První pozorování: M - Břeclav-Poštorná 16.VII. 2 im. /Ja/

F. Hojnější výskyt: M - Klentnice okr. Břeclav 17.VII. 7 im. /Ja/;
M - Pavlov okr. Břeclav 21.VIII. 10 im. /Ja/;
M - Ostrožská Nová Ves okr. Uherské Hradiště 25. VIII. 8 im. /Gw/

H. Poslední pozorování: M - Uherské Hradiště 28.IX. 1 im. /Gw/

NYMPHALIDAE

Vanessa cardui (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972 : 21, 1973 : 19, 1974 : 17

B. Počet pozorovacích míst:

	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1972	-	2	8	37	17	14	1	79
1973	-	3	11	9	18	5	1	47
1974	1	-	5	4	10	6	-	26

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	-	2	9	50	30	16	1	108
1973	-	3	11	10	19	5	1	49
1974	1	-	6	4	14	12	-	37

D. Počet pozorovaných kusů:

1972	-	12	28	386	84	33	1	544
1973	-	4	20	28	54	6	1	113
1974	2	-	13	4	26	16	-	61

1972

E. První pozorování: M - Vyškov na Moravě 20.V. /Ja/;
M - Ivančice okr. Brno-venkov 22.V. 11 im. /Hl/

F. Hojnější výskyt: M - Klentnice okr. Břeclav 1.VIII. 20 im. /Gw/;
S - Starý Smokovec 15.VII. cca 50 im. /Ka/;
S - Levočské pohoří 16.VII. cca. 100 im. /Ka/;
S - Klokočov okr. Michalovce 25.VII. 40 im. /La/

G. Migrace: S - Slovenský Raj okr. Spišská Nová Ves - údolí od Hrabušic ke Stratené 30.VII. tah směrem na Stratenou v intervalech cca 30 sec., celkem 65 im. /La/

H. Poslední pozorování: Č - Soběšín okr. Kutná Hora 1. X. /Fx/

1973

E. První pozorování: M - Jihlava 10.V. 2 im. /Kl/;
M - Uherské Hradiště 22.V. /Gw/
F. Hojnější výskyt: M - Jihlava 5.-8.VIII. denně à 5-6 im. /Kl/
H. Poslední pozorování: M - Uherské Hradiště 7.X. /Gw/

1974

E. První pozorování: Č - Příbram-okolí 30.IV. 2 im. /Tl - Jícha/.
F. Hojnější výskyt: M - Ostrožská Nová Ves okr. Uherské Hradiště 25.VIII. 10 im. /Gw/.
H. Poslední pozorování: Č - Stará Huť u Dobříše 12.IX. /Čv/;
M - Ivančice okr. Brno-venkov 14.IX. 2 im./Hl/;
M - Salaš okr. Uherské Hradiště 14.IX. /Gw/.

Vanessa atalanta (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972 : 30, 1973 : 19, 1974 : 11
B. Počet pozorovacích míst:

	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1972	-	1	9	29	34	26	6	105
1973	1	1	4	12	28	13	2	61
1974	-	-	3	6	11	6	2	28

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	-	1	10	38	79	40	6	174
1973	1	1	4	13	34	17	2	72
1974	-	-	4	8	16	11	6	45

D. Počet pozorovaných kusů:

1972	-	1	11	116	470	121	12	731
1973	1	1	26	48	84	32	3	195
1974	-	-	6	11	30	13	10	70

1972

E. První pozorování: Č - Nahořany nad Metují okr. Náchod 23.V. /Pk/;
M - Visalaje okr. Frýdek-Místek 8.VI. /Ja/.
F. Hojnější výskyt: S - Levočské pohoří - Zlatá hora 16.VII. 25 im./Ka/;
M - Zálesí okr. Znojmo 10.-16.VIII. denně à cca 40-50 im. /Mk/.
H. Poslední pozorování: M - Husleny okr. Vsetín 8.X. /Lš/;
Č - Oboz u Slapské přehrady 8.X. /Hevler/;
Č - Ohrazenice u Turnova 11.X. /Mu/.

1973

E. První pozorování: M - Mikulovice okr. Šumperk 26.IV. /Va/.
F. Hojnější výskyt: M - Frenštát pod Radhoštěm 25.VI. 18 im. /Čv/.

H. Poslední výskyt: Č - Roždalovice okr. Nymburk 4.X. 4 im. /Lš/;
Č - Chlomek u Davle, okr. Praha-Západ 7.X. /Pi/;
S - Kamenica nad Hronom 29.IX. 2 im. /Čv/;
Bulharsko - Sofia 9.X. /Fx/.

1974

E. První pozorování: S - Klak - Malá Fatra 5.VI. /Kf/;
Č - Radlík okr. Praha-Západ 15. a 16.VI. 4 im. /Sd - Šlosarová/;
M - Třinec-okolí 20.VI. /Sn/.

F. Hojnější výskyt: S - Sološnica okr. Senica 6.IX. 18 im. a 8.IX. 26 im. /Ja/.

H. Poslední pozorování: Č - Chotýšany okr. Benešov 27.IX. /Hb/;
S - Višňové 28.IX. 2 im. /Kf/;
Č - Příbram ?.X. 5 im. /Tl/;
Č - Slaný ?.X. 5 im. /Tl/.

N y m p h a l i s a n t i o p a (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972 : 20, 1973 : 20, 1974 : 23

B. Počet pozorovacích míst:

	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	celý rok
1972	8	11	9	4	4	15	9	1	1	62
1973	9	11	7	6	13	21	9	1	-	77
1974	21	10	6	2	6	19	6	1	0	71

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	9	15	12	5	4	38	9	1	1	94
1973	13	12	11	6	16	43	11	1	-	113
1974	36	17	9	2	8	22	7	1	-	102

D. Počet pozorovaných kusů:

1972	29	39	33	6	410+	73+	16	2	1	609+
	+/	včetně			400 lar.	1 pup.				401
1973	25	20	13	14	172++	73++	13	1	-	331++
	++/	včetně			150 lar.	1 lar.				151 lar.
1974	67	44	11	2	11	33	18	1	-	187

Kromě uvedených imag byla zjištěna 4 hnízda housenek:
M - Brno - Bohunice 8.VII. 1 hnízdo /Hl/;
Č - Příbram-okolí ?.VII. 3 hnízda /Tl/.

1972

E. První pozorování: Č - Karlštejn okr. Praha-západ 16.III. /Čv/;
Č - Liberec 17.III. 2 im. /Mu/.

F. Hojnější výskyt: S - Čalovo 26.III. 11 im. /Čv/;
M - Velké Dářko 8.VII. cca 400 lar. /Hl/.

H. Poslední pozorování: M - Vyškov na Moravě 26.XI. /Ja/.

1973

E. První pozorování: M - Mušov okr. Břeclav 11.III. /La/;
Č - Plzeň-okolí 22. a 23.III. /Kl/;
M - Nový Rychnov okr. Pelhřimov 24.III. /Gw/;
Č - Týnec nad Sázavou okr. Benešov 24.III. /Sd/;
Č - Soběšín okr. Kutná Hora 24.III. /Fx/;
Č - Liberec 24.III. /Mu/.

F. Hojnější výskyt: Č - Žďár nad Sázavou 24.-25.VII. 100 lar. /Gw/

H. Poslední pozorování: Č - Mníšek u Liberce 5.X. /Mu/;
Č - Chotětín okr. Rokycany 29.IX. /Kt/;
M - Mikulovice okr. Šumperk 27.IX. /Va/.

1974

E. První pozorování: Č - Srbsko okr. Praha-západ 20.III. /Sk/;
Č - Březina okr. Rokycany 20.III. /Kt/.

F. Hojnější výskyt: M - Salaš okr. Uherské Hradiště 10 im. /Gw/.

H. Poslední pozorování: Č - Chlomek u Davle okr. Praha-západ 13.IX./Šp/;
Č - Rokytnice nad Jizerou 15.IX. /Lš/;
M - Stupava okr. Uherské Hradiště 19.X. /Gw/.

Srovnáváme-li celkový počet kusů zjištěných v jednotlivých letech, dosahují roky 1972-1974 vyššího průměru a blíží se roku 1971, který byl dosud nejúspěšnější. Odečteme-li totiž z celkových údajů počet nahlášených housenek, které celkový přehled zkreslují, bylo v roce 1971 zaregistrováno 202 imag, v roce 1972 179 imag, v roce 1973 180 imag a v roce 1974 187 imag.

LYCAENIDAE

Lampides boeticus (L.)

Nedošla žádná hlášení z Československa.

SPHINGIDAE

Acherontia atropos (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 21, 1973: 17, 1974: 7

B. Počet pozorovacích míst:

	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1972	-	-	2	5	-	7
1973	1	-	10	14	3	28
1974	-	-	1	5	1	7

C. Počet pozorovacích dnů:

	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1972	-	-	2	22	-	24
1973	1	-	61	14	3	79
1974	-	-	1	5	1	7

D. Počet pozorovaných kusů:

1972	lar.	-	-	-	4	-	4
	pup.	-	-	1	29	-	30
	im.	-	-	1	2	-	3
	ex.	-	-	2	35	-	37
1973	lar.	-	-	42	1	-	43
	pup.	-	-	87	6	-	93
	im.	1	-	1	10	3	15
	ex.	1	-	130	17	3	151
1974	lar.	-	-	-	2	-	2
	pup.	-	-	-	3	1	4
	im.	-	-	1	-	-	1
	ex.	-	-	1	5	1	7

1972

Výčet všech nálezů: Č - Mochov u Brandýsa nad Labem 21.VIII. im. /Sd - J.V. Staněk/;
Č - Litvínov okr. Most 19.IX. im. /Sd - Hejkal/;
Č - Žíteč u Chlumu u Třeboně okr. Jindřichův Hradec 13.-16.IX. 3 lar. a 6 pup. /Sd - žáci ZDŠ v Chlumu u Třeboně/;
Č - Velvary u Kralup 20.IX. lar. /Čr/;
M - Mikulovice okr. Šumperk 15.IX. im. /Va/;
M - Tvarožná Lhota okr. Hodonín 28.VIII. pup. /Sd - Štípská/; dtto v IX. 2 pup. /Sd - Bartošková/; dtto pup. /Sd - Petr/; dtto 2 pup. /Sd - Hřibnák/; dtto pup. /Sd - Bedrava/; dtto pup. /Sd - Křižan/; dtto 18.IX. pup. /Sd - Komoň/; dtto 18.IX. pup. /Sd - Komoňová/; dtto 2.IX. pup. /Sd - Kučerová/; dtto 11.IX. pup. /Sd - Pavlináková/; dtto 16.IX. 3 pup. /Sd - R. Říhová/; dtto 11. a 16.IX.pup. /Sd - F. Říhová/; dtto 7.IX. 4 pup. /Sd - Poláš-ková/; dtto 6.IX.pup. /Sd - Staša/; dtto 23.IX. pup. /Sd - Špiruda/; dtto 11.IX. pup. /Sd - Vítková/. Sledování smrtihlavů občany Tvarožné Lhoty okr. Hodonín organizuje každoročně F. Podolan z této obce.

1973

Výčet všech nálezů: Č - Koloveč okr. Domažlice 8.VI. im. /Sd - Kastner/;
M - Čejkovice okr. Hodonín 4.VIII. im. /Mk/;
M - Brno-Modřice 3.VIII. 2 lar. /La/; dtto 5.IX. pup. /La/; dtto 5.IX. 2 im. ex pup. /La/;
Č - Střehom okr. Mladá Boleslav 13.-31.VIII. 10 lar. a 3 pup. /Kp/;
Č - Ošťovice okr. Mladá Boleslav 13.-31.VIII. 30 lar. a 56 pup. /Kp/;
Č - Osek u Sobotky okr. Jičín 13.-31.VIII. 19 pup. /Kp/;
Č - Dobšín okr. Mladá Boleslav 13.-31.VIII. 2 pup. /Kp/;
Č - Kamenice okr. Mladá Boleslav 20.VIII. pup. /Kp/;
Č - Přepeře okr. Mladá Boleslav 13.-31.VIII. 6 pup. /Kp/;
Č - Frýdlant v Čechách 24.IX. im. /Kp/;
Č - Pesvice okr. Chomutov 8.IX. im. /Sd - Kräupel/;
Č - Jince u Příbrami 16.IX. im. /Sd - Doležal/;
Č - Kněžské Dvory okr. České Budějovice 9.IX. im. /Sd - Kubeš/;
M - Tvarožná Lhota okr. Hodonín 16.IX. 2 pup. /Sd - Štípská/;
M - Tvarožná Lhota okr. Hodonín 21.IX. im. /Sd - Bartošková/;
Č - Stará Paka 19.IX. im. /Kr - Mráček/;
Č - Žatec 9.X. im. /Kr - Hanták/;
M - Moravský Písek 20.IX. im. ex p. /Zl/;
S - Kamenica nad Hronom 28.IX. im. /Čv/;
M - Klentnice okr. Břeclav 24.IX. a 4.X. im. /Hc/;
Č - Chotětín okr. Rokycany 28.IX. lar. /Kt/;
M - Mikulovice okr. Šumperk 15.IX. im. /Va/;
M - Lázně Lipová 24.IX. im. /Va/;
Č - Ktiš, Blanský les 8.X. im. /Sp - Hřebeček/.

V roce 1973 bylo nalezeno nejvíce exemplářů, hlavně díky nálezům na okrese Jiřín a Mladá Boleslav /Kp/, kde bylo zjištěno v době od 13. do 31. srpna celkem 127 exemplářů /40 housenek a 87 kukel/.

1974

Výčet všech nálezů: Č - Horní Záhoří okr. Písek ?.IX. lar. /Le/;
M - Tvarožná Lhota okr. Hodonín 13.IX. pup. /Sd-Podolan/;
M - Ivaň okr. Břeclav 22.IX. pup. /Hc/;

M - Šumná okr. Znojmo 22. IX. lar. /Sd - Ševčík/;
M - Hrubšice u Ivančic okr. Brno-venkov 29.IX. pup. /Hl/;
Č - Malčice okr. Písek 23.X. pup. /Kt/;
Č - Chrustenice okr. Beroun 15.VIII. 1 im. /Burda/.

Herse convolvuli (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 32, 1973: 29, 1974: 35

B. Počet pozorovacích míst:

	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1972	2	-	1	8	3	14
1973	-	-	16	23	7	46
1974	1	2	4	31	3	41

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	2	-	6	35	3	46
1973	-	-	20	29	7	56
1974	1	2	5	38	6	52

D. Počet pozorovaných kusů:

1972	lar.	-	-	7	9	-	16
	pup.	-	-	-	26	2	28
	im.	2	-	-	11	1	14
=	ex.	2	-	7	46	3	58
1973	lar.	-	-	1	-	-	1
	pup.	-	-	-	-	-	-
	im.	-	-	20	29	7	56
=	ex.	-	-	21	29	7	57
1974	lar.	-	-	6	2	-	8
	pup.	-	-	1	2	5	8
	im.	1	2	3	50	5	61
=	ex.	1	2	10	54	10	77

1972

Výčet všech nálezů: Č - Vysoké Mýto 12.VI. im. /Sd - Votroubek/;
Č - Praha 14.VI. im. /Sd - Sklenář/;
Č - Příbram 23.IX. im. /Tl/;
M - Mikulovice okr. Šumperk 17.IX. im. /Va/;
M - Jihlava 12.IX. im. /Sd - Krejčí/;
M - Břeclav 16. a 18.IX. 2 im. /St/;
S - Kamenica nad Hronom 21.IX. im. /Čv/;
M - Tvarožná Lhota okr. Hodonín 25.VIII. 2 lar. /Sd - Bačík Josef I/; dtto 16.VIII. lar. /Sd - Holubíková/; dtto 26.VIII. lar. /Sd-Škrahulková/; dtto v VIII. lar. /Sd - Kosík/; dtto lar. /Sd - Lovecká/; dtto lar. /Sd - Žáková/;

M - Tvarožná Lhota okr. Hodonín 7.IX. 2 pup. /Sd - Holubíková/; dtto v IX. im. /Sd - Bačík F./; dtto 3 pup. /Sd - Bačík Josef II/; dtto 2 lar. /Sd - Bačíková Anežka/; dtto pup. /Sd - Bačíková Antonie/; dtto lar. /Sd - Bačíková Marie I/; dtto pup. /Sd - Bačíková Marie II/; dtto im. /Sd - Hanák/; dtto pup. /Sd - Helísková/; dtto pup. /Sd - Holubík/; dtto lar. /Sd - Hřibnáková/; dtto pup. /Sd - Hudečková Margita/; dtto pup. /Sd - Hudečková Marie/; dtto pup. /Sd - Chalupová/; dtto lar. /Sd - Křižanová Marie I/; dtto lar. /Sd - Křižanová Marie II/; dtto pup. /Sd - Nejedlík/; dtto 3 pup. /Sd - Polášek/; dtto pup. /Sd - Sečková/; dtto 2 pup. /Sd - Tomeček/; dtto lar. a 2 pup. /Sd - Vajčnerová/; dtto 2 pup. /Sd - Vítek/;
M - Strážnice v IX. lar. /Sd - Piškula/; dtto lar. /Sd - Bursík/;
M - Kněždub okr. Hodonín 5.X. pup. /Sd - Bedrava/;
M - Tvarožná Lhota okr. Hodonín 1.X. pup. /Sd - Komoň/;
M - Ivančice okr. Brno-venkov 11.IX. 3 im. /Hl/;
Č - Praha-Letná 8.X. im. /Tl/;
M - Tvarožná Lhota 2.IX. 2 pup. /Sd - Uřičář/; dtto 1 pup. /Sd - Vítková/.

1973

Výčet všech nálezů: Č - Střehom okr. Mladá Boleslav 13.VIII. im. /Kp/;
Č - Týnec nad Labem 14.VIII. im., 15.VIII. im., 16.VIII. im., 9.IX. im., 17.IX. im. /Ve/;
M - Mikulovice okr. Šumperk 15.VIII. lar., 26.VIII. im., 15.IX. im., 24.IX. im. /Va/;
Č - Čelákovice 21.VIII. im. /El/;
Č - Kbely u Prahy 24.VIII. im. /El/;
M - Uherské Hradiště 23. a 25.VIII. im. /Gw/;
M - Vracov 30.IX. im. /Gw/;
M - Klentnice okr. Břeclav 25.VIII. im. /La/;
M - Brno 30.VIII. a 9.X. im. /La/;
S - Myjava 27.VIII. a 3. IX. im. /Kf/;
S - Myjava IX. im. /Kf - Devan/;
M - Lednice okr. Břeclav 29.VIII. im. /Hc/;
Č - Osová Bítýška okr. Žďár nad Sázavou 29.VIII. im. /Sd - Plocek/;
Č - Dolní Bousov okr. Mladá Boleslav 30. a 31.VIII. im. /Kp/;
Č - Praha 30.VIII. im. /Čv/;
Č - Horská Kvilda 31.VIII. im. /Sp/;
M - Moravský Písek okr. Uherské Hradiště 30.VIII. 2 im., 2.IX. im., 3.IX. im., 10.IX., 20.IX. im., 25.IX. im., 6.X. im. /Zl/;

Č - Zíchov okr. Domažlice 3.IX. im., 7.IX. im /Hš/;
Č - Vrha eč okr. Klatovy 5.IX. im. /Sd - Hubený/;
Č - Liberec 1.IX. im. /Sd - Vítek/;
Č - Teplice - Soběđruhy 5.IX. im. /Šp - Škvařil/;
Č - Přívětice okr. Rokycany 9.X. im. /Kt/;
M - Týnec okr. Břeclav 15.IX. im. /Hc/;
M - Klentnice okr. Břeclav 4.X. im. /Hc/;
M - Mikulov okr. Břeclav 10.IX. im. /Hc/;
M - Frenštát pod Radhoštěm 12.IX. im. /Ja/;
S - Košice 14.IX. im. /Sd - Suvák/;
M - Skřípov okr. Opava 10.IX. im. /Sd - Cihlář/;
M - Hranice na Moravě 25. a 27.IX. im. /Sd - Dobeš/;
Č - Praha-Holešovice 19.IX. im. /Kr - Jilich/;
Č - Ostrov nad Ohří okr. Karlovy Vary 19.IX. im. /Kr - Jakubčík/;
M - Jihlava 21.IX. im. /Sg - Beňa/;
S - Kamenica nad Hronom 29.IX. im. /Čv/;
Č - Vroutek u Podbořan okr. Louny X. im. /Sd - Kudyn/;
M - Brtnice u Jihlavy 7.X. im. /Ja/;
Č - Hrusice okr. Benešov 16.X. /Sd - Pulkrábková/;
Č - Písek 19.IX. im. /Kr/

1974

Výčet všech nálezů: M - Břeclav 29.VI. im. /St/;
S - Banská Bystrica 3.VII. im. /Sd - Košťál/;
Č - Vysoká nad Labem 24.VII. im. /Sd - Mareš/;
Č - Velká Bučina okr. Kralupy 7.VIII. im. /Čr/;
M - Tvarožná Lhota okr. Hodonín 8.VIII. 5 lar. /Sd - Komoňová/; dtto lar. /Sd - Ant. Vítková/; dtto 23.VIII. pup. /Sd - L. Hromková/;
M - Břeclav-Poštorná 26.VIII. 2 im. /Ja/;
Č - Rožďalovice okr. Nymburk 5.IX. im. /Lš/;
Č - Košák u Rožďalovic okr. Nymburk 21.IX. 1 ar. /Lš/;
Č - Praha-Dejvice 8.IX. im. /Sd - Čermáková/;
S - Banská Bystrica 8.IX. 2 im. /Sd - Košťál/;
M - Tvarožná Lhota okr. Hodonín 9.IX. pup. /Sd - F. Bačík/; dtto 1 pup. /Sd - J. Špiruda/;
Č - Kvasiny okr. Rychnov nad Kněžnou 4.IX. im. /Rt/;
Č - Dobré 16.IX. im. /Rt/;
Č - Skuhrov nad Bělou 25.IX. im. /Rt/;
M - Mikulov okr. Břeclav 11.IX. 2 im. a 13.IX. im. /Hc/;
Č - Náchod 6.IX. im. /Ho/;

Č - Velký Osek 27.IX. im. /Ho/;
S - Bratislava 1, IX. im. /Sd - Kozánek/;
Č - Kamenice okr. Mladá Boleslav 5.IX. im. /Kp/;
Č - Horní Bousov okr. Mladá Boleslav 21.IX. im. /Kp/,
Č - Příbram 14.IX. 2 im. /Tl/; dtto 22.IX. im. /Tl - Jícha/; dtto 24.IX. im. /Tl - Nekolný/; dtto 26.IX. im. /Tl - Nekolný/;
Č - Praha 23.IX. im. /Tl/;
M - Jihlava 13.IX. im. /Sd - Řeháková/;
M - Brtnice u Jihlavy 28.IX. im. /Ja/;
M - Tupesy okr. Uherské Hradiště 16.IX. im. /Gw/;
M - Kroměříž 18.IX. im. /Gw - Helia/;
M - Tupesy okr. Uherské Hradiště 20.IX. 2 im. /Gw - Helia/;
M - Strání okr. Uherské Hradiště 21.IX. 2 im. /Gw/;
Č - Hradec Králové 15. a 16.IX. 10 im. /Sd - Košťál/;
Č - Předměřice okr. Hradec Králové 29.IX. lar. /Sd - Košťál/;
Č - Strážné - Krkonoše 19.IX. im. /Sd - Datel/;
Č - Ratiboř okr. Jindřichův Hradec 21.IX. im. /Sd - Janda/;
S - Bratislava 26.IX. im. /Sd - Buchel/;
Č - Praha - Jinonice 14.IX. im. /Sk/;
Č - Letohrad okr. Ústí nad Orlicí 19.IX. im. /Sd - Tomek/;
M - Ivančice okr. Brno-venkov 20.IX. 2 im. /Hl/;
M - Oslavany okr. Brno-venkov 29.IX. im. /Hl/;
Č - Písek-okolí ?IX. 2 im. /Le/;
Č - Hradec Králové X. im. /Sd - Šimeček/;
M - Tvarožná Lhota okr. Hodonín 6.X. 4 pup. /Sd - Špiruda/;
Č - Hrusice okr. Praha-východ 14.X. im., 19.X. 2 im., 21.X. im. /Sd - Pulkrábek/;
M - Tvarožná Lhota okr. Hodonín 30.X. pup. /Sd - Mazůrová/.

Roky 1972 - 1974 se od sebe příliš nelišily a odpovídaly nižšímu průměru sledovaných let.

Celerio lineata livornica (Esp.)

Nedošla žádná hlášení z Československa.

Deilephila celerio (L.)

Nedošla žádná hlášení z Československa.

Daphnis nerii (L.)

Došlo pouze jediné hlášení v roce 1972: Č - Cep u Třeboně okr. Jindřichův Hradec VII. im. /Sd - Fliček/

Macroglossum stellatarum (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 14, 1973: 13, 1974: 8

B. Počet pozorovacích míst:

	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	celý rok
1972	6	2	9	5	2	-	24
1973	3	4	6	6	3	-	22
1974	2	4	1	6	-	1	14

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	9	2	12	6	2	-	31
1973	3	13	27	23	6	-	72
1974	2	5	1	10	-	1	19

D. Počet pozorovaných kusů:

1972	29	2	16	10	2	-	59
1973	4	20	53	67	7	-	151
1974	7	5	1	22	-	1	36

1972

E. První pozorování: M - Visalaje okr. Frýdek-Místek 8.VI. 2 im. /Ja/;
Č - Rožďalovice okr. Nymburk 9.VI. im. /Lš/.

H. Poslední pozorování: Č - Praha-Strašnice 21.IX. im. /Fx/

1973

E. První pozorování: S - Myjava 25.VI. 2 im. /Kf/;
M - Mikulovice okr. Šumperk 28.VI. im. /Va/;
Č - Soběšín okr. Kutná Hora 30.VI. im. /Fx/

F. Hojnější výskyt: M - Mikulovice okr. Šumperk 1.-30.VIII. 34 im.,
5.IX. - 30.IX. 54 im. /Va/

H. Poslední pozorování: M - Mikulovice okr. Šumperk 14.X. /Va/;
S - Závod okr. Malacky 4.X. im. /St/

1974

E. První pozorování: M - Ivančice okr. Brno-venkov 20.VI. 2 im. /Hl/;
M - Mohelno okr. Brno-venkov 24.VI. 5 im. /Hl/;
S - Čachtice 5.VII. im. /Lš/

H. Poslední pozorování: Č - Davle okr. Praha-západ 28.IX. 3 im. /Šp/;
M - Břeclav-Poštorná 5.XI. im. /Ja/

NOCTUIDAE

Scotia ipsilon (Hufn.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 15, 1973: 15, 1974: 10

B. Počet pozorovacích míst:

	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	celý rok
1972	1	1	6	7	6	7	18	7	4	57

	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	celý rok
1973	-	1	2	12	13	17	15	5	1	66
1974	-	-	1	1	3	4	8	3	2	22
C. Počet pozorovacích dnů:										
1972	-	1	3	5	4	6	14	4	1	38
+No	-	-	-	5	4	6	16	8	1	40
+Mk	1	-	1	6	17	6	5	5	2	43
+JČ	-	-	2	2	1	-	6	4	-	15
=celk.	1	1	6	18	26	18	41	21	4	136
1973	-	-	1	8	12	12	15	3	-	51
+No	-	-	-	3	9	17	15	5	-	49
+Mk	-	1	1	13	17	7	6	-	1	46
+JČ	-	-	-	2	5	2	4	1	-	14
=celk.	-	1	2	26	43	38	40	9	1	160
1974	-	-	-	-	6	2	7	1	1	17
+No	-	-	-	-	1	1	2	-	1	5
+Mk	-	-	1	2	3	2	-	2	-	10
+JČ	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
=celk.	-	-	1	2	10	5	10	4	2	34
D. Počet pozorovaných kusů:										
1972	-	3	4	56	12	16	99	8	1	199
+No	-	-	-	5	4	16	49	11	1	86
+Mk	1	-	1	7	32	6	7	10	3	67
+JČ	-	-	2	2	3	-	7	4	-	18
=celk.	1	3	7	70	51	38	162	33	5	370
1973	-	-	1	37	31	20	77	3	-	169
+No	-	-	-	3	11	28	37	6	-	85
+Mk	-	1	1	23	21	7	8	-	1	62
+JČ	-	-	-	2	6	2	5	1	-	16
=celk.	-	1	2	65	69	57	127	10	1	332
1974	-	-	-	-	22	4	16	1	1	44
+No	-	-	-	-	1	1	3	-	1	6
+Mk	-	-	1	2	3	2	-	2	-	10
+JČ	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
=celk.	-	-	1	2	26	7	20	4	2	62

1972

E. První pozorování: S - Jur u Bratislavy 31.3. /Mk/;
S - Kamenica nad Hronom 22. IV. /Čv/;
Č - Bechyně 7.V. /Fx/;
M - Brno-Černá Pole 5.V. /Mk/,

F. Hojnější výskyt: Č - Leština u Světlé nad Sázavou 22.IX. 50 im. /Pi/;
M - Visalaje okr. Frýdek-Místek 27.VI. 28 im. /Ja/;
Č - Praha-Ruzyně 6.IX. 10 im. /No/;
Č - Přerov nad Labem 8.IX. 10 im. /Čv/

H. Poslední pozorování: M - Brno-Černá Pole 8.XI. /Mk/;
Č - Praha-Ruzyně 5.XI. /No/;
Č - Studněves okr. Kladno 9.X. /Sk/;
Č - Příbram 5.XI. /Tl/

1973

E. První pozorování: M - Zlochov 26.IX. /Mk/;
M - Brno 5.V. /Mk/;
Č - Slapy nad Vltavou 20.V. /Čv/

F. Hojnější výskyt: Č - Praha-Nebušice 3.-4.IX. 50 im. /Ča/;

H. Poslední pozorování: M - Brno-Černá Pole 10.XI. /Mk/;
Č - Horní Bezděkov u Unhoště 13.X. /Sk/;
Č - České Budějovice 7.X. /Sp/;
Č - Praha-Ruzyně 14.X. /No/

1974

E. První pozorování: M - Brno-Černá Pole 8.X. /Mk/;

H. Poslední pozorování: Č - Praha-Ruzyně 24.XI. /No/;
Č - Náchod 10.XI. /Ho/

N o c t u a p r o n u b a (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 15, 1973: 17, 1974: 14

B. Počet pozorovacích míst:

	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1972	1	4	11	14	11	2	43
1973	1	8	14	17	11	4	55
1974	-	3	6	16	8	1	34

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	1	5	15	15	9	-	45
+No	-	1	9	22	13	-	45
+Mk	-	-	9	24	13	1	47
+JČ	-	1	16	18	8	-	43
=celk.	1	7	49	79	43	1	180
1973	1	5	12	28	12	1	59
+No	-	4	15	30	15	1	65
+Mk	5	5	3	25	16	4	58
+JČ	-	5	16	52	22	1	96
=celk.	6	19	46	135	65	7	278

	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1974	-	1	17	29	9	-	56
+No	-	1	15	22	15	1	54
+Mk	-	1	2	16	11	-	30
+JČ	-	-	2	6	2	-	10
=celk.	-	3	36	73	37	1	150
D. Počet pozorovaných kusů:							
1972	1	31	126	67	25	-	250
+No	-	1	27	123	45	-	196
+Mk	-	-	20	62	24	1	107
+JČ	-	1	35	27	10	-	73
=celk.	1	33	208	279	104	1	626
1973	2	17	87	92	46	1	245
+No	-	4	41	242	75	1	363
+Mk	-	6	5	105	63	7	186
+JČ	-	5	30	175	53	1	264
=celk.	2	32	163	614	237	10	1058
1974	-	1	126	76	21	-	224
+No	1	1	20	63	22	1	107
+Mk	-	1	2	35	11	-	49
+JČ	-	-	2	13	2	-	17
=celk.	-	3	150	187	56	1	397

1972

E. První pozorování: M - Ivančice okr. Brno-venkov 27. V. /Hl/;
M - Visalaje okr. Frýdek-Místek 8.VI. 4 im. /Ja/;
Č - Leština u Světlé nad Sázavou 17.VI. 2 im. /Pi/;
Č - Praha-Ruzyně 21.VI. /No/;
Č - Český Krumlov 30.VI. /Sp/

F. Hojnější výskyt: M - Visalaje okr. Frýdek-Místek 20.VI. 16 im., 10. VII. 18 im., 19.VII. 30 im. /Ja/;
S - Turzovka okr. Čadca 9.VIII. 28 im., 17.VIII. 16 im. /Ja/

H. Poslední pozorování: M - Ivančice okr. Brno-venkov 27.X. 2 im. /Hl/;
M - Brno-Černá Pole 6.X. /Mk/;
Č - Praha-Ruzyně 27.IX. /No/;
S - Kamenica nad Hronom 23.IX. /Čv/

1973

E. První pozorování: M - Břeclav 9.X. /St/;
M - Brno-Černá Pole 13.VI. /Mk/;
S - Kamenica nad Hronom 16.VI. 2 im. /Čv/;
Č - České Budějovice 17.VI. /Sp/

F. Hojnější výskyt: S - Dlhá Ves okr. Rožňava 5.-8.VIII. 30 im. /La/;
Č - Praha-Ruzyně 28.VIII. 21 im. /No/;
M - Frenštát pod Radhoštěm 30.VII. 16 im., 31.VII. 28 im., 3.IX. 16 im. /Ja/

H. Poslední pozorování: Č - Písek 14.X. /Le/;
M - Brno-Černá Pole 7.X. /Mk/;
Č - Srbsko u Berouna 2.X. /Čv/

1974

E. První pozorování: M - Brno-Černá Pole 26.VI. /Mk/;
Č - Náchod 29.VI. /Ho/;
Č - Praha-Ruzyně 27.VI. /No/

G. Byla pozorována pasivní migrace: s nákladem rajčat bylo přivezeno do Podivína, okr. Břeclav v období 20.8. - 4.9. asi 50 im. Rajčata byla přepravována na návěsech z Chotína, okr. Komárno, Orechovej Poton, okr. Dunajská Streda a z Čalova, okr. Dunajská Streda /Pi/

H. Poslední pozorování: Č - Praha-Ruzyně 6.X. /No/;
M - Brno-Černá Pole 28.IX. /Mk/;
Č - Zlivice okr. Písek 23.IX. /Le/

V letech 1972 a 1973 byl počet pozorovaných druhů nadprůměrný, v roce 1973 dosáhl dokonce rekordní hodnoty 1058 /doposud bylo pozorováno nejvíce kusů v roce 1966 - 886/. Rok 1974 byl opět průměrný.

O p i g e n a p o l y g o n a (Den. et Sch.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 9, 1973: 8, 1974: 5

B. Počet pozorovacích míst:

	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1972	5	9	8	-	22
1973	1	7	5	-	13
1974	1	2	5	1	9

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	20	26	17	-	63
1973	1	15	9	-	25
1974	2	3	10	1	16

D. Počet pozorovaných kusů:

1972	256	111	29	-	396
1973	1	23	21	-	45
1974	2	4	16	3	25

1972

E. První pozorování: Č - Terezín u Kunžaku 14.VII. 23 im. /Sm/;
Č - Praha-Ruzyně 26.VII. /No/;
M - Brno-Černá Pole 17.VII. /Mk/

F. Hojnější výskyt: Č - Terezín u Kunžaku 14.VII. 23 im., 16.VII. 53 im., 18.VII. 50 im., 19.VII. 51 im., 20.VII. 38 im., 21.VII. 18 im., 6.VIII. 12 im., 9.VIII. 11 im., 10.VIII. 11 im. /Sm/;
Č - Dvůr u Písku 9.VIII. 29 im. /Le/

H. Poslední pozorování: Č - Český Krumlov 26.IX. 2 im. /Sp/;
Č - Putim 24.IX. /Le/;
S - Kamenica nad Hronom 20.IX. 2 im. /Čv/;
M - Brno-Černá Pole 15.IX. /Mk/;
M - Radějov 20.IX. 7 im. /Hl/

1973

E. První pozorování: Č - Terezín u Kunžaku 6.VII. /Le/;
Č - Praha-Ruzyně 3.VIII. /No/;
Č - Sázava u Davle okr. Praha-západ 4.VIII. /Pi/;
M - Moravský Písek 16.VIII. /Zl/

F. Hojnější výskyt: Kamenica nad Hronom 27.IX. 10 im. /Čv/

H. Poslední pozorování: M - Moravský Písek 30.IX. 2 im. /Zl/;
M - Brno-Černá Pole 28.IX. 2 im. /Mk/;
S - Kamenica nad Hronom 27.IX. 10 im. /Čv/;
Č - Praha-Ruzyně 25.IX. /No/

1974

E. První pozorování: Č - Praha-Ruzyně 30.VII. /No/

H. Poslední pozorování: M - Ivančice okr. Brno-venkov 11.X. /Hl/

Tento druh byl sledován až od roku 1970. Ve všech těchto letech byl počet pozorovaných kusů 25 - 45, kromě roku 1972, kdy dosáhl desetkrát vyšší hodnoty než v ostatních letech - 396. K největšímu rozmnožení došlo v jižních Čechách v VII. a VIII. 1972, o čemž svědčí údaje z lapače v Terezíně u Kunžaku.

Peridroma saucia (Hb.)

1972: S - Kamenica nad Hronom 22.IX. /Čv/;
M - Brno-Černá Pole 4.IX., 31.X. /Mk/;
Č - České Budějovice 19.IX. /Sp/;
M - Havlov okr. Žďár nad Sázavou 7.IX. 5 im., 8.IX. 3 im., 9.IX. 7 im. /Hl/;
M - Moravský Písek 20.V., 23.V. /Zl/

1973: S - Gbelce okr. Nové Zámky 15.IX. 2 im. /Mk/

1974: Nedošlo žádné hlášení z Československa

Tento druh k nám zalétá jen vzácně v příznivých letech. V roce 1972 byl počet pozorovaných kusů poněkud vyšší než v ostatních letech.

Amathes c-nigrum (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 12, 1973: 14, 1974: 13

B. Počet pozorovacích míst:

	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	celý rok
1972	1	4	7	9	10	16	6	1	54
1973	-	7	11	9	16	8	7	-	58
1974	-	3	5	6	9	16	3	-	42

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	1	2	2	11	9	17	-	-	42
+No	-	3	25	8	20	26	3	-	85
+Mk	-	2	15	3	28	22	7	1	78
+JČ	-	-	18	8	30	60	3	-	119
=celk.	1	7	60	30	87	125	13	1	324
1973	-	4	11	9	34	3	3	-	64
+No	-	2	24	10	26	28	8	-	98
+Mk	-	9	23	3	31	29	7	-	102
+JČ	-	1	27	10	52	43	7	-	140
=celk.	-	16	85	32	143	103	25	-	404
1974	-	1	11	20	18	26	1	-	77
+No	-	6	15	2	19	25	3	-	70
+Mk	-	3	8	1	25	27	3	-	67
+JČ	-	-	-	-	4	7	-	-	11
=celk.	-	10	34	23	66	85	7	-	225

D. Počet pozorovaných kusů:

1972	1	7	3	72	45	213	-	-	341
+No	-	6	95	18	998	1305	3	-	2425
+Mk	-	2	22	3	362	137	11	1	538
+JČ	-	-	22	9	74	317	4	-	426
=celk.	1	15	142	102	1479	1972	18	1	3730
1973	-	26	58	78	315	6	4	-	487
+No	-	2	66	21	1824	1018	14	-	2945
+Mk	-	8	177	3	1054	343	18	-	1623
+JČ	-	1	78	15	832	235	14	-	1175
=celk.	-	57	379	117	4025	1602	50	-	6230
1974	-	1	48	64	522	379	2	-	1016
+No	-	7	28	3	168	301	4	-	511
+Mk	-	3	11	1	668	295	4	-	982
+JČ	-	-	-	-	15	13	-	-	28
=celk.	-	11	87	68	1373	988	10	-	2537

1972

E. První pozorování: Č - Kvasiny okr. Rychnov nad Kněžnou 22. IV. /Rt/;
Č - Praha-Strašnice 22.V. /Fx/;
Č - Praha-Ruzyně 23.V. /No/;
M - Brno-Černá Pole 22.V. /Mk/;
S - Kamenica nad Hronom 26.V. /Čv/

F. Hojnější výskyt: Č - Praha-Ruzyně 30.VIII. 150 im., 4.IX. 100 im./No/;
Č - Leština u Světlé nad Sázavou 22.IX. 100 im. /Pi/;

H. Poslední pozorování: M - Brno-Černá Pole 2.XI. /Mk/;
Č - Putim 9.X. /Le/;
Č - Písek 8.X. /Le/;
Č - Praha-Ruzyně 6.-8.X. /No/;
Č - České Budějovice 14.X. /Sp/;
Č - Český Krumlov 10.X. /Sp/;
S - Kamenica nad Hronom 23.IX. /Čv/

1973

E. První pozorování: S - Kamenica nad Hronom 10.V. 8 im. /Čv/;
M - Brno-Černá Pole 20.V. /Mk/;
M - Jihlava 30.V. /Sg/;
Č - České Budějovice 30.V. /Sp/;
Č - Praha-Ruzyně 30.V. /No/

F. Hojnější výskyt: M - Brno-Černá Pole 19.VIII.-6.IX. denně 39 - 119 im. /Mk/;
Č - Terezín u Kunžaku 20.VIII. 152 im., 22.VIII. 71 im., 23.VIII. 73 im. /Le/;
S - Dlhá Ves okr. Rožňava 5.-8.VIII. 200 im. /La/;
Č - Praha-Ruzyně 26.VIII. 175 im., 3.IX. 132 im./No/

H. Poslední výskyt: M - Brno-Černá Pole 16.X. /Mk/;
Č - Praha-Ruzyně 15.X. /No/;
Č - České Budějovice 8.X. /Sp/;
Č - Sázava u Davle 5.X. /Pi/;
M - Uherské Hradiště 4.X. /Gw/;
M - Jihlava 3.X. /Sg/

1974

E. První pozorování: M - Brno-Černá Pole 12.V. /Mk/;
Č - Praha-Ruzyně 17.V. /No/;
S - Kamenica nad Hronom 25.V. /Gw/

F. Hojnější výskyt: M - Brno-Černá Pole 16.VIII. 48 im., 18.VIII. 60 im., 19.VIII. 69 im., 20.VIII. 57 im., 21.VIII. 55 im., 25.VIII. 40 im. /Mk/;

M - Břeclav 4.IX. 148 im., 26.VIII. 86 im. /Ja/;
M - Strání okr. Uherské Hradiště 17.VIII. 50 im. /Gw/
G. Migrace: Byla pozorována pasivní migrace: s nákladem rajčat bylo přivezeno do Podivína okr. Břeclav v období 20.VIII.-4.IX. asi 400 im. Rajčata byla přepravována na návěsech z Chotína okr. Komárno, Orechovej Poton okr. Dunajská Streda a z Čalova okr. Dunajská Streda /Pi/
H. Poslední pozorování: Č - Praha-Ruzyně 10.X. /No/;
M - Brno-Černá Pole 6.X. /Mk/;
M - Břeclav 2.X. /Ja/ .

Mythimna L-album (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 9, 1973: 9, 1974: 8
B. Počet pozorovacích míst:

	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	celý rok
1972	5	5	4	7	10	4	1	31
1973	-	4	4	5	8	3	-	24
1974	1	3	4	5	7	2	-	22
C. Počet pozorovacích dnů:								
1972	-	3	2	8	15	2	1	31
+No	-	1	3	2	15	3	-	24
+Mk	-	6	9	7	26	11	-	59
+JČ	-	-	1	-	1	-	-	2
=celk.	-	10	15	17	57	16	1	116
1973	-	3	6	4	9	1	-	23
+No	-	-	1	7	24	4	-	36
+Mk	-	9	8	10	22	9	-	58
+JČ	-	-	-	-	4	-	-	4
=celk.	-	12	15	21	59	14	-	121
1974	-	10	15	4	6	-	-	35
+No	-	6	9	2	21	5	-	43
+Mk	1	16	16	12	28	5	-	78
=celk.	1	32	40	18	55	10	-	156
D. Počet pozorovaných kusů:								
1972	-	4	5	93	26	4	2	134
+No	-	1	8	3	25	3	-	40
+Mk	-	9	11	12	95	19	-	146
+JČ	-	-	1	-	1	-	-	2
=celk.	-	14	25	108	147	26	2	322
1973	-	37	7	13	18	1	-	76
+No	-	-	1	13	62	4	-	80
+Mk	-	17	12	27	148	13	-	217

	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
+JČ	-	-	-	-	4	-	-	4
=celk.	-	54	20	53	232	18	-	377
1974	-	17	118	10	11	-	-	156
+No	-	6	11	2	69	5	-	93
+Mk	1	39	29	33	133	8	-	243
=celk.	1	62	158	45	213	13	-	492

1972

E. První pozorování: M - Brno-Černá Pole 9.VI. /Mk/;
Č - Praha-Ruzyně 24.VI. /No/

F. Hojnější výskyt: Č - Jelení Vrchy okr. Prachatice 15.VIII. 12 im./Ja/;
M - Ivančice okr. Brno-venkov 15.VIII. 27 im. /Hl/;
Č - Borová Lada okr. Prachatice 21.VIII. 36 im. /Hl/

H. Poslední pozorování: M - Brno-Černá Pole 28.X. /Mk/;
M - Ivančice okr. Brno-venkov 28.X. /Hl/;
Č - Praha-Ruzyně 6.-8.X. /No/;
S - Kamenica nad Hronom 23.IX. /Čv/;
M - Moravský Písek 7.XI. /Zl/

1973

E. První pozorování: M - Brno-Černá Pole 4.VI. /Mk/;
S - Kamenica nad Hronom 15.VI. 15 im. /Čv/

F. Hojnější výskyt: M - Brno-Černá Pole 3.IX. 15 im., 4.IX. 12 im. /Mk/;
M - Hustopeče 22.VI. 20 im. /Čv/;
S - Kamenica nad Hronom 15.VI. 15 im. /Čv/

H. Poslední pozorování: M - Brno-Černá Pole 11.X. /Mk/;
Č - Praha-Ruzyně 10.X. /No/;
M - Uherské Hradiště 4.X. /Gw/;
S - Kamenica nad Hronom 29.IX. 4 im. /Čv/

1974

E. První pozorování: M - Brno-Černá Pole 29.V. /Mk/;
M - Břeclav 3.VI. /Ja/;
Č - Praha-Ruzyně 14.VI. /No/

F. Hojnější výskyt: M - Břeclav 17.VII. 43 im. /Ja/

H. Poslední pozorování: Č - Praha-Ruzyně 18.X. /No/;
M - Brno-Černá Pole 13.X. /Mk/

Počet pozorovaných kusů byl ve všech třech letech vysoce nadprůměrný, maximální hodnoty - 492 kusů - dosáhl v roce 1974.

M y t h i m n a v i t e l l i n a (Hb.)

1972: S - Kamenica nad Hronom 22.IX. 2 im. /Čv/;

M - Havlov okr. Žďár nad Sázavou 2 im. /Hl/
1973: S - Kamenica nad Hronom 16.VI. 2 im., 26.IX. im. /Čv/
1974: S - Kamenica nad Hronom 24.VIII. im. /Čv/

Naposledy byl tento druh pozorován 6.X.1965 ve Štúrově; uplynulé 3 roky byly pro něj tedy obzvláště příznivé; byl nalezen nejen na Jižním Slovensku, nýbrž i v Havlově na Moravě - je to zároveň nejseverněji položená lokalita, kde by tento druh chyçen. Nálezy potvrzují výskyt ve 2 generacích v VI. a IX.

Phlogophora meticulosa (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 10, 1973: 9, 1974: 12
B. Počet pozorovacích míst:

	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	celý rok
1972	1	2	1	-	7	7	3	1	22
1973	-	3	4	3	4	6	5	-	25
1974	2	2	3	2	8	8	4	2	31
C. Počet pozorovacích dnů:									
1972	1	2	1	-	6	4	1	1	16
+No	-	-	-	-	1	4	1	-	6
+Mk	-	-	-	-	8	11	1	-	20
+JČ	-	-	-	-	-	2	-	-	2
=celk.	1	2	1	-	15	21	3	1	44
1973	-	2	7	3	1	3	1	-	17
+No	-	-	1	-	1	11	1	-	14
+Mk	-	1	3	1	7	12	1	-	25
+JČ	-	-	-	-	1	1	3	-	5
=celk.	-	3	11	4	10	27	6	-	61
1974	1	-	1	7	9	13	5	1	37
+No	-	1	1	-	7	15	2	-	26
+Mk	2	2	2	1	5	16	3	1	32
+JČ	-	-	-	-	1	1	-	-	2
=celk.	3	3	4	8	22	45	10	2	97
D. Počet pozorovaných kusů:									
1972	1	2	1	-	10	25	1	1	41
+No	-	-	-	-	2	5	1	-	8
+Mk	-	-	-	-	11	14	1	-	26
+JČ	-	-	-	-	-	2	-	-	2
=celk.	1	2	1	-	23	46	3	1	77
1973	-	4	34	3	1	32	1	-	75
+No	-	-	1	-	1	12	1	-	15
+Mk	-	1	3	1	11	17	3	-	36

	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	celý rok
+JČ	-	-	-	-	1	1	4	-	6
=celk.	-	5	38	4	14	62	9	-	132
1974	I	-	1	20	46	54	8	1	131
+No	-	1	1	-	10	18	2	-	32
+Mk	2	2	2	1	6	22	3	1	39
+JČ	-	-	-	-	1	1	-	-	2
=celk.	3	3	4	21	63	95	13	2	204

1972

E. První pozorování: S -Velké Leváre 20.IV. /La/;
M - Brno-Ořešín 8.V. /Ja/;
Č - Leština u Světlé nad Sázavou 20.V. /Pi/

F. Hojnější výskyt: S - Turzovka-Dlhá okr. Čadca 20.IX. 11 im. /Ja/;
S - Kamenica nad Hronom 20.IX. 10 im. /Čv/

H. Poslední pozorování: Č - Příbram 1.X., 2.XI. /Tl/;
Č - Praha-Ruzyně 25.X. /No/;
M - Brno-Černá Pole 16.X. /Mk/;
S - Kamenica nad Hronom 23.IX. /Čv/

1973

E. První pozorování: M - Brno-Černá Pole 3.V. /Mk/;
S - Kamenica nad Hronom 16.VI. 8 im. /Čv/;
Č - Praha-Ruzyně 26.VI. /No/

F. Hojnější výskyt: S - Kamenica nad Hronom 27.IX. 30 im. /Čv/

H. Poslední pozorování: Č - Praha-Ruzyně 8.X. /No/;
Č - České Budějovice 7.X. /Sp/;
Č - Čelákovice 7.X. /Čv/;
M - Brno-Černá Pole 3.X. 3 im. /Mk/

1974

E. První pozorování: M - Brno-Černá Pole 18.IV. /Mk/;
M - Břeclav 20.IV. /St/;
Č - Praha-Ruzyně 12.V. /No/

H. Poslední pozorování: Č - Náchod 10.XI. /Ho/;
M - Brno-Černá Pole 5.XI. /Mk/

Laphygma exigua (Hb.)

1972: Nedošlo žádné hlášení z Československa

1973: S - Kamenica nad Hronom 7.VII. 1 im. /Čv/

1974: Nedošlo žádné hlášení z Československa

Jediný zjištěný exemplář pochází opět z nejjižnější části našeho území, kde byl tento druh vzácně pozorován i v minulosti.

Chloridea maritima (Graslin.)

1972: M - Brno-Černá Pole 15.VIII. 1 im., 16.VIII. 1 im., 8.IX. 1 im./Mk/;
Č - České Budějovice 18.VII. 1 im. /Sp/
1973: Č - Františkovy Lázně 28.VIII. 1 im. /Kx/;
Č - Písek 12.VII. 1 im. /Le/;
M - Klentnice okr. Břeclav 18.VI. 1 im., 25.VII. 1 im. /La/;
S - Štúrovo okr. Nové Zámky 27.VII. 6 im. /La/
1974: Č - Režabinec 16.VII. 1 im. /Le/;
M - Ivančice okr. Brno-venkov 22.VII. 3 im. /Hl/;
M - Brno-Černá Pole 26.VII. 1 im. /Mk/

Většina hlášení pochází opět z jižních oblastí Československa. Poněvadž létá převážně ve dne, nebývá zachycen ve světelných lapačích.

Chloridea peltigera (Den. et Sch.)

Nedošla žádná hlášení z Československa.

Chloridea armigera (Hb.)

Nedošla žádná hlášení z Československa.

Chloridea scutosa (Den. et Sch.)

1972: S - Chotín okr. Komárno 28.V. 20 im. /Čv/;
M - Moravský Písek 23.VII. /Zl/
1973: S - Chotín okr. Komárno 13.V. 30 im. /Čv/;
S - Kamenica nad Hronom 8.VII. 1 im. /Čv/
1974: Nedošlo žádné hlášení z Československa

Došlá hlášení jsou, kromě nálezu v Moravském Písku, z jižního Slovenska, kde byl tento druh pozorován i v minulosti; počet pozorovaných kusů v letech 1972 a 1973 svědčí o větším příletu.

Chrysaspidia bractea (Den. et Sch.)

1972: Č - Mrtvý Luh 20.VIII. /La/;
Č - Kvasiny u Rychnova nad Kněžnou 6.VIII. /Rt/;
S - Stratená ve Slov. Raji 30.VII. 6 im. /La/;
Č - Náchod 8.VIII. /Ho/;
Č - Jelení Boudy 900 m Krkonoše 15.VIII. /Lš/;
Č - Hrdoňovice okr. Jičín 27.VII. /Kp/;
Č - Krčkovice okr. Semily 28.VII. /Kp/;
Č - Pavlov okr. Havlíčkův Brod 18.VII. /Sg/;
Č - Terezín u Kunžaku okr. Jindřichův Hradec 3.VII. 1 im., 7.VII. 1 im., 12.VII. 1 im., 14.VII. 6 im., 16.VII. 9 im., 18.VII. 1 im., 20.VII. 2 im., 21.VII. 2 im., 22.VII. 2 im., 23.VII. 1 im.,

24.VII. 3 im., 25.VII. 1 im., 26.VII. 1 im., 28.VII. 3 im., 1.VIII. 2 im., 12.VIII. 1 im. /Sm/.

1973: M - Nepomuky okr. Jihlava 30.VII. /Kl/;
Č - Vidovice u Velkých Popovic 300 m 20.VII. 1 im. /Ča/;
M - Radějov 300 m 6.VII. 1 im. /Gw/;
Č - Srbsko u Berouna 4.VII. 2 im. /Čv/;
Č - Smědeč okr. Prachatice 650 m 5.VII. 2 im. /Ha/;
Č - Soběslav-Vesce 9.VII. /Fx/;
M - Bělá pod Pradědem 700 m 30.VII., 1.VIII. /Fx/;
Č - Františkovy Lázně 15.VII., 30.VII., 4.VIII. /Kx/;
Č - Terezín u Kunžaku 3.VII. 8 im., 6.VII. 1 im., 8.VII. 1 im., 1.VIII. 2 im., 21.VIII. 1 im., 24.VIII. 1 im. /Le/;
S - Dlhá Ves okr. Rožňava 8.VIII. 1 im. /La/;
M - Buchlovice 13.VIII. 1 im. /Jn/;
M - Doloplazy 12.VII., 8.VIII. /Jn/

1974: Č - Náchod 23.VII. 5 im. /Ho/;
S - Modrá - Piesok okr. Pezinok 17.VII. 1 im. /Sk/;
Č - Režabinec 26.VII., 16.VIII. /Le/

Druh je domácí ve vyšších polohách, odkud přišla také většina hlášení. Přesto přišlo několik hlášení z nižších poloh, kolem 300 m n.m. Je škoda, že někteří pozorovatelé neuvádějí u svých nálezů nadmořskou výšku, čímž význam svého nálezu znehodnocují, protože nelze rozhodnout, zda jde o lokalitu ve vyšší poloze nebo v nížině.

A u t o g r a p h a c o n f u s a (Stph.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 8, 1973: 14, 1974: 11

B. Počet pozorovacích míst:

	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1972	1	3	1	7	4	7	3	26
1973	-	4	2	5	14	14	1	40
1974	-	2	2	4	10	5	1	24

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	1	2	-	7	4	7	3	24
+No	-	1	-	3	2	-	-	6
+Mk	-	-	1	-	4	8	3	16
+JČ	-	-	-	-	1	-	-	
=celk.	1	3	1	10	11	15	6	47
1973	-	5	1	10	14	25	-	55
+No	-	-	-	2	4	3	1	10
+Mk	-	-	1	8	5	8	-	22
+JČ	-	-	-	2	2	-	-	4
=celk.	-	5	2	22	25	36	1	91

	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1974	-	2	6	10	17	9	-	44
+No	-	-	-	-	2	3	-	5
+Mk	-	-	-	1	7	12	1	21
+JČ	-	-	-	1	1	-	-	2
=celk.	-	2	6	12	27	24	1	72
D. Počet pozorovaných kusů:								
1972	1	5	-	28	11	44	3	92
+No	-	1	-	3	3	-	-	7
+Mk	-	-	1	-	4	9	3	17
+JČ	-	-	-	-	1	-	-	1
=celk.	1	6	1	31	19	53	6	117
1973	-	11	1	57	26	47	-	142
+No	-	-	-	2	4	3	1	10
+Mk	-	-	1	11	6	15	-	33
+JČ	-	-	-	2	2	-	-	4
=celk.	-	11	2	72	38	65	1	189
1974	-	2	7	62	33	20	-	124
+No	-	-	-	-	2	3	-	5
+Mk	-	-	-	1	9	15	1	26
+JČ	-	-	-	1	1	-	-	2
=celk.	-	2	7	64	45	38	1	157

1972

E. První pozorování: S - Kamenica nad Hronom 22.IV. /Čv/;
S - Tbn u Komárna 5.V. /Čv/;
Č - Praha-Ruzyně 22.V. /No/;
M - Moravský Písek 11.V. 3 im. /Zl/

F. Hojnější výskyt: S - Kamenica nad Hronom 20.IX. 20 im., 22.IX. 10 im. /Čv/;
M - Radějov okr. Hodonín 11.VII. 10 im. /Hl/

H. Poslední pozorování: M - Moravský Písek 29.X. /Zl/;
M - Brno-Černá Pole 10.V. /Mk/;
S - Kamenica nad Hronom 22.IX. /Čv/;
Č - Terezín u Kunžaku 1.-15.IX. /Sm/;
S - Turzovka - Dlha okr. Čadca 20.IX. /Ja/;
M - Pavlovské vrchy 8.X. /La/

1973

E. První pozorování: M - Hustopeče 4.V. /Mt/;
S - Kováčov okr. Nové Zámky 5.V. 2 im. /Fx/;
S - Kamenica nad Hronom 10.V. 5 im. /Čv/

H. Poslední pozorování: Č - Praha-Ruzyně 8.X. /No/;
S - Kamenica nad Hronom 29.IX. /Čv/;
M - Uherské Hradiště 20.IX. 3 im. /Gw/;
M - Frenštát pod Radhoštěm 18.IX. 2 im. /Ja/;
M - Brno-Černá Pole 18.IX. /Mk/;
Č - Studněves u Slaného 18.IX. /Sk/

1974

E. První pozorování: M - Uherské Hradiště 21.V. /Gw/;
S - Kamenica nad Hronom 25.V. /Gw/;
Č - Studněves okr. Kladno 20.VI. /Sk/
H. Poslední pozorování: M - Brno-Černá Pole 11.X. /Mk/;
M - Břeclav 25.IX. /Ja/;
Č - Praha-Ruzyně 18.IX. /No/

A u t o g r a p h a g a m m a (L.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 23, 1973: 19, 1974: 19

B. Počet pozorovacích míst:

	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	celý rok
1972	1	6	20	26	30	25	11	1	120
1973	-	13	16	30	28	26	12	1	126
1974	1	3	9	12	18	23	9	1	76

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	-	4	24	82	62	46	11	-	229
+No	-	-	20	22	25	23	1	-	91
+Mk	1	3	17	30	30	23	6	1	111
+JČ	-	1	7	44	31	33	-	-	116
=celk.	1	8	68	178	148	125	18	1	547
1973	-	8	15	36	37	36	11	1	144
+No	-	2	14	29	28	29	11	-	113
+Mk	-	8	36	122	102	81	5	-	354
+JČ	-	-	5	32	20	20	4	-	81
=celk.	-	18	70	219	187	166	31	1	692
1974	1	5	18	30	31	42	9	1	137
+No	-	-	13	25	26	27	3	-	94
+Mk	-	4	11	25	27	22	-	-	89
+JČ	-	-	1	1	5	6	-	-	13
= celk.	1	9	43	81	89	97	12	1	333

D. Počet pozorovaných kusů:

1972	-	5	233	735	367	217	17	-	1574
+No	-	-	78	437	339	157	1	-	1012
+Mk	1	3	55	636	251	127	6	1	1080
+JČ	-	1	9	458	89	59	-	-	616
=celk.	1	9	375	2266	1046	560	24	1	4282

	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	celý rok
1973	-	25	46	417	200	133	44	1	866
+No	-	4	26	208	132	245	23	-	638
+Mk	-	12	96	360	363	139	6	-	976
+JČ	-	-	7	106	35	39	5	-	192
=celk.	-	41	175	1091	730	556	78	1	2672
1974	1	15	102	266	191	178	10	1	764
+No	-	-	23	69	100	213	4	-	409
+Mk	-	5	33	416	216	138	-	-	808
+JČ	-	-	1	1	12	9	-	-	23
=celk.	1	20	159	752	519	538	14	1	2004

1972

E. První pozorování: M - Brno-Černá Pole 10.IV. /Mk/;
S - Ton u Komárna 5.V. /Čv/;
Č - Bechyně 7.V. /Fx/

F. Hojnější výskyt: S - Kežmarok 29.VI. 50 im. /Ka/;
S - Kamenica nad Hronom 1.VII. 50 im. /Čv/;
Č - Pavlov okr. Havlíčkův Brod 7.IX. odhad 3000 im. /Sg/;
Č - Terezín u Kunžaku okr. Jindřichův Hradec 7.VII. 53 im. /Sm/;
M - Brno-Černá Pole 6.VII. 90 im. /Mk/;
Č - Praha-Ruzyně 24.VII. 42 im. /No/;
M - Břeclav 1.-9.VII. 295 im. /St/

H. Poslední pozorování: M - Brno-Černá Pole 8.XI. /Mk/;
Č - Praha-Smíchov 31.X. /Šm/;
Č - Praha-Hradčany 30.X. /Fx/;
Č - Sázavka okr. Havlíčkův Brod 28.X. /Pi/;
Č - Soběšín okr. Kutná Hora 28.X. /Fx/;
M - Ivančice okr. Brno-venkov 28.X. /Hl/;
Č - Kvasiny okr. Rychnov nad Kněžnou 28.X./Rt/

1973

E. První pozorování: S - Kováčov okr. Nové Zámky 5.V. /Fx/;
S - Kamenica nad Hronom 10.V. /Čv/;
M - Nepomuky okr. Jihlava 16.V. /Kl/;
M - Břeclav 19.V. /St/;
M - Frenštát pod Radhoštěm 20.V. /Ja/;
Č - Praha-Ruzyně 22.V. /No/;
Č - Sázava u Davle 26.V. /Pi/;

F. Hojnější výskyt: Č - Praha-Ruzyně 5.IX. 49 im. /No/;
M - Brno-Černá Pole 1.-2.VIII. 105 im. /Mk/;
S - Kamenica nad Hronom 7.-13.VII. 300 im./Čv/;

H. Poslední pozorování: M - Frenštát pod Radhoštěm 9.XI. /Ja/;
Č - Soběšín okr. Kutná Hora 16.X. 20 im./Fx/;
Č - Praha-Ruzyně 16.X. /No/;
Č - Praha-Hradčany 14.X. /Čv/;
M - Brno-Černá Pole 14.X. /Mk/;
Č - Písek 21.X. /Le/

1974

E. První pozorování: Č - Soběšín okr. Kutná Hora 5.VI. /Fx/;
M - Mikulov 29.IV. /Hc/;
F. Hojnější výskyt: M - Brno-Černá Pole 15.VII. 151 im., 16.VII. 81 im. /Mk/;
M - Mikulov 8.VI. 60 im. /Hc/;
Č - Praha-Ruzyně 12.IX. 56 im. /No/;
M - Břeclav 25.VII. 58 im. /Ja/;
M - Radějov 3.VIII. 50 im. /Gw/;
M - Ostrožská Nová Ves 25.VIII. 50 im. /Gw/
H. Poslední pozorování: Č - Kleny u České Skalice 2.11. /Ho/;
Č - Soběšín okr. Kutná Hora 12.X. /Fx/;
Č - Sázava u Davle okr. Praha-západ 12.X./Pi/;
M - Mikulov 8.X. /Hc/

Vzhledem k tomu, že většina amatérských pozorovatelů neuvádí všechna pozorování, nýbrž jen první a poslední, popř. hojnější výskyt, mají větší význam pro určení, jak byl tento druh v příslušném roce hojný, údaje z lapačů, zvláště pak z lapače v Brně /Mk/, který je v činnosti po celou dobu sledování tažných motýlů u nás. Podle tohoto lapače jsou roky 1972 - 1974 nadprůměrné /průměr za předchozích 7 let činí 792 ex., maximální údaj z tohoto lapače je z roku 1970: 1149 ex./.

GEOMETRIDAE

Cosymbia pupillaria (Hb.)

1972: Nedošlo žádné hlášení z Československa.
1973: S - Rémetské Hámre, okr.Michalovce 25.VII. /La/
1974: Nedošlo žádné hlášení z Československa.

Tento jediný nález je zároveň prvním údajem o výskytu C. pupillaria /Hb./ na území Československa za dobu sledování tažných motýlů od r. 1965 .

Nycterosea obstipata (F.)

1972: Č - Praha-Ruzyně 20.IX. 1 im. /No/;

M - Hustopeče 15.VI. /Mt - Dufek/;
M - Moravský Písek 3.XI. /Zl/
1973: Č - Praha-Hrad 1.VI. /Čv/;
Č - Praha-Ruzyně 31.V., 27.VIII., 8.X. a 1 im. /No/
1974: M - Ivančice okr. Brno-venkov 22.VIII. 1 im. /Hl/

Tento vzácný druh je u nás pravidelným hostem. Počet pozorovaných kusů za léta 1972 - 1973 nevybočuje z průměru. Opět se potvrzuje, že má u nás zřejmě 2. generaci; motýli, kteří přilétli v V. - VI. pravděpodobně zakládají druhou generaci vyskytující se v VIII. - X., resp. XI.

PYRAUSTIDAE

Nomophila noctuella (Den. et Sch.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 7, 1973: 5, 1974: 2
B. Počet pozorovacích míst:

	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1972	-	-	4	1	4	1	10
1973	1	-	2	3	2	1	9
1974	1	-	-	-	3	-	4

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	-	-	4	1	7	1	13
1973	2	-	4	3	2	1	12
1974	1	-	-	-	3	-	4

D. Počet pozorovaných kusů:

1972	-	-	6	1	7	15	29
1973	2	-	4	5	9	1	21
1974	1	-	-	-	3	-	4

1972

E. První pozorování: Č - Studněves u Slaného okr. Kladno 19.VII. /Sk/;
F. Hojnější výskyt: Č - Praha-Ruzyně 23.VII. 3 im. /No/;
M - Zubří okr. Žďár nad Sázavou 10.X. 15 im./La/
H. Poslední pozorování: M - Zubří okr. Žďár nad Sázavou 10.X. 15 im./La/

1973

E. První pozorování: Č - Praha-Ruzyně 23.V. /No/
F. Hojnější výskyt: M - Stupava-Chřiby okr. Uherské Hradiště 25.IX. 8 im. /La/
H. Poslední pozorování: Č - České Budějovice - Roudná 7.X. /Sp/

1974

E. První pozorování: Č - Praha-Ruzyně 20.V. /No/
H. Poslední pozorování: Č - Praha-Ruzyně 19.IX. /No/

Udea martialis (Guénée)

1972: Č - Písek 24.IX. /Le/;
Č - Č. Vrbné okr. České Budějovice 15.-19.IX. 4 im. /Sp/;
Č - Leština u Světlé nad Sázavou okr. Havlíčkův Brod 22.IX./Pi/
1973: Č - Písek 24.IX. /Le/
1974: Nedošlo žádné hlášení z Československa.

Ostrinia nubialis (Hb.)

1972: Č - Český Krumlov 18.V., 25.V. /Sp/;
M - Pouzdřany 18.VII. /La/
1973: Č - České Budějovice-Roudné 11.VII., 21.VII. /Sp/;
M - Brno-Černá Pole 27.VI., 20.VII. /Mk/
1974: Č - Studněves okr. Kladno 27.VII., 2.VIII. /Sk/

Pyrausta sticticalis (L.)

1972: Výčet všech nálezů: Č - Praha-Zlíchov 13.VIII. /Sd/;
Č - České Vrbné okr. České Budějovice 14.VIII. 2 im. /Sp/;
Č - Český Krumlov 16.VIII. /Sp/;
M - Stupava okr. Uherské Hradiště 17.IX./La/;
M - Milovice okr. Břeclav 8.X. /La/

1973:
A. Počet pozorovatelů: 4
B. Počet pozorovacích míst:

V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	celý rok
5	6	8	8	5	32

C. Počet pozorovacích dnů:

6	15	37	40	13	111

D. Počet pozorovaných kusů:

9	19	56	77	23	184

E. První pozorování: M - Chrlice 5.V. /Mk/
F. Hojnější výskyt: M - Velké Pavlovice 25.VII. 6 im. /Mk/;
M - Čejkovice 1., 3., 5.VIII. à 6 im. /Mk/;
M - Ostroh 3.IX. 7 im. /Mk/
H. Poslední pozorování: M - Ostroh 9.IX. /Mk/
1974:
Výčet všech nálezů: Č - Soběšín okr. Kutná Hora 23.VIII., 13.IX./Fx/;
M - Ochoz u Brna 9.V. /Sg/;
M - Klentnice okr. Břeclav 3.IX. /Sg/;
M - Nedvědice u Žďáru nad Sázavou 6.IX. /Sg/;
M - Brno 12.V., 15.VII., 16.VII., 2.VIII. /Mk/

Palpi·ta unionalis (Hb.)

Jediný údaj: Č - Praha-Ruzyně 19.IX.1974 /No/

Etiella zinckenella (Tr.)

1972: Č - České Vrbné okr. České Budějovice 14.VIII. 16 im., 15.VIII. 2 im. /Sp/

PLUTELLIDAE

Plutella maculipennis (Curt.)

A. Počet pozorovatelů: 1972: 6, 1973: 7, 1974: 4

B. Počet pozorovacích míst:

	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
1972	-	-	1	3	9	6	3	3	25
1973	-	-	2	4	18	8	2	2	36
1974	2	-	-	2	2	1	-	1	8

C. Počet pozorovacích dnů:

1972	-	-	1	3	11	7	3	3	28
1973	-	-	2	5	37	10	2	2	58
1974	2	-	-	2	2	1	-	1	8

D. Počet pozorovaných kusů:

1972	-	-	1	12	36	13	5	3	70
1973	-	-	3	7	10159	15	2	2+vh	10188
1974	2	-	-	4	3	1	-	1	11

1972

E. První pozorování: Č - Soběšín okr. Kutná Hora 21.V. /Fx/

F. Hojnější výskyt: Č - Vrbné okr. České Budějovice v lapači VI. 8 im., VII. 15 im. /Sp/

H. Poslední pozorování: Č - Praha-Hrad 30.X. /Fx/

1973

E. První pozorování: Č - Slaný okr. Kladno 2.V. 2 im. /Sk/

F.-G. Hojnější výskyt: S - Klokočov okr. Michalovce 28.-30.VII. v opuštěném lomu na 1 m^2 až 20 im., celkem asi 10000 im. /La/; Č - Horská Kvilda 7.X. velmi hojný - zřejmá migrace, v předchozích dnech nepozorován. /Sp/; Č - Suchdol-Únětice okr. Praha-západ 6.VII. 48 im. /Sd/; Č - Praha-Ruzyně 12.VII. 12 im. /No/; Č - Studněves u Slaného okr.Kladno 21.VII. 13 im. /Sk/

H. Poslední pozorování: Č - Únětice okr. Praha-západ 13.X. /Sk/

1974

E. První pozorování: Č - Vinařice okr. Kladno 29.III./Sk/; Č - Podlešín u Slaného 29.III. /Sk/

H. Poslední pozorování: Č - Soběšín okr. Kutná Hora 12.X. /Fx/

1975

Miloslav Soldát

Zpráva za rok 1975 je již sestavována na základě oběžníku Československé společnosti entomologické při ČSAV č.j. 130/F-75 ze dne 25. 9.1975, podle kterého původní seznam tažných motýlů byl podstatně snížen. Naproti tomu je v ní už zahrnut nově sledovaný druh z čeledi Nymphalidae, Issoria lathonia (L.).

(Dodatek k vysvětlivkám:

J. Jiná hlášení mimo území ČSSR, která se však do přehledů nezapočítávají.)

PIERIDAE

Aporia crataegi (L.)

Hlášení, která nám zaslal omezený počet pozorovatelů ukazují, že pro Aporia crataegi (L.) byl rok 1975 celkem příznivý. Místa nálezů, i když byly zjištěny nové lokality, se převážně soustřeďují opět na okres Příbram, kde tento druh je několika entomology pravidelně každoročně sledován.

A. Počet pozorovatelů: 5

B. Počet pozorovacích míst:

VI.	VII.	celý rok
7	4	11

C. Počet pozorovacích dnů:

7	7	14

D. Počet pozorovaných kusů:

18	45	63

E.F.H. Výčet všech nálezů: Č - Holoubkov, okr. Rokycany 27.VI. 3 im. /Hg/; Č - Mořina, okr. Beroun 27.VI. /Sk/; Č - Voznice, okr. Příbram 27.VI. 2 im.; Č - Dobříš, okr. Příbram 27.VI.; Č - Osov, okr. Příbram 27.VI.; Č - Řevnice, okr. Praha-západ 27.VI. /Ky/; Č - Jince, okr. Příbram 3.VII. 3 im. /Sn-ml./; Č - Holoubkov, okr. Rokycany 5.VII. /Hg/; Č - Jince, okr. Příbram 9.VII. /Sn-ml./; Č - Příbram-Březové Hory 29. VI. 9 im., 5.VII. 14 im., 6.VII. 18 im., 12.VII. 2 im., 13.VII. 6 im. / Ze/.

Pontia daplidice (L.)

Došlo pouze hlášení tří pozorovatelů ze 3 lokalit.
E.F.H. Výčet všech nálezů: M - Mohelno okr. Brno-venkov 15.VI. 5 im., 16.VII. 6 im. /Hl/; S - Malacky 12.VIII. /Hc/; S - Myjava 14.VIII./Kf/

Colias crocea (Fourcr.)

A. Počet pozorovatelů: 6
B. Počet pozorovacích míst:

VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
9	3	6	6	24

C. Počet pozorovacích dnů:

9	6	6	8	29

D. Počet pozorovaných kusů:

35	18	8	13	74

E. První pozorování: M - Břeclav-Poštorná 5.VII. 3 im./Ja/
F. Hojnější výskyt: S - Myjava 14.VIII. 10 im. /Kf/
G. Pozorování migrace: S - Myjava 14.VIII. 10 im. letělo přímočaře jednotlivě od severovýchodu na jihozápad /Kf/
H. Poslední pozorování: M - Břeclav-Poštorná 28.X. /Ja/; M - Žarošice, okr. Hodonín 29.X. /Ja/; M - Uničov 29.X. 3 im. /Sn/

Rok 1975 byl pro tento druh velmi příznivý, neboť za celkem 11 sledovaných let, byl překonán pouze rokem 1972, ve kterém bylo zjištěno na našem území 95 imag.

NYMPHALIDAE

Issoria lathonia (L.)

A. Počet pozorovatelů: 12
B. Počet pozorovacích míst:

V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
3	1	3	10	10	2	29

C. Počet lozorovacích dnů:

5	1	3	25	21	2	57

D. Počet pozorovaných kusů:

15	5	5	203	34	2	264

E. První pozorování: Č - Kosoř okr. Praha-západ 8.V. 3 im., 16.V. 5 im. /Ky/
F. Hojnější výskyt: Č - Petrov okr. Praha-západ od 3.VIII. do 7.VIII. včetně 125 im. /Šp/
H. Poslední pozorování: Č - Týnec nad Sázavou okr. Benešov 11.X. /Sd/; Č - Soběšín okr. Kutná Hora 12.X. /Fx/

Vzhledem k tomu, že tento druh byl zařazen do seznamu sledovaných

tažných motýlů dodatečně koncem roku 1975, lze dosažené výsledky hodnotit jako úspěšné.

V a n e s s a c a r d u i (L.)

A. Počet pozorovatelů: 25

B. Počet pozorovacích míst:

V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
2	6	9	28	12	4	61

C. Počet pozorovacích dnů:

2	7	11	63	30	4	117

D. Počet pozorovaných kusů:

2	16	60	126	75	4	283

E. První pozorování: Č - Praha-Šárka 13.V. /Sk/; M - Klentnice, okr. Břeclav 18.V. /Hc/

F. Hojnější výskyt: M - Velehrad okr. Uherské Hradiště 30.VII. 25 im. /Gw/; M - Mikulov okr. Břeclav 1.VIII. 20 im. /Gw/

H. Poslední pozorování: M - Tišnov 17.X. /Hc/; M - Mikulovice okr. Šumperk 25.X. /Va/

Také tento druh dosáhl vysokého počtu. Rok 1975 se řadí u něho jako druhý nejúspěšnější rok, překonaný pouze, podobně jako u druhu Colias crocea Fourcr. , rokem 1972, kdy jsme zaregistrovali celkem 431 kusů.

V a n e s s a a t a l a n t a (L.)

A. Počet pozorovatelů: 32

B. Počet pozorovacích míst:

	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
	2	4	37	49	62	15	169

C. Počet pozorovacích dnů:

	2	7	74	128	174	21	406

D. Počet pozorovaných kusů:

lar.	-	-	-	205	10	-	215
pup.	-	-	-	-	14	-	14
im.	3	22	188	335	895	69	1512
=ex.	3	22	188	540	919	69	1741

Uvedený počet nevystihuje ještě skutečnost, neboť neobsahuje zjištění několika entomologů, kteří ve svých hlášení neuvedli počet viděných imag, ale shrnuli své údaje do všeobecných termínů jako "nebývalé množství", "velký výskyt", "větší množství" a podobně.

E. První pozorování: Č - Dobšín,okr. Mladá Boleslav 11.V. 2 im. /Kp/; Č - Praha-Šárka 13.V. /Sk/

F. Hojnější výskyt: M - Ivančice, okr. Brno-venkov od 2.IX. do 10.IX.

včetně 180 im. /Hl/; Č - Chotýšany u Vlašimi 1. a 2.X. celkem 40 im./Hb/; M - Uherské Hradiště 18.IX. 30 im. /Gw/; M - Týnec okr. Břeclav 23.IX. 50 im. /Hc/; S - Velké Leváre okr. Senica 3.IX. 40 im. /Ja/; S - Podhorní Újezd okr. Senica 14.IX. 48 im., 15.IX. 36 im. /Ja/

G. Pozorování migrace: Č - Praha-Hostivař 17.VII. letěl motýl přes přehradní jezero stále přímým směrem od severu k jihu /Fx/; Č - Šlovice okr. Plzeň-jih 11.IX. letěl motýl přímočaře bez zastávky jižním směrem. Překážku /asi 3 m vysokou zeď/ přeletěl horem, stále přitom zachovávaje jižní směr /Pi/; M - Ostrava-Poruba 20.IX. v dopoledních hodinách à 1 imago po dvouminutových intervalech, celkem 15 imag jihovýchodním stejným směrem /Sn/; M - Ostrožská Nová Ves okr. Uherské Hradiště 20.IX. 25 im. jednotlivě letících jižním směrem /Gw/

H. Poslední pozorování: Č - Klatovy 15.X. /Hu/; Č - Bochov okr. Karlovy Vary 16.X. /Bi/; Č - Javorná u Karlových Var 16.X. 2 im. /Fr/; M - Uničov 29.X. 2 im. /Sn/

J. Jiná hlášení: Maďarská lidová republika - Balaton-Keszthely 1.VIII. 6 im., 2.VIII. 10 im. /Ja/; Jugoslávie - Varaždín 2.VIII. 16 im. /Ja/; Jugoslávie - Pula-Banjole 5.VIII. 16 im., 6.VIII. 10 im., 7. až 12.VIII. à 10 až 20 imag denně/Ja/; Jugoslávie - Mostar 13.VIII. 16 im. /Ja/; Jugoslávie - Banja Luka 13.VIII. 6 im. /Ja/

Tento druh dosáhl v roce 1975 největšího počtu výskytu za všechna sledovaná léta.

SPHINGIDAE

Acherontia atropos (L.)

Tento druh je systematicky sledován již od roku 1964. Rok 1975 byl za celé sledované období vůbec nejslabší. Na našem území byla zjištěna v roce 1975 pouze 3 imaga. Kromě toho jsme obdrželi hlášení: 1 imago z Rumunska. Níže uvádím podrobné údaje.

E.F.H. Výčet všech nálezů: M - Horní Bečva - Bečkovice okr. Vsetín v VII. /Sd - Zahradníček/; Č - Prachatice 13.IX. /Sd - Pavlíčko/; M - Mikulovice okr. Šumperk 26.IX. /Va/

J. Jiná hlášení: Rumunsko - černomořské pobřeží 26.IX. /Čr/

Herse convolvuli (L.)

A. Počet pozorovatelů: 31

B. Počet pozorovacích míst:

VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
2	2	11	26	1	42

C. Počet pozorovacích dnů:

2	2	11	52	1	68

D. Počet pozorovaných kusů:

	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
lar.	-	1	2	-	-	3
pup.	-	-	-	1	-	1
im.	1	3	10	63	1	78
= ex.	1	4	12	64	1	82

E.F.H. Výčet všech nálezů:

Č - České Budějovice 29.VI. /Sd - Malík/;
M - Studénka okr. Nový Jičín 13.VII. 2 im. /Sd - Lubojacký/;
Č - České Budějovice 14.VII. /Sd - Malík/;
M - Dyjákovice okr. Znojmo .. VII. 1 lar. /Sd - Babíček/;
M - Klentnice okr. Břeclav 6.VIII. /Hc/;
Č - Písek 15.VIII. /Le/;
M - Tupesy okr. Uherské Hradiště 15.VIII. 1 lar. /Gw - Helia/;
Č - Libčany okr. Hradec Králové 20.VIII. /Sd - Hruška/;
Č - Hrachov - Svatý Jan okr. Příbram 26.VIII. /Sd - Bláha/;
M - Svratka 26.VIII. /Sd - Novotný/;
M - Lednice okr. Břeclav 27.VIII. /Hc/;
Č - Brloh okr. Český Krumlov 27.VIII. /Sd - Hajduch/;
Č - Prachatice 27.VIII. /Sd - Pavlíčko/;
S - Dubová pri Modre - Malé Karpaty 30.VIII. /Sd - Dobiáš/;
M - Vranov nad Dyjí okr. Znojmo 31.VIII. /Ho/;
M - Fojtova Kraš pošta Vidnava .. VIII. 1 lar. /Sd - Sláma/;
Č - Týnec nad Labem 4.IX. /Ve/;
Č - Trutnov 8.IX. /Sd - Hruška/;
M - Uherské Hradiště 10.IX. /Gw/;
Č - Kralupy 10.IX. /Čr/;
Č - Prachatice 10.IX. /Sd - Pavlíčko/;
S - Bratislava 12.IX. /Sd - Buchel/;
Č - Náchod 11.IX. /Ho/;
S - Bratislava 13.IX. /Sd - Buchel/;
Č - Borek u Rokycan 13.IX. /Hg/;
Č - Libčany okr. Hradec Králové 13.IX. /Sd - Hruška/;
Č - Doubrava u Mnichova Hradiště okr. Mladá Boleslav 14.IX. /Kp/;
Č - Havlíčkův Brod - okolí 14.IX. /Sd - Morávek/;
Č - Pardubice 15.IX. /Sd - Zahradník/;
Č - Horní Bousov okr. Mladá Boleslav 15.IX. 2 im. /Kp/;
M - Vícemilice okr. Vyškov 18.IX. /Sd - Vykoukal/;
Č - Lhenice okr. Prachatice 18.IX. /Sd - Hajduch/;
Č - Brloh okr. Český Krumlov 19.IX. /Sd - Hajduch/;
S - Bratislava a okolí od 2.IX. do 15.IX. včetně 7 im. /Sd - Fajčík/;

Č - Libčany okr. Hradec Králové 19.IX., 20.IX. /Sd - Hruška/;
Č - Nový Hradec Králové 19.IX. 2 im. /Sd - Košťál/;
Č - Prachatice od 18.IX. do 26.IX. včetně 10 im. /Sd - Pavlíčko/;
Č - Loučovice okr. Český Krumlov 23.IX. /Sd - Kolovratník/;
M - Mikulovice okr. Šumperk 23.IX., 24.IX., 25.IX. 2 im., 28.IX./Va/;
Č - Horní Bousov 25.IX. /Kp/;
Č - Františkovy Lázně 28.IX. /Čv/;
Č - Prachatice 28.IX. 4 im. /Sd - Pavlíčko/;
M - Bohuslavice okr. Opava 30.IX. /Sd - Hříbek/;
M - Lanžhot okr. Břeclav .. IX. 1 pup., 4 im. /Sd - Švirga/;
Č - Praha-Zlíchov .. IX. /Dvořák/;
M - Břeclav-Poštorná 9.IX., 15.IX. 3 im., 16.IX., 17.IX., 16.X. /Ja/

Celerio lineata livornica (Esp.)

Nedošla žádná hlášení o jeho výskytu v ČSSR v roce 1975.

Daphnis nerii (L.)

Po dvouleté přestávce byl opět chycen na našem území jeden motýl samička .
M - Lanžhot okr. Břeclav 2.IX. /Sd - Švirga/.

Macroglossum stellatarum (L.)

A. Počet pozorovatelů: 11
B. Počet pozorovacích míst:

	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	celý rok
	1	1	3	4	8	17

C. Počet pozorovacích míst:

	1	1	3	4	15	24

D. Počet pozorovaných kusů:

lar.	7	-	-	-	-	7
im.	-	1	3	4	28	36
= ex.	7	1	3	4	28	43

E. První pozorování: M - Mohelno - Mohelská státní rezervace na kvetoucích svízelích 20.V. 7 lar. /Hl/;
M - Svratka 17.VI. /Sd - Hájek/
H. Poslední pozorování: M - Mikulovice okr. Šumperk 28.IX. /Va/;
M - Mikulov okr. Břeclav 4.X. /Hc/
J. Jiná hlášení: Jugoslávie - Pula-Banjole 5.VIII. 2 im., 6.VIII. 10 im., 10.VIII. 18 im. /Ja/

Ve srovnání s dřívějšími roky, jeví se rok 1975 celkem jako průměrný.

Petr Pipek Miloslav Soldát

PIERIDAE

Aporia crataegi (L.)

A. Počet pozorovatelů: 11

B. Počet pozorovacích míst:

V.	VI.	VII.	VIII.	celý rok
4	10	3	1	18

C. Počet pozorovacích dnů:

5	12	8	1	26

D. Počet pozorovaných kusů:

10	33	9	1 bez přemnožení	53

přemnožení - viz text 160.000 - 165.000

Údaj, týkající se přemnožení, není promítnut do počtu pozorovatelů, míst a dnů ve výše uvedené tabulce.

E.F.H. Výčet všech nálezů: M - Lednice, okr. Břeclav 11.V. /Ja/; M - Valtice, okr. Břeclav 11.V. 2 im., 26.V. 4 im. /Ja/; M - Perná okr. Břeclav 22.V. /Ja/; M - Břeclav 26.V. 2 im./Ja/; M - Uničov 9.VI. /Sn/; S - Kúty, okr. Senica nad Myjavou 17.VI. /Ja/; S - Brodské, okr. Senica n/M. 17.VI. /Ja/; S - Gbely, okr. Senica nad Myjavou 17.VI. 2 im. /Ja/; Č - Mořina, okr.Beroun 22.VI. 2 im.,26.VI. /Sk/; Č - Lysá nad Labem 25.VI. /Hn/; Č - Holoubkov, okr. Rokycany 25.VI. 7 im., 26.VI. /Hg/; Č - Slapy 26.VI. 10 im. /Sd - Toman/; Č - Jince, okr. Příbram 26.VI. 5 im. /Sd - Plevka/; Č - Chlomek u Davle, okr. Praha-západ 26.VI. /Šp/; Č - Mladotice, okr. Písek od 6.VII. do 11.VII. 5 im. /Hn/; Č - Bochov, okr. Karlovy Vary 4.VII., 6.VII. /Bi/; Č - Obořiště, okr. Příbram 4.VII. 2 im. /Ze/; Č - Příbram 13.VIII. /Sd - Homola/.

Kromě toho došla 2 hlášení o přemnožení Aporia crataegi (L.) v příbramském okrese, kde se tento druh vyskytuje pravidelně. Č - Podlesí, Orlov u Příbrami 19.VI. cca 10 - 15.000 im. Jedním mávnutím síťky bylo možno ulovit až 60 kusů /Hn/; Č - Příbram - Březové Hory 8.V. 3.000 lar., 16.V. 2.000 lar., 6.VI. 500 pup., 19.VI. - 4.VII. masový výskyt imag, 10. a 11.VII.imaga se vyskytují

již jen v malém množství a olétaná, 17.VII. 2 im., 18.VII. 1 im. 25.VI. už pozorováno skeletování listů vylíhlými housenkami. Celkem bylo za rok 1976 zničeno při organizovaném ničení imag školní mládeží v okrese Příbram cca 150 000 jedinců /Ze/.

Údaje o přemnožení běláska ovocného v Příbrami - Březových horách jsou součástí samostatné práce /Zelený J.: Přemnožení běláska ovocného Aporica crataegi (L.) v Čechách , která je připravena k tisku.

Oproti minulým letům dochází tedy k značnému přemnožení na okrese Příbram a také k rozšíření tohoto druhu na další lokality. Pozorování tohoto potenciálního škůdce ovocných stromů bude mít jistě v příštích letech značný hospodářský význam.

Pontia daplidice (L.)

V roce 1976 jsme dostali jen několik málo údajů a to opět pouze z oblasti Moravy a Slovenska, kde je tento druh domácí.

A. Počet pozorovatelů: 5

B. Počet pozorovacích míst:

III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	celý rok
1	-	1	-	3	3	2	10

C. Počet pozorovacích dnů:

1	-	1	-	3	5	8	18

D. Počet pozorovaných kusů:

1	-	2	-	3	16	192	214

E.F.H. Výčet všech nálezů: M - Břeclav 23.III. /Hc/; M - Pouzdřany, okr. Břeclav 11.V. 2 im. /Ja/; S - Plešivec 26.VII. /Hc/; M - Rohatec, okr. Hodonín 18.VII. /Gw/; S - Chlaba, okr. Nové Zámky 20.VII. /Ví - - Skuta/; M - Perná, okr. Břeclav 14.VIII. 6 im., 21.VIII. 2 im. /Ja/; S - Brezová pod Bradlom 24.VIII. 2 im. /Ja/; S - Drietoma, okr. Trenčín 25.VIII. 4 im. /Ja/; S - Myjava, okr. Senica nad Myjavou 25.VIII. 2 im. /Ja/; M - Ivančice, Mohelno, okr. Brno-venkov od 2.IX. do 9.IX. 192 im. /Hl/.

Colias crocea (Fourcr.)

Hlášení, která nám došla pocházejí vesměs z jihovýchodní oblasti našeho státu.

A. Počet pozorovatelů: 3

B. Počet pozorovacích míst:

VIII.	IX.	celý rok
10	4	14

C. Počet pozorovacích dnů:

10	4	14

D. Počet pozorovaných kusů:

32	8	40

E.F.H. Výčet všech nálezů: S - Knížská Nemá, okr. Prievidza 3.VIII. 2 im. /Sd - Homola/; M - Ivančice, okr. Brno-venkov 10.VIII. 7 im. /Hl/; M - Radějov, okr. Hodonín 15.VIII. 7 im. /Hl/; S - Myjava, okr. Senica nad Myjavou 21.VIII. /Ja/; S - Kúty, okr. Senica nad Myjavou 21.VIII. /Ja/; S - Šaštín 23.VIII. 4 im. /Ja/; S - Rohožník 23.VIII. /Ja/; S - Brezová pod Bradlom 24. VIII. 4 im. /Ja/; S - Trenčín 25.VIII. 2 im. /Ja/; S - Drietoma, okr. Trenčín 25.VIII. 2 im. /Ja/; S - Čachtice 21.IX. /Ja/; S - Stará Turá 21.IX. 2 im. /Ja/; S - Nová Bošáca, okr. Trenčín 22.IX. /Ja/; S - Soblahov, okr. Trenčín 22.IX. 4 im. /Ja/.

NYMPHALIDAE

Vanessa cardui (L.)

A. Počet pozorovatelů: 12

B. Počet pozorovacích míst:

VI.	VII.	VIII.	IX.	celý rok
5	6	15	4	30

C. Počet pozorovacích dnů:

6	6	17	5	34

D. Počet pozorovaných kusů:

13	15	44	13	85

E. První pozorování: Č - Bochov, okr. Karlovy Vary 26.VI. /Bi/; M - Mikulovice, okr. Šumperk 25.VI. /Va/; M - Ostrožská Nová Ves, okr. Uherské Hradiště 26.VI. /Gw/; M - Ivančice, okr. Brno-venkov 28.VI. 2 im. /Hl/.

F. Hojnější výskyt: S - Čachtice 22.IX. 18 im. /Ja/.

H. Poslední pozorování: S - Čachtice 22.IX. 18 im. /Ja/; M - Uničov 23.IX. /Sn/; M - Uherské Hradiště 26.IX. /Gw/.

Oproti minulým letům je rok 1976 podprůměrný.

Vanessa atalanta (L.)

A. Počet pozorovatelů: 21

B. Počet pozorovacích míst:

V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
3	8	8	19	20	7	65

C. Počet pozorovacích dnů:

3	9	9	24	29	8	82

D. Počet pozorovaných kusů:

3	11	14	88	41	20	177

E. První pozorování: Č - Černíkovice, okr. Rychnov nad Kněžnou 2.V. /Rt/; Č - Praha-Bráník 18.V. /Hn/; M - Mikulovice, okr. Šumperk 20.V. /Va/.

F. Hojnější výskyt: S - Velké Leváre 21.IX. 60 im. /Ja/; S - Čachtice 22.IX. 18 im. /Ja/.
H. Poslední pozorování: M - Ivančice, okr. Brno-venkov 6.X. 7 im. /Hl/; Č - Bochov, okr. Karlovy Vary 9.X. /Bi/; Č - Kosoř, okr. Praha-západ 12.X. /Ky/; M - Zborov 31.X. /Sn/.

Také u tohoto druhu je výskyt v roce 1976 podprůměrný.

Issoria lathonia (L.)

A. Počet pozorovatelů: 15
B. Počet pozorovacích míst:

IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
2	12	7	19	27	5	3	75

C. Počet pozorovacích dnů:

2	23	18	44	47	6	6	146

D. Počet pozorovaných kusů:

3	55	76	640	194	8	3	979

E. První pozorování: Č - Únětice, okr. Praha-západ 20.IV. /Sk/; Č - Kvasiny, okr. Rychnov nad Kněžnou 25.IV. /Rt/; Č - Týnec nad Sázavou, okr. Benešov 1.V., 2.V. 2 im. /Sd/.
F. Hojnější výskyt: M - Klentnice, okr. Břeclav 4.VII. 20 im. /Gw/; Č - Petrov a Chlomek u Davle, okr. Praha-západ od 11.VII. do 16.VII. cca 500 im. /Šp/.
H. Poslední pozorování: S - Čachtice 22.IX. /Ja/; Č - Černíkovice, okr. Rychnov nad Kněžnou 5.X. /Rt/; M - Uničov 24.X. 2 im. /Sn/.

Počet zjištěných imag byl proti roku 1975, který byl prvním pozorovacím rokem pro tento druh, více jak trojnásobný.

SPHINGIDAE

Acherontia atropos (L.)

A. Počet pozorovatelů: 9
B. Počet pozorovacích míst:

	VII.	VIII.	IX.	X.	celý rok
	1	-	6	2	9

C. Počet pozorovacích dnů:

	1	-	7	3	11

D. Počet pozorovaných kusů:

lar.	1	-	2	-	3
pup.	-	-	5	2	7
im.	-	-	1	1	2
= ex.	1	-	8	3	12

E.F.H. Výčet všech nálezů: M - Lubojaty-Lhotka, okr. Nový Jičín 6.VII. lar. /Sd - Nohel/; Č - České Velenice IX. lar. /Ví - Liška/; Č - Bechlín, okr. Litoměřice 13.IX. pup. /Sd - Dlouhý/; Č - Dobev, okr. Písek 16.IX. 2 pup. a 17.IX. pup. /Kt/; M - Mikulovice, okr. Šumperk 20.IX. /Va/; Č - Mašovice, okr. Tábor 21.IX. pup. /Ví - Petr Vítek/; Č - Písek 30.IX. lar. /Le/; M - Lednice, okr. Břeclav 10.X. /Sd - Veruzáb/; Č - Prasetín, okr. Tábor 11.X. pup., 13.X. pup. /Sd - Vančura/.

I když se zvýšil počet zjištěných exemplářů proti posledním 2 rokům, jeví se rok 1976 jako nadále podprůměrný.

Herse convolvuli (L.)

A. Počet pozorovatelů: 60

B. Počet pozorovacích míst:

	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	celý rok
	1	4	6	18	34	13	1	77

C. Počet pozorovacích dnů:

	1	4	6	33	60	19	1	124

D. Počet pozorovaných kusů:

	lar.-	-	2	1	-	-	-	3
	pup.-	-	-	15	11	4	1	31
	im. 1	5	6	30	73	28	-	143
=	ex. 1	5	8	46	84	32	1	177

E.F.H. Výčet všech nálezů: M - Klobouky, okr. Břeclav 19.V. /Sd - Huták/; M - Břeclav 6.VI. 2 im. /Hs/; M - Břeclav 25.VI. /St/; Č - Ratiboř, okr. Jindřichův Hradec 27.VI. /Sd - Janda/; Č - Libčany, okr. Hradec Králové 29.VI., 1.VII. /Sd - Hruška/;Č - Hněvkovice - Týn nad Vltavou, okr. Písek 20.VII. /Sd - Šnajberk/; Č - Klokočov, okr. Havlíčkův Brod 22.VII. /Sd - Šíp/; S - Kamenica nad Hronom, okr. Nové Zámky 22. VII. /Gw/; M - Moravský Písek, okr. Uherské Hradiště 27.VII. 2 im. /Gw/; M - Tvarožná Lhota, okr. Hodonín 28.VII. lar. /Sd - Petrová/; Č - Mrtník u Komárova, okr. Beroun 30.VII. lar. /Sd - Pionýrská skupina Mír Hostivice/; M - Tvarožná Lhota, okr. Hodonín 2.VIII. pup. /Sd - Špiruda/; dtto 7.VIII. 3 pup. /Sd - Harnoš/; dtto 7.VIII. pup. /Sd - Harnošová/; dtto 12.VIII. pup. /Sd - Podolan/; dtto 12.VIII. 3 pup. /Sd - Polášková/; dtto 16.VIII. pup. /Sd - Polášek/; dtto 28.VIII. 2 pup. /Sd - Petrová/; dtto 28.VIII. pup. /Sd - Tomečková/; M - Perná u Mikulova, okr. Břeclav 8.VIII. /Ja/; M - Klobouky, okr. Břeclav 13.VIII. pup. /Sd - Huták/; Č - Hradec Králové 15.VIII. /Kš/; Č - Lovosice, okr. Litoměřice 16.VIII. /Sd - Lorenc/; M - Strání, okr. Uherské Hradiště 17.VIII. /Gw/; M - Radějov, okr. Hodonín 20.VIII. a 27.VIII. /Hs/; M - Spytihněv, okr. Gottwaldov 21.VIII. /Sd - Soukup/; Č - Stráž nad Nežárkou od 21.VIII. do 27.VIII. 12 im. /Sd - Šibík/; M - Blatnice, okr.

Hodonín 23.VIII. pup. /Sd - Horňáček/; Č - Písek 29.VIII. /Le/; S - Bratislava 29.VIII. /Sd - Gažová/; M - Skřípov, okr.Opava 30.VIII. /Sd - Cihlář/; M - Břeclav 27.VIII. lar., 30.VIII. /St/; M - Břeclav 30.VIII. 5 im. /Hs/; S - Myjava, okr. Senica nad Myjavou 31.VIII. /Kf/; M - Ohrazenice u Jaroměřic nad Rokytnou, okr. Třebíč 31.VIII. /Sd - Říha/; M - Břeclav 1.IX. 3 im., 3.IX. 2 im. /Hs/; Č - Pavlov, okr. Havlíčkův Brod 1.IX. /Sg/; M - Sedlec u Mikulova, okr. Břeclav 1.IX. pup. /Sd - Pfeifer/; S - Bratislava 2.IX., 5.IX., 10.IX. 2 im., 17.IX. /Sd - Fajčík/; M - Znojmo 1.IX. /Ví/; M - Radějov, okr. Hodonín 4.IX., 5.IX., 11.IX. 2 im. /Hs/; M - Břeclav 3.IX. /St/; M - Moravská Nová Ves, okr. Břeclav 6.IX. pup., 6.IX. /Sd - Nešporová/; M - Tvarožná Lhota, okr. Hodonín 9.IX. pup., 11.IX. pup. /Sd - Polášek/; dtto 10.IX. pup. /Sd - Petrová/; dtto 11.IX. /Sd - Josef Petr/; dtto 15.IX./Sd - Podolanová/; dtto 16.IX. /Sd - Komoň/; dtto 17.IX. /Sd - Podolan ml./; dtto 23.IX. pup. /Sd - Jan Petr/; dtto 22.IX. pup. /Sd - A. Chalupová/; dtto od 20. IX. do 25.IX. 4 pup. /Sd - Spáčilová/; Č - Týniště nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou 11.IX. /Rt/: M - Břeclav 20.IX. 3 im., 22.IX., 27. IX. 2 im. /Hs/; Č - Příbram 12.IX./Tl/; Č - Dobšín, okr. Mladá Boleslav 15.IX. /Kp/; M - Perná u Mikulova, okr. Břeclav 25.IX., 2 im., 26.IX. 4 im. /Ja/; S - Kúty, okr. Senica nad Myjavou 16.IX. 2 im., 20.IX. 4 im., 27.IX., 28.IX. /Ja/; Č - Náchod 14.IX. /Ho/; M - Ivančice, okr. Brno-venkov 15.IX. 3 im. /Hl/; M - Břeclav - Poštorná 24.IX. /Ja/; Č - Kralupy nad Vltavou 20.IX. /Čr/; M - Mikulovice, okr. Šumperk 16.IX., 23.IX. /Va/; Č - Týnec nad Labem, okr. Kolín 13.IX. 3 im. /Ve/; Č - Žďárské Chalupy, okr. Písek 13.IX. /Sd - Bohuslav/; Č - Tanvald, okr. Jablonec nad Nisou 22.IX. /Sd - Simon/; M - Uherské Hradiště 21.IX. /Gw/; M - Úsov, okr. Šumperk 2.IX. /Sd - Zd.Gottwald/; M - Zábřeh 3.IX. /Sd - Zd.Gottwald/; M - Jihlava 13.IX. /Sd - Hos/; Č - Hradec Králové 10.IX., 23.IX. /Kš/; Č - Stráž u Tachova, okr. Tachov 2.IX. /Sd - Ježek/; S - Trebišov 8.IX. /Kf/; M - Nivnice, okr. Uherské Hradiště 8.IX., 14.IX., 29.IX. /Sd - Lukeš/; M - Klobouky, okr. Břeclav 25.IX. /Sd - Huták/; Č - Vroutek, okr. Louny 19.IX. /Sd - Chrž/; Č - Ratiboř, okr. Jindřichův Hradec 24.IX. /Sd - Janda/; M - Tvarožná Lhota, okr. Hodonín 1.X. pup. /Sd - F.Chalupová/; dtto 4.X. pup. /Sd - F. Podolan st./; M - Radějov, okr. Hodonín 1.X. /Hs/; dtto 1.X. 2 im. /Cw/; M - Lednice, okr. Břeclav 2.X. /Gw/; M - Nivnice, okr. Uherské Hradiště 2.X. 2 im., 3.X., 10.X., 13.X. /Sd - Lukeš/; M - Studénka, okr. Nový Jičín 14.X. /Sd - Lubojacký/; Č - Zrůbek 9.X. /Tl/; Č - Kladno 14.X. /Tl/; Č - Praha-Nové Město 8.X. /Sd - K.Červinka/; S - Kúty, okr. Senica nad Myjavou 5.X., 6.X., 12.X. 12 im., 20.X. /Ja/; Č - Tachov 7.X. pup. /Sd - Krupička/; M - Sedlec u Mikulova, okr. Břeclav .. XI. pup. /Sd - Pfeifer/; M - Vír, okr. Žďár n.S. .. X. pup. /Sd - Matuška/.

U tohoto druhu došlo v roce 1976 k podstatnému zvýšení výskytu. Ve srovnání s dřívějšími roky dostává se rok 1976 na 2. místo. Byl překonán jen rokem 1970, ve kterém bylo tehdy zjištěno, včetně dodatečných hlášení, celkem 306 kusů.

Celerio lineata livornica (Esp.)

V roce 1976 nedošla žádná hlášení o jeho výskytu na území ČSSR.

Daphnis nerii (L.)

V roce 1976 ulovil 2.XI. F.Doležal ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu 1 imago, které je uloženo ve sbírce Vl.Sýkory ml. ve Žďáru nad Sázavou.

Macroglossum stellatarum (L.)

A. Počet pozorovatelů: 14

B. Počet pozorovacích míst:

VI.	VII.	VIII.	IX.	celý rok
1	3	7	7	18

C. Počet pozorovacích dnů:

2	4	7	9	22

D. Počet pozorovaných kusů:

4	4	10	11	29

E.F.H. Výčet všech nálezů: M - Mohelno, okr. Brno-venkov 11.VI. 3 im., 18.VI. /Hl/; S - Kúty, okr. Senica nad Myjavou 20.VII., 27.VII. /Ja/; S - Gbely, okr. Senica nad Myjavou 21.VII. /Ja/; M - Strážnice, okr. Hodonín 21.VII. /Sk/; S - Višňové, okr. Trenčín 18.VIII. /Kf/; M - Perná u Mikulova, okr. Břeclav 21.VIII. 2 im. /Ja/; S - Poradie, okr. Senica nad Myjavou 24.VIII. 2 im. /Kf/; Č - Soběšín, okr. Kutná Hora 25. VIII. /Fx/; M - Moravský Písek, okr. Uherské Hradiště 27.VIII. /Gw/; M - Uherské Hradiště 28.VIII. 2 im. /Gw/; Č - Náchod 29.VIII. /Ho/; Č - Leština, okr. Havlíčkův Brod 11.IX. /Pi/; M - Mikulovice, okr. Šumperk 4.IX., 15.IX., 29.IX. /Va/; Č - Kvašiny, okr. Rychnov nad Kněžnou 18.IX. /Rt/; M - Mikulov, okr. Břeclav 20.IX. 3 im. /Hc/; Č - Bochov, okr. Karlovy Vary 24.IX. /Bi/; Č - Dobšín, okr. Mladá Boleslav 20.IX. /Kp/; Č - Hradec Králové 28.IX. /Kš/.

Výskyt u tohoto druhu byl v roce 1976 podprůměrný.

Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden alle eingegangenen Meldungen von der fünfjährigen Zeitspanne 1972 - 1974, 1975, 1976 zusammengefasst, und zwar in derselben Form wie in den vorgehenden Gesamtberichten (siehe FELIX 1971 und FELIX,SOLDÁT 1972). Alle Angaben sind folgendermassen eingereiht :

A.: Anzahl der Beobachter.

B. B.: Anzahl der Beobachtungsorten.

C.: Anzahl der Beobachtungstage nicht reduziert .

D.: Anzahl der beobachteten Stucke.

Die Angaben B., C., D werden je nach Jahren und Monaten in Tabellenform zusammengefasst. Angaben von Lichtfallen sind bei häufigeren Noctuiden extra angeführt und mit folgenden Abkürzungen bezeichnet :

No : Dr.Ivo Novák, Lichtfalle Praha-Ruzyně, Mittelböhmen,

Mk : Ing.Jaroslav Marek, Lichtfalle Brno-Černá Pole, Südmähren,

JČ : Lichtfallen in Südböhmen : Ing. K.Spitzer, České Budějovice, J.Levý und Fr.Krampl, Písek und Umgebung.

E.: Erste Beobachtung in jedem Jahr.

F.: Häufigeres Auftreten der Art.

G.: Direkte Beobachtungen der Migration.

H.: Letzte Beobachtung in jedem Jahr.

J.: Andere Beobachtungen ausser dem Gebiete der ČSSR Tschechoslowakei , die aber in Tabellen Absatze A., B., C., D. nicht eingerechnet werden.

Am Ende jeder konkret angeführten Meldung befindet sich die Abkürzung des Zunamens des Beobachters. Die Liste der Abkürzungen findet man im Text des Vorwortes.

Weitere oft benützte Abkürzungen :

Č - Bohmen
M - Mahren und Schlesien
S - Slowakei

im. - Falter Imago
lar.- Raupe
pup.- Puppe
ex. - Stuck

Wichtigere Bemerkungen zu einzelnen Arten

1972 - 1974

Aporia crataegi (L.) ist im südöstlichen Teil des Gebietes M,S

bodenständig. In Böhmen wurde sein Vorkommen nur aus einigen Lokalitäten gemeldet.

Pieris brassicae (L.). Im Jahre 1973 wurden zwei Beobachtungen der direkten Migration aus dem Gebiet der westlichen Slowakei gemeldet.

Pontia daplidice (L.) ist in M und S bedenständig, aus Č wurden nur einige Beobachtungen gemeldet.

Colias crocea (Fourcr.) wurde in ähnlicher Häufigkeit wie in den vorigen Jahren gemeldet.

Acherontia atropos (L.). In den Jahren 1972 und 1974 wurden nicht viele Beobachtungen gemeldet, während im Jahre 1973 wurde eine grosse Menge der Raupen und Puppen in ostlichem Böhmen beobachtet.

Bei den wandernden Noctuiden wurde - wie im Jahre 1970 - grossere Vermehrung beobachtet. Besonders überdurchsnittliches Vorkommen wurde bei N.pronuba L. , O.polygona Den. et Sch. und M.L-album L. beobachtet.

Das ernste Mal wurde bei uns Cosymbia pupillaria Hb. gefunden.

Sonst brauchen die Tabellen und weitere Angeben keinen Kommentar. Sie sind auch für die nicht-tschechischen Leser verständlich.

1975

Aporia crataegi (L.) war nicht häufig. **Häufige Vorkommen war wieder in Bezirk Č - Příbram beobachtet.**

Pontia daplidice (L.) Die vereinzelten Meldungen stammen nur aus Mähren und Slowakei.

Colias crocea (Fourcr.) erschien in höherer Menge.

Issoria lathonia (L.) wurde zum erstenmal im Jahre 1975 in die Reihe der Wanderfalter eingereiht.

Vanessa cardui (L.) Für diese Art war das Jahr 1975 das zweite erfolgreichste Jahr.

Vanessa atalanta (L.) sehr häufig. Das Auftreten im Jahre 1975 war bisher das stärkeste.

Acherontia atropos (L.). Für diese Art war das Auftreten im Jahre 1975 umgekehrt - d.h. das schwächste.

Herse convolvuli (L.) erschien in durchschnittlicher Menge.

Daphnis nerii (L.) nach zweijährige Pause wurde wieder ein Stück festgestellt.

Macroglossum stellatarum (L.) - ziemlich häufig.

Aporia crataegi (L.) eine Massenvermehrung wurde im Bezirk Příbram beobachtet; gleichzeitig erfolgte eine Arealausbreitung im Gebiete Böhmens.

Die Arten Pontia daplidice (L.), Colias crocea (Fourcr.), Vanessa atalanta (L.) und Vanessa cardui (L.) kamen im Jahre 1976 in einer geringen Menge im Vehältnis zu anderen Jahren.

Issoria lathonia war relativ häufig.

Anzahl der beobachteten Wanderschwätmer Achrontia atropos (L.) und Macroglossum stellatarum (L.) war geringer im Verhältnis zu den vorigen Jahren. Dagegen das Vorkommen des Herse convolvuli (L.) war im Jahre 1976 häufiger als in den vorigen Jahren; nur das J.1970 war für das Vorkommen dieser Art stärker. Damals wurden 306 Stücke Herse convolvuli (L.), einschliesslich der nachträglichen Meldungen, festgestellt.

Daphnis nerii (L.)- ein Stück wurde festgestellt.

Literatura

Felix V., 1971: Pozorování tažných motýlů v Československu v letech 1965 - 1969, Zprávy Čs.spol.entomol.při ČSAV, 7: 7 - 54.

Felix V. et Soldát M., 1972: Zpráva o pozorování tažných motýlů v Československu v letech 1970 - 1971, Zprávy Čs.spol.entomol. při ČSAV, 8: 125 - 150.

Hrubý K., 1964: Prodrómus Lepidopter Slovenska, SAV, Bratislava.

Adresa autorů (Anschriften der Verfasser):

Doc.PhDr. Václav Felix,CSc, Hřibská 2039, 100 00 Praha 10,tel.77 79 73.
Ing. Petr Pipek, Široká 22, 110 00 Praha 1, telefon 695 76.
Miloslav Soldát, Vilímovská 15, 160 00 Praha 6, telefon 36 83 05.