V roce 1964 byla babočka osiková hlášena jen z několika málo míst. Jednotlivé kusy se vyskytovaly po přezimování od 10.IV. do začátku září.
Čechy: Třemošnice-Sv.Jan, 21.-25.VII. 6 ex. (V.Šmelhausová); Náchod, hnízdo housenek cca 90 kusů, červenec (O.Holeček), motýli se líhli 23.-24.VII. (M.Soldát, J.Šmelhaus); Poděbrady, 10. IV. 1 ex. (J.Dobiáš), Liberec od 10.IV. do 4.IX. jednotlivě (H. Musil), Janské Lázně (Krkonoše), září (J.Šmelhaus); Slovensko: Šúr u Bratislavy, 15.V. 2 ex. (Moucha).

Autographa confusa (Stph.) (= gutta Gn.)
V roce 1964 byl zjištěn vyrovnaný výskyt na Moravě i na Slovensku. Zvláště zajímavé je hlášení J.Marka o výskytu druhu v Brně. Morava: Brno, 14.VII., 18.VII., 20.VII., 23.VII., 30.VII., 5. VIII., 4.IX., 6.IX., 10.IX. a 12.X. po 1 ex. na světlo (J.Marek), Ivančice, 14.VI. až 11.VII. a 19.VII. až 20.VIII. jednotlivě na světlo (J.Hladký), Pánov u Hodonína, 15.IX. velmi hojně na světlo (J.Marek).

WANDERFALTERBEOBACHTUNGEN 1964 IN DER ČSSR

Der vorliegende Bericht für das Jahr 1964 ist die zweite selbständige Veröffentlichung über die Wanderfalterbeobachtungen in der Tschechoslowakei. Der Bericht für das Jahr 1963 wurde in der Zeitschrift "Entomologische Berichte", Jahrgang 1964, Seiten 140-144 (Herausgeber: Deutscher Kulturbund, Berlin) veröffentlicht.

NÁLEZ EUPITHECIA EGENARIA HS. NA ÚZEMÍ NAŠÍ REPUBLIKY (LEP. GEOMETRIDAE)

Miloslav K u d l a

V prvním sešitě "Zpráv" uveřejnil Jiří Šmelhaus příspěvek o nálezech rodu Eupithecia v Čechách. K tomu připojuji několik druhů zjištěných v okolí Olomouce.

Na popud ing. Gunara Träffa ze Švédska, poslal jsem mu ke zpracování a determinaci menší kořist těchto píďalek, ulovenou na světlo v roce 1964. V tomto materiálu byl zjištěn i velmi vzácný a pro ČSSR nový druh Eupithecia egenaria Hs., ulovený

9.6. v Hrubé Vodě (lő). Laskavostí Ing.G.Träffa byla mi zapůjčena fotokopie velmi obsáhlé podrobné práce o Eup.egenaria Hs. (Schütze E., 1954).

Manfred Koch (1961) uvádí tento druh a zaznamenává stručně nejdůležitější údaje podle nejnovějších zjištění. Naleziště jím uvedená se týkají území Německa. Na doplnění uvádím další zajímavosti z práce Schützeho.

Motýlek, jehož housenka se živí květy lípy velkolisté (Tilia platyphyllos Scop.), se zdržuje v korunách těchto lip a zřídka usedá níže na kmeny. Získá se poblíže těchto lip lovem na světlo. Lípa velkolistá kvete dříve než lípa malolistá, právě v době, kdy se líhnou housenky. Stadium housenek trvá necelé tři týdny. Kuklí se v řídkém zámotku na zemi. Kukla je okrově hnědá se zelenými pochvami křídel. Na doplnění nalezišť uvádím místa nálezů ze sousedního Rakouska. Starší údaje: Gumpoldskirchen, Hainburg, střední Štýrsko. Novější nález z r. 1951: Tainach v Korutanech.

Determinace většiny píďalek rodu Eupithecia je nesnadná a je pravděpodobné, že tato vzácnost byla ulovena u nás i jinde a zůstala neurčena nebo byla určena nesprávně.

Další druhy ulovené ve zmíněném roce na světlo u Olomouce: Eupithecia castigata (Hbn.), E.succenturiata (L.), E.vulgata (Haw.), E.assimilata Guén., E.absinthiata (Cl.), E.sobrinata (Hbn.), E.virgaureata Dbl., E.subumbrata (D.et Schiff.), E.centaureata D.et Schiff.), E.innotata (Hufn.) f. fraxinata Crewe.

Z nálezů z dřívějších roků uvádím ještě tyto dva zajímavé druhy: Eup. venosata (Fab.), 18.6.1963 Hrubá Voda a Eup. sinuosaria Ev. Tento východní druh byl uloven v několika jedincích v r. 1953 až 1957 v okolí Olomouce, na okraji města i v městě samém. Předtím již v r. 1945 sbíral Eup. sinuosaria na Kosíři u Olomouce Ing. J. Klácel. V roce 1957 se tato píďalka zatoulala až do Hrubého Jeseníku, kde jsem ji chytil v Karlově Studánce (765 m) na světlo dne 18.června.

DIE ENTDECKUNG DER EUPITHECIA EGENARIA HS. IN TSCHECHOSLOWAKEI

Bei Olmütz in Mähren (Hrubá Voda) habe ich am 9.Juni 1964 ein Männchen der Art Eupithecia egenaria Hs. gefangen. Dieses

Exemplar habe ich noch mit mehreren anderen Eupithecien beim Lichtfang erbeutet. Die Determination dieser Art ist schwierig, wandte mich daheran Herrn Ing. Gunnar Träff (Schweden) mit der Bitte um die Bestimmung. Zwei weitere interessanten Arten dieser Gattung habe ich ebenfalls in der Umgebung von Olmütz gefangen: E.venosata (Fab.) und E.sinuosaria Ev. Die letztere sammelte ich in einigen Exemplaren in den Jahren 1953 bis 1957. Schon früher wurden sie von Ing.J.Klácel im Jahre 1945 am Kosíř bei Olmütz gesammelt.

LITERATURA

K o c h M., 1961: Wir bestimmen Schmetterlinge, IV, Radebeul. S c h ü t z e E., 1954: Eupithecien-Studien III, Abhandlungen und Berichte LIX des Vereins für Naturkunde, Kassel. Š m e l h a u s J., 1965: Eupithecia impurata (Hb.) zjištěna v Čechách a další poznámky o rodu Eupithecia (Geometridae, Lep.), Zprávy Čs.spol.entomol. 1 (1): 7-10.

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU VZÁCNÝCH COLEOPTER

Vladimír K a r a s

V poslední době se mně podařilo nalézti vzácné druhy Encephalus complicans West. a Euconnus rutilipennis Müll. ve velmi hojném počtu. Uvádím proto, za jakých podmínek a na jakém biotopu byli brouci nalezeni.

Encephalus complicans West. (Staphylinidae). Po tomto druhu jsem několik let bezvýsledně pátral v jižních Čechách v oblasti Veselí n.Luž., Třeboň a Hlubocká n.Vlt., přestože podmínky jsou na některých lokalitách ideální. V r.1958 jsem učinil dva náhodné sběry po 1 ex. Jeden kus byl nalezen v prosevu seškrabované kůry z polosuché Salix (červen). Druhý kus jsem našel za naprosto odlišných podmínek, v prosevu vlhkých mechů se starých stavidel a roubení podél Zlaté stoky u Horusického rybníka na místech, kde se vyskytoval Dianous coerulescens Gyll.

V květnu r. 1963 jsem sbíral u Hluboké n.Vlt. v polesí Stará obora, na hřebenových partiích Malého a Velkého Kameníku, kde jsou ještě zachovány zbytky starých bukových porostů. Kmeny jsou