PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU ČELEDĚ STRATIOMYIDAE (DIPTERA) NA JIŽNÍ MORAVĚ

Tomáš Gregor

Podkladem tohoto příspěvku je materiál, získaný při sběru ostatních dvoukřídlých během několika let z okolí Znojma a Vranovské přehrady. Ze 64 druhů dosud známých v českých zemích bylo nalezeno a je uvedeno 21 druhů. Dokladový materiál je uložen ve sbírce autora.

Zástupci čeledě Stratiomyidae jsou převážně vlhkomilné mouchy. V přírodě se s nimi setkáváme, vzhledem k relativně krátké době letu imag pouze ojediněle. Z tohoto důvodu je materiál získaný v průběhu několika let na menším území důležitý i k poznání fauny celé ČSSR.

Děkuji p. doc.Dr. R. Rozkošnému z přír.fak. UJEP v Brně za laskavé překontrolování determinace.

Přehled zjištěných druhů

Solva marginata Meigen. Vyskytuje se ve střední a jižní Evropě. V ČSSR poměrně hojná. 29.7.1960 údolí řeky Dyje u Znojma; 10.6.1969 údolí říčky Jevišovky u Výrovic.

Beris chalybeata Förster. S oblibou v chráněných údolích v blízkosti řek. Celá Evropa. V ČSSR hojně. 14 ♂♂ 5 ♀♀ 13.5.1956 údolí řeky Dyje u Znojma, 20.5.1967 a 20.5.1968 na mokrých loukách u Šumné; 4.6.1967 a 13.5.1967 potok Únanovka u Kuchařovic; 13.5.1967 okraj lesa u Kuchařovic.

Beris clavipes Linnaeus. Vyskytuje se na květech v blízkosti lesů a řek. 1 ♀ 13.5.1967 u potoka Únanovka u Kuchařovic.

Beris fuscipes Meigen. Vyskytuje se ve stinných údolích řek. V ČSSR hojná pouze místně. 1 ♂ 13.5.1967 údolí Únanovky u Kuchařovic.

Beris morrisi Dale. Na vlhkých místech, okrajích lesů a tekoucích vod. 1 ♂ 22.7.1967 Stříbrná zátoka na Vranovské přehradě.

Beris vallata Förster. Vyskytuje se v nižších polohách. Poměrně hojný druh. 1 ♂ 11.6.1967 Popice na okoličnatých; 1 ♀ 28.6.1967 Citonice, břeh potoka.

Actina nitens Latreille. Imaga se vyskytují i na suchých lokalitách a dále od vodních toků. Pouze ve střední a jižní Evropě. V ČSSR obecná. 27.5.1956, 18.5.1960, 8.5.1961. 21.5.1961, 10.5.1975, 19.5.1975 a 20.5.1975 v údolí řeky Dyje nad Znojmem; 17.5.1960,

18.5.1970 v údolí řeky Dyje pod Znojmem, 13.5.1967 údolí potoka Únanovka u Kuchařovic; 28.5.1970 bažantnice u Lechovic.

Sargus cuprarius Linnaeus. S oblibou se sluní na různé vegetaci. Celá palaearktická oblast. Hojný druh na celém území státu. 22.7.1967 Stříbrná zátoka na Vranovské přehradě; 26.7.1967 Mikulov-Turold, 24. 8.1967 břeh potoka u Suchohrdel.

Chloromyia formosa Scopoli. Sedá na keřích na slunci. Skoro všude obecná. 22.7.1956 Lednice kolem rybníků. 8.7.1958 okraj bažantnice u Lechovic; 26.6.1969 a 22.7.1967 Stříbrná zátoka na Vranovské přehradě; 4.7.1966 břeh řeky Dyje u Dobšic; 26.7.1966, 24.6.1967, 4.7.1968 okraj lesa u Suchohrdel; 20.6.1968 břeh potůčku u Suchohrdel; 1.7.1968 na lesní cestě u Kuchařovic; 16.6.1969 okraj lesa u Lechovic; 7.7.1975 okraj lesa u Popic; 8.7.1975 břeh rybníka u Mramotic.

Chloromyia melampogon Zeller. Kromě v severních částech v celé Evropě. Rozšířená v celé ČSSR, hojněji v teplejších oblastech. 1.7.1968 na lesní cestě u Kuchařovic.

Microchrysa polita Linnaeus. Holarktický druh. V ČSSR hojný. 29.6.1961 park ve Znojmě; 4.7.1968 a 27.5.1970 okraj lesa a u potoka u Suchohrdel.

Hirtea longicornis Scopoli. V ČSSR skoro obecný druh. Převážně v nížinách. 1 ♂ a 1 ♀ 3.5.1960 na listech nazemi na louce u Lechovic; 1 ♀ 3.6.1973 údolí říčky Jevišovky u Plavče.

Laternigera furcata Fabricius. Celá Euroasie. V ČSSR známá z celého území. 1 ♂ 26.5.1960 okraj lesa u Suchohrdel.

Stratiomys chamaeleon Linnaeus. Vyskytuje se na vlhkých biotopech Evropy a Asie. V ČSSR obecný druh. 2 ♀♀ 7.6.1958 u rybníka u Kravska.

Neuraphanisis tigrina Fabricius. Evropa a východní Sibiř. V ČSSR obecná u tůní a močálů. 5 ♂♂ 1.6.1960 u rybníka u Kravska, 1 ♀ 6.6. 1960 u rybníka u Plenkovic.

Catatasia argentata Fabricius. Celá Evropa a Sibiř. 1 ♂ 3 ♀♀ 15.5.1970 podél potoka u Čumné, 1 ♀ 28.5.1970 na okraji vodního příkopu u Lechovic.

Oplodontha viridula Fabricius. Obecný palaearktický druh. V ČSSR hojný. 1 ♂ 9.7.1958 u rybníka u Kravska, 2 ♂♂ a 1 ♀ 6.6.1960 u rybníka u Plenkovic, 1 ♂ 31.7.1968 na louce u potoka u Suchohrdel.

Oxycera leonina Panzer. Na vlhkých loukách s tůňkami v celé Evropě. V ČSSR není obzvláště hojná. 1 ♀ 26.7.1969 Stříbrná zátoka na Vranovské přehradě.

Oxycera meigeni Staeger. Skoro v celé Evropě. V ČSSR roztroušeně po celém území. 1 ♀ 31.7.1968 okraj lesa u Suchohrdel.

Oxycera terminata Meigen. Imaga podél potoků. Skoro v celé Evropě. V ČSSR vzácná. 1 ♀ 4.7.1968 břeh potůčku u Suchohrdel.

Pachygaster atra Panzer. Vyskytuje se na zakřovených stráních, kde létá často v hejnech. Známý druh z celé ČSSR. 26.7.1966 a 20.6.1968 na okraji lesa u Suchohrdel, 11.6.1967 na zarostlé mezi u Popic, 26.7.1967 Mikulov-Turold, 16.6.1969 lužní les u Lechovic, 26.7.1969 Stříbrná zátoka na Vranovské přehradě.

Zusammenfassung

Der Autor bringt Funde der Familie Stratiomyidae Diptera aus der Umgebung von Znojmo und Vranovská přehrada. Aus 64 in Böhmen und Mähren bekannten Arten hat er hier 21 Arten gefunden. Die Belegstücke sind in der Sammlung des Autors.

Literatura

Dušek J., Rozkošný R. 1963-1974:Revision mitteleuropäischer Arten der Familie Stratiomyidae Diptera mit besonderer Berücksichtigung der Fauna der ČSSR I.-V. Acta entom. bohemoslov., 60: 202-221, 61: 360-373, 62:24-60, 64:140-165, 71:322-341.

Szilády Z., 1932: Dornfliegen,Notacantha: Erinnidae,Stratiomyidae z Dahl: Die Tierwelt Deutschlands. p.1-39.

Trojan P.,1963: Stratiomyidae z:Klucze do oznaczenia owadów Polski, XXVIII. 22, Polski zwiazek entomologiczny N.41, 72 pp.

Adresa autora (Anschrift des Autors):
Tomáš Gregor, Máchovo nám. 4, Znojmo