NOVÉ A ZAJÍMAVÉ NÁLEZY DRABČÍKOVITÝCH Z ČESKOSLOVENSKA

NEW AND INTERESTING FINDS OF STAPHYLINIDAE FROM CZECHOSLOVAKIA

Coleoptera Staphylinidae

Jaroslav Boháč

Při faunistickém výzkumu drabčíků a při určování materiálů jiných sběratelů byly nalezeny některé zajímavé a tři nové druhy drabčíků pro naše území. Pokud není uvedeno jinak, sbíral jsem uvedené druhy sám a dokladové kusy jsou v mé sbírce. Za determinaci druhů rodu Stenus Latr. děkuji panu L. Hromádkovi a za determinaci některých druhů podčeledi Aleocharinae panu Dr.Z.Likovskému,CSc. Údaje o celkovém rozšíření uvedených druhů jsou v pracích: Horion,1963,1965,1967, Smetana,1958, Szujecki,1965 a dalších.

Micropeplus fulvus Er. - Bohemia c.: Čelákovice,26.3.1973 3 ex.(P.Švácha lgt.); Čelákovice,17.12.1972 2 ex.v prosevu stohu (Z.Kačenka le git); Lány,8.12.1974 1 ex. (P.Werner lgt.). V Československu dosud jen sporadicky a známo málo nálezů.

Eusphalerum rectangulum Fauv. - Bohemia c.: Klánovice, 25.5.1968 více ex.; Mirošovice,7.6.1957 (J.Tichý lgt.); Říčany, 6.6.1956 (Tichý J. lgt.); České Středohoří,Kajba, VI.1973 (sběry PŘF UK Praha); Únětice; Unhošť více ex. (Ernest lgt.); Bohemia b.: Podkrkonoší, Malé Svatoňovice, 21.7.1969; Bukovina u Čisté; Dolní Mísečky,Krakonoš velmi hojný (J.Tichý lgt.); Bohemia m.: Benešov nad Černou,29.6.70. více ex. v náplavu; Slovakia c.: Nízké Tatry - Moštěnice, Prašivá VIII.1970; Malá Fatra-Vrátná dolina, 800-1000 m., 11.6.1971 (Strejček lgt.).
Tento druh byl považován za vzácný (Roubal 1930). Na Slovensku byl zjištěn jako poměrně hojný (Smetana 1963). Lze se domnívat, že i v Čechách je poměrně hojný.

Eusphalerum pseudaucupariae Strand (aucupariae Kiesw.) - Moravia b.: Jeseníky-Hrubý Jeseník, M.Morávka, 3.7.1974 8 ex. (Strejček lgt.). Zatím je znám z Vysokých a Nízkých Tater, Beskyd a ze Soosu.

Eusphalerum atrum Heer - Moravia: Žďárské vrchy-Žákova hora, 3.5.1974, Fagetum, více ex. (J.Strejček lgt.), Boháč et Zanetti det.
V Československu dosud chyběly spolehlivé údaje o výskytu tohoto druhu.

Phyllodrepa puberula Bernh. - Bohemia c.: Unhošť, 1.5.1974 1 ex. (P.Werner lgt.).
Ze Slovenska znám jen jeden starší údaj, z Čech uvádí jeden nález Smetana 1957 .

Omalium validum Kr. - Moravia b.: Javorníky-Velké Karlovice, 355/60 1 ex. v hnízdě Mus sp., sběr Parasitologického ústavu (Daniel lgt.).
Vzácný druh, který je nalézán v jeskyních nebo hnízdech drobných savců. Z Československa známo jen několik starších nálezů.

Omalium septentrionis Th. - Bohemia c.: Praha-Vinohrady, 6.6.1969 3 ex. v trusu; Praha-Strašnice, 23.4.1971 3 ex. do pastí (Kačenka lgt.).
Tento druh je znám z okolí Prahy, toto jsou další novější nálezy.

Omalium deubeli Bernh. - Slovakia c.: Nízké Tatry-Králova hola, 24.7. 1970 1 ex. v prosevu na hranici lesa (Boháč et Kačenka lgt.).
Další potvrzení starších nálezů Roubalových (1930).

Phloeonomus lapponicus Zett. - Bohemia c.: Kolín-Zálabí, 7.4.1971 10 ex. pod kůrou Pinus společně s Placusa atrata Sahlb., Atheta aequata Er. a Phloeonomus pusillus (Grav.). V Československu vzácný druh.

Xylodromus testaceus Steph. - Bohemia c.: Srbsko, 9.1972 1 ex. v prosevu (Vl.Švihla lgt.); Klánovice, 2.5.1968 v chodbách drobného savce 1 ex.; Praha-Cibulka, 6.8.1961 1 ex. (J.Strejček lgt.); Bohemia m.: Hluboká nad Vltavou-Chotýčany, 9.9.1972, Fagetum, podsev (J.Strejček lgt.).
V Československu místy a vzácně a asi vázán na nějakého drobného savce.

Lathrimaeum melanocephalum Illig. - Bohemia b.: Krkonoše-Žacléř Dvorský les , 10.7.1969 1 ex. v prosevu rašeliníku a jiných mechů ve Fagetu; Slovakia or.: Remetske Hámre, 22.5.1975 1 ex. (P.Werner lgt).

Deliphrum tectum (Payk.) - Slovakia or.: Podbanské, 3.9.1975 1 ex. na hnijící houbě (P.Werner lgt.).
První nový údaj od jediného údaje Roubalova (1930).

Olophrum transversicolle Luze - Bohemia b.: Mimoň, V.1973 1 ex. v prosevu na rašeliništi (Mikvas lgt.).
Tento druh byl zatím nalezen pouze na Šumavě (Jezerní stěna) (Smetana, 1962) na Horské Kvildě, 12.5.1973 vyšlapáváním na Jezerní slati 2 ex. (Kačenka et Boháč lgt.). Na téže lokalitě smýkán 17.4.1961 1 ex.immaturní (sběry PŘF UK,Praha). Horion (1963) připouští, že by mohlo jít o boreoalpinní druh (zatím znám jen z Apl a severní Evropy).

Geodromicus plagiatus (F.) - Slovakia or.: Remet.Hámre,VII.1972 1 ex. (J.Horák lgt.). Tento vzácný druh byl znám jen z Moravy a Slovenska

Geodromicus danieli Smetana - Slovakia c.: Malá Fatra-Vrátná dolina, 900-1000 m., 15.6.1971 1 ex. (J.Strejček lgt.).
Další nález tohoto nedávno popsaného druhu na Slovensku.

Anthophagus praeustus Muell. - Bohemia c.: Mladá Boleslav-Brodce n.J., 30.5.1974 2 ex. (K.Mikvas lgt.). Z Čech znám jen ze dvou lokalit.

Planeustomus palpalis Er. - Bohemia m.: Ruda u Třeboně 1 immaturní ex. (sběry PŘF UK.).
Z Čech jsou známy jen staré údaje Skalitzkého a Rambouska.

Planeustomus heydeni Epp. - Slovakia m.: Kováčovské kopce, 6.4.1964 4 ex. (Čepelák lgt.).
Další nález tohoto vzácného druhu známého dosud jen ze dvou nálezů z jižního a východního Slovenska.

Oxytelus pumilius Er. - Slovakia m.: Filákovo, 9.5.1973 6 ex. v ovčím trusu (Sv.Bílý lgt.).
Tento druh je ze Slovenska znám jen z jedné lokality (Roubal,1930) a i na Moravě a v Čechách je jen několik nálezů.

Oxytelus affinis Czwal. - Bohemia c.: Únětice-Tiché údolí, 21.9.1972 Holý vrch 2 ex. na skalní stepi v ovčím trusu (Strejček lgt.); Praha-Lahovice, 4.1.1975 (Zbuzek lgt.).
Z Čech uváděn Roubalem (1941) z okolí Prahy.

Stenus maculiger Weise - Slovakia or.: Nová Sedlica, V.1975 4 ex. na břehu potoka (Boháč,Bílek,Werner lgt.).
Tento druh byl nedávno (Puthz,1972) zjištěn jako nový pro území Československa z této lokality.

Stenus asphaltinus Er. - Slovakia or.: Remet.Hámre, 21.5.1975 1 ex.; Nová Sedlica, 27.5.1975 1 ex. Ze Slovenska známy tři starší údaje.

Stenus indifeerens Puthz - Bohemia c.: Davle 1 ex.; Moravia b.: N. Ostrava 1 ex. (Jureček lgt.), dále 1 ex. s lokalitou Böhmerwald - - Tanzer. Všechny ex. ve sbírkách Národního muzea v Praze. Nový druh pro naše území.

Stenus ludyi Fauv. - Bohemia b.: Čistá u Horek, 17.10.1970 1 ex. (J.Tichý lgt.); Slovakia or.: Nová Sedlica-Rabia skala, 20.7.1973 prosev ve Fagetu 2 ex. (Strejček lgt.), 27.5.1975 za stejných okolností společně s Leptusa koronensis Ganglb.

Stenus fuscicornis Er. - Slovakia m.: Bratislava-Devinska Kobyla, 5.7.1972 1 ex. společně se Staphylinus chalcocephalus, Hypomedon melanocephalus, Medon brunneus, Medon ferrugineus, Atheta laticollis.

Rugilus mixtus Lohse - Bohemia c.: Vysoké Chvojno u Pardubic-Buky, 25.7.1974 1 ex. (V.Růžička lgt.); Slovakia or.: Remet.Hámre, 23.5.1975 více ex. v prosevu v bukovém lese; Nová Sedlica, 27.5. 1975 jako předešlý, XI.1975 více ex. (Skoupý lgt.).
Další údaje o výskytu tohoto nedávno popsaného druhu.

Medon dilutus Er. - Bohemia c.: Čelákovice, 30.11.1974 17 ex. v hnízdě Talpa europaea (krtek obecný) (P.Werner lgt.).
Tento význačný talpofil byl nalezen v poslední době jen dvakrát Smetanou (1964).

Medon ripicola Kr. - Bohemia c.: Praha-Chuchle, 2 ex. u křečka (Cricetus) (Machulka lgt.); Čelákovice, 2.4.1974 1 ex. (P.Werner lgt.).
Z Čech známa v poslední době jen jedna lokalita (Smetana, 1962).

Hypomedon bicolor (Ol.) - Moravia m.: Kobylí, 21.6.1941 1 ex. J. (Tichý lgt.) První údaj o výskytu tohoto druhu na Moravě.

Hypomedon debilicornis Woll. - Bohemia c.: Doubravčice, VIII.1972 3 ex. pod slámou (L.Hromádka lgt.); Praha-Stromovka, 24.8.1974 5 ex. v prosevu stohu (P.Werner lgt.).
Kosmopolitní druh, jehož původním místem výskytu je západní a jižní Evropa, odkud se stále šíří na východ. Samec je velmi vzácný a byl teprve nedávno popsán (Coiffait, 1970). Pravděpodobně se rozmnožuje převážně parthenogeneticky. Nový druh pro naše území.

Klíč k určení našich druhů rodu Hypomedon Cas.

Liší se od rodu Medon Steph. podle gulárních švů, které se rozbíhají, u Medon Steph. běží tyto švy rovnoběžně.

1. Tykadla krátká, články 4 - 6 nejsou delší než široké, hlava a štít silně chagrinované. Světle žlutý. . . . . Hypomedon debilicornis (Woll.)
   Tykadla protáhlá, články 4 - 6 delší než širší, hlava a štít bez mikroskulptury, hladké. Hlava vždy tmavá ... 2
2. Krovky na švu delší než největší délka štítu. Hlava širší než delší s výraznými spánkovými rohy. Vzdálenost mezi očima větší než délka spánků. . . . . Hypomedon bicolor (Ol.)
   Krovky na švu kratší nebo stejně dlouhé jako štít. Hlava není širší než delší, spánkové rohy méně výrazné. Vzdálenost mezi očima vždy menší než délka spánků. 3
3. Krovky kratší než štít. Sternit 6 s výkrojkem, nad nímž je sternit trojúhelníkovitě vtlačen, ostré okraje tohoto vtlaku s černými chloupky. . . . . Hypomedon fallax Lokay
   Krovky stejně dlouhé jako štít. Sternit 6 s ostřejším výkrojkem, na jehož bási není přítomen ani trojúhelníkovitý vtlak ani ochlupení . . . . . Hypomedon melanocephalus (F.)

Scopaeus minimus Er. - Slovakia m.: Komárno, 1927 2 ex. (Machulka lgt., coll. Nár.muzeum Praha) společně se Scopaeus laevigatus, Rugilus similis, Hypomedon melanocephalus, Achenium depressum, Achenium humila, Ochtlebium fraticorne a Lathrobium furcatum. První spolehlivý údaj pro území Československa.

Lathrobium scutellare Nordm. - Slovakia m.: Štúrovo, 27.5.1964 1 ex. (Čepelák lgt.).

Lathrobium ripicola Czwal. - Slovakia or.: Velké Trakany, V.1975 1 ex. (Vl.Švihla lgt.).
Ze Slovenska uvádí jen Roubal (1930) a Smetana (1957).

Lathrobium castaneipenne Kol. - Bohemia c.: Hostivice u Prahy, 14.4.1963 3 ex. (Strejček lgt.); Moravia m.: Lednice, 14.3.1974 1 ex. (Strejček lgt.); Slovakia m.: Štúrovo, 9.5.1974 1 ex. (Vl.Švihla lgt.).

Lathrobium pallidum Nord. - Bohemia c.: Praha-Suchdol, 3.5.1973 (Jindra lgt.); Rokycany, 12.7.1972 4 ex. (Pražák lgt.).

Achenium humile Nic. - Bohemia c.: Žíželice, 15.4.1969 4 ex. (J.Horák lgt.); Český Brod, IV.1914 (Rambousek lgt.); Moravia m.: Břeclav 4.6.1972 1 ex. (J.Strejček lgt.).
Zatím byly známy jen staré nálezy Fleischerovy (1927).

Xantholinus relucens Grav. - Bohemia c.: Únětice, 7.1974 1 ex. (Ernest lgt.).

Atrecus longiceps Fauv. - Slovakia c.: Nízké Tatry-Prašivá, 1.8.1971 pod kůrou jedlí 10 ex.

Erichsonius subopacus Hochh. - Bohemia c.: Únětice, IV.1974 1 ex. (L.Ernest lgt.); Unhošť, 29.3.1975 1 ex. (P.Werner lgt.); Dračice (Hrozinka lgt.).

Philonthus pseudovarians Strand - Bohemia c.: Lány, 21.5.1972 1 ex. (P.Werner lgt.): Slovakia c.: Vysoké Tatry, 20.6.1969 2 ex. v trusu (Pražák lgt.).
Druh byl popsán Strandem v r. 1941 a jeho rozšíření je dosud málo známo, protože je zaměňován s běžným druhem P.varians Payk.

Gabrius femoralis Hochh. - Moravia b.: Beskydy, Horní Bečva, 25.7.1966 1 ex. Zajímavý nález tohoto pontomediterránního druhu, který byl zatím znám jen z jižního Slovenska a z jedné lokality na Moravě.

Staphylinus latebricola Grav. - Bohemia c.: Vrané nad Vltavou-Homole, 7.5.1972 1 ex. (J.Strejček lgt.); Moravia m.: Pálava, V.1972 1 ex. (K.Hůrka lgt.); Slovakia or.: Rožňava, 1.7.1974 1 ex. (P.Zbuzek lgt).
Velmi vzácný a sporadický druh.

Ocypus ophthalmicus Scop. - Bohemia b.: České Středohoří, Raná, do pastí (K.Hůrka lgt.); Moravia m.: Lednice, VI.1972 1 ex. (Zacharda lgt.).
Vzácný a teplomilný druh známý z Československa jen ze šesti lokalit.

Ocypus brunnipes F. - Moravia m.: Pálava, 25.5.1968 1 ex. (J.Horák lgt.), tamtéž 6.6.1974 1 ex. K.Hůrka lgt. .

Ocypus pedator Grav. - Bohemia c.: Praha-Maniny, VI.1972 1 ex. pod kamenem; Roudnice, 4.4.1974 1 ex. (Rath lgt.); České Středohoří - - Radovesice u Bíliny, VII.1972 1 ex. do pastí (sběr PřF UK,Praha); Slovakia or.: Královský Chlmec, V.1975 1 ex. pod kamenem.
Teplomilný druh, u nás velmi vzácný.

Ocypus winkleri Bernh. - Bohemia c.: Srbsko, 23.3.1975 3 ex. pod kameny, tamtéž VI.1974 1 ex. (T.Scholz lgt.), tamtéž 28.10.1974 2 ex pod kameny; České Středohoří-Radovesice u Bíliny, VII.1972 2 ex do pastí; Holák, 12.10.1971 1 ex. do pasti (sběr PřF UK,Praha);

Žatec, X.1974 1 ex. na stepi (J.Strejček lgt.).
Další nálezy tohoto velmi málo známého druhu.

Ocypus compressus Matsh. - Slovakia: Němečky u T., 30.5.1970 1 ex. (Volák lgt.).

Ontholestes haroldi Esp. - Bohemia c.: Unhošť, 1.5.1974 3 ex. v ovčím trusu (P.Bílek lgt.); Slovakia or.: Remet.Hámre, VII.1972 2 ex. ve starých stromových houbách společně s Philonthus cyanipennis, Gyrophaena gentilis, Atheta sp.

Euryporus picipes Payk. - Slovakia c.: Belanské Tatry, 24.7.1970 1 ex. (Poláček lgt.); Vihorlat, 15.7.1955 1 ex.

Quedius ventralis Arag. - Bohemia b.: Údlice, 24.4.1971 1 ex.(Laibner lgt.). Na celém území velmi vzácný, zvláště v Čechách.

Quedius invreae Grid. - Bohemia b.: České Středohoří,Radovesice u Bíliny, VII.1972 2 ex. (sběr PŘF UK,Praha) ; Šlechtín pr. Ledeč, V.1975 1 ex. (Flegr lgt.); Bohemia b.: Malé Svatoňovice, 13.7.1969 1 ex. v prosevu u Lasius fuliginosus.

Quedius balticus Korge - Bohemia c.: Doubravčice, V.1974 1 ex. (L. Hromádka lgt.). Třetí nález tohoto nedávno popsaného druhu.

Quedius nemoralis Baudi - Bohemia m.: Domažlice, 5.3.1919 1 ex. (Růžička lgt.); Bohemia b.: Oleško pr. Hrady, 25.8.1972 1 ex. na písčině (J.Strejček lgt.).

Quedius riparius Kell. - Bohemia m.: Senotín u Jindř.Hradce, VII.1972 2 ex. na břehu potoka ve smrkovém lese společně s Lesteva longelytrata; Benešov nad Černou, 7.6.1967 2 ex. v náplavu Černé.

Quedius fulvicollis Steph. - Bohemia or.: Orlické hory-Šerák 1000 m., 7.5.1973 1 ex. (J.Strejček lgt.); Moravia m.: Lomy, 7.8.1971 1 ex. (Z.Kačenka lgt.).

Acylophorus glaberrimus Hrbst. - Moravia m.: Nesyt, 23.5.1968 1 ex. (J.Horák lgt.).

Mycetoporus piceolus Muls.Rey - Moravia m: Lomy, 7.7.1971 1 ex.; Mutěnice, 16.11.1971 1 ex. (Kačenka lgt.); Čejč, 5 ex. (Roubal lgt.).

Mycetoporus forticornis Fauv. - Bohemia c.: Dolní Bezděkov, 23.4.1971 1 ex. (K.Mařík lgt.); Moravia m.: Lanžhotský prales, 15.10.1971 1 ex. na mezi (J.Strejček lgt.).

Mycetoporus niger Fairm. - Moravia m.: Lomy, 7.8.1971 1 ex. (Z.Kačenka lgt.).

Bryoporus crassicornis Maekl. - Bohemia m.: Bor u Třeboně, 8.5.1967 1 ex. (Karas lgt.).
Jeden z nejméně známých Tachyporinů. Z Čech první údaj, z Moravy je znám starý údaj Wankův, ze Slovenska jsou jen staré údaje Roubalovy.

Tachinus marginatus Gyll. - Slovakia b.: Tvarožná, 8.8.1960 1 ex. (J.Valeš lgt.).

Tachinus bipustulatus F. - Bohemia or.: Deštná, 15.4.1961 1 ex. (Hrozinka lgt.).

Myllaena gracilicornis Fairm. - Bohemia c.: Klánovice, 2.6.1973 5 ex. vyplavováním břehu potoka. Společně s Deinopsis erosa a Trogopholoeus sp.

Encephalus complicans Westw. - Bohemia c.: Čelákovice, III.1975 1 ex. v prosevu mechu na břehu tůně (Švihla lgt.); Moravia m.: Mutěnice, VI.1974 1 ex. (Ernest lgt.).

Euryusa optabilis Heer - Bohemia m.: Třeboň, 24.6.1973 1 ex. u Lasius brunneus spolu s E.sinuata; tamtéž 2 ex. (Roubal lgt.); Slovakia: Zvolen, 7.10.1924 2 ex. (J.Roubal lgt.).

Tachyusida gracilis Er. - Slovakia or.: Remetské Hámre, 23.5.1975 1 ex. pod kůrou jedle ve společnosti Lasius brunneus (Bílek,Boháč,Werner lgt.). Tento "pralesní relikt" sbírán naposled Machulkou (1935) u Košic a Dvořákem v Ruské Porubě.

Autalia longicornis Scheerp. - Bohemia m.: Hluboká nad Vltavou,Chotýčany, 9.9.1972 3 ex. (J.Strejček lgt.).

Alaobia scapularis Th. - Bohemia c.: Dolní Bezděkov, 15.6.1971 1 ex. (K.Mařík lgt.); Slovakia m.: Silica, VII.1962 2 ex. (R.Rous lgt.).

Atheta malleus Joy - Bohemia b.: Ústí nad Labem,Chabařovice, 19.8.1967 1 ex. v prosevu u tůně (J.Strejček lgt.).

Atheta melanocera (Thoms.) - Bohemia c.: Praha-Kundratice, I.1966 1 ex. (R.Rous lgt.).

Atheta sequanica (Bris.) - Slovakia m: Štúrovo, V.1964 1 ex. (Rous lgt.).

Atheta clancula (Er.) - Moravia m.: Břeclav, 22.4.1972 1 ex. pod dubem s mravenci (J.Strejček lgt.); Slovakia m:: Jur pri Bratislave, V.1965 (R.Rous lgt.).

Atheta hepatica Thoms. - Bohemia c.: Praha-Prokopské údolí, 28.4.1974 2 ex. (Rath lgt.); Veltrusy, 30.4.1974 3 ex., Čelákovice, VII.1954 1 ex. (R.Rous lgt.); Bohemia or. Hradec Králové, 30.4.1971 1 ex.

(J.Jindra lgt.); Nová Ves-Čermná nad Orlicí, 7.5.1973 1 ex. (Laibner lgt.); Bohemia b.occ.: Žatec-Dolánky, V.1973 1 ex. na skalní stepi (J.Strejček lgt.); Slovakia c.: Muráň, VII.1972 1 ex. (Král lgt.); Slovakia or.: Remet.Hámre, 24.5.1975 4 ex. v prosevu Druh je patrně daleko hojnější než se uvádí.Hlavně v chodbách myší.

Atheta monticola Thoms. - Bohemia m.: Šumava, VIII.1964 1 ex. (R. Rous lgt.).

Atheta repanda Muls.Rey (britanniae Bernh.) - Bohemia c.: Křivoklát - - Oupoř, 28.5.1971 1 ex. v listnatém lese (J.Strejček lgt.); Bohemia b.: Krkonoše, VII.1963 1 ex. (R.Rous lgt.); Bohemia m.: Šumava, VII.1964 1 ex. (R.Rous lgt.); Slovakia or.: Nová Sedlica, VIII.1968 2 ex.(R.Rous lgt.).
Tento druh byl nedávno hlášen jako nový pro území Československa.

Atheta liturata Steph. - Moravia m.: Lednice, park, 22.5.1971 2 ex. (J.Strejček lgt.).

Atheta nigritula Grav. - Bohemia c.: Dolní Bezděkov, 15.6.1971 1 ex. (K.Mařík lgt.); Bohemia b.: Mimoň, 1 ex. (Mikvas lgt.); Moravia m.: Mutěnice, 25.8.1970 více ex. (Z.Kačenka lgt.).
První údaj z Moravy .

Atheta paracrassicornis Brund. - Bohemia m.: Boubín, VIII.1964 1 ex. (R.Rous lgt.); Šumava, VIII.1964 1 ex. (R.Rous lgt.); Slovakia or.: Nová Sedlica, VIII.1965 2 ex. (R.Rous lgt.).
První nález z Čech.

Atheta nitidula Kr. - Bohemia b.: Krkonoše-Malý Šišák, 18.9.1961 1 ex. (J.Strejček lgt.); Bohemia m.: Horská Kvilda, 17.4.1961, 18.3.1961 2 ex. v prosevu Sphagnum (sběr PŘF UK,Praha).

Atheta oblongiuscula (Sharp) - Slovakia: Muráň, VI.1966 1 ex.(Rous lgt).

Atheta pagana Er. - Bohemia b.: Krkonoše- Velké Kolo, 6.8.1963 2 ex. v 1400 m. (R.Rous lgt.).

Atheta dadopora Thoms. - Bohemia m.: Hluboká nad Vltavou-Chotýčany, 9.9.1972 3 ex. (J.Strejček lgt.).

Atheta deplanata Grav. - Bohemia c.: Praha-Císařské louka, 20.11.1971 2 ex. v dutině topolu.

Megacrotona lateralis Mannh. - Bohemia b.: Krkonoše, VIII.1963 3 ex. (R.Rous lgt.); Slovakia c.: Moštěnice, VII.1971 1 ex. ; Zvolen, V.1953 1 ex. (R.Rous lgt.).

Zyras hampei Kr. - Moravia m.: Břeclav-Pohansko, 13.4.1971 4 ex. v lužním lese (J.Strejček lgt.).

Zyras plicatus Er. - Bohemia c.: Žatec, 9.5.1974 1 ex. smýkán na hlinité stepi (J.Strejček lgt.); Slovakia m.: Kováčov, 11.-13.5. 1973 1 ex. (J.Horák lgt.).

Zoosetha procidua Ganglb. - Bohemia c.: Dražič, II.1966 6 ex. (J.Strejček lgt.).

Devia prospera Er. - Moravia m.: Horní Věstonice, 6.7.1967 3 ex. (Volák lgt.).

Stichoglossa semirufa Er. - Moravia: Střelice, 12.12.1963 1 ex. (Reška lgt.).
První konkrétní údaj z Moravy.

Aleochara vagepunctata Kr. - Bohemia c.: Hostivice u Prahy, 12.2.1961 1 ex. v hnízdě krtka (Talpa europaea) (J.Strejček lgt.).

Aleochara breiti Ganglb. - Bohemia c.: Srbsko, 14.4.1971, V.1975 více ex. v hnízdě sysla.

Aleochara cuniculorum Kr. - Moravia m.: Bzenec, 14.4.1974 7 ex. v hnízdě sysla (J.Strejček lgt.).

Aleochara ruficornis Grav. - Bohemia c.: Veltrusy, 29.4.1972 1 ex. pod kmenem pod nímž byly také myší chodby; Bohemia b.: České Středohoří-Kajba, 22.4.1972 1 ex. (sběr PŘF UK,Praha).

Aleochara erythroptera Grav. - Bohemia c.: Čelákovice, V.1972 2 ex. (Vl.Švihla lgt.); Slovakia: Fiľakovo, 9.5.1973 1 ex. v ovčím trusu (Sv.Bílý lgt.).

Souhrn

V práci jsou uvedeny nové nálezy 95 druhů vzácných nebo zajímavých drabčíků. Tři druhy : Hypomedon debilocornis (Woll.), Scopaeus minimus Er. a Stenus indifferens Puthz jsou nové pro Československo. Eusphalerum atrum Heer je první spolehlivý údaj z Moravy, Phyllodrepa puberula Bernh. je druhý údaj z Čech, Planeustomus heydeni Esp. je třetí údaj ze Slovenska. Stenus maculiger Weise , který byl nedávno hlášen jako nový pro naše území, je znovu potvrzen. Jsou uvedeny nové nálezy Rugilus mixtus Lohse a Quedius balticus Korge a Bryoporus crassicornis M. je poprvé hlášen z Čech.

Zajímavý je nález druhu Olophrum transversicolle Luze, známeho zatím jen z Alp, Šumavy a severní Evropy. Jsou uvedeny nové nálezy Zyras plicatus Er. a Tachyusida gracilis Er. společně s některými druhy tribu Callicerini.

S u m m a r y

In the present paper there are reported new findings of 95 rare and remarkable Staphylinid species. Three species: Stenus indifferens Puthz, Hypomedon debilicornis (Woll.) and Scopaeus minimus Er. are new for Czechoslovakia. Eusphalerum atrum Heer is from Moravia for the frist time reliable reported, Phyllodrepa puberula Bernh. is the second find in Bohemia, Planeustomus heydeni Epp. is the third find in Slovakia. Stenus maculiger Weise, which was reported from Slovakia recently. is now mentioned again. New date on Rugilus mixtus Lohse and Quedius balticus Korge in Czechoslovakia are presented. Bryoporus crassicornis Maekl. is the new species for Bohemia. Notable find of Olophrum transversicolle Luze, which species has been known to this time from Alps, Šumava and noathern Europe only, is reported now. Funther new finds of Zyras plicatus Er., Tachyusida gracilis Er. and some species from tribus Callicerini are given.

L i t e r a t u r a

C o i f f a i t H., 1970: Staphylinidae nouveaux ou mal connus de la région paléarctique occidentale. Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 106: 99 - 111.

F l e i s c h e r A., 1927-1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. Brno, 4,485 pp. Zvláštní otisk z Časopisu Moravského zemského muzea, roč. 25 - 29.

H o r i o n A., 1963: Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer, 9, Staphylinidae 1. Teil (Micropeplinae bis Euaeatethinae). Überlingen-Bodensee.

- 1965: Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer, 10, Staphylinidae 2. Teil (Paederinae bis Staphylininae). Überlingen-Bodensee.

- 1967: Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer, 11, Staphylinidae 3. Teil (Habrocerinae bis Aleocharinae). Überlingen-Bodensee.

P u t h z V., 1972: Beiträge zur Kenntnis der Steninen. Philippia, 1 / 4: 213 - 214.
R o u b a l J., 1930: Katalog Coleopter Slovenska a Podkarpatska I., Bratislava.
S m e t a n a A., 1957: Systematické a faunistické poznámky ke zvířeně drabčíků Československa III. Čas. Čs.spol.ent. 54: 246 - 262.
- . . 1958: Drabčíkovití - Staphylinidae. 1.část: Staphylininae. Fauna ČSR, 12, NČSAV Praha, 435 pp.
- 1963: Příspěvek k poznání zvířeny drabčíků Slovenska. Ac. rer.nat.Mus.Nat.Slov.,Bratislava 9: 64 - 67.
- 1964: Systematické a faunistické poznámky ke zvířeně drabčíků Československa VI. Čas. Čs.spol.ent. 61: 162 - 172.
S z u j e c k i A., 1965: Zarlinki (Euaesthetinae) i kiepurki (Paederinae), Staphylinidae - Kusowate, 2.czesc. Klucze do oznaczania owadów Polski 19, 24 c. Warszawa, 72 pp.

Adresa autora (Anschrift des Autors):
Jaroslav Boháč, W.Piecka 90, 100 00 Praha 10.